

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-002951

159882

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 4430

Société : RAN

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : Fer EL Ward Lahmssine

Date de naissance :

Adresse : 102 Angle Rue Ned EL Haqqani Res. la perle
Appt 38 Bourgogne

Tél. : 0667772332 Total des frais engagés : 1000000 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr Wataa OUAHID
Psychiatre
183, Appt 6, Etg 3, Bd. Med V Berrechid
شارع محمد الخامس برشيد
الطبقة 3، شارع محمد الخامس برشيد
Tél: 05 22 51 65 52 - Gsm: 06 73 64 70 70
INPE: 071208466

Date de consultation : 21/04/2023

Nom et prénom du malade : El Ward Moulane Age : 22 ans

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : affection psychiatrique

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 05/05/2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient.	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/04/2023	C2	300 DH	Mr. Wafaa OUAHID Psychiatre Etg 6, Bd. Med V Bouskoura 55 52 - Gsm: 06 73 64 70 13 071208466	13

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Montant de la Facture
 PHARMACIE CHABOD BERRECHID 22-32-42-30	45,50  PHARMACIE CHABOD BERRECHID 22-32-42-30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 D 00000000 00000000 35533411 11433553 B	G	COEFFICIENT DES TRAVAUX
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DU en pédopsychiatrie

DU en thérapie cognitivo-comportementale

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca

Ex psychiatre à l'hôpital psychiatrique Er-razi de Salé

Ex Médecin chef du service psychiatrique au CHP Essaouira

Ex psychiatre à l'hôpital psychiatrique de Berrechid



دبلوم جامعي في الطب النفسي للأطفال

دبلوم جامعي في العلاج السلوكي المعرفي

خريجة كلية الطب الدار البيضاء

طبيبة سلامة مستشفى الطب النفسي الرازي سلا

طبيبة سابقة بقسم الأمراض النفسية المستشفى الإقليمي المصيرة

طبيبة نفسية سابقة بمستشفى الأمراض العقلية برشيد

د.وفاء وحيد

Dr.Wafa OUAHID

طبيبة نفسانية

Psychiatre psychothérapeute

14/04/2023

Mr El Ward Marwan E

12250

1
un
u
2 -

Vyo zexacie Layali

MAROC PHARMACIE CHAIBBOUABA
alia Senna
Docteur
Layali 12
Bd Moham
TEL: 05 22 42 30

Sedatif PC

2 - 0 - 2

RV dans 01 ماه

15/05/2023

الدكتورة وفاء وحيد
طبيبة نفسانية
Dr. Wafa OUAHID Psychiatre
183, Appt 6, Bdg 3, Bd. Med V Berrechid
Tel: 05 22 51 65 52 - GSM: 06 73 64 70 70
INPE: 071208466

PHARMACIE CHAIBBOUABA



+212 (0) 6 66 13 70 32



wafaoua@gmail.com

Sédatif PC

COMPRIMÉ

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **SÉDATIF PC, comprimé** et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 3- Comment prendre **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SÉDATIF PC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états anxieux et émotifs, les troubles mineurs du sommeil.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SÉDATIF PC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec SÉDATIF PC, comprimé :

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SÉDATIF PC, comprimé n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains comprimé

Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

BOTTU SA
PPV: 45 DH 60

Sédatif PC

COMPRIMÉ

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 7 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

- 1- Qu'est-ce que **SÉDATIF PC, comprimé** et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 3- Comment prendre **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver **SÉDATIF PC, comprimé** ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SÉDATIF PC, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états anxieux et émotifs, les troubles mineurs du sommeil.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SÉDATIF PC, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Faites attention avec SÉDATIF PC, comprimé :

Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SÉDATIF PC, comprimé n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains comprimé

Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

BOTTU SA
PPV: 45 DH 60

VYOXET® 20 mg

Gélule - Boîtes de 14 et 28

Fluoxétine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que VYOXET 20 mg, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VYOXET 20 mg, gélule ?
3. Comment prendre VYOXET 20 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver VYOXET 20 mg, gélule ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE VYOXET 20 mg, GÉLULE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

VYOXET 20 mg, gélule, contient une substance active, la fluoxétine, et fait partie d'un groupe de médicaments appelés antidépresseurs inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS).

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter :

Chez l'adulte :

- soit un épisode dépressif,
- soit des troubles obsessionnels compulsifs,
- soit la boulimie : VYOXET est utilisé en complément d'une psychothérapie pour la diminution de la fréquence des crises de boulimie, des vomissements ou de la prise de laxatifs.

Comment VYOXET fonctionne ?

Tout le monde possède dans son cerveau une substance appelée sérotonine. Les personnes qui sont déprimées, qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs ou de boulimie ont des taux moins élevés de sérotonine que les autres. Le fonctionnement de VYOXET et des autres ISRS n'est pas totalement expliqué mais ils pourraient aider à augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Traiter ces maladies est important pour vous aider à vous sentir mieux. Si elle n'est pas traitée, votre maladie peut ne pas disparaître, peut s'aggraver et être plus difficile à soigner. Il est possible qu'il soit nécessaire que vous suiviez votre traitement pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois afin de s'assurer que les symptômes disparaissent.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE VYOXET 20 MG, GÉLULE ?

Ne prenez jamais VYOXET 20 mg, gélule :

- Si vous êtes allergique à la fluoxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Si vous développez une éruption cutanée ou d'autres réactions allergiques (tels que démangeaisons, un gonflement des lèvres ou du visage, ou un essoufflement), arrêtez tout de suite les gélules et contactez votre médecin immédiatement.

- Si vous prenez d'autres médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs non sélectifs et irréversibles de la monoamine oxydase (IMAOs) en raison de la survenue possible de réactions graves voire fatales (par exemple l'iproniazide utilisé pour traiter des dépressions).

Le traitement par VYOXET ne doit être ce l'IMAO non sélectif et irréversible.

Ne prenez aucun IMAO non sélectif semaines après l'arrêt de votre traitement prescrit pendant une longue durée et/ou à envisager un intervalle de temps plus long.

• Si vous prenez du métaproloïl (pour traiter augmentation du risque que votre cœur va Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien dans les situations suivantes :

- Problèmes cardiaques.
- Début de fièvre, spasme musculaire ou trouble mental tels que confusion, irritabilité et syndrome appelé « syndrome sérotoniné neuroleptiques ». Bien que ce syndrome menacer le pronostic vital, contactez votre traitement par VYOXET pourrait devoir être

• Manie ou antécédents de manie : en cas de survenue, contactez votre médecin immédiatement, il pourrait arrêter VYOXET.

• Antécédent d'anomalies de la coagulation ou apparaissances inhabituelles.

• Prise de médicaments qui agissent sur la coagulation.

Autres médicaments et VYOXET 20 mg, gélule :

• Convulsions ou antécédents d'épilepsie : en cas de constatez que la fréquence des crises augmente, immédiatement, il pourrait arrêter le traitement par VYOXET.

• Electroconvulsothérapie en cours.

• Traitement en cours par le tamoxifène (utilisé dans le sein) : voir rubrique « Autres médicaments et VYOXET 20 mg, gélule ».

• Impatiences, impossibilité de rester assis ou debout

Une augmentation de
• Diabète : votre métabolisme d'antidiabétique autre
• Maladie du foie : votre traitement.
• Rythme cardiaque : carence en sel suite à l'utilisation de traitements.
• Traitement en cours : Glaucome (augmentation de la pression oculaire).
Idées suicidaires et anxiété

Si vous souffrez de idées suicidaires. Ces manières d'antidépresseur, car elles peuvent être plus.

Vous êtes particulièrement sensible à certains cas suivants :

- si vous avez déjà eu une tentative de suicide.
- si vous êtes un jeune présentant une maladie mentale.

En cas de survie immédiatement vous pouvez vous faire aider.

Vous pouvez vous faire aider si vous êtes dépressif ou si vous avez envie de lire cette notice. Vous pouvez également aider votre comportement.

Dysfonction sexuelle

Les médicaments peuvent provoquer des symptômes de dysfonction sexuelle. Ces symptômes se sont également rencontrés.

Autres médicaments et VYOXET

Informez votre médecin ou pharmacien pourriez prendre tous les médicaments.

Ne prenez pas VYOXET avec :

• Certains IMAOs non sélectifs (qui peuvent entraîner la dépression) : les IMAOs peuvent interagir avec VYOXET (voir rubrique « Autres médicaments et VYOXET »).

• Le métaproloïl lorsqu'il y a une augmentation de la pression artérielle. VYOXET peut modifier la réponse à ce médicament (interaction) :

- Le tamoxifène (utilisé pour traiter certaines maladies) peut modifier les concentrations de tamoxifène et décider de changer de médicament.

• Les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAOS) peuvent modifier les concentrations de monoamine oxydase et décider de changer de médicament.

• Les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAOS) peuvent modifier les concentrations de monoamine oxydase et décider de changer de médicament.

LOT : 221202
EXP : 08/2025
PPV : 132,50 DH

VYOXET
Fluoxétine

28 Gélules



6 118 000 083252