

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0017692

119556

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 4182 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : A. MAI RAHAL

Date de naissance : 1941

Adresse : SALMA FILM 28 RUE 32 NE 07 CASABLANCA

Tél. : 0656212055 Total des frais engagés : 1111 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 06 AVR 2023

Nom et prénom du malade : MESKAoui FATIMA Age : 80 ans

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Tremblement main droite

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : MASA Le : 03/05/2023

Signature de l'adhérent(e) : AP

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin
06 AVR 2023	Y		15000	Docteur L.YIRI Cabinet Général Médecin de Boulane 33 Avenue EL Jadida Casablanca Appt. 3 Salmia Casablanca Medecine Generale Avenue EL Jadida Casablanca App. 3 Salmia Casablanca
25 AVR 2023	urtole			

PHARMACIE

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Praticien :
Dr. YIRI CASABLANCA
226, Boulevard Al Joubert
Salmia 2 - Casablanca
Tél.: 05 22 38 01 47
ICE : 00211585400002
N.P.E : 092004506

Date

Montant de la Facture

06/04/23

73,70

+ 76,20

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
L'ANALYSE MEDICAL DR. YIRI ZOHIR 226, Boulevard Al Joubert Salmia 2 - Casablanca Tél.: 05 22 38 01 47 ICE : 00211585400002 N.P.E : 092004506	25/04/23	B 560	420,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CŒFFICIENT DES TRAVAUX

O.D.F PROTHÈSES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G		



[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CŒFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

CŒFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

Docteur Ahmed LIYIRI

MEDECINE GENERALE
ECHOGRAPHIE
DIABETOLOGIE
Ex. MEDECIN CHEF
DU CENTRE SANTE SALMIA
TEL : 05 22 55 10 69



الدكتور أحمد لييري

الطب العام
الفحص بالصدى
علاج داء السكري
رئيس المركز الصحي السالمية سابقا
الهاتف : 05 22 55 10 69

Casablanca, le الدار البيضاء في

06 AVR 2023

MESKAOUI FATHIMA

60140 SIDI BOUABA
1 wef, la boite x 10 ✓
13,30 - Afzane ✓ N° 101538
ref, la boite x 20 ✓

7370

PHARMACIE FADILA-CASABLANCA
Mme FILALI GUENNOUIN lotissam
226, Boulevard Al Joulane
Salmia 2 - Casablanca
Tél.: 05 22 78 01 47
ICE : 002115854000092
I.N.P.E : 092004506



Docteur Ahmed LIYIRI
Médecin Générale
Avenue El Joudane B Immeuble 33
Appt 3 Salmia Casablanca

شارع الجولان « ب » العمارة 33 شقة 3 السالمية عمالة مقاطعات بن امسيك - الدار البيضاء
Bd. Al Joulane B immeuble 33 Appt 3 Salmia Prefecture des Arrondissements Ben M'Sik - Casablanca

Artane® 5 mg

Chlorhydrate de Trihexyphénidyle

Comprimés

SANOFI

Avertissement

- Des perturbations des cas avertis
- Ne pas arrêter le médical.
- En cas d'antécédent (tel que constipation grave)
- ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

LOT
PER.08.2025

ARTANE 5 MG
CR B20
P.P.V.13DH30



6 118000 060314

Autres médicaments et ARTANE 5 mg, comprimé

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse, Allaitement et fertilité

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Allaitement

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSEZ ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la vision ou de l'attention, rendant la conduite des véhicules dangereuse.

ARTANE 5mg, comprimé contient du lactose (140,7 mg par comprimé) et de l'amidon de blé (gluten).

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient une très faible teneur en gluten (provenant de l'amidon de blé) et est donc peu susceptible d'entraîner des problèmes en cas de maladie cœliaque. Un comprimé sécable ne contient pas plus de 8,67 microgrammes de gluten.

Si vous avez une allergie au blé (différente de la maladie cœliaque), vous ne devez pas prendre ce médicament (voir rubrique « Ne prenez jamais ARTANE 5 mg, comprimé »).

3. COMMENT PRENDRE ARTANE 5 mg, comprimé ?

Posologie

La posologie est variable et doit être adaptée à l'intensité

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE ARTANE 5 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique : ANTI-PARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE - code ATC : N04AA01

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ARTANE 5 mg, comprimé ?

Ce médicament est recommandé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ARTANE 5 mg, comprimé dans les cas suivants :

si vous êtes allergique au chlorhydrate de trihexyphenidyle ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- si vous êtes allergique au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Di-INDO®

(Indométhacine calcique pentahydraté)

1 - DENOMINATION DU MEDICAMENT

- DI-INDO® Comprimés dispersibles dosés à 25 mg en comprimés.
- DI-INDO® Comprimés effervescents à 25 mg en boîtes de comprimés.
- DI-INDO® Gélules dosées à 25 mg (imprimées « DI-INDO® 25 ») orange en boîtes de 30 gélules.
- DI-INDO® Comprimés effervescents dosés à 50 mg en comprimés.
- DI-INDO® Comprimés dispersibles dosés à 50 mg en comprimés.
- DI-INDO® Suppositoires dosés à 50 mg en boîtes de 10 sup.
- DI-INDO® Suppositoires dosés à 100 mg en boîtes de 10 sup.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

2 - COMPOSITION DU MEDICAMENT

- DI-INDO® Comprimés dispersibles à 25 mg

Indométhacine calcique pentahydrate 25 mg
Excipients : Crospovidone, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, saccharine sodique, arôme ananas poudre atomisée E9819356, lactose monohydrate.

- DI-INDO® Comprimés effervescents à 25 mg

Indométhacine calcique pentahydrate 25 mg
Excipients : Acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, saccharine sodique, arôme pamplemousse poudre 17019455, benzoate de sodium, antimousse PD 30, doucette de sodium, alcool éthylique 96%, eau purifiée.

- DI-INDO® Gélules à 25 mg

Indométhacine calcique pentahydrate 25 mg
Excipients : Silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, lécithine de soja purifiée, carboxyméthyl amidon sodique, lactose monohydrate. Enveloppe de la gélule : gélatine, dioxyde de titane, jaune de quinoléine, jaune orange FCF, calibrage n° 2.

- DI-INDO® Comprimés effervescents à 50 mg

Indométhacine calcique pentahydrate 50 mg
Excipients : Saccharine sodique, arôme pamplemousse, benzoate de sodium, acide citrique anhydre, bicarbonate de sodium, siméthicone émulsion, doucette de sodium, alcool éthylique 96%, eau purifiée.

- DI-INDO® Comprimés dispersibles à 50 mg

Indométhacine calcique pentahydrate 50 mg
Excipients : Silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, crospovidone, saccharine sodique, arôme ananas poudre atomisée E9819356, lactose monohydraté, cellulose microcristalline.

- DI-INDO® Suppositoires à 50 mg

Indométhacine calcique pentahydrate 50 mg
Excipients : Glycérides hémisynthétiques solides, Glycerides polyglycolysés saturés.

- DI-INDO® Suppositoires à 100 mg

Indométhacine calcique pentahydrate 100 mg
Excipients : Glycérides hémisynthétiques solides, Glycerides polyglycolysés saturés.

LISTES DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

- * Comprimé dispersible : Lactose.

- * Gélule : Lactose.

* Comprimé effervescent : Sodium : environ 596 mg de sodium par comprimé effervescent à 25 mg et environ 592 mg de sodium par comprimé effervescent à 50 mg.

3 - CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE OU TYPE D'ACTIVITE

Anti-inflammatoire non stéroïdien, inhibiteur préférentiel de la cyclooxygénase-2 (COX-2).

4 - INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans) :

- en traitement de longue durée de :
 - certains rhumatismes inflammatoires chroniques,
 - certaines arthroses sévères;
 - en traitement de courte durée de :
 - certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinites,

DI-INDO® 100 mg 10 suppositoires

PPU 60DH40
EXP 08/2025
LOT 28008 3

le
U
A
5

..... primés
. 1 à 3 comprimés dispersibles ou comprimés effervescents à 50 mg en doses fractionnées par jour.

Durée du traitement

DI-INDO® doit être utilisé aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin l'aura conseillé.

Si vous avez pris plus de DI-INDO® que vous n'auriez dû : en cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

6 - CONTRE-INDICATIONS

Ne prenez jamais DI-INDO®, dans les cas suivants :

- au delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
- antécédent d'allergie à l'un des excipients,
- antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
- hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
- maladie grave du foie,
- maladie grave du rein,
- maladie grave du cœur,
- enfant de moins de 15 ans.

EN CAS DE DOUBTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7 - EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, DI-INDO® est susceptible d'entraîner des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les médicaments tels que DI-INDO® pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

- Peuvent survenir :
 - des réactions allergiques :
 - * cutanées de type éruption, urticaire, démangeaisons, inflammation des vaisseaux sanguins, rougeur, exceptionnellement : éruption cutanée lors d'une exposition au soleil;
 - * respiratoires de type crise d'asthme, œdème pulmonaire;
 - * générales, brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke),
 - rarement, un décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps,
 - rarement, jaunisse.
 - Dans certains cas rares, il est possible que survienne une hémorragie digestive.

Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.

Dans tous ces cas, arrêter le traitement et avertir un médecin

- Peuvent survenir également :
 - des troubles digestifs : maux d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, constipation,
 - des maux de tête, vertiges, fatigue intense, confusion mentale, syncope, somnolence, insomnie, angoisse, convulsions,
 - des troubles psychiques : délires, hallucinations,
 - des troubles neurologiques : atteinte des nerfs des membres, mouvements involontaires, faiblesse musculaire et plus rarement, fourmillements, difficultés d'élocution,
 - des troubles visuels : rarement, douleurs des orbites, vision trouble,
 - des troubles du fonctionnement des reins,
 - des troubles de l'audition : rarement, surdité,
 - des troubles cardiaques : rarement, hypo ou hypertension, palpitations, douleur thoracique, troubles du rythme, œdèmes périphériques,



LABORATOIRE D'ANALYSES
MÉDICALES SALMIA

DR. MAHI ZOHIR

Ex Biologiste à CHU-Casablanca

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALESL SALMIA

مختبر التحاليل الطبية السالمية

Diplômé d'Etude Spécialisé en Immunologie
Hematologie - Bacteriologie - Virologie
Biochimie - Parasitologie - Mycologie

CASABLANCA le: 25/04/2023

FACTURE N° 2483/23

Médecin

Docteur AHMED LIYIRI

Nom du patient

MME MESKAOUI FATIMA

Examens

- NFS- AU- VITD3

Cotation

B 560

Montant

420,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de: QUATRE CENT VINGT DIRHAMS

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES SALMIA
N°939 EL JOLANE SALMIA 2 CASA
TEL: 03 00 54 01 30 / 03 00 54 00 75

Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30, Le Samedi de 8h à 12h30

N°9, Boulevard Al Joulane, Salmia 2, Ben Msik - Casablanca - Tél/Fax : 08 08 54 01 30 - Email : laboratoire.salmia2@gmail.com

IF : 50351577 - INPE : 093061497 - ICE : 003034168000075 - Prélèvement à domicile sur RDV : +212 664 081 080

Docteur Ahmed LIYIRI

MEDECINE GENERALE

ECHOGRAPHIE

DIABETOLOGIE

Ex. MEDECIN CHEF
DU CENTRE SANTÉ SALMIA

TEL : 05 22 55 10 69



الدكتور أحمد لييري

الطب العام

الفحص بالصدى

علاج داء السكري

رئيس المركز الصحي السالمية سابقا

الهاتف : 05 22 55 10 69

Casablanca, le الدار البيضاء في

25 AVR 2023

Mme MESTAKOUI FATIMA

49,60

Ⓐ Dure 100.000

(S.V)

rauf 15 Jours x 45 ♂

13,30 x 2 26,60

Ⓐ Anfaue <

(S.V)

rauf x 60 Jours

76,20

PHARMACIE FILALI CASABLANCA

Mme FILALI GUENNOUN Ibtissam

226, Boulevard Al Joutane

Salmia 2 - Casablanca

Tél. 05 22 38 01 47

ICE : 00215854000092

I.N.P.E : 092004506



Dr. Ahmed LIYIRI
Medecine Générale
Avenue El Joutane B Immeuble 33
Appt. 3 Salmia Casablanca

شارع الجولان « ب » العمارة 33 شقة 3 السالمية عمالة مقاطعات بن امسيك - الدار البيضاء
Bd. Al Joulane B immeuble 33 Appt 3 Salmia Prefecture des Arrondissements Ben M'Sik - Casablanca

vision ou de l'attention, rendant la conduite des véhicules dangereuse.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Lactose : 140,7 mg par comprimé de 5 mg.

Amidon de blé (gluten).

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

La posologie est variable et doit être adaptée à l'intensité des troubles ainsi qu'à la susceptibilité individuelle de chaque patient.

Elle est de 1 à 2 comprimés par jour en moyenne.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré, durée du traitement

SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas d'ingestion massive, contacter immédiatement un médecin ou votre centre anti-poison.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- sécheresse de la bouche,
- troubles de la vision,
- rétention urinaire,
- constipation.

Ces effets sont plus fréquents chez les personnes âgées qui sont plus sensibles au traitement et qui

peuvent manifester aussi une agitation ou des troubles psychiques, éventuellement dus à un dosage inadapté.

Si ces troubles surviennent, demandez avis à votre médecin pour ajuster la posologie.

Ont été signalés quelques cas :

- d'inflammation du tissu de soutien des dents, secondaire à la sécheresse de la bouche,
- d'éruptions cutanées,
- de dilatation du côlon,
- d'occlusion intestinale.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Titulaire d'AMM au Maroc :

sanofi-aventis Maroc. Route de Rabat R.P.1,
Aïn Sebaâ, Casablanca.

Lahcen BOUCHAOUIR, Pharmacien Responsable.

Nom et adresse du fabricant :

Maphar. Km 10, Route côtière 111, QI-Zenata,
Aïn Sebaâ, Casablanca.



Artane® 5 mg

Chlorhydrate de Trihexyphénidyle

Comprimés

SANOFI

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle 5 mg
 Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (l'évileite), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

ATTENTION !

Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mises en garde

- Des perturbations dans tous
- En raison de la présence de certains médicaments ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, de la lactase (maladies métaboliques).

Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse – Allaitement

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

Allaitement

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la

P.F.R.: 09/2008
LOT: 22Z008

ARTANE 5MG
CP B20

P.P.V : 13DH30

6 118000 060314

P.P.V : 49,60 DH

LOT: 22127

EXP: 09/2025

Docteur Ahmed LIYIRI

MEDECINE GENERALE
ECHOGRAPHIE
DIABETOLOGIE
Ex. MEDECIN CHEF
DU CENTRE SANTÉ SALMIA
TEL : 05 22 55 10 69



الدكتور أحمد لييري

الطب العام
الفحص بالصدى
علاج داء السكري
رئيس المركز الصحي السالمية سابقا
الهاتف : 05 22 55 10 69

Casablanca, le

06 AVR 2023

الدار البيضاء في

BILAN BIOLOGIQUE

Nom : NESKAOUI

Prénom : FATIMA

Age : 19 Ans Sexe : M F

Groupage sanguin

- Groupe
- Rhésus
- RAI

Hématologie/infectiologie

- NFS
- Plaquettes
- Electrophorèse de l'hémoglobine
- Réticulocytes
- VS
- CRP
- Procalcitonine

Bilan d'hémostase

- TP
- INR
- Fibrinogène

Bilan lipidique

- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL
- Triglycérides

Bilan glycémique

- Glycémie à jeun
- Hyperglycémie provoquée
- Hémoglobin glyquée

Bilan martial

- Fer sérique
- CTF
- Ferritine
- Transferrine

Ionogramma sanguin

- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Phosphore
- Magnésium
- Protéines
- Acide urique

Ionogramme urinaire

- Diluée
- Na+
- K+
- Cl-
- Calcium
- Phosphore
- Urée

Fonction rénale

- Urée
- Créatinine
- Clearance de la créatinine
- Protéinurie des 24h

Fonction hépatique et pancréatique

- ASAT
- ALAT
- Phosphatase alcaline
- Gamma GT
- Bilirubine libre et conjuguée
- Amylase
- Lipase
- Electrophorèse des protéines

Bactériologie

- Prélèvement vaginal
- ECBU
- ATB GRAMME

Bilan hormonal

- Estradiol
- Prolactine
- FSH
- BHCG
- T3
- T4
- TSH us

Sérologie et immunologie

- Sérologie Toxoplasmose
- Sérologie Rubéole
- VDRL
- TPHA
- Hépatite A
- Hépatite B : Antigène Hbs Antigène Hbe Anticorps Anti Hbc Anticorps Anti Hbs Anticorps Anti Hbe
- Hépatite C
- ASLO

Examen des selles

- Coprologie
- Parasitologie

Examen des selles

- Test de grossesse
- PSA
- Vitamine D2
- Vitamine D3
- CPK
- Troponin

Autres :

شارع الجولان « ب » العمارة 33 شقة 3 السالمية عمالة مقاطعات بن امسيك - الدار البيضاء
Bd. Al Joulane B immeuble 33 Appt 3 Salmia Prefecture des Arrondissements Ben M'Sik - Casablanca

Dr. Ahmed LIYIRI
Médecine Générale
Avenue EL Joulane B imm. 33
Appt. 3 Salmia Casablanca



**LABORATOIRE D'ANALYSES
MÉDICALES SALMIA**
DR. MAHI ZOHIR
Ex Biologiste à CHU-Casablanca

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALE S ALMIA

مختبر التحاليل الطبية السالمية

Diplômé d'Etude Spécialisé en Immunologie
Hematologie - Bacteriologie - Virologie
Biochimie - Parasitologie - Mycologie

Prélèvement du : 25/04/2023 à 07:37

Résultats édités le: 25/04/2023



MME MESKAOUI FATIMA

Dossier N° 23D604

Prescripteur: Docteur AHMED LIYIRI

Page: 2/2

BIOCHIMIE SANGUINE (Roche-cobas c311;c 111)

ACIDE URIQUE.....	36,00	mg/l	20,00 à 60,00 mg/l
(Colorimétrie)	214,20	μmol/l	119,00 à 357,00 μmol/l

VITAMINES

(Roche-cobas e411)

VITAMINES D : D2 + D3.....	10,11	ng/ml	(*)	30,00 à 100,00 ng/ml
(Electrochemiluminescence sur cobas E 411)				

Interprétation:

_<10ng/ml: Carence en Vitamine D

_30-80ng/ml:valeur normale

_10-30ng/ml: insuffisance en Vitamine D

_>150ng/ml:Intoxication possible par la vitamine D

Total de pages: 2

Dr MAHI ZOHIR
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES SALMIA
Boulevard Al Joulane, Salmia 2, Ben Msik - Casablanca - Tél/Fax : 08 08 54 01 30 - Email : laboratoire.salmia2@gmail.com
Nº9, Boulevard Al Joulane, Salmia 2, Ben Msik - Casablanca - Tél/Fax : 08 08 54 01 30 - Email : laboratoire.salmia2@gmail.com
IF : 50351577 - INPE : 093061497 - ICE : 003034168000075 - Prélèvement à domicile sur RDV : +212 664 081 080

Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30, Le Samedi de 8h à 12h30

Nº9, Boulevard Al Joulane, Salmia 2, Ben Msik - Casablanca - Tél/Fax : 08 08 54 01 30 - Email : laboratoire.salmia2@gmail.com
IF : 50351577 - INPE : 093061497 - ICE : 003034168000075 - Prélèvement à domicile sur RDV : +212 664 081 080



Prélèvement du : 25/04/2023 à 07:37

Résultats édités le: 25/04/2023



Prescripteur: Docteur AHMED LIYIRI

MME MESKAOUI FATIMA

Dossier N° 23D604

Page: 1/2

HEMATOLOGIE
Sysmex xn-350; xs-1000i

NUMERATION SANGUINE

GLOBULES BLANCS.....	8.000	/mm ³	4 000 à 10 000 /mm ³
GLOBULES ROUGES.....	4,67	M/mm ³	3,8 à 5,4
HEMOGLOBINE.....	12,7	g/dL	12 à 16
HEMATOCRITE.....	38,8	%	37 à 47
VGM.....	83,1	µ ³	82 à 98
TCMH.....	27,2	pg	27 à 33
CCMH.....	32,7	g/dL	32 à 36
PLAQUETTES.....	251	10 ³ /mm ³	150 à 400

FORMULE LEUCOCYTAIRE

Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi de 7h30 à 18h30, Le Samedi de 8h à 12h30

N°9, Boulevard Al Joulane, Salmia 2, Ben Msik - Casablanca - Tél/Fax : 08 08 54 01 30 - Email : laboratoire.salmia2@gmail.com

IF : 50351577 - INPE : 093061497 - ICE : 003034168000075 - Prélèvement à domicile sur RDV : +212 664 081 080