

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ○ Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| ○ Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| ○ Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.



Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 10558

Société :

Actif

Pensionné[e]

Autre :

Nom & Prénom : MESSAS

Med

Date de naissance :

Adresse :

Tél. 06.62.47.21.13

Total des frais engagés : VININ Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

**Dr YOUSSEF MDHC**  
Psychiatre - Psychothérapeute  
5 Bd. Mohamid V Lot Al Yousr 1  
er Etage 26100 - Berrechid  
el. 0522 33 66 11 Gsm 0662 47 15 92

**06 AVR. 2023**

Date de consultation :

**SINI F**

Age: 1963

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Toux de Plume

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....


Signature de l'adhérent[e] :



#### **BELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes  |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| 06 AVR 2023     | Conseil           |                       | 30000                           | Jr. YOUSSET MÜHL<br>Psychiatre - Psychothérapeute<br>5, Bd. Mohamad V Lot A Yousr 1<br>er Etage 600 Berrechid<br>é. 0522 83 00 11 Gsm 0662 17 15 92 |

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur  | Date     | Montant de la Facture |
|---|----------|-----------------------|
| <br>06/04/23 | 06/04/23 | 376,40                |

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Coefficients | Montant des Honoraires |
|---|------|------------------------------|------------------------|
|   |      |                              |                        |
|   |      |                              |                        |
|   |      |                              |                        |
|   |      |                              |                        |
|   |      |                              |                        |

## AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature<br>du Praticien | Date des<br>Soins | Nombre |     |     |     | Montant détaillé<br>des Honoraires |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
|                                     |                   | A M    | P C | I M | I V |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |
|                                     |                   |        |     |     |     |                                    |

#### **BEDEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient |                         |
|-----------------|----------------|------------------|-------------|-------------------------|
|                 |                |                  |             | Coefficient des travaux |
|                 |                |                  |             | Montants des soins      |
|                 |                |                  |             | Début d'exécution       |
|                 |                |                  |             | Fin d'exécution         |

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

**[Création, remont, adjonction]**  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

The diagram shows the upper dental arch with numbered teeth from 1 to 8 on both sides. The teeth are represented by circles with specific symbols inside:

- Teeth 1:** A circle with a vertical line through it.
- Teeth 2:** A circle with a horizontal line through it.
- Teeth 3:** A circle with a diagonal line from top-left to bottom-right.
- Teeth 4:** A circle with a diagonal line from top-right to bottom-left.
- Teeth 5:** A circle with a small circle inside.
- Teeth 6:** A circle with a cross inside.
- Teeth 7:** A circle with a vertical line and a small circle at the top.
- Teeth 8:** A circle with a vertical line and a small circle at the bottom.

A large letter **D** is positioned above the arch, pointing towards the left side. A large letter **C** is positioned to the right of the arch, pointing towards the right side. Below the arch, a large letter **B** is centered.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Youssef MOHI

Psychiatre-Psychothérapeute

Ex-Directeur de l'Hôpital Psychiatrique de Berrechid

Consultation sur rendez-vous

I.N.P : 061 01 19 53



061 01 19 53



الدكتور يوسف موهى

أخصائي في الطب النفسي و العلاج النفسي

المدير السابق بمستشفى الأمراض العقلية ببرشيد

بالموعد

ORDONNANCE

Nom: SÎNÎF FÂTTÎMÎ

le : 06 AVR. 2023

$$148.30 \times 2 = 296.60$$

PRIS D'AR 296



$$13.30 \times 6 = 79.80$$

0 - 0 - 1

Arbaa NS



~~T = 376.40~~ 2 - 0 - 2  
Dame de Mar Tenuel  
(04) Geneve Cnn



Le: 04-08-2023 à 12H30

Dr. Youssef MOHI  
Psychiatre - Psychotherapeute  
5, Bd Mohamed V LOLA Yousr 1  
1er Etage 26400 - Berrechid  
Tél: 0522 33 66 11 Gsm 0662 47 15 92

15 Bd Mohamed V Lot Yousr, 1er étage  
26120 Berrechid - à coté de la CNSS

شارع محمد الخامس تجزئة اليسر الطابق 1  
26120 برشيد - قرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

+212 (0) 5 22 33 66 11 · +212 (0) 6 62 47 15 92 · cabinetdrmohi@gmail.com

# PRISDAL®



Attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) DENOMINATION

PRISDAL®

### b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rispéridon (DCI) | 0,5 mg  |
|                  | ou 1 mg |
|                  | ou 2 mg |
|                  | ou 3 mg |
|                  | ou 4 mg |

Excipients (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalactosidé, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose ; Pelliculage: Opadry jaune (cp à 0,5 et 2 mg), Opadry orange (cp à 0,5 et 3 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 4 mg)

### c) FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés.

### d) PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30.

### e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

AUTRES ANTIPSYCHOTIQUES (CODE ATC : N05AX08).

### 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

- Traitement de la schizophrénie.
- Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.
- Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les patients présentant une démence d'Alzheimer modérée à sévère ne répondant pas aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.
- Traitement symptomatique de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perturbateurs nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou un médecin très familier du traitement du trouble des conduites de l'enfant et de l'adolescent.

### 3. ATTENTION !

#### a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS LES CAS SUINTS:

- Hypersensibilité connue à la rispéridone ou à l'un des autres composants.

#### b) MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

##### UTILISER CE MEDICAMENT AVEC PRECAUTION :

- Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et démentis en prenant en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles de l'élocution ou de la vision.
- Tenir compte des propriétés alphabloquantes de la rispéridone pouvant favoriser la survenue d'une hypotension orthostatique lors de l'instauration progressive du traitement.
- Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, hypovolémie, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement du segment QT).
- Evaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une démence à Corps de Lewy.
- Possibilité d'hypoglycémie, ou d'aggravation du diabète sous traitement par la rispéridone, d'où la nécessité d'une surveillance clinique chez les personnes diabétiques ainsi que chez celles présentant des facteurs de risque.
- PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients à antécédents d'hypoproлатéinémie et chez ceux qui présentent des tumeurs partiellement prolactiné-dépendantes.

• PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des antécédents de convulsions ou d'autres situations cliniques pouvant potentiellement abaisser le seuil épileptogène.

• Un triapisme peut survenir au cours du traitement par PRISDAL donc être utilisé avec prudence en cas d'exposition à un exercice physique intense, des températures extrêmes ou lors d'un traitement concomitant par des médicaments ayant une activité anticholinergique ou tendance à la déshydratation

#### • Enfants et adolescents :

Le prescripteur est tenu de faire une évaluation complète des causes physiques et sociales du comportement agressif avant de débuter le traitement.

• A cause des effets sédatifs de la rispéridone, un suivi rapproché doit être effectué (conséquences de la sédation sur les capacités d'apprentissage).

• Du fait des effets potentiels liés à la prolactine, il faudra envisager une évaluation régulière des fonctions endocrinianes.

• Évaluer régulièrement les syndromes extrapyramidaux et autres troubles de la motricité.

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

#### c) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

##### *Effets de PRISDAL sur d'autres médicaments :*

• Augmentation du risque d'effet sédatif avec les médicaments ou substances agissant au niveau central : alcool, opiacés, antihistaminiques, benzodiazépines.

• Antagonisme de l'effet de la lévodopa et d'autres agonistes dopamnergiques.

• Effet hypotonisant lors de l'utilisation concomitante avec un traitement antihypertenseur.

##### *Effets potentiels d'autres médicaments sur PRISDAL :*

• Diminution des concentrations plasmatiques de la fraction antipsychotique active de la rispéridone avec la prise de carbamazépine, rifampicine, phénytoïne et phénobarbital (inducteurs du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine (P-gp)).

• Augmentation des concentrations plasmatiques de la rispéridone avec les inhibiteurs du CYP2D6 tels que la fluoxétine, la paroxétine, la quinidine ou l'halopéridol.

• Augmentation des concentrations plasmatiques de la rispéridone par le vérapamil, un inhibiteur du CYP3A4 et de la P-gp.

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER MATIÈREMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN A VOTRE ARRIVÉE.**

#### d) GROSSESSE ET ALLAITEMENT

**Grossesse :** PRISDAL peut être sauf en cas de nécessité, cours de la grossesse.

**Allaitement :** les avis regard des risques potentiels doivent être demandés au conseiller en pharmacien avant de prendre PRISDAL.

#### e) CONDUCTEURS

PRISDAL peut avoir un effet conduire et à utiliser le système nerveux et la doit être informé de ne pas ce que leur sensibilité individuelle.

#### f) COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

##### a) POSOLOGIE USUELLE

###### *Schizophrénie :*

**Adulte :** PRISDAL peut être délivré le traitement par 2

être augmentée à 4 mg maintenue inchangée, ou la majorité des patients bénéficient entre 4 et 6 mg. Chez certains patients, la dose initiale et d'entretien. Les posologies de plus de supérieure aux posologies augmentation de l'incidence sécurité d'emploi de posologie évaluée, et elles ne sont pas recommandées.

DAL®  
LOT 0203456  
EXP 06/25  
PPV 143DH30

més pelliculés

PRISDAL® 2 mg

30 comprimés pelliculés



recommandées.

# PRISDAL®



Attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

## 1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### a) DENOMINATION

PRISDAL®

### b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

Par comprimé pelliculé

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rispéridon (DCI) | 0,5 mg  |
|                  | ou 1 mg |
|                  | ou 2 mg |
|                  | ou 3 mg |
|                  | ou 4 mg |

Excipients (communs): Cellulose microcristalline, amidon prégalactosidé, stéarate de magnésium, hydroxypropylméthylcellulose ; Pelliculage: Opadry jaune (cp à 0,5 et 2 mg), Opadry orange (cp à 0,5 et 3 mg), Opadry blanc (cp à 1 mg), Opadry vert (cp à 4 mg)

### c) FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimés pelliculés.

### d) PRÉSENTATIONS

Boîtes de 30.

### e) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

AUTRES ANTIPSYCHOTIQUES (CODE ATC : N05AX08).

### 2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

- Traitement de la schizophrénie.
- Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux troubles bipolaires.
- Traitement de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante chez les patients présentant une démence d'Alzheimer modérée à sévère ne répondant pas aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres.
- Traitement symptomatique de courte durée (jusqu'à 6 semaines) de l'agressivité persistante dans le trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou d'autres comportements perturbateurs nécessitent un traitement pharmacologique.

Le traitement pharmacologique doit faire partie intégrante d'un programme de traitement plus large, incluant des mesures psychosociales et éducatives.

Il est recommandé que la rispéridone soit prescrite par un spécialiste en neurologie de l'enfant et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ou un médecin très familier du traitement du trouble des conduites de l'enfant et de l'adolescent.

### 3. ATTENTION !

#### a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS LES CAS SUIVANTS:

- Hypersensibilité connue à la rispéridone ou à l'un des autres composants.

#### b) MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

##### UTILISER CE MEDICAMENT AVEC PRÉCAUTION :

- Il est recommandé aux prescripteurs d'évaluer les risques et les bénéfices de l'administration de PRISDAL chez les patients âgés et démentis en prenant en compte les facteurs de risque prédictifs de survenue d'accident vasculaire cérébral tels que faiblesse ou insensibilité soudaines au niveau du visage, des bras ou des jambes, troubles de l'élocution ou de la vision.
- Tenir compte des propriétés alphabloquantes de la rispéridone pouvant favoriser la survenue d'une hypotension orthostatique lors de l'instauration progressive du traitement.
- Ce médicament sera utilisé avec prudence chez les patients à risque cardiovasculaire connu (insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, hypovolémie, troubles du rythme cardiaque, antécédents familiaux d'allongement du segment QT).
- Evaluer le rapport bénéfice-risque lors de la prescription de PRISDAL chez les patients présentant une maladie de Parkinson ou une démence à Corps de Lewy.
- Possibilité d'hypoglycémie, ou d'aggravation du diabète sous traitement par la rispéridone, d'où la nécessité d'une surveillance clinique chez les personnes diabétiques ainsi que chez celles présentant des facteurs de risque.
- PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients à antécédents d'hypoproлатéinémie et chez ceux qui présentent des tumeurs partiellement prolactiné-dépendantes.

• PRISDAL doit être utilisé avec prudence chez les patients présentant des antécédents de convulsions ou d'autres situations cliniques pouvant potentiellement abaisser le seuil épileptogène.

• Un triapisme peut survenir au cours du traitement par PRISDAL donc être utilisé avec prudence en cas d'exposition à un exercice physique intense, des températures extrêmes ou lors d'un traitement concomitant par des médicaments ayant une activité anticholinergique ou tendance à la déshydratation

• **Enfants et adolescents :**  
Le prescripteur est tenu de faire une évaluation complète des causes physiques et sociales du comportement agressif avant de débuter le traitement.

- A cause des effets sédatifs de la rispéridone, un suivi rapproché doit être effectué (conséquences de la sédation sur les capacités d'apprentissage).
- Du fait des effets potentiels liés à la prolactine, il faudra envisager une évaluation régulière des fonctions endocrinianes.
- Evaluer régulièrement les syndromes extrapyramidaux et autres troubles de la motricité.

**EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**  
**c) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES**

#### *Effets de PRISDAL sur d'autres médicaments :*

- Augmentation du risque d'effet sédatif avec les médicaments ou substances agissant au niveau central : alcool, opiacés, antihistaminiques, benzodiazépines.
- Antagonisme de l'effet de la lévodopa et d'autres agonistes dopamnergiques.
- Effet hypotonisant lors de l'utilisation concomitante avec un traitement antihypertenseur.

#### *Effets potentiels d'autres médicaments sur PRISDAL :*

- Diminution des concentrations plasmatiques de la fraction antipsychotique active de la rispéridone avec la prise de carbamazépine, rifampicine, phénytoïne et phénobarbital (inducteurs du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine (P-gp)).
- Augmentation des concentrations plasmatiques de la rispéridone avec les inhibiteurs du CYP2D6 tels que la fluoxétine, la paroxétine, la quinidine ou l'halopéridol.
- Augmentation des concentrations plasmatiques de la rispéridone par le vérapamil, un inhibiteur du CYP3A4 et de la P-gp.

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER MATIÈREMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN A VOTRE ARRIVÉE.**

#### *d) GROSSESSE ET Grossesse :*

PRISDAL® peut être sauf en cas de nécessité cours de la grossesse.

**Allaitement :** les avis regard des risques potentiels doivent être demandés au conseiller en pharmacien avant.

#### *e) CONDUCTEURS /*

PRISDAL® peut avoir un effet conduire et à utiliser le système nerveux et la doit être informé de ne pas ce que leur sensibilité individuelle.

#### *f) COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?*

##### *a) POSOLOGIE USUELLE*

###### *Schizophrénie :*

**Adulte :** PRISDAL peut être Débuter le traitement par 2 mg augmentée à 4 mg maintenue inchangée, ou la majorité des patients bénéficient entre 4 et 6 mg. Chez certains patients, la dose initiale et d'entretien Les posologies de plus de supérieure aux posologies augmentation de l'incidence sécurité d'emploi de posologie évaluée, et elles ne sont pas recommandées.

DAL®

LOT 0203456

EXP 06/25

PPV 1430H30

més pelliculés

PRISDAL® 2 mg

30 comprimés pelliculés



6 1180012 00967



# Artane® 5 mg

*Chlorhydrate de Trihexyphénidyle*

Comprimés

SANOFI

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle ..... 5 mg  
 Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (lélite), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

### Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

### Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

### ATTENTION !

#### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mises en garde spéciales

- Des perturbations psychiques peuvent survenir : dans tous les cas avertir votre médecin.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

### Grossesse – Allaitement

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

#### Allaitement

L'allaitement n'est pas recommandé.

|       |         |                 |          |
|-------|---------|-----------------|----------|
| LOT   | PER.:   | ARTANE 5MG      | le       |
| D'UN  | 08/2008 | CP B20          | O        |
| DE L' |         | P.P.V.: 13DH30  | AU COURS |
| TOUJ  |         |                 | T DE     |
| OU A  |         |                 | MEDECIN  |
|       |         |                 | PRENDRE  |
|       |         | 6 118000 060314 |          |

UN MEDICAMENT.

### Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la



# Artane® 5 mg

*Chlorhydrate de Trihexyphénidyle*

Comprimés

SANOFI

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle ..... 5 mg  
 Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (lélite), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

### Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

### Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

### ATTENTION !

#### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mises en garde spéciales

- Des perturbations psychiques peuvent survenir : dans tous les cas avertir votre médecin.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### Grossesse – Allaitement

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

#### Allaitement

L'allaitement est possible avec ce médicament. Il est recommandé de faire une consultation avec le traité. Le médicament est commercialisé sous le nom de Artane 5mg CP B20 P.P.V.: 13DH30 O AU COURS DE LA SEMAINE. PRENDRE 6 118000 060314 UN MEDICAMENT.

### Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la



# Artane® 5 mg

*Chlorhydrate de Trihexyphénidyle*

Comprimés

SANOFI

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle ..... 5 mg  
 Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (lélite), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

### Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

### Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

### ATTENTION !

#### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mises en garde spéciales

- Des perturbations psychiques peuvent survenir : dans tous les cas avertir votre médecin.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

### Grossesse – Allaitement

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

#### Allaitement

L'allaitement n'est pas recommandé. Le médicament est éliminé dans le lait maternel. Les quantités administrées sont très faibles mais elles peuvent néanmoins entraîner des effets indésirables chez l'enfant.  
 LOT 1 PER.08 D'UN CP B20 P.P.V. : 13DH30 AU COURS DE L'ALLAITEMENT. T DE TOUJOU PRENDRE O U A 6 118000 060314 E MEDECIN UN MEDICAMENT.

### Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la



# Artane® 5 mg

*Chlorhydrate de Trihexyphénidyle*

Comprimés

SANOFI

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle ..... 5 mg  
 Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (lélite), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

### Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

### Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

### ATTENTION !

#### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mises en garde spéciales

- Des perturbations psychiques peuvent survenir : dans tous les cas avertir votre médecin.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### Grossesse – Allaitement

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

#### Allaitement

L'allaitement n'est pas recommandé. Le médicament est éliminé dans le lait maternel. Les quantités administrées sont très faibles mais elles peuvent néanmoins entraîner des effets indésirables chez l'enfant.  
 LOT 1 PER.08 D'UN CP B20 P.P.V. : 13DH30 AU COURS DE L'ALLAITEMENT. T DE TOUJOU PRENDRE O U A 6 118000 060314 E MEDECIN UN MEDICAMENT.

### Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la



# Artane® 5 mg

*Chlorhydrate de Trihexyphénidyle*

Comprimés

SANOFI

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle ..... 5 mg  
 Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (lélite), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

### Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

### Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

### ATTENTION !

#### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mises en garde spéciales

- Des perturbations psychiques peuvent survenir : dans tous les cas avertir votre médecin.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### Grossesse – Allaitement

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

#### Allaitement

L'allaitement n'est pas recommandé. Le médicament est éliminé dans le lait maternel. Les quantités administrées sont très faibles mais elles peuvent néanmoins entraîner des effets indésirables chez l'enfant.  
 LOT 1 PER.08 D'UN CP B20 P.P.V. : 13DH30 AU COURS DE L'ALLAITEMENT. T DE TOUJOU PRENDRE O U A 6 118000 060314 E MEDECIN UN MEDICAMENT.

### Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la



# Artane® 5 mg

*Chlorhydrate de Trihexyphénidyle*

Comprimés

SANOFI

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Chlorhydrate de trihexyphénidyle ..... 5 mg  
 Excipients : lactose monohydraté, amidon de blé (gluten), silice colloïdale hydratée (lélite), talc, stéarate de magnésium q.s.p. un comprimé.

### Forme pharmaceutique et présentation

Comprimé, boîte de 20.

### Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIPARKINSONIEN ANTICHOLINERGIQUE

(N : Système Nerveux Central)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans la maladie de Parkinson et les syndromes parkinsoniens induits par un traitement neuroleptique.

### ATTENTION !

#### Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- glaucome par fermeture de l'angle (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil),
- difficultés pour uriner (d'origine prostatique ou autre),
- cardiopathie décompensée (maladie du cœur),
- allergie connue à l'un des composants de ce médicament,
- intolérance ou allergie au gluten, en raison de la présence d'amidon de blé (gluten).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### Mises en garde spéciales

- Des perturbations psychiques peuvent survenir : dans tous les cas avertir votre médecin.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

### Précautions d'emploi

- Ne pas arrêter brutalement le traitement sans avis médical.
- En cas d'antécédent de maladie obstructive de l'intestin (tel que constipation grave) ou de rétention urinaire, prévenir votre médecin.

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### Grossesse – Allaitement

#### Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

#### Allaitement

L'allaitement n'est pas recommandé. Le médicament est éliminé dans le lait maternel. Les quantités administrées sont très faibles mais elles peuvent néanmoins entraîner des effets indésirables chez l'enfant.  
 LOT 1 PER.08  
 D'UN CP B20  
 DE L P.P.V.:13DH30  
 TOU OUA 6 118000 060314  
 PRENDRE  
 UN MEDICAMENT.

### Conducteurs et utilisateurs de machines

L'usage d'Artane peut induire des troubles de la