

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'entente préalable renseignée sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M23-001571

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2534 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : Veuve
 Nom & Prénom : ELAZIZ MINA
 Date de naissance : 01.01.1953
 Adresse : Ali 1 Rue 6 N° 16 - oulfa
 OASA
 Tél. : 0663 223377 Total des frais engagés : 1494,- Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. BELKEBIR Khadija
Médecine - Générale
Rue 27 N° 94 El Alia
Cité Oulfa - Casablanca
Tél : 05 22 90 48 76

Date de consultation : 03.05.2023
 Nom et prénom du malade : ELAZIZ MINA Age :
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant
 Nature de la maladie : HTA
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /


Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Praticien des Actes
03.01.23	C1	(150 M	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	31/5/23	1344,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> H 25533412 21433552 00000000 00000000 D </div> <div style="text-align: center;"> G 00000000 00000000 35533411 11433553 B </div> </div> <p>(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/> MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> DATE DU DEVIS <input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Khadija BELKEBIR

MEDECINE GENERALE

Lot. EL Alia - Rue 27 N° 94

Bd. Oued Tansift - EL Oulfa

☎ : 05 22 90 48 76 - CASABLANCA

الدكتورة خديجة بلكبير

الطب العام

تجزئة العالية - الزنقة 27 الرقم 94

شارع وادي تانسيفت - الألفة

الهاتف : 05 22 90 48 76 - الدار البيضاء

Casablanca, le 03-05-23 في الدار البيضاء،

ELAZIZ

MINA

Ex fange



224,00

X6

1710

95

5-9/160

(x8)

Dr. BELKEBIR Khadija
Médecine Générale
Rue 27 N° 94 El Alia
Cité Oulfa - Casablanca
Tél : 05 22 90 48 76

III de 3-01

1344,00
PHARMACIE
MEDICINE
Tél : 05 22 90 48 76

Dr. BELKEBIR Khadija
Médecine - Générale
Rue 27 N° 94 El Alia
Cité Oulfa - Casablanca
Tél : 05 22 90 48 76

Si vous avez présenté après la prise d'Exforge (ou d'autres médicaments tels que l'ECA) des réactions telles qu'un gonflement des jambes, des yeux, des lèvres (angioedème), vous devez arrêter d'utiliser Exforge et consulter votre médecin. Si vous souffrez d'un infarctus du myocarde, vous devez suivre les instructions de votre médecin. Votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale.

Exforge® 5 mg/160 mg
28 comprimés pelliculés

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Listel - Uniquement sur ordonnance.

Une aggravation de l'insuffisance cardiaque (gonflement de la poitrine) ou un infarctus du myocarde peuvent survenir après le début du traitement. Le jus de pamplemousse et certains médicaments peuvent interagir avec Exforge. Si vous prenez Exforge, il faut éviter d'absorber des quantités importantes (plus d'un litre par jour) de jus de pamplemousse; s'il est absorbé en quantités normales (1 verre de 250 ml par jour), il est improbable que des problèmes en résultent.

Si vous êtes dans l'un de ces cas, parlez-en à votre médecin avant de prendre Exforge.

Informez-le également si vous avez subi une transplantation rénale ou si l'on a diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l'artère rénale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!), et en particulier:
 - des médicaments pour abaisser la tension artérielle, en particulier des inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène,
 - des médicaments contenant du potassium ou des compléments alimentaires à base de potassium ou de sels contenant du potassium. Votre médecin contrôlera éventuellement périodiquement votre taux de potassium dans le sang.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez actuellement (ou avez pris récemment) d'autres médicaments modifiant la quantité d'amlodipine dans l'organisme, en particulier des médicaments contre les mycoses (tels que kétoconazole, itraconazole), pour le traitement du SIDA ou d'infections à VIH (tels que ritonavir,

Si vous avez présenté après la prise d'Exforge (ou d'autres médicaments tels que des inhibiteurs de l'ECA) des réactions telles qu'un gonflement des jambes, des yeux, des lèvres (angioœdème), vous devez arrêter de prendre Exforge et consulter votre médecin.

Si vous souffrez d'une maladie cardiaque (comme un infarctus du myocarde) ou si vous avez eu un infarctus du myocarde, votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale.

Une aggravation de votre maladie (comme une insuffisance cardiaque ou un infarctus du myocarde) peut survenir après le début du traitement.

Le jus de pamplemousse est un puissant inhibiteur de l'enzyme CYP3A4, ce qui peut augmenter les concentrations sanguines de certains médicaments. Le jus de pamplemousse peut également interférer avec l'absorption de certains médicaments. Il est recommandé d'éviter de consommer du jus de pamplemousse pendant le traitement par Exforge. Si vous devez consommer du jus de pamplemousse, il est recommandé de le consommer en quantités normales (1 verre de 250 ml par jour), il est improbable que des problèmes en résultent.

Si vous êtes dans l'un de ces cas, parlez-en à votre médecin avant de prendre Exforge.

Informez-le également si vous avez subi une transplantation rénale ou si l'on a diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l'artère rénale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!), et en particulier :
 - des médicaments pour abaisser la tension artérielle, en particulier des inhibiteurs de l'ECA ou l'alisquirène,
 - des médicaments contenant du potassium ou des compléments alimentaires à base de potassium ou de sels contenant du potassium. Votre médecin contrôlera éventuellement périodiquement votre taux de potassium dans le sang.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez actuellement (ou avez pris récemment) d'autres médicaments modifiant la quantité d'amlodipine dans l'organisme, en particulier des médicaments contre les mycoses (tels que kétoconazole, itraconazole), pour le traitement du SIDA ou d'infections à VIH (tels que ritonavir,



6118001030569

EXFORGE

5mg/160mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 224,00 DH

Exforge® 5 mg/160 mg

28 comprimés pelliculés

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Li-stel - Uniquement sur ordonnance.

احترم الجرعات الموصوفة

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

Si vous avez présenté après la prise d'Exforge (ou d'autres médicaments tels que l'ECA) des réactions telles qu'un gonflement des jambes, des yeux, des lèvres (angioedème), vous devez arrêter d'utiliser Exforge et consulter votre médecin. Si vous souffrez d'un infarctus du myocarde, vous devez suivre les instructions de votre médecin. Votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale.

Exforge® 5 mg/160 mg
28 comprimés pelliculés

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Listel - Uniquement sur ordonnance.

Une aggravation de l'insuffisance cardiaque (gonflement de la poitrine) ou un infarctus du myocarde peuvent survenir après le début du traitement. Le jus de pamplemousse et ses composants peuvent augmenter l'effet des médicaments, y compris Exforge. Si vous prenez Exforge, il faut éviter d'absorber des quantités importantes (plus d'un litre par jour) de jus de pamplemousse; s'il est absorbé en quantités normales (1 verre de 250 ml par jour), il est improbable que des problèmes en résultent.

Si vous êtes dans l'un de ces cas, parlez-en à votre médecin avant de prendre Exforge.

Informez-le également si vous avez subi une transplantation rénale ou si l'on a diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l'artère rénale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!), et en particulier:
 - des médicaments pour abaisser la tension artérielle, en particulier des inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène,
 - des médicaments contenant du potassium ou des compléments alimentaires à base de potassium ou de sels contenant du potassium. Votre médecin contrôlera éventuellement périodiquement votre taux de potassium dans le sang.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez actuellement (ou avez pris récemment) d'autres médicaments modifiant la quantité d'amlodipine dans l'organisme, en particulier des médicaments contre les mycoses (tels que kétoconazole, itraconazole), pour le traitement du SIDA ou d'infections à VIH (tels que ritonavir,

Si vous avez présenté après la prise d'Exforge (ou d'autres médicaments tels que des inhibiteurs de l'ECA) des réactions telles qu'un gonflement des jambes, des yeux, des lèvres (angioœdème), vous devez arrêter de prendre Exforge et consulter votre médecin.

Si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou si vous avez eu un infarctus du myocarde, suivez les instructions de votre médecin. Votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale.



6118001030569

EXFORGE

5mg/160mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 224,00 DH

Exforge® 5 mg/160 mg

28 comprimés pelliculés

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Listel - Uniquement sur ordonnance.

احترم الجرعات الموصوفة

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

Une aggravation de l'insuffisance cardiaque (gonflement de la poitrine) ou un infarctus du myocarde peuvent survenir après le début du traitement.

Le jus de pamplemousse contient des composés qui peuvent interférer avec l'action de certains médicaments, y compris Exforge. Il faut éviter d'absorber plus d'un litre par jour de jus de pamplemousse; s'il est absorbé en quantités normales (1 verre de 250 ml par jour), il est improbable que des problèmes en résultent.

Si vous êtes dans l'un de ces cas, parlez-en à votre médecin avant de prendre Exforge.

Informez-le également si vous avez subi une transplantation rénale ou si l'on a diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l'artère rénale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!), et en particulier :
 - des médicaments pour abaisser la tension artérielle, en particulier des inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène,
 - des médicaments contenant du potassium ou des compléments alimentaires à base de potassium ou de sels contenant du potassium. Votre médecin contrôlera éventuellement périodiquement votre taux de potassium dans le sang.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez actuellement (ou avez pris récemment) d'autres médicaments modifiant la quantité d'amlodipine dans l'organisme, en particulier des médicaments contre les mycoses (tels que kétoconazole, itraconazole), pour le traitement du SIDA ou d'infections à VIH (tels que ritonavir,

Si vous avez présenté après la prise d'Exforge (ou d'autres médicaments tels que des inhibiteurs de l'ECA) des réactions telles qu'un gonflement des jambes, des yeux, des angioœdème), vous devez arrêter d'utiliser Exforge et consulter votre médecin. Si vous souffrez d'une maladie cardiaque ou si vous avez eu un infarctus, suivez les instructions de votre médecin. Votre médecin contrôlera régulièrement votre fonction rénale.



Exforge® 5 mg/160 mg
28 comprimés pelliculés

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Li-stel - Uniquement sur ordonnance.

احترم الجرعات الموصوفة

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

لا تخطئ - يصرف فقط بموجب وصفة طبية

Une aggravation de l'insuffisance cardiaque (gonflement de la poitrine) ou un infarctus peuvent survenir après le début du traitement. Le jus de pamplemousse contient des composants pouvant interagir avec certains médicaments, y compris Exforge. Il faut éviter d'absorber plus d'un litre par jour de jus de pamplemousse; s'il est absorbé en quantités normales (1 verre de 250 ml par jour), il est improbable que des problèmes en résultent. Si vous êtes dans l'un de ces cas, parlez-en à votre médecin avant de prendre Exforge. Informez-le également si vous avez subi une transplantation rénale ou si l'on a diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l'artère rénale. Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!), et en particulier:
 - des médicaments pour abaisser la tension artérielle, en particulier des inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène,
 - des médicaments contenant du potassium ou des compléments alimentaires à base de potassium ou de sels contenant du potassium. Votre médecin contrôlera éventuellement périodiquement votre taux de potassium dans le sang.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez actuellement (ou avez pris récemment) d'autres médicaments modifiant la quantité d'amlodipine dans l'organisme, en particulier des médicaments contre les mycoses (tels que kétoconazole, itraconazole), pour le traitement du SIDA ou d'infections à VIH (tels que ritonavir,

Si vous avez présenté après la prise d'Exforge (ou d'autres médicaments tels que des inhibiteurs de l'ECA) des réactions telles qu'un gonflement des jambes, des yeux, des angioœdème), vous devez arrêter de prendre Exforge et consulter votre médecin.



Une aggravation de l'asthme (ou une crise de poitrine) ou un infarctus du myocarde après le début du traitement.

Le jus de pamplemousse contient des composants pouvant interagir avec certains médicaments, y compris les inhibiteurs de l'ECA.

Il faut éviter d'absorber plus d'un litre par jour de jus de pamplemousse; s'il est absorbé en quantités normales (1 verre de 250 ml par jour), il est improbable que des problèmes en résultent.

Si vous êtes dans l'un de ces cas, parlez-en à votre médecin avant de prendre Exforge.

Informez-le également si vous avez subi une transplantation rénale ou si l'on a diagnostiqué chez vous un rétrécissement de l'artère rénale.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si :

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication!), et en particulier:
 - des médicaments pour abaisser la tension artérielle, en particulier des inhibiteurs de l'ECA ou l'aliskirène,
 - des médicaments contenant du potassium ou des compléments alimentaires à base de potassium ou de sels contenant du potassium. Votre médecin contrôlera éventuellement périodiquement votre taux de potassium dans le sang.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez actuellement (ou avez pris récemment) d'autres médicaments modifiant la quantité d'amlodipine dans l'organisme, en particulier des médicaments contre les mycoses (tels que kétoconazole, itraconazole), pour le traitement du SIDA ou d'infections à VIH (tels que ritonavir,

**DECLARATION DE MALADIE LONGUE DUREE : VALABLE 6
MOIS**

code : PR2FR04

Version : 01

Date : 24/05/2022

Partie réservée à l'adhérent (e) ou ayant droit

Nom et prénom :

ELAZIZ HINA

Matricule :

N° CIN :

Adresse :

Bénéficiaire de soins : ☐ Adhérent ☐ Conjoint ☐ Enfant

Dr. BELKEBIR Khadija

Partie réservée au médecin traitant

Je soussigne :

Médecine Générale

Spécialité :

M. G

N° ICE :

Rue 27 N° 94 Alia
Cité Oufia - Casablanca
Tél : 05 22 90 48 76

N° INPE :

09 1018895

Certifie que Mlle, Mme, M. :

ELAZIZ HINA

Nécessitant un traitement d'une durée :

☐ < 3 mois

☐ Entre 3 et 6 mois

☒ A vie

Arguments cliniques et résultats des examens complémentaires récents justifiant le diagnostic et traitement :

HTA

Dont ci-joint ordonnance :

Traitement prescrit :

Exforge 5-8/160

Je déclare les informations ci-dessus sincères et véritables

Fait à :

Casa le 03/05/23

Cachet et signature du médecin traitant :

Dr. BELKEBIR Khadija
Médecine Générale
Rue 27 N° 94 Alia
Cité Oufia - Casablanca
Tél : 05 22 90 48 76

* Cette déclaration est renouvelable une fois

En application de la loi 08-09 relative à la protection des données à caractère personnel, MUPRAS garantit la confidentialité des informations communiquées