

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **1848**

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

**BIBLAT Mohamed**

Date de naissance :

**10/02/1948**

Adresse :

**BD BNAOU SINA RSD KASBA EN TIZÉA N° 8  
14445884 N° 1 CASABLANCA**

Tél. :

**06 874 163 05**

Total des frais engagés :

Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

**03/05/2023**

Nom et prénom du malade :

**FILALI Najia**

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

**Suivi Glaucome**

Affection longue durée ou chronique :

ALD  ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **La Casablanca**

Le : **10/05/2023**

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
03 05 2023	C		250.00	Dr. NAYE R. Ophthalmologie Lot. Nasim, Lot N°5 Route d'Azemmour Casablanca - 0522265119 / 0643-08-22-95

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARMACIE AL BOUSTAN Houida BELHOUCINE Bab Sina Derb El Wad Hassani - CASABLANCA Tél. : 05 22 90 31 00	25/23	477.70

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				<input type="text"/>
<img alt="Diagram of the dental arch showing numbered teeth from 1 to 8 in both upper and lower				

**Docteur Karim NAYME**

**Ophtalmologiste**

**Maladies et chirurgie des yeux**



**الدكتور كريم النعيم**

**طبيب العيون**

**أمراض و جراحة العيون**

**Chirurgie de cataracte - Glaucome**

**Chirurgie réfractive - Traitement du Kératocône**

**Oeil et diabète**

**Adaptation en lentilles de contact**

**Pathologie vitréo-rétinienne**

**Chirurgies des paupières et des voies lacrymales**

**جراحة المجلالة داء الزرق**

**تصحيح البصر بالليزر**

**إصابة العين بداء السكري**

**العدسات اللاصقة الطبية**

**أمراض السائل الزجاجي والشبكة**

**جراحة الجفون و مسالك الدموع**

casablanca

Le 03 mai 2023

**Mme FILALI NAJIA**

100,70


XOLAMOL COLLYRE



une goutte 8 h matin et 20 h le soir  
à renouveler  
ne pas arrêter, dans les deux yeux, pendant 3 Mois

222,00

GANFORT: COLLYRE



1 goutte par jour le soir à 21 h, dans les deux yeux, pendant 3 Mois

140,00

MIXTEARS

1 goutte fois 3/jour, dans les deux yeux, pendant 2 Mois



477,70

**Prise de RDV par téléphone**

**5, Bd Abdelhadi Boutaleb (ex Rte d'Azemour) Lot. Nassim Casablanca**

**5, شارع عبد الهادي بوطالب (طريق ازهور ساقية التجزة النسيم البيضاء)**

**📞 + 212 522 36 60 79 / 06 43 08 22 95**

**✉ karim.nayme@gmail.com** **FB Cabinet ophtalmologie Dr nayme karim**



Lot:  
FAB:  
EXP:

Texte légal de l'

**GANFORT®**

0,3 mg/ml + 5 mg

Bimatoprost/timolol



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que GANFORT®, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser GANFORT®, collyre ?
3. Comment utiliser GANFORT®, collyre ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GANFORT®, collyre ?
6. Informations supplémentaires

#### 1. Qu'est-ce que GANFORT®, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?

#### Classe pharmacothérapeutique ou le type d'activité

Préparation ophtalmologique - agents bêta-bloquants, Code ATC : S01ED51

GANFORT® contient deux substances actives différentes (bimatoprost et timolol) qui réduisent toutes deux la pression dans l'œil. Le bimatoprost, analogue de la prostaglandine, appartient à un groupe de médicaments appelés prostamides. Le timolol appartient à un groupe de médicaments appelés bêtabloquants.

L'œil contient un liquide aqueux et transparent qui nourrit l'intérieur de l'œil. Ce liquide est constamment évacué de l'œil et du nouveau liquide est produit pour le remplacer.

n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

**Faites attention avec Xolamol® collyre** Avant d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous avez ou avez eu dans le passé :

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou oppression thoracique, un essoufflement ou étouffement), angor de Prinzmetal (douleur à la poitrine en se reposant), insuffisance cardiaque, hypotension.
  - perturbations du rythme cardiaque tels que des pouls lents.
  - problèmes respiratoires, asthme ou maladie pulmonaire obstructive chronique.
  - maladie de la circulation sanguine pauvre (comme la maladie de Raynaud ou le syndrome de Raynaud)
  - diabète comme Xolamol® collyre peut masquer les signes et symptômes de l'hypoglycémie.
  - hyperactivité de la glande thyroïde comme Xolamol® collyre peut masquer les signes et les symptômes.
  - problèmes de foie, si vous avez une faiblesse musculaire ou avez été diagnostiquée comme ayant la myasthénie.
  - toute allergie à un médicament que vous avez pris. Si vous développez une conjonctivite (rougeur et irritation des yeux), un gonflement de l'oeil ou des paupières, une éruption cutanée ou des démangeaisons de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux) **contactez immédiatement votre médecin.** Ces symptômes peuvent être dus à une réaction allergique ou peuvent être un effet secondaire de Xolamol® collyre (voir « Effets secondaires possibles »).

collyre (voir «effets secondaires possibles»).

**Dites à votre médecin** si vous développez une infection oculaire, recevez un traumatisme oculaire, subissez une chirurgie oculaire, développez d'autres réactions ou aggravation des symptômes.

Si vous portez **des lentilles de contact souples**, il est important que vos lentilles soient enlevées avant d'utiliser votre collyre et ne les remettez pas dans vos yeux jusqu'à 15 minutes après l'utilisation de votre collyre comme le chlorure de benzalkonium peut éventuellement décolorer les lentilles de contact.

Avant **la chirurgie et l'anesthésie** (même chez le dentiste), dites à votre médecin ou votr vous utilisez Xolamol® collyre, comme médicament peut modifier les effets de médicaments utilisés pendant l'anesthésie avoir une chute brutale de la pression ai

82181 13 34 9

**Utilisation chez l'enfant**

les nourrissons et les enfants.

**Utilisation chez les personnes agées**  
Dans les études avec Xolamol® collyre, 1 Xolamol® collyre ont été similaires chez âgées et plus jeunes.

topique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par injection.

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

#### Très fréquent (affectant plus de 1 utilisateur sur 10):

Brûlures et picotements des yeux, goût inhabituel

#### **Fréquent (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 100):**

Fréquent (allant jusqu'à 10 déclenchements sur 100). Rougeur de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux), larmoiement ou démangeaisons de l'œil (des yeux), et des effets sur la surface de l'œil (des yeux), gonflement et/ou irritation de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux), sensation d'avoir quelque chose dans l'œil (érosion de la cornée), diminution de la sensibilité corneenne (ne pas réalisant d'avoir quelque chose dans les yeux et ne pas ressentir de la douleur), douleur oculaire, yeux secs, vision trouble, maux de tête, simoulate (sensation de tension ou de plénitude dans le nez), sensation d'être malade, aussi que des nausées et de la fatigue.

Bas fréquent (effectuant 1 à 10 utilisateurs sur

**Peu fréquent (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 1000):** Étourdissements, dépression, inflammation de l'iris, vision floue (dans certains cas, en raison de l'arrêt des médicaments pour traiter la contraction excessive de la pupille de l'œil), ralentissement du rythme cardiaque, évanouissement, respiration laborieuse, indigestion, et calculs rénaux (souvent marqués par l'apparition soudaine d'une atroce, la douleur des crampes dans leur bas des dos et/ou du côté, leur aine ou leur abdomen).

Bans (effectuant 1 à 10 utilisateurs sur 10 000):

**Rare (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 10 000).**  
Lupus érythémateux disséminé (une maladie immunitaire qui peut provoquer une inflammation des organes internes), picotements ou engourdissement des mains ou des pieds, troubles du sommeil, cauchemars, perte de mémoire, affaiblissement des muscles, diminution de la libido, accident vasculaire cérébral, myopie temporaire qui peut résoudre lorsque le traitement est arrêté, le développement de fluide sous la rétine (décollement de la choroïde après chirurgie de filtres obtenant des paupières vision

ombant des paupières, vision es paupières, gonflement de la lèvre de troubles de la vue), isse, sonneries dans votre e basse, rythme cardiaque iciques, palpitations (rythme régulier), œdème, le), infarctus du myocarde, ongestive (maladie cardiaque nfiement des pieds et des amulation du liquide), flux veau, gonflement ou froideur et réduction de la t les jambes, crampes dans dans les jambes lors de la

Xolamol®  
Xolamol®

## MiXTears

«Gouttes oculaires à action protectrice, hydratante, antioxydante et nourrissante pour faciliter le processus de réépithérialisation de la surface oculaire à base de hyaluronate de sodium de haut et bas poids moléculaires.

Coller multidoze de 10ml sans conservateur

LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER À UTILISER LE PRODUIT

## INTRODUCTION

Grâce à sa composition particulière, MiXTears a une action protectrice, hydratante, humectante, antioxydante et nourrissante et facilite ainsi le processus de réépithérialisation de toute la surface oculaire (cornée et conjonctive), contribuant à la création d'un microenvironnement approprié, rétablissant l'équilibre correct du film lacrymal, puis contribuant en même temps à la diminution des irritations dues à la fois aux facteurs environnementaux et à la chirurgie.

## DESCRIPTION

MiXTears est un dispositif médical pour usage ophtalmique à base d'une solution aqueuse stérile, sans conservateur, à faible viscosité, qui contient des éléments naturellement présents dans les tissus oculaires et dans le film lacrymal, des polymères hydrophiles et des hydratants (acide hyaluronique avec deux types de poids moléculaires polyvinylpyrrolidone), un acide aminé essentiel (glycine), une vitamine (o-cotophréol acétate) associée à des composants à action spécifique - et en particulier un extrait d'origine naturelle (Centella Asiatica) - qui, tous ensemble, facilitent la ré-épithérialisation plus rapide des tissus.

Hyaluronate de Sodium est

un polymère polysaccharide à haute biocompatibilité qui est naturellement présent dans tous les tissus. Dans la formulation il est utilisé avec deux types de poids moléculaire différents: avec un poids moléculaire élevé (HMWHA) car il présente des propriétés de mouillage exceptionnelles, augmente la viscosité de la solution et par conséquent la résistance au niveau épithéial; il s'avère donc être un excellent lubrifiant grâce à son comportement visco-élastique. Avec un faible poids moléculaire (HPBM) car il facilite la phase initiale du processus de cicatrisation et améliore l'action physiologique des kératinocytes pour la sécrétion de facteurs anti-infectieux.

Le Centella Asiatica est populairement connu pour son action cicatrisante et réparatrice. Ses constituants les plus représentatifs sont les terpènes et flavonoïdes qui possèdent des propriétés antioxydantes, cytoprotectrices et anti-apoptotiques.

Le TPGS E est un dérivé de la vitamine E naturelle, rendue soluble dans l'eau, dans les préparations ophtalmiques, il remplit une double fonction: antioxydant, comme piégeur de radicaux libres générés par les offenses auxquelles l'œil est exposé quotidiennement et qui peuvent provoquer une inflammation et une irritation; lubrifiant et humectant grâce à la part de polyéthylène glycol qui a une grande capacité de liaison aux molécules d'eau.

La glycine est le plus simple des acides aminés essentiels; il est naturellement présent dans le film lacrymal et est l'un des principaux composants du collagène de type IV, constituant de la membrane basale oculaire et du stroma.

Le mannoitol est un glucide simple dont l'utilisation dans les formulations ophtalmiques est principalement due à son activité osmotique. En outre, il empêche la dégradation de l'acide hyaluronique.

Le PVP (polyvinylpyrrolidone) est un polymère hydrosoluble largement utilisé dans les formulations de collyre comme agent mouillant (il humidifie la cornée et réduit l'évaporation des larmes) et lubrifiant (il facilite le mouvement de la paupière en réduisant le frottement sur la surface cornéo-conjonctivale qui est responsable de la sensation de sécheresse oculaire).

La combinaison du Hyaluronate de Sodium + polyvinylpyrrolidone + polyéthylène glycol rend MiXTears légèrement visqueux, dans le but de contrôler l'élimination naturelle des gouttes oculaires de la surface de l'œil, pendant le clignement, sans provoquer de vision floue ou d'inconfort comme cela se produit généralement avec les produits à viscosité élevée.

## INDICATIONS

YEUX SECS  
MiXTears est indiqué pour le soulagement des symptômes modérés de la sécheresse oculaire dus à des causes à la fois extrinsèques et intrinsèques, telles que:

- Conditions environnementales et climatiques défavorables, telles que l'utilisation de la climatisation (dans la voiture, au bureau, à la maison), les vents forts, la pollution de l'air et lorsque le climat est très chaud.  
- Thérapie topique chronique avec des gouttes oculaires contenant des conservateurs.  
- Utilisation incorrecte de lentilles de contact, de toutes sortes, Port de lentilles

pendant une longue période de la journée.  
- Sécheresse oculaire due à des allergies, conjonctivite, carence en vitamine A.  
- Altération anatomique des paupières (bulbe de la paupière incongru, ouverture anormale des paupières, clignement anormal).

- Pathologie oculaire due à une composition lipidique anormale du film lacrymal, telle qu'une blépharite.  
- Production insuffisante de la couche lipidique du film lacrymal en raison d'un dysfonctionnement de la glande de Meibomius.  
- Clignement inefficace dû, par exemple, à une utilisation prolongée de l'ordinateur ou à une conduite prolongée.  
- Etat de métopathie ou post-métopathie.

**CHIRURGIE**  
MiXTears est également indiqué après la chirurgie, et en particulier la chirurgie réparatrice, comme la photoréfraction Réfractive (PRK ou ablation au laser excimer) car il assiste le processus physiologique de réparation oculaire et de réépithérialisation (au cours de laquelle la synthèse de collagène nécessaire à la fermeture de la lésion se produit) comme il :

- Contribue à un niveau de lubrification adéquat en évitant le frottement de la paupière pendant le clignement, ce qui provoquerait une irritation supplémentaire de l'épithélium oculaire et un état d'algie.  
- Contraste les conditions de la sécheresse oculaire (dérivée de l'intervention elle-même ou de la pharmacothérapie couramment prescrite) grâce à l'action hydratante et adoucissante du Hyaluronate de Sodium.  
- Il exerce une action antioxydante marquée (grâce aux triterpènes et flavonoïdes contenus dans l'extrait de centella asiatica, ainsi que la vitamine E) avec capture

des radicaux libres et chélation des métaux lourds, protégeant ainsi les tissus endommagés.  
- Rééquilibre le microenvironnement oculaire compromis par l'intervention, reconstruisant le film lacrymal avec des substances physiologiquement présentes dedans (comme la glycine, les sels minéraux, l'eau).

**LENTILLES DE CONTACT**  
MiXTears est indiqué pour une utilisation avec des lentilles de contact souples et RGP; plus précisément:

- Pour atténuer l'effet des lentilles: placez une goutte sur le côté intérieur de la lentille avant l'application; cela protégera la surface cornéenne.

- Quelques gouttes de produits, placés directement sur la lentille avant l'application, aider à éliminer les traces du conservateur de la solution polyvalente ou de stockage de la lentille.

- Avec les lentilles sur l'œil, appliquez une ou deux gouttes sur chaque œil et clignez les yeux plusieurs fois pour les rendre plus confortables et soulager la sécheresse oculaire. Cela améliore également le mouillage et l'hydratation de la conjonctive, minimisant les dommages dus à la friction lors du clignement et en cas d'abrasion du tissu conjonctival aide à une guérison plus rapide.

- Après le retrait des lentilles, quelques gouttes de produit soulagent la fatigue oculaire due à un port prolongé de plus, MiXTears contribue à réparer l'épithélium oculaire et est la conséquence directe de l'utilisation des lentilles de contact.  
MiXTears est indiqué pour une utilisation fréquente et prolongée. Peut être utilisé pendant la journée ou alternativement avant le coucher (utilisation de nuit).

## INSTRUCTIONS

DU RÉCIPIENT

- Nettoyez soigneusement vos mains.
- Déchirer le joint inviolable avant la première administration.

3) Retirer le capuchon protecteur du flacon.

4) Retournez le flacon et y exercez une légère pression pour instiller 2 gouttes dans chaque œil, sauf autrement prescrit.

5) L'utilisation nécessite d'exercer une pression plus élevée pour permettre l'issu du produit. Cela est dû aux propriétés du système de fermeture qui préservent la stérilité et les caractéristiques chimiques et physiques des solutions sans conservateur.

6) Après utilisation, refermez immédiatement le flacon.

7) Le contenu doit être consommé dans les 6 mois suivant la première ouverture.

**COMPOSITION**  
Hyaluronate de Sodium (poids moléculaire élevé), Hyaluronate de Sodium (faible poids moléculaire) extrait de Centella Asiatica (L.) Urbain (titré en asياتicoside ≥ 3%), L-glycine, vitamine ETPGS, Polyvinylpyrrolidone, D-Mannitol, Phosphate de sodium monohydraté monohydraté, Phosphate de sodium dibasique dodecahydrate, Chlorure de sodium, Eau pour injection jusqu'à 100 ml.

**AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS**

- Le produit est destiné à un usage ophtalmique uniquement.  
- N'utilisez pas le produit si la boîte ou le multi-dose sont endommagés ou pas parfaitement fermés.  
- Le contenu doit être utilisé par une seule personne.  
- Pendant l'instillation, ne touchez pas l'œil ou toute autre surface avec le compte-gouttes

## DU RÉCIPIENT

- N'utilisez pas le produit en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients de la formulation.

- En cas de probabilité immédiate de traitement et conseil médicin.

- L'administration de médicaments ophtalmiques conjointement avec l'utilisation de ces gouttes ophtalmiques doit être effectuée sous la surveillance d'un m<sup>é</sup>decin dans tous les cas, attendez au moins 5 minutes entre chaque application.

- Ces gouttes ophtalmiques ne remplacent aucun médicament pouvant être prescrit par le m<sup>é</sup>decin.

- N'utilisez pas le produit après la date d'expiration.

- Ne pas jeter le récipient après utilisation.

- Tenir hors de portée des enfants.

**EMBALLAGE**  
Flacon multi dose de 10 ml, sans conservateur.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

- Le contenu doit être utilisé dans les 6 mois suivant la première ouverture.  
- Conserver en dessous de 30 °C dans un endroit sec à l'abri de la chaleur et de l'exposition directe au soleil.

## VALIDITÉ

Avant l'emballage non ouvert, ne pas dépasser la date de péremption indiquée sur la boîte et sur l'étiquette du flacon.

- Distribué par : Bottu S.A.  
82, Allée des Casuarinas - BP  
2583 Aïn Seba - 20580  
Casablanca-Morocco

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.  
Via Modena, 15

PEC 140 OH 00

Dispositif médical stérile par filtration.

Dernière révision Janjoom:  
01.07 du 07/2022

Dernière révision du fabricant du 01.04 du 05/2022

Fabricant du dispositif médical.

CE  
1986

Le produit est un dispositif médical marqué CE pour l'Notify Body TÜV avec N. 1986.

Conserver en dessous de 30 °C.

Ne jeter pas le récipient après utilisation.

Avertissements et précautions d'usage générales.

N'utilisez pas le produit si la boîte ou le multi-dose sont endommagés ou non fermés.

Date d'expiration.

Avant utilisation, faire attentionnément les instructions figurant sur la notice.

LOT

Nombre de lot de M.C.