

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES RÉMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tel : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W21-795345

Maladie  Dentaire  Optique  Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : *EST* Société : *AGAM*

Actif  Pensionné(e)  Autre : *2*

Nom & Prénom : *KADRI - HASSAN - Adli*

Date de naissance : *8-1-1953*

Adresse : *AGADIR - Agdal - Rabat*

Tél. : *066717245* Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin *Dr. BENZINEB Asmae*  
*Psychiatre - Pedopsychiatre*  
*73, Angle Avenue Oqba et Rue Sebou, N°15*  
*Agdal - Rabat*  
*+212 537 68 09 84*

Cachet du médecin :

Date de consultation : ..... Nom et prénom du malade : *KADRI - HASSAN* Age : .....  
 Lui-même  Conjoint  Enfant

Lien de parenté : *depression*

Nature de la maladie : *depression*

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : *10/11/2023*

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

Signature de l'adhérent(e) : *S. BENZINEB*

Le : *07-11-23*

ACCUEIL

ADHÉRENT

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) : *S. BENZINEB*

Le : *07-11-23*

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/08/2003	C		350,00	 Dr. BENZINEB Asmae Psychiatre - Pédopsychiatre Psychothérapeute 23, Angle Avenue Coba et Rue Sébastien

EXECUTION DES ORDONNANCES\*

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <b>ASMOUN</b> Docteur en Pharmacie Aum ASSALI MARY AL HOSSEINI BERRECHID Tel. 06 22 42 84 08	07/04/23	3095,43

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Asmae BENZINEB

Psychiatre - Psychothérapeute

Thérapie comportementale & cognitive

Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Thérapie EMDR



الدكتورة أسماء بنزينب

طبيبة نفسانية

اختصاصية في الأمراض النفسية والعقاقية

العلاج السلوكي المعرفي

الطب النفسي للأطفال والمرأة

Le 05 AVR 2023

Mme KARTITE MAR YEM

8 x 132,00

1) Panxetie wine

18 d 113,30

241

8672

2) Depak 500 mg

T. 3095,40

Tarif

06

Dr. BENZINEB Asmae

Psychiatre - Pédopsychiatre

Psychothérapeute

73, Angle Avenue Oqba et Rue Sebou, N°15

Agdal - Rabat

+212 537 68 09 84

ASMOUN Samir  
Docteur en Pharmacie

Rue AS-SALAM MIZAN HOUSS

BERRECHID

741 05 22 32 84 04

73, زاوية شارع عقبة وزنقة سبو، رقم 15 (فوق مقهى كازينو) - أكدال، الرباط - الهاتف : +212 537 68 09 84

73, Angle Avenue Oqba et Rue Sebou, N°15 (Au dessus de Café Casarina) Agdal, Rabat - Tél. : +212 537 68 09 84

E-mail : asmae.benzineb@gmail.com



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Dépakin® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé

ac sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1-

▼ Ain Sebaâ 20250 - Casablanca

DEPAKINE CHRONO 500MG CP PEL B30

P.P.V. : 113DH30

la

inc



6 1 1 8 0 0 1 0 8 1 0 7 3

D.L.

DL. 113DH30. L'USOIRE GRAVEMENT A L'ENFANT A

NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
- si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Depakin Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
- prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
- ne pas arrêter de prendre Dépakin Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Ce qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

## Que contient

1. Qu'est-ce que Dépakin Chrono
2. Quelles sont les informations à signaler tout effet
3. Comment prendre Dépakin Chrono
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver Dépakin Chrono
6. Contenu de l'emballage et de la notice

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKINE CHRONO UTILISE

Classe pharmacothérapeutique : antiépileptiques. Dépakin Chrono appartient à la classe des antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A SIGNALER AVANT DE PRENDRE DEPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakin Chrono si :

- si vous êtes enceinte, sauf si l'épilepsie n'est efficace pour empêcher l'arrêt de l'allaitement et fertilité - (voir rubrique 2 pour les femmes).
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que aucun autre traitement de l'épilepsie ne vous êtes capable de recommander pour empêcher l'arrêt de l'allaitement et fertilité - (voir rubrique 2 pour les femmes).
- si vous êtes allergique à la valproate ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 2.
- si vous êtes allergique à la valproate (divalproate),
- si vous avez une maladie de la thyroïde grave notamment liée à la maladie de Gravellier,
- si vous souffrez d'une porphyrie (foie),
- si vous avez un problème mitochondrial (par ex. le syndrome de Kearns-Sayre),
- si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 2),
- si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).

#### NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

## Dépakine® Chrono 500 mg,

### comprimé n°111-1

sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1-  
Ain Sebaâ 20250 - Casablanca  
DEPAKINE CHRONO 500MG CP PEL B30  
PPV : 113DH30



6 118001 081073

DEPARTMENT OF THE INTERIOR GRAVEMENT

#### **NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE**

#### **Les enfants exposés *in utero* au valproate**

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

**Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :**

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
  - si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

**Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :**

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Depakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devrez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
  - prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
  - ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

**Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.**

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. le qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

### Onde contém

### 1. Qu'est-ce qu'une *skype* ?

1. Qu'est-ce qu'Alors sont les

## 2. Quelles sont les normes?

## Dépakine Chrono

### 3. Comment prendre Dépak

#### 4. Quels sont les effets indésirables?

## 5. Comment conserver Dépa

### 5. Comment conseiller depuis l'avenir

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKIN UTILISE

Classe pharmacothérapeutique  
Dépakine Chrono appartient  
aux antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFOS PRENDRE DEPAKINE CH

#### Contre-indications :

**Ne prenez jamais Dépakine**

- si vous êtes enceinte, sauf l'épilepsie n'est efficace pour l'allaitement et fertilité - G3 (femmes »),
  - si vous êtes une femme enceinte ou en cours d'allaitement et que vous êtes capable de ressentir des effets de la prévention pour éviter une épilepsie (allaitement et fertilité - G3 (femmes »).
  - si vous êtes allergique à la valproate ou à l'un des autres composés mentionnés dans la rubrique
  - si vous êtes allergique à un autre médicament contenant le valproate (divalproate, ..., ...)
  - si vous avez une maladie hépatique grave
  - si vous ou un membre de votre famille avez une maladie grave notamment liée à la maladie hépatique
  - si vous souffrez d'une porphyrie (maladie de la foie),
  - si vous avez un problème mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS)
  - si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique)
  - si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

## Dépakine® Chrono 500 mg,

### comprimé n°111-1

sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1-  
Ain Sebaâ 20250 - Casablanca  
DEPAKINE CHRONO 500MG CP PEL B30  
PPV : 113DH30



6 118001 081073

#### DEUTERONOMY 10:19-20 GRAVEMENT

NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.  
Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
  - si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

**Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :**

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Depakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devrez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
  - prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
  - ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

**Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.**

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien, le qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

### Onde contém:

1. Qu'est-ce qu'une kine
2. Quelles sont les informations dénakinées.

- 3. Comment prendre Dépakine Chrono
  - 4. Quels sont les effets indésirables de Dépakine Chrono ?
  - 5. Comment conserver Dépakine Chrono ?
  - 6. Contenu de l'emballage de Dépakine Chrono

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKIN UTILISE

Classe pharmacothérapeutique  
Dépakine Chrono appartient  
aux antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFOS PRENDRE DEPAKINE CH

#### **Contre-indications :**

#### **Ne prenez jamais Dénakin**

- si vous êtes enceinte, sauf l'épilepsie n'est efficace pas l'allaitement et fertilité - G femmes »),
  - si vous êtes une femme et autre traitement de l'épilepsie vous êtes capable de responsabilité de la prévention pour éviter un allaitement et fertilité - G femmes »).
  - si vous êtes allergique à la valproate ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique
  - si vous êtes allergique à un autre médicament
  - si vous avez une maladie hépatique
  - si vous ou un membre de votre famille avez une maladie grave notamment liée à la maladie hépatique
  - si vous souffrez d'une porphyrie
  - si vous avez un problème mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS)
  - si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique)
  - si vous prenez en même temps un médicament pour traiter la dépression).











## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

## Dépakine® Chrono 500 mg,

### comprimé n°111-1

sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P.1-  
Ain Sebaâ 20250 - Casablanca  
DEPAKINE CHRONO 500MG CP PEL B30  
PPV : 113DH30



6 118001 081073

#### DEUTERONOMY 10:19 GRAVEMENT

NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.  
Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
  - si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

**Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :**

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Depakine Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devrez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
  - prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
  - ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

**Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.**

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien, le qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

### Onde contém

1. Qu'est-ce qu'une kine
2. Quelles sont les informations dénakinées.

- 3. Comment prendre Dépakine Chrono
  - 4. Quels sont les effets indésirables de Dépakine Chrono ?
  - 5. Comment conserver Dépakine Chrono ?
  - 6. Contenu de l'emballage de Dépakine Chrono

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKIN UTILISE

Classe pharmacothérapeutique  
Dépakine Chrono appartient  
aux antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de 17 kg et plus.

## 2. QUELLES SONT LES INFOS PRENDRE DEPAKINE CH

#### **Contre-indications :**

**Ne prenez jamais Dénakin.**

- si vous êtes enceinte, sauf l'épilepsie n'est efficace pas l'allaitement et fertilité - G femmes »),
  - si vous êtes une femme et autre traitement de l'épilepsie vous êtes capable de responsabilité de la prévention pour éviter un allaitement et fertilité - G femmes »).
  - si vous êtes allergique à la valproate ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique
  - si vous êtes allergique à un autre médicament
  - si vous avez une maladie hépatique
  - si vous ou un membre de votre famille avez une maladie grave notamment liée à la maladie hépatique
  - si vous souffrez d'une porphyrie
  - si vous avez un problème mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS)
  - si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique)
  - si vous prenez en même temps un médicament pour traiter la dépression).







## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Dépakin® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé

ac sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1-

▼ Ain Sebaâ 20250 - Casablanca

DEPAKINE CHRONO 500MG CP PEL B30

P.P.V. : 113DH30

la

inc



6 1 1 8 0 0 1 0 8 1 0 7 3

D.L.

DL. 113DH30. L'USOIRE GRAVEMENT A L'ENFANT A

NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
- si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Depakin Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
- prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
- ne pas arrêter de prendre Dépakin Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Ce qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

## Que contient

1. Qu'est-ce que Dépakin Chrono
2. Quelles sont les informations à signaler tout effet
3. Comment prendre Dépakin Chrono
4. Quels sont les effets indésirables
5. Comment conserver Dépakin Chrono
6. Contenu de l'emballage et de la notice

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKINE CHRONO UTILISE

Classe pharmacothérapeutique : antiépileptiques. Dépakin Chrono appartient à la classe des antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A SIGNALER AVANT DE PRENDRE DEPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakin Chrono si :

- si vous êtes enceinte, sauf si l'épilepsie n'est efficace pour empêcher l'arrêt de l'allaitement et fertilité - (voir rubrique 2 pour les femmes).
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que aucun autre traitement de l'épilepsie ne vous êtes capable de recommander pour empêcher l'arrêt de l'allaitement et fertilité - (voir rubrique 2 pour les femmes).
- si vous êtes allergique à la valproate ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 2.
- si vous êtes allergique à la valproate (divalproate),
- si vous avez une maladie de la thyroïde grave notamment liée à la maladie de Gravellier,
- si vous souffrez d'une porphyrie (foie),
- si vous avez un problème mitochondrial (par ex. le syndrome de Kearns-Sayre),
- si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 2),
- si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).







## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Dépakin® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé

ac sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1-

▼ Ain Sebaâ 20250 - Casablanca

DEPAKINE CHRONO 500MG CP PEL B30

P.P.V. : 113DH30

la

inc



6 1 1 8 0 0 1 0 8 1 0 7 3

DL

1. L'EFFET GRAVEMENT A L'ENFANT A

NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
- si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

Si du valproate vous a été prescrit et que vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants, vous devez notamment :

- utiliser au moins une méthode de contraception efficace, sans interruption, pendant toute la durée de votre traitement par Depakin Chrono. Votre médecin discutera de cela avec vous mais vous devez également suivre les conseils donnés à la rubrique 2 de cette notice.
- prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin spécialiste si vous envisagez une grossesse ou pensez être enceinte.
- ne pas arrêter de prendre Dépakin Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Ce qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

## Que contient

1. Qu'est-ce que Dépakin Chrono
2. Quelles sont les informations à connaître sur Dépakin Chrono
3. Comment prendre Dépakin Chrono
4. Quels sont les effets indésirables de Dépakin Chrono
5. Comment conserver Dépakin Chrono
6. Contenu de l'emballage et de la notice

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKINE CHRONO ET QU'EST-CE QU'IL UTILISE

Classe pharmacothérapeutique : anticonvulsif. Dépakin Chrono appartient à la classe des anticonvulsifs antépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DEPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakin Chrono si :

- si vous êtes enceinte, sauf si l'épilepsie n'est efficacement contrôlée par d'autres traitements (sauf si vous êtes une femme enceinte et que vous êtes incapable de prendre d'autre traitement pour éviter une grossesse pendant la grossesse et l'allaitement et fertilité - Consultez votre médecin pour les femmes »),
- si vous êtes une femme enceinte et que vous êtes capable de prendre d'autre traitement pour éviter une grossesse pendant la grossesse et l'allaitement et fertilité - Consultez votre médecin pour les femmes »),
- si vous êtes allergique à la valproate (valproate de sodium ou à l'un des autres composants mentionnés dans la rubrique 4),
- si vous êtes allergique à la valproate (divalproate de sodium),
- si vous avez une maladie de la thyroïde grave notamment liée à la maladie de Basedow,
- si vous ou un membre de votre famille souffrez d'une maladie grave notamment liée à la maladie de Basedow,
- si vous souffrez d'une porphyrie (maladie de la foie),
- si vous avez un problème mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS),
- si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 4),
- si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).

# Paroxétine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

## Comprimé pelliculé sécable

20 mg

## Voie Orale

Veuillez lire et prendre ce mémorandum de la partie de ce paquet que vous avez acheté. Il contient des informations sur les effets indésirables et les interactions avec d'autres médicaments.

Lot 1  
P.E.R. 06/2025

PAROXETINE WIN 20MG  
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



6 118000 062301

vous plus  
ment qu'un  
être quez  
votre

### 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUAIS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

#### Indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessions avec comportement incontrôlable), trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous deviez être en société), état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

#### Contre-indications

#### Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé MAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthionium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par MAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous - Prise ou utilisation d'autres médicaments). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pourra diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une isométhorétine (electroshock). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le cécoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous - Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans).

#### Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :

PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Normalement, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessus apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturité et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : diminution des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inamical, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agoraphobie, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez). Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessus ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu le placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine (Voir rubrique 3 - Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même), pensées suicidaires et tentatives de suicide).

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants : • si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé. • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était plus élevé chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychique traitée par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux et demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vérifier s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave ou qu'il y a un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec la paroxétine**

Des patients traités par la paroxétine di-  
-kathésie, qui comprend le fait de se sentir  
assis ou debout tranquillement,  
sérotoninergique, comportant certaines  
confusion mentale, agitation,  
hallucinations, vision ou sons  
dans la tête, des saignements, des  
muscles ou rythme cardiaque  
et d'autres symptômes, contactez votre  
médecin ou pharmacien. Des effets indésirables de PAROXETINE WIN  
peuvent également être causés par les effets indésirables (voir rubrique 6).

**Interactions avec d'autres médicaments**

**Prise ou utilisation avec d'autres médicaments**

# Paroxétine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

## Comprimé pelliculé sécable

20 mg

## Voie Orale

Veuillez lire et prendre ce mémorandum de la partie de ce paquet que vous avez acheté. Il contient des informations sur les effets indésirables et les interactions avec d'autres médicaments.

Lot 1  
P.E.R. 06/2025

PAROXETINE WIN 20MG  
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



vous plus  
ment qu'un  
être quez  
votre

### 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUAIS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

#### Indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessions avec comportement incontrôlable), trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous deviez être en société), état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

#### Contre-indications

Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé MAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthionium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par MAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous - Prise ou utilisation d'autres médicaments). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pourra diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une isométhorétine (electroshock). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le cécoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous - Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans).

#### Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :

PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Normalement, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessus apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturité et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : diminution des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inamical, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agoraphobie, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez). Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessus ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu le placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine (Voir rubrique 3 - Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même), pensées suicidaires et tentatives de suicide).

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants : • si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé. • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était plus élevé chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychique traitée par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux et demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vérifier s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave ou qu'il y a un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec la paroxétine**

Des patients traités par la paroxétine déclarent des effets indésirables tels que l'akathisie, qui comprend le fait de se sentir agité ou déboueté, confusion mentale, agitation, hallucinations, vision ou sons, muscles ou rythme cardiaque anormaux, et d'autres symptômes, contactez votre pharmacien ou votre médecin si vous présentez des effets indésirables de PAROXETINE WIN.

**Interactions avec d'autres médicaments**

**Prise ou utilisation avec d'autres médicaments**

# Paroxétine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

## Comprimé pelliculé sécable

20 mg

## Voie Orale

Veuillez lire et prendre ce mémorandum de la partie de ce paquet que vous avez acheté. Il contient des informations sur les effets indésirables et les interactions avec d'autres médicaments.

Lot 1  
P.E.R. 06/2025

PAROXETINE WIN 20MG  
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



vous plus  
ment qu'un  
être quez  
votre

### 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUAIS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

#### Indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessions avec comportement incontrôlable), trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous deviez être en société), état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

#### Contre-indications

Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé MAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthionium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par MAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous - Prise ou utilisation d'autres médicaments). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pourra diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une isométhorétine (electroshock). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le cécoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous - Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans).

#### Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :

PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Normalement, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessus apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturité et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : diminution des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inamical, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agoraphobie, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez).

Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessus ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu le placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine (Voir rubrique 3 - Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même), pensées suicidaires et tentatives de suicide).

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants :

• si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé, • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était plus élevé chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychique traitée par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux et demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave ou d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec la paroxétine**

Des patients traités par la paroxétine di-  
-kathésie, qui comprend le fait de se sentir  
assis ou debout tranquillement, et  
sérotoninergique, comportant certai-  
-nons de confusion mentale, agitation,  
hallucinations, vision ou sons, et  
muscles ou rythme cardiaque.

Si vous avez des symptômes, contactez votre pharmacien ou votre médecin. Des effets indésirables peuvent survenir avec la paroxétine.

**Interactions avec d'autres médicaments**

Prise ou utilisation de PAROXETINE WIN avec d'autres médicaments.

# Paroxétine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

## Comprimé pelliculé sécable

20 mg

## Voie Orale

Veuillez lire et prendre ce mémorandum de la partie de ce paquet que vous avez acheté. Il contient des informations sur les effets indésirables et les interactions avec d'autres médicaments.

Lot 1  
P.E.R. 06/2025

PAROXETINE WIN 20MG  
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



vous plus  
ment qu'un  
être quez  
votre

### 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUAIS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

#### Indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessions avec comportement incontrôlable), trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous deviez être en société), état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

#### Contre-indications

Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé MAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthionium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par MAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous - Prise ou utilisation d'autres médicaments). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pourra diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une isométhorétine (electroshock). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le cécoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous - Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans).

#### Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :

PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Normalement, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessus apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturité et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : diminution des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inamical, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agoraphobie, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez). Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessus ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu le placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine (Voir rubrique 3 - Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même), pensées suicidaires et tentatives de suicide).

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants : • si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé. • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était plus élevé chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychique traitée par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux et demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de vérifier s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave ou qu'il y a un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec la paroxétine**

Des patients traités par la paroxétine déclarent des effets indésirables tels que l'akathisie, qui comprend le fait de se sentir agité ou déboueté, confusion mentale, agitation, hallucinations, vision ou sons, muscles ou rythme cardiaque anormaux, et d'autres symptômes, contactez votre pharmacien ou votre médecin si vous présentez des effets indésirables de PAROXETINE WIN.

**Interactions avec d'autres médicaments**

**Prise ou utilisation avec d'autres médicaments**

# Paroxétine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

## Comprimé pelliculé sécable

20 mg

## Voie Orale

Veuillez lire et prendre ce mémorandum de la partie de ce paquet que vous avez acheté. Il contient des informations sur les effets indésirables et les interactions avec d'autres médicaments.

Lot 1  
P.E.R. 06/2025

PAROXETINE WIN 20MG  
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



vous plus  
ment qu'un  
être quez  
votre

### 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUAIS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

#### Indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessions avec comportement incontrôlable), trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous deviez être en société), état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

#### Contre-indications

Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé MAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthionium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par MAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous - Prise ou utilisation d'autres médicaments). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pourra diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une isométhorétine (electroshock). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le cécoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous - Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans).

#### Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :

PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Normalement, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessous apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturité et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : diminution des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inamical, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agoraphobie, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez). Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessous ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu le placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine (Voir rubrique 3 - Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même), pensées suicidaires et tentatives de suicide).

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants : • si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé. • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était plus élevé chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychique traitée par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux et demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave ou d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec la paroxétine**

Des patients traités par la paroxétine di-  
-kathésie, qui comprend le fait de se se-  
-satisfaire ou de débout tranquille-  
-ment, sont également connus.  
-sérotoninergique, comportant cer-  
-confusion mentale, agitation,  
-hallucinations, vision ou sons  
-muscles ou rythme cardiaque  
-symptômes, contactez votre  
-des effets indésirables (voir rubrique 4 -  
-Interactions avec d'autres médicaments et/ou

**Prise ou utilisation avec d'autres médicaments et/ou**

# Paroxétine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

## Comprimé pelliculé sécable

20 mg

## Voie Orale

Veuillez lire et prendre ce mémorandum de la partie de ce paquet que vous avez acheté. Il contient des informations sur les effets indésirables et les interactions avec d'autres médicaments.

Lot 1  
P.E.R. 06/2025

PAROXETINE WIN 20MG  
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



6 118000 062301

vous plus  
ment qu'un  
être quez  
votre

### 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUAIS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

#### Indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessions avec comportement incontrôlable), trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous deviez être en société), état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

#### Contre-indications

Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé MAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthionium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par MAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous - Prise ou utilisation d'autres médicaments). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pourra diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une isométhorétine (electro choc). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le cécoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous - Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans).

#### Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :

PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Normalement, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessus apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturité et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : diminution des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inamical, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agoraphobie, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez).

Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessus ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu le placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine (Voir rubrique 3 - Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même), pensées suicidaires et tentatives de suicide).

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants :

• si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé, • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était plus élevé chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychique traitée par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux et demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave ou d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec la paroxétine**

Des patients traités par la paroxétine di-  
-kathésie, qui comprend le fait de se sentir  
assis ou debout tranquillement, et  
sérotoninergique, comportant certai-  
-nons de confusion mentale, agitation,  
hallucinations, vision ou sons, et  
muscles ou rythme cardiaque.

Si vous avez des symptômes, contactez votre médecin. Des effets indésirables de PAROXETINE WIN peuvent inclure les effets indésirables suivants :

**Interactions avec d'autres médicaments**

Prise ou utilisation de PAROXETINE WIN avec d'autres médicaments

# Paroxétine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

## Comprimé pelliculé sécable

20 mg

## Voie Orale

Veuillez lire et prendre ce mémorandum de la partie de ce paquet que vous avez acheté. Il contient des informations sur les effets indésirables et les interactions avec d'autres médicaments.

Lot 1  
P.E.R. 06/2025

PAROXETINE WIN 20MG  
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



6 118000 062301

vous plus  
ment qu'un  
être quez  
votre

### 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUAIS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

#### Indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessions avec comportement incontrôlable), trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous deviez être en société), état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

#### Contre-indications

Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé MAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthionium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par MAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous - Prise ou utilisation d'autres médicaments). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pourra diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une isométhorétine (electro choc). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le cécoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous - Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans).

#### Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :

PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Normalement, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessus apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturité et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : diminution des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inamical, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agoraphobie, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez).

Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessus ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu le placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine (Voir rubrique 3 - Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même), pensées suicidaires et tentatives de suicide).

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants :

• si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé, • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était plus élevé chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychique traitée par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux et demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave ou d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec la paroxétine**

Des patients traités par la paroxétine déclarent des effets indésirables tels que l'akathisie, qui comprend le fait de se sentir agité ou déboueté tranquillement, et le syndrome sérotoninergique, comportant certaines manifestations comme la confusion mentale, agitation, hallucinations, vision ou sons, muscles ou rythme cardiaque anormaux, et d'autres symptômes, contactez votre médecin si vous présentez des effets indésirables de PAROXETINE WIN.

**Interactions avec d'autres médicaments**

Prise ou utilisation d'autre médicament

# Paroxétine Win®

Paroxétine chlorhydrate anhydre

## Comprimé pelliculé sécable

20 mg

## Voie Orale

Veuillez lire et prendre ce mémorandum de la partie de ce paquet que vous avez acheté. Il contient des informations sur les effets indésirables et les interactions avec d'autres médicaments.

Lot 1  
P.E.R. 06/2025

PAROXETINE WIN 20MG  
CP PELL SEC B30

P.P.V : 132DH00



vous plus  
ment qu'un  
être quez  
votre

### 1. QU'EST-CE QUE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ET DANS QUAIS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### Classe pharmacothérapeutique

PAROXETINE WIN est un traitement destiné aux adultes souffrant de dépression et/ou de troubles anxieux.

#### Indications thérapeutiques

Les troubles anxieux dans lesquels PAROXETINE WIN peut être prescrit sont les suivants : troubles obsessionnels compulsifs (pensées répétitives, obsessions avec comportement incontrôlable), trouble panique (attaques de panique, y compris celles causées par la peur des lieux publics, l'agoraphobie), trouble anxiété sociale (peur ou rejet de situations où vous deviez être en société), état de stress post-traumatique (anxiété causée par un événement traumatisant), anxiété généralisée.

PAROXETINE WIN appartient à la classe de médicaments appelés Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine (ISRS).

Les personnes souffrant de dépression et d'anxiété présentent un taux de sérotonine (substance présente dans le cerveau) diminué.

Le mécanisme d'action de PAROXETINE WIN et des autres ISRS n'est pas complètement connu, mais ils augmenteraient le taux de sérotonine dans le cerveau.

Bien traiter votre dépression ou votre trouble anxieux est important pour vous aider à vous sentir mieux.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?

#### Contre-indications

Ne prenez jamais PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable :

• Si vous prenez ou avez pris au cours des 2 dernières semaines un médicament appelé MAO (inhibiteur de la monoamine oxydase, incluant le moclobémide et le chlorure de méthylthionium (bleu de méthylène)). Votre médecin vous dira comment débuter le traitement avec la paroxétine une fois que vous aurez arrêté le traitement par MAO. • Si vous prenez un anti-psychotique appelé thioridazine ou un anti-psychotique appelé pimozide.

• Si vous êtes allergique à la paroxétine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous êtes concerné par l'un de ces points, ne prenez pas PAROXETINE WIN et informez-en votre médecin.

#### Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

#### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PAROXETINE WIN 20mg, comprimé pelliculé sécable.

• Si vous prenez un autre traitement (voir rubrique ci-dessous - Prise ou utilisation d'autres médicaments). • Si vous prenez du tamoxifène pour traiter un cancer du sein. PAROXETINE WIN pourra diminuer l'efficacité du tamoxifène, votre médecin pourra préférer un autre traitement antidiépresseur. • Si vous avez des problèmes de reins, de foie ou de cœur.

• Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous avez eu dans le passé des convulsions ou des crises. • Si vous avez déjà eu un épisode « maniaque » (excitation incontrôlable et hyperactivité). • Si vous avez eu une isométhorétine (electroshock). • Si vous avez des troubles de la coagulation, des ecchymoses (bleus) ou si vous saignez facilement, ou si vous prenez un médicament qui peut augmenter les saignements comme la warfarine, des antipsychotiques comme la perphénazine ou la clozapine, des antidépresseurs tricycliques, des médicaments contre la douleur ou l'inflammation appelés Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine, l'ibuprofène, le cécoxib, l'étodolac, le diclofénac, le méoxicam.

• Si vous êtes diabétique. • Si vous suivez un régime pauvre en sel. • Si vous souffrez de glaucome (hypertension au niveau de l'œil). • Si vous êtes enceinte ou envisagez de l'être ou si vous allez (voir rubriques « Grossesse » et « Allaitement »). • Si vous avez moins de 18 ans (voir rubrique ci-dessous - Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans).

#### Utilisation chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans :

PAROXETINE WIN ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.

Les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables tels que tentative de suicide, pensées suicidaires ou comportement hostile (comportement agressif, d'opposition et colère) lorsqu'ils sont traités par la paroxétine.

Normalement, il est possible que votre médecin décide de prescrire PAROXETINE WIN à des patients de moins de 18 ans si il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

Si votre médecin vous a prescrit (ou à votre enfant) PAROXETINE WIN et que vous désirez en discuter avec lui, adressez-vous à lui. Vous devez informer votre médecin si l'un des symptômes ci-dessous apparaît ou s'aggrave lors de la prise de PAROXETINE WIN par un patient de moins de 18 ans.

Dans cette tranche d'âge, la sécurité à long terme de la paroxétine concernant la croissance, la maturité et le développement cognitif et comportemental n'a pas encore été établie.

Dans les études chez des patients de moins de 18 ans, les effets secondaires fréquents qui affectent moins de 1 enfant/adolescent sur 10 étaient les suivants : diminution des pensées suicidaires et des tentatives de suicide, agressivité envers soi-même, comportement hostile, agressif ou inamical, manque d'appétit, tremblements, transpiration excessive, hyperactivité, agoraphobie, des fluctuations de l'humeur et accès de pleurs et des ecchymoses ou des saignements inhabituels (par exemple des saignements de nez).

Dans ces études, les symptômes décrits ci-dessous ont également affecté les enfants et adolescents qui avaient reçu le placebo, mais à une fréquence moindre.

Dans ces études, certains patients de moins de 18 ans ont présenté des effets indésirables lors de la diminution de doses ou de l'arrêt de la paroxétine. Ces effets étaient similaires à ceux observés chez l'adulte à l'arrêt de la paroxétine (Voir rubrique 3 - Comment prendre PAROXETINE WIN 20 mg, comprimé pelliculé sécable ?).

De plus, les patients de moins de 18 ans ont présenté assez fréquemment (moins de 1 patient sur 10) des douleurs abdominales, une nervosité, fluctuations de l'humeur (accès de pleurs, agressivité envers soi-même), pensées suicidaires et tentatives de suicide).

**Idées suicidaires et aggravation de votre dépression ou de votre trouble anxieux**

Si vous souffrez de dépression et/ou de troubles anxieux, vous pouvez parfois avoir des idées d'auto-agression (agressivité envers vous-même) ou de suicide. Ces manifestations peuvent être majorées au début d'un traitement par antidépresseur, car ce type de médicament n'agit pas tout de suite mais seulement après 2 semaines ou plus de traitement.

Vous êtes plus susceptible de présenter ce type de manifestations dans les cas suivants :

• si vous avez déjà eu des idées suicidaires ou d'auto-agression dans le passé, • si vous êtes un jeune adulte. Les études cliniques ont montré que le risque de comportement suicidaire était plus élevé chez les adultes de moins de 25 ans présentant une maladie psychique traitée par antidépresseur.

Si vous avez des idées suicidaires ou d'auto-agression, immédiatement votre médecin ou allez directement à l'hôpital. Vous pouvez vous faire aider par un ami ou un parent, en lui expliquant que vous êtes dépressif ou que vous souffrez d'un trouble anxieux et demandant de lire cette notice. Vous pouvez lui demander de s'il pense que votre dépression ou votre anxiété s'aggrave ou d'un changement dans votre comportement.

**Effets indésirables importants observés avec la paroxétine**

Des patients traités par la paroxétine déclarent des effets indésirables tels que l'akathisie, qui comprend le fait de se sentir agité ou déboueté tranquillement, sérotoninergique, comportant certaines symptômes, contactez votre pharmacien ou votre médecin si vous avez des effets indésirables de PAROXETINE WIN.

**Interactions avec d'autres médicaments**

**Prise ou utilisation avec d'autres médicaments**