

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1530

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MANSOUR HASSAN

Date de naissance : 15/05/1951

Adresse : 32, Rue des BRUYERES marix est Casab

Tél. 0661464641

Total des frais engagés

1749.00

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 21/07/2023

Nom et prénom du malade : MANSOUR HASSAN

Age :

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Douloul + 65

Pathologie :

INPE : 091191981

10 MAI 2023

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



Déclaration de Maladie

M22-0018295

160080

Autres

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 29/03/2023 | | | 250 | 250 |
| | | | | RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|---|------------|-----------------------|
| Mme. BENNIS Zineb PHARMACIE YACOUB EL MANSOUR 63, 65 Bd. Yacoub El Mansour Tel: 0522 25 52 04 - Casablanca | 29/03/2023 | Montant: 0911991 |

ANALYSES - RADIographies

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Cœfficients | Montant des Honoraires |
|---|------|-----------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX

| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|----------------------------------|----------------|--------|---|---|---|---------------------------------|
| | | A | M | P | C | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | Coefficient des Travaux |
|--|---|------------------|-------------|-------------------------|
| | | | | MONTANTS DES SOINS |
| | | | | DEBUT D'EXECUTION |
| | | | | FIN D'EXECUTION |
| O.D.F PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE | | | Coefficient des Travaux |
| | H | 25533412 | 21433552 | MONTANTS DES SOINS |
| | | 00000000 | 00000000 | DATE DU DEVIS |
| | D | 00000000 | 00000000 | DATE DE L'EXECUTION |
| | B | 35533411 | 11433553 | |
| (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession | | | | |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Loubna KABBAJ

Médecine générale

Femmes - Hommes - Enfants

- Ancien médecin Urgentiste Polyclinique CNSS derb Ghellef, Casablanca
- Diplôme Universitaire de Diabétologie Faculté de Médecine de MONTPELLIER
- Diplôme Inter-universitaire Hypertension Artérielle Faculté de Médecine de STRASBOURG
- Echographie générale
- Electrocardiogramme

الدكتورة لبني قباج

الطب العام

نساء - رجال - أطفال

- طبيبة مستعجلات بمصحة درب غلف المتعددة
- التخصصات للضمان الاجتماعي سابقـا
- دبلوم جامعي في مرض السكري
- كلية الطب مونتيور
- دبلوم بين جامعي في مرض إرتفاع ضغط الدم
- كلية الطب ستراسبورغ
- الشخص بالصدى
- التخطيط الكهربائي للقلب

Casablanca, le : الدار البيضاء في 29/03/2023

MR MANANE HASSAN

- Hytacand 16 mg/12,5 - comprimé
2 Comprimé, matin, pendant 3 mois
- Levothyrox 100 µg - comprimé sécable
1 comprimé le matin pendant 3 mois
- Deroxat 20 mg - comprimé pelliculé sécable
1 comprimé, matin pendant 3 mois
- Glucophage 850 mg - comprimé pelliculé
1 comprimé midi soir pendant 3 mois
- Medizapin 2,5 mg - comprimé
1 Comprimé, soir pendant 3 mois
- Vitamine d3 b.o.n. 200 000 ui / ml - solution injectable im et buvable
1 ampoule/ mois pendant 3 mois

- Resuva 10 mg - comprimé
1 Comprimé, matin pendant 3 mois
- Eużol 40mg - Gélule
1 Gélule, avant les repas pendant 3 mois

05-22 86 14 93

l.kabbaj@hotmail.fr

Abdelmoumen center, Angle bd Abdelmoumen et Bd Anoual

1er étage, bureau 109 - Casablanca

Patente 34700377 - ICE : 001619698000022

05 22 86 14 93

l.kabbaj@hotmail.fr

مجمع عبد المؤمن، زاوية شارع عبد المؤمن وشارع أنوال الطابق الأول

الرقم 109 الدار البيضاء

16 mg/12,5 mg Cpr

Bte de 30

29 DMP/21 INRQ

P.P.V: 176,20 DH

6 118001

020898

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol

- si vous avez déjà eu une crise de goutte.
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux dissiminié (LED).
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol

- si vous avez déjà eu une crise de goutte.
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux dissimilé (LED).
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir

16 mg/12,5 mg Cpr

Bte de 30

29 DMP/21 INRQ

P.P.V: 176,20 DH

6 118001

020898

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol

- si vous avez déjà eu une crise de goutte.
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux dissiminié (LED).
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir

16 mg/12,5 mg Cpr

Bte de 30

29 DMP/21 INRQ

P.P.V: 176,20 DH

6 118001

020898

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol

- si vous avez déjà eu une crise de goutte.
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux dissimilé (LED).
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir

16 mg/12,5 mg Cpr

Bte de 30

29 DMP/21 INRQ

P.P.V: 176,20 DH

6 118001

020898

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol

- si vous avez déjà eu une crise de goutte.
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux dissimilé (LED).
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir

16 mg/12,5 mg Cpr

Bte de 30

29 DMP/21 INRQ

P.P.V: 176,20 DH

6 118001

020898

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

HYTACAND® 8mg/12,5mg, comprimé

HYTACAND® 16mg/12,5mg, comprimé

candésartan cilexétol/hydrochlorthiazide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interroger votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que HYTACAND®, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre HYTACAND®, comprimé ?
3. Comment prendre HYTACAND®, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver HYTACAND®, comprimé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE HYTACAND, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Le nom de votre médicament est HYTACAND. Il est utilisé pour traiter la pression artérielle élevée (hypertension artérielle) chez les patients adultes.

Il contient deux substances actives : le candésartan cilexétol

- si vous avez déjà eu une crise de goutte.
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle.

Si vous n'êtes pas certain(e) que l'une de ces situations vous concerne, parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre HYTACAND.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HYTACAND :

- si vous êtes diabétique.
- si vous avez des problèmes cardiaques, hépatiques ou rénaux.
- si vous avez récemment subi une transplantation rénale.
- si vous avez des vomissements, que vous avez récemment eu des vomissements importants ou si vous avez de la diarrhée.
- si vous souffrez d'une maladie de la glande surrénale appelée syndrome de Conn (ou aussi appelé hyperaldostéronisme primaire).
- si vous avez déjà eu une maladie appelée le lupus érythémateux dissiminié (LED).
- si votre pression artérielle est basse.
- si vous avez déjà eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous avez déjà eu une allergie ou de l'asthme.
- vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

HYTACAND est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir

من المعومات من صبيت أو الصبي.

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع . تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

علامات فرط التدفق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحو سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك ،

عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات والأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، انتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الابلاغ عن الآثار الجانبية:

ة بامراض القلب والاواعية الدموية، وخاصة ناجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية،)، أو ارتفاع ضغط الدم،

ية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و

سي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة).
ر العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH) إجراء بعض التحاليل البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفل).

عند النساء الحوامل: لا ينصح باستخدامه في النصف الثاني من



من المعومات من صبيت أو الصبي.

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع . تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

علامات فرط التدفق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحو سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك ،

عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات والأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، انتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الابلاغ عن الآثار الجانبية:

ة بامراض القلب والاواعية الدموية، وخاصة ناجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية،)، أو ارتفاع ضغط الدم،

ية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و

سي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة).
ر العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH) إجراء بعض التحاليل البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفل).

عند النساء الحوامل: لا ينصح استخدامه في النصف الثاني من



من المعومات من صبيت أو الصبي.

4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتما عند الجميع . تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

علامات فرط التدفق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحو سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك ،

عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات والأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، انتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الابلاغ عن الآثار الجانبية:

ة بامراض القلب والاواعية الدموية، وخاصة ناجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية،)، أو ارتفاع ضغط الدم،

ية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباه و

سي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة).
ر العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH) إجراء بعض التحاليل البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، و إذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفل).

عند النساء الحوامل: لا ينصح باستخدامه في النصف الثاني من



LOT 221854
EXP 12/2027
PPV 45.20D1

إذا تفاقم أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه الفشرة

- 1- ما هو كليكوفاج ، قرص مغلق وما هي حالات استعماله؟
 - 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مغلق؟
 - 3- ما هي طريقة تناول كليكوفاج ، قرص مغلق؟
 - 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟
 - 5- ما هي طريقة حفظ كليكوفاج ، قرص مغلق؟
 - 6- محتوى، العلبة، معلومات إضافية.

٩٤- ما هو ظيكوفاج، ورصن مختلف وما هي حالات استعماله؟
الصنف الصيدلاني: العلاجي A10BA02 code ATC

الصنف الصيدلاني العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي وتحذيرات: يحتوى كليكوفاج على متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ بيغوانيد.

لإنسولين هرمون ينتجه البنكرياس يسمح للجسم باستعادة كمية الغلوكوز (السكر) المتواجد في الدم. يستخدم الجسم الغلوكوز لإنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينتج البنكرياس لديك الإنسولين بكمية كافية أو جسمك ليس قادرًا على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد تناولك وجبات على تخفيف معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح المستوى آمناً، ولكنك من المستحسن الطبيب.

للسنوي أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي .
إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوفاج على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري . يشرك كليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن .

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوفاج؟

يسعدكم في يهودا والجليل والجليل، يستعمل كليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 (المسمى كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتمرين البدني وحدهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.

يستطيع المرضى البالغون تناول **ثليوكفاج** وحده أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابلة للحل أو إنソスولين).
يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول **ثليوكفاج** وحده أو مع الأنسولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكو فاج ، فرص مغلف؟

مواقع الاستعمال:

لا تتناول أبداً كليكوفاج في الحالات التالية:

6. إذا كانت تتعانى من الأرجحية (الحساسية المفرطة) تجاه المتفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد

- إذا كنت تعاني من مسادر في المعدة
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى
- إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمستوي السكر في الدم) بصورة صارمة، غثيان، تقيّع، إسهال، فقدان سريع للوزن، حماض لبني (أنظر "خطر حماض لبني" أسفل) أو حماض كيتوني. الحماض الكيتوني إصابة تكتن في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسباب سكري أولى. الأعراض هي تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

5- إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (اجتلاف)، مثلًا على إثر إسهاه مستمر أو حاد، أو إذا تقطّعت مدة مرات على التوالي، قد يؤدي الاجتلاف إلى مشاكل كثيرة من شأنها أن تعرّضك لخطر الهمضان اللبني، (انظر "تحفّرات واحتياطات").

لخطر الحموض النبوي (نقر لحدب و بحبيبات).
إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثلاً التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكليتين. قد تؤدي الاصابات الحادة إلى مشاكل في الكليتين من شأنها تعريفك لخطر الحموض النبوي
الناظر "انته" مع "الذكى قفاج" [أذناه].

• إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الهاپس اللبني (انظر تحديرات وإنذيرات).
• إذا كنت تتناول علاجا ضد القصور القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الهاپس اللبني (انظر تحديرات وإنذيرات).
• انتظر انتهي مع كليوكواج أدناه.

LOT 221854
EXP 12/2027
PPV 45.20D1

إذا تفاقم أحد الأعراض غير المرغوبة أو إذا لاحظت تأثيرا غير مرغوب لم يرد ذكره في هذه النشرة، عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي به.

على ماذا تحتوي هذه الفشرة

- 1- ما هو كليكوفاج ، قرص مغلق وما هي حالات استعماله؟
 - 2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكوفاج ، قرص مغلق؟
 - 3- ما هي طريقة تناول كليكوفاج ، قرص مغلق؟
 - 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟
 - 5- ما هي طريقة حفظ كليكوفاج ، قرص مغلق؟
 - 6- محتوى، العلبة، معلومات إضافية.

١- ما هو تلوكوفاج ، قرص مختلف وما هي حالات استعماله؟
الصنف الصيدلاني العلاجي A10BA02 code ATC

الصنف الصيدلاني العلاجي A10BA02 code ATC

دواعي وتحذيرات: يحتوى كليكوفاج على متفورمين. إنه دواء مستعمل لعلاج السكري. ينتمي إلى فئة الأدوية المسماة بـ بيغوانيد.

لأنه ينفع في إنتاج الطاقة أو يخزنه لاستخدامه لاحقاً. عندما تكون مريضاً بالسكري، لا ينفع البنكرياس لديك الإنسولين بكيفية كافية أو جسمك ليس قادر على استخدام الإنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح. يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الغلوكوز في الدم. يساعد تناولك وجبات على تخفيف معدل الغلوكوز في دمك حتى يصبح

للسنوي أقرب ما يمكن من المستوى الطبيعي .
إذا كنت بالغاً وتعاني من وزن زائد، يسمح كذلك تناول كليكوفاج على المدى الطويل للمساعدة على الحد من أخطار المضاعفات المصاحبة للسكري . يشترك كليكوفاج بالاستقرار في الوزن أو بفقدان قليل من الوزن .

ما هي الحالات التي يستعمل فيها كليكوفاج؟

يسعدكم في يهودا والسامرة والجليل والجليل، يستعمل كليكوفاج لعلاج السكري من النوع 2 (المسمى كذلك "السكري غير المتوقف على الإنسولين") عندما لا يسمح النظام الغذائي والتغذية البدني وحالهما بالتحكم بمعدل الغلوكوز في الدم. ويستخدم بشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.

يستطيع المرضي البالغون تناول **كليكوفاج وحدة أو مع أدوية أخرى ضد السكري (أدوية قابله للبلع أو إنソولين).**
يستطيع الأطفال في سن العاشرة وما فوق والراهقون تناول كليكوفاج وحدة أو مع الإنソولين.

2- ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول كليكو فاج ، فرص مغلف؟

موانع الاستعمال:

لا تتناول أبداً كليكوفاج في الحالات التالية:

6. إذا كانت تتعانى من الارتجاع (الحساسية المفرطة) تجاه المتفورمين أو أحد المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في الفقرة 6.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد

- إذا كنت تعاني من مسادر في المعدة
- إذا كنت تعاني من تدهور حاد في وظائف الكلى
- إذا كنت تعاني من سكري غير متحكم به، يصاحبه مثلاً فرط سكر الدم (ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم) بصورة صارمة، غثيان، تقيّع، إسهال، فقدان سريع للوزن، حموضة لبني (أنظر "خطر حموضة لبني" أسفل) أو حموضة كيتوني. الحموضة الكيتونية إصابة تكتنف في تراكم مواد في الدم تسمى "أجسام كيتونية" والذي من شأنه التسبب بسببات سكري أوّلية. الأعراض هي تشمل ألم في المعدة، تنفس سريع وعميق، الرغبة في النوم، نفس ذو رائحة فاكهة غير معتادة.

5- إذا فقدت كمية كبيرة من الماء (اجتلاف)، مثلًا على إثر إسهاه مستمر أو حاد، أو إذا تقطّعت عدة مرات على التوالي، قد يؤدي الاجتلاف إلى مشاكل كثيرة من شأنها أن تعرّضك لخطر الهمضان اللبني، (انظر "تحفّرات واحتياطات").

لخطر الحموض اللبناني (النظر تغييرات و إنجيارات).
إذا كنت تعاني من التهاب حاد، مثل التهاب الرئتين أو القصبات، أو التهاب الكليتين. قد تؤدي الاصابات الحادة إلى مشاكل في الكليتين من شأنها تعريفك لخطر الحموض اللبناني

٤) (انظر "انتبه مع كليكوقاج" أدناه).

٥) إذا كنت تتناول علاجا ضد القصور القلبي الحاد أو إذا عانيت من وقت قريب من نوبة قلبية، أو إذا كنت تعاني من مشاكل حادة في ما يخص الدورة الدموية (مثل صدمة)، أو إذا كنت تعاني من صعوبات في التنفس. ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نقص في إمداد الأنسجة بالأكسجين، مما يعرضك لخطر الحماض اللبناني (انظر "تحذيرات وإحتياطات").

LOT : 2453
PER : 08-25
P.P.V : 216 DH 00

us ne devez pas consommer ce médicament si vous avez une indigestion ou une douleur à l'estomac ou une indigestion, ou une diarrhée. Si votre médecin vous a prescrit ce médicament, il vous a recommandé de prendre ce médicament.

pharmacien vous l'a dit. Demandez à votre pharmacien si besoin.

• Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin sera amené à vous surveiller.

• Si votre médecin vous a dit de prendre ce médicament, vous devez l'informer si les symptômes persistent ou se modifient.

Posologie

Votre médecin vous dira le nombre de gélules à prendre et la dose recommandée dépendra de votre état de santé, de votre âge et de votre sexe.

Les doses recommandées sont mentionnées dans le tableau suivant.

Utilisation chez les adultes âgés de 18 ans et plus

Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides)

• Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour la guérison complète.

• La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est de 20 mg une fois par jour.

• Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour la guérison complète.

• Si vous avez de graves problèmes hépatiques, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour.

En cas d'infection par la bactérie appartenant au groupe B streptococcus et prévention de l'ulcère du duodénum et prévention de l'ulcère du duodénum

• La dose recommandée est d'une gélule d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• Votre médecin vous demandera également de prendre de l'amoxicilline et de la clarithromycine.

• La dose recommandée est d'une gélule d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

Prévention des ulcères associés à la prise d'anticoagulants

• La dose recommandée est d'une gélule d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• Votre médecin vous indiquera la dose nécessaire pour la guérison complète. La dose maximale est de 80 mg de EUZOL® une fois par jour.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

• La dose recommandée est de 40 mg d'EUZOL® une fois par jour pendant 4 semaines.

ng
LOT 42327
PER 26/24
E.M.G

Il y a tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Rosuva Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rosuva Promopharm ?
 3. Comment prendre Rosuva Promopharm ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver Rosuva Promopharm ?
 6. Informations supplémentaires.
1. Qu'est-ce que Rosuva Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe Pharmacothérapeutique

La substance active est la rosuvastatine.

Elle appartient à la classe pharmacothérapeutique: Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - Code ATC : C10AA07

Rosuva Promopharm appartient au groupe des médicaments appelés statines.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Rosuva Promopharm vous a été prescrit parce que:

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Rosuva Promopharm est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.
- Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de Rosuva Promopharm.

Ou

- Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

ng
LOT 42327
PER 26/24
E.M.G

Il y a tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Rosuva Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Rosuva Promopharm ?
 3. Comment prendre Rosuva Promopharm ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver Rosuva Promopharm ?
 6. Informations supplémentaires.
1. Qu'est-ce que Rosuva Promopharm et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe Pharmacothérapeutique

La substance active est la rosuvastatine.

Elle appartient à la classe pharmacothérapeutique: Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase - Code ATC : C10AA07

Rosuva Promopharm appartient au groupe des médicaments appelés statines.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Rosuva Promopharm vous a été prescrit parce que:

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Rosuva Promopharm est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.
- Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de Rosuva Promopharm.

Ou

- Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

التدخلات الدوائية

لتفادى أية تدخلات دوائية محتملة، يجب بانتظام إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني عن كل علاج آخر قيد التناول.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا كنت تضدين أنك حاملاً أو تخططين لإجهاض طفل، اسأل طبيبك أو الصيدلاني للحصول على المنشورة قبل تناول هذا الدواء، بإمكان وصف هذا الدواء أثناء الحمل أو الإرضاع إذا لزم الأمر.

كيف يستعمل هذا الدواء

المقادير

في جميع الأحوال يجب التقيد بوصفة الطبيب.
المقادير الاعتبارية هي كالتالي:

الوقاية

عند الرضيع الذي يتغذى بحلليب مزود بالفيتامين D: نصف أنسجة الألve 100 000وحدة دولية كـ 6 أشهـ

في حالة تناول جرعة زائدة، يجب إيقاف العلاج. قلل من تناول الكالسيوم (مثل منتجات الألبان) وشرب الكثير من الماء.

ماذا تفعل إذا نسيت جرعة

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استئناف طبيبك أو الصيدلاني لمزيد من المعلومات.

ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء الرغم من عدم حصول الجميع منها.

شائع (قد يصيب ما يصل إلى 1 من كل 10) في حالة الحقن، يمكن أن تحدث تفاعلات في موس والحكمة والعدوى والورم الحبيبي (الكتلة الحبيبية والتهاب السبيل) (التهاب الأنسجة الدهنية) والعقدة (من الممكن حدوث كتلة صغيرة أو



من صيـ

التدخلات الدوائية

لتفادى أية تدخلات دوائية محتملة، يجب بانتظام إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني عن كل علاج آخر قيد التناول.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا كنت تضدين أنك حاملاً أو تخططين لإجهاض طفل، اسأل طبيبك أو الصيدلاني للحصول على المنشورة قبل تناول هذا الدواء، بإمكان وصف هذا الدواء أثناء الحمل أو الإرضاع إذا لزم الأمر.

كيف يستعمل هذا الدواء

المقادير

في جميع الأحوال يجب التقيد بوصفة الطبيب.
المقادير الاعتبارية هي كالتالي:

الوقاية

عند الرضيع الذي يتغذى بحليب مزود بالفيتامين D: نصف أنسجة الألve 100 000وحدة دولية كـ 6 أشهـ

في حالة تناول جرعة زائدة، يجب إيقاف العلاج. قلل من تناول الكالسيوم (مثل منتجات الألبان) وشرب الكثير من الماء.

ماذا تفعل إذا نسيت جرعة

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استئناف طبيبك أو الصيدلاني لمزيد من المعلومات.

ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء الرغم من عدم حصول الجميع منها.

شائع (قد يصيب ما يصل إلى 1 من كل 10) في حالة الحقن، يمكن أن تحدث تفاعلات في موس والحكمة والعدوى والورم الحبيبي (الكتلة الحبيبية والتهاب السبيل) (التهاب الأنسجة الدهنية) والعقدة (من الممكن حدوث كتلة صغيرة أو



من صيـ

التدخلات الدوائية

لتفادى أية تدخلات دوائية محتملة، يجب بانتظام إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني عن كل علاج آخر قيد التناول.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا كنت تضدين أنك حاملاً أو تخططين لإجهاض طفل، اسأل طبيبك أو الصيدلاني للحصول على المنشورة قبل تناول هذا الدواء، بإمكان وصف هذا الدواء أثناء الحمل أو الإرضاع إذا لزم الأمر.

كيف يستعمل هذا الدواء

المقادير

في جميع الأحوال يجب التقيد بوصفة الطبيب.
المقادير الاعتبارية هي كالتالي:

الوقاية

عند الرضيع الذي يتغذى بحليب مزود بالفيتامين D: نصف أنسجة الألve 100 000وحدة دولية كـ 6 أشهـ

في حالة تناول جرعة زائدة، يجب إيقاف العلاج. قلل من تناول الكالسيوم (مثل منتجات الألبان) وشرب الكثير من الماء.

ماذا تفعل إذا نسيت جرعة

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استئناف طبيبك أو الصيدلاني لمزيد من المعلومات.

ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء الرغم من عدم حصول الجميع منها.

شائع (قد يصيب ما يصل إلى 1 من كل 10) في حالة الحقن، يمكن أن تحدث تفاعلات في موس والحكمة والعدوى والورم الحبيبي (الكتلة الحبيبية والتهاب السبيل) (التهاب الأنسجة الدهنية) والعقدة (من الممكن حدوث كتلة صغيرة أو



من صيـ