

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS EN CAS DE REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-014897

Optique Autres 16086

Maladie Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 823 Société : Royal Air Maroc

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : LAAOUI NA Khadidja

Date de naissance : 01-01-1948

Adresse : 26 Rue Jaber Ben Hayane APPT 36

Escalier A 2^e etage CASABLANCA

Tél. 06 63 07 54 69 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <i>Le des GENERATIONS Ballouk nne en face de la ra Casablanca 50,32</i>	25/04/93	78,20

Dr. Dr. J. B. BLOUW
Dr. Dr. J. B. BLOUW
Dr. Dr. J. B. BLOUW

ANALYSES ERADIOGRAPHIES

Signature et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des coefficients	Montant des Honoraires
	09202940		

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est chargé de la prise en charge traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important Veuillez joindre à ce document la liste des traitements réalisés dans le cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
25533411	11432552

The diagram shows a circular arrangement of 16 numbered circles (1 through 8) on a coordinate system. The horizontal axis is labeled D (left) and G (right). The vertical axis is labeled H (up) and has an arrow pointing downwards. The circles are arranged in four concentric rings. The outermost ring contains 8 circles labeled 1 through 8 clockwise from the top. The next ring contains 8 circles labeled 8 through 1 clockwise from the top. The third ring contains 8 circles labeled 7 through 4 clockwise from the top. The innermost ring contains 8 circles labeled 4 through 1 clockwise from the top. The circles are numbered 1 through 8 in a clockwise direction starting from the top.

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

PHARMACIE DES GENERATIONS
BALLOUK ABDELMAJID
53 RUE JABER IBN HAYANE BD D'ANFA
-CASAB-

Tél : 0522207333

25/04/2023

LAAOUINA KHADIJA

FACTURE N° : 15052

du 25/04/2023

Qté	Désignation	Prix PPV	Montant	TVA
1	D- CURE FORT / 3 AMPOULES	49,60	49,60	7%
2	RHINOFEBRAL GELULES	14,30	28,60	7%
Total TTC				78,20

Arrêtée la présente Facture à la somme de :
SOIXANTE DIX HUIT DIRHAMS ET VINGT CTS

	TAUX	HT	TVA	TTC
7.00%	7,00	73,08	5,12	78,20
		73,08	5,12	78,20

Pharmacie des GENERATIONS
Abdelmajid BALLOUK
53, Rue Jaber Ibn Hayane en face de la
Commune Sidi Belyut Bd d'Anfa Casablanca
Tel : 0522.20.73.33 | 0522.26.50.32

PPV: 49,60 DH
LOT: 20J13
EXP: 10/2023

Notice :
Information de l'utilisateur
D-CURE FORTE 100.000 U.I.,
solution buvable en ampoule, boîtes de 3.
Cholécalciférol (Vitamine D 3).

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

QUE CONTIENT CETTE NOTICE ?

1. Qu'est-ce que D-Cure forte et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser D-Cure forte ?
3. Comment prendre D-Cure forte ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver D-Cure forte ?
6. Information supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE D-CURE FORTE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaceutique : Vitamines.
- Indications thérapeutiques : D-CURE FORTE 100.000 UI est utilisé en tant que traitement d'attaque pour la carence en vitamine D.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER D-CURE FORTE ?

N'utilisez pas D-CURE FORTE :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au cholécalciférol ou à tout autre excipient de D-CURE FORTE (cf. rubrique 6).
- si vous avez moins de 18 ans.
- si vous souffrez d'hypercalcémie (augmentation du taux de calcium dans le sang) et/ou
- si vous souffrez d'hypercalcurie (augmentation du taux de calcium dans les urines).
- si vous souffrez de syndrome hypoparathyroïdisme (perturbation du métabolisme de la hormone parathyroïdienne), puisque le besoin en vitamine D peut être réduit lors de phases de sensibilité normale à la vitamine D. Dans ce cas, il y a un risque de surdosage prolongé. Des dérivés de la vitamine D qui se régulent mieux sont disponibles dans ces cas.
- si vous avez une prédisposition à la formation de calculs rénaux contenant du calcium.
- si vous avez une hypervitaminose D.

Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Utilisez D-CURE FORTE avec précaution :

- si vous présentez des troubles de l'excrétion urinaire de calcium et de phosphate,
- si vous êtes actuellement traité par des dérivés de benzothiadiazine (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire),
- chez les patients immobilisés puisqu'ils risquent de développer une hypercalcémie, (augmentation du taux de calcium dans le sang) et une hypercalcurie (augmentation du taux de calcium dans les urines)
- si vous souffrez de sarcoidose compte tenu du risque accru de conversion de la vitamine D en son métabolite actif. Dans ce cas, il y a lieu de surveiller la calcémie et la calciurie.

Il y a lieu de surveiller l'effet sur le métabolisme calcique et phosphorique chez les patients souffrant d'insuffisance rénale traités avec D-CURE FORTE.

Si d'autres médicaments contenant de la vitamine D sont prescrits, la dose de vitamine D contenue dans D-CURE FORTE doit être prise en considération. L'administration supplémentaire de vitamine D ou de calcium ne peut se faire que sous surveillance médicale. Dans ces cas, les taux de calcium dans le sang et dans les urines doivent être contrôlés.

En cas de traitement prolongé avec D-CURE FORTE, il est recommandé de contrôler les taux de calcium dans le sang et les urines ainsi que la fonction rénale par dosage de la créatinine sérique. La surveillance est particulièrement importante chez les personnes âgées recevant un traitement concomitant par glycosides cardiaques (utilisés pour stimuler la fonction cardiaque) ou diurétiques (utilisés pour stimuler l'excrétion urinaire). En

RHINOFEBRAL®

Gélule, boîte de 20

Paracétamol / Maléate de chlorphénamine/Acidé ascorbique

- Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice.

756.836.07.19

LOT : 220060
EXP : 01/2025
PPV : 14,30 DH

UT.A.V.:

LOT N°: LOT (DH): Add

RHINOFEBRAL® GÉLULES POUR LEUR DES RÉCEPTEURS H1 - N (Système nerveux central) / R (système respiratoire)

Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient du paracétamol, un antihistaminique, la chlorphénamine et de la vitamine C. Il est indiqué pour le traitement symptomatique de l'écoulement nasal lors d'un rhume avec maux de tête et/ou fièvre chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE RHINOFEBRAL, gélule ?

Ne prenez jamais RHINOFEBRAL, gélule :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol, au maléate de chlorphénamine, à l'acide ascorbique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique : Informations supplémentaires

- En cas de maladies associées à la rétention de fer, telles que l'hémochromatose, la thalassémie et l'anémie sidéroblastique,

- En cas d'insuffisance rénale sévère ou hémodialyse,

- Si vous avez une maladie grave du foie,

- Si vous avez une difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,

- Si vous avez un glaucome.

Ce médicament ne doit GÉNÉRALEMENT PAS ETRE UTILISÉ pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre RHINOFEBRAL, gélule.

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, prévenir immédiatement un médecin.

La prise concomitante de ce médicament en association avec l'alcool ou tous les médicaments comprenant de l'alcool est déconseillée (voir RHINOFEBRAL, gélule avec de l'alcool).

Ce médicament contient du paracétamol, du maléate de chlorphénamine, et de la vitamine C. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie).

En cas de survenue d'écoulement nasal purulent comme en cas d'aggravation ou en l'absence d'amélioration de votre état au bout de 5 jours de traitement (persistance de la fièvre...), CONSULTEZ UN MEDECIN.

Il existe des médicaments plus adaptés pour les enfants de moins de 12 ans. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous ou votre enfant avez une maladie héréditaire rare appelée « déficit en glucose-6-phosphate-deshydrogénase », demandez l'avis de votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous souffrez d'une maladie du foie, consultez un médecin avant de prendre ce médicament.

Des réactions cutanées graves ont été signalées très rarement chez des patients recevant du paracétamol. Par conséquent, arrêtez d'utiliser RHINOFEBRAL, gélule et contactez immédiatement votre médecin dès l'apparition d'une éruption cutanée ou tout autre signe d'hypersensibilité (tels que la fièvre, des rougeurs ou de nombreuses petites pustules).

Demandez à un médecin avant utilisation en cas d'antécédents de calculs rénaux. L'acide ascorbique ne doit pas être administré à des doses supérieures à 1 gramme (1000 mg) aux patients atteints de lithiasis rénale.

Si vous souffrez de glaucome (augmentation de la pression de l'œil), si vous avez du mal à uriner

d'origine prostatique, consultez un médecin av...
Si vous souffrez, d'une affection respiratoire chronique, un asthme bronchique ou lorsqu...
consultez un médecin avant d'utiliser ce médicament.
Demandez à votre médecin ou pharmacien av...
dépresseurs du système nerveux central. La c...
En cas de persistance de fièvre ou de douleur l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Des précautions sont nécessaires chez les personnes prédisposées aux constipations chroniques, au...
En cas de maladie grave du foie ou des reins...
Ce médicament peut entraîner une somnolence.

- Il peut être préférable de commencer le traitement par de l'alcool.
- Et d'éviter les médicaments contenant de l'alcool.
Si les symptômes persistent ou s'aggravent, ou doivent arrêter de prendre ce médicament et contactez immédiatement votre médecin.
EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A DEMANDER AU PHARMACIEN.

Enfants

Sans objet.

Prises d'autres médicaments et RHINOFEBRAL

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez d'autres médicaments.

Afin d'éviter les effets néfastes d'un surdosage, évitez les médicaments contenant des anti-allergiques ou des décongestionnants. HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN. Ceci est particulièrement important si vous prenez des médicaments contenant de l'alcool ou des morphiniques (médicaments utilisés pour traiter la douleur). (médicament immunosuppresseur utilisé pour traiter certaines maladies auto-immunes). La prise de ce médicament doit être évitée avec les médicaments qui peuvent augmenter sa toxicité, ainsi qu'avec des médicaments comprenant de l'alcool. Signalez que vous prenez ce médicament si vous prenez également de l'alcool ou de sucre dans le sang.

RHINOFEBRAL, gélule avec de l'alcool

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec de l'alcool. Les patients alcooliques chroniques doivent éviter de prendre ce médicament avec du paracétamol ou d'autres analgésiques ou antipyretiques.

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou que vous allez, si vous prévoyez de l'être, informez votre médecin ou pharmacien. Le fait de la présence de maléate de chlorphénamine dans ce médicament est déconseillé pendant la grossesse sauf avis contre-indication.

AllaITEMENT Ce médicament passe dans le lait maternel. RHINOFEBRAL en cas d'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules, aux risques de somnolence attachés à l'utilisation de ce médicament. Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

Ce médicament est à utiliser avec prudence en conduisant.

3. COMMENT PRENDRE RHINOFEBRAL, gélule

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez la date limite de validité.

Ce médicament est réservé à L'ADULTE ET A LA PERSONNE ENREGISTRÉE.

La dose recommandée est de 1 gélule par prise, sans dépasser 5 gélules par jour.

Mode et voie d'administration

VOIE ORALE.

Les gélules sont à avaler telles quelles avec une boisson.

Fréquence d'administration

Les prises de ce médicament doivent être espacées. En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale), la dose quotidienne doit être diminuée.

Compte tenu de l'effet sédatif de ce médicament.

Durée du traitement

RHINOFEBRAL®

Gélule, boîte de 20

Cétamol /Acide ascorbique/Maléate de Chlorphénamine

UTAV.:

PPV (DH) : LOT N° :

PPV : 14
LOT : 210226
AV : 00000000
H : 4

756.836.07.19

lisez cette notice avant de prendre ce médicament.
en cas de besoin de la relire.

Si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes ave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, pharmacien.

..... 240,00mg
..... 3,20mg
..... 100,00 mg
q.s.p une gélule
de magnésium.

ECEPTEURS H1

un antihistaminique, la chlorphénamine et de la vitamine C.
lique de l'écoulement nasal lors d'un rhume avec maux de tête et/ou fièvre chez

ANT DE PLUS DE 12 ANS.

1 gélule par prise, à renouveler en cas de besoin, au bout de 4 heures, sans dépasser 5 gélules par jour.

Mode et voie d'administration

VOIE ORALE

Les gélules sont à avaler telles quelles avec une boisson (par exemple : eau, lait, jus de fruit).

Durée du traitement

La durée habituelle du traitement est de 5 jours.

Si la fièvre ne diminue pas au bout de 3 jours ou si les signes cliniques s'aggravent, ne continuez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Devant les signes cliniques généraux d'infection, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée.

Fréquence d'administration

Les prises de ce médicament doivent être espacées de 4 heures au minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum.

Compte tenu de l'effet sédatif de ce médicament, il est préférable de commencer le traitement le soir.

Contre-Indications :

Ne prenez jamais RHINOFEBRAL, gélule dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol ou aux antihistaminiques,
- Maladie grave du foie,
- Difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre,
- Glaucome.

Ce médicament ne doit GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, RHINOFEBRAL, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Certains effets indésirables nécessitent D'ARRETER IMMEDIATEMENT LE TRAITEMENT ET D'AVERTIR UN MEDECIN.

Dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption ou une rougeur cutanée ou une réaction allergique pouvant se manifester par un brusque gonflement du visage et de cou ou par un malaise brutal avec chute de la pression artérielle. Il faut immédiatement arrêter le traitement, avertir votre médecin et ne plus jamais reprendre de médicaments contenant du paracétamol.

Exceptionnellement des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains globules blancs ou de certaines cellules du sang comme les plaquettes pouvant se traduire par des saignements de nez ou de gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

D'autres effets indésirables peuvent survenir :

- Somnolence, baisse de vigilance plus marquées en début de traitement,
- Baisse de la mémoire ou de la concentration, vertiges (plus fréquents chez le sujet âgé),
- Incoordination motrice,
- Sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation, rétention d'urine, constipation, palpitations, baisse de pression