

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **1604**

Société : **RAT**

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **Tadili Sidi Hennid**

Date de naissance : **16/10/1969**

Adresse : **06 Avenue Abdelkrim Khatib Casab Rabat**

Tél. : **06 584 269 29**

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Maha RAISOUNI
Professeur de Cardiologie
36, Angle Av. Abtal et Oum Rabii
App. N° 9, Agdal - Rabat

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant


Nature de la maladie : **HTA / dyslipidémie**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2 MAI 2024	CS	1	350,00	Dr. Maha RAIS SOUNI Professeur de Cardiologie 36, Angle Av. Abdes et Oum Rabii Appt. N° 9, Agdal - Rabat

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Montant de la Facture
 PHARMACIE DE L'OCEAN 4 Av. Abdellatif El Khattabi Océan Rabat Tel: 05 37 20 21 76  102045937	PHARMACIE DE L'OCEAN 54 Av. Abdellatif El Khattabi Océan  1950,83

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRES BIO CONNECT Dr. ARISS Soufiane N°40, Bd. Ibn Toumerte les Orangers - Rabat		16/10/2014	120.00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412	21433552	
00000000	00000000	
D		C
00000000	00000000	
35533411	11433553	
	P	

[Création, remont, adjonction]

A diagram of a dental arch (maxilla) with numbered teeth (1 through 8) on both the upper and lower arches. A vertical line labeled 'H' at the top and 'B' at the bottom represents the midline. A horizontal line labeled 'D' on the left and 'G' on the right represents the dental arch. The teeth are numbered as follows: upper arch (H to B): 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; lower arch (B to G): 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. The diagram shows the relationship between the upper and lower arches, with the upper arch being larger and the lower arch being smaller.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur Maha Raissouni

CARDIOLOGUE

Professeur en Cardiologie de la Faculté
de Médecine de Rabat

Ex chef de Service de Cardiologie Clinique à
Hôpital Militaire - Rabat

Diplôme Inter-universitaire
d'Échocardiographie, Bordeaux - France



د. مهـى الـريـسـوـنـى

طـبـيـةـ أـمـرـاـضـ الـقـلـبـ وـ الشـرـاـيـنـ

أـسـتـاذـةـ سـابـقـةـ بـكـلـيـةـ الطـبـ وـ الصـيـدـلـاـةـ بـالـرـيـاـطـ

رـئـيـسـ سـابـقـاـ مـلـصـلـحـةـ الـقـلـبـ بـالـمـسـتـشـفـىـ الـعـسـكـرـىـ

مـحمدـ الـخـامـسـ بـالـرـيـاـطـ

دـيـلـوـمـ جـامـعـيـ فـيـ تـخـطـيـطـ صـدـىـ الـقـلـبـ ،ـ بـورـدوـ -ـ فـرـنـسـ

Rabat le: 02 MAI 2023

NOTE D'HONORAIRES

ICE : 002901392000004

INPE : 101106193

Nom du Patient : TADILI SIDI HAMID

Consultation spécialisée : 350dhs

La somme est arrêtée à : 350dhs

TROIS CENT CINQUANTE DIRHAMS

Dr. Maha RAISSEOUNI
Professeur de Cardiologie
36, Angle Av. Abtal et Oum Rabii
Appt. N° 9, Agdal - Rabat



+212 537 77 41 02 / +212 610 06 83 74



raissounimaha@gmail.com



36, Angle Av. Abtal et Oum Rabii, Appt. 9, Agdal - Rabat

Dr. Arji Soufiane

Spécialiste en Biologie Médicale et de la reproduction

-Diplômé de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
-Diplômé en Médecine et Biologie de la Reproduction à Paris V.
-Ex-Interne et Résident des CHU de Rabat et de Casablanca.

24h/7j
URGENCES

الدكتور عرجي سفيان

الاختصاصي في التحاليل الطبية وبيولوجيا الاجناب

- خريج كلية الطب والصيدلة بالرباط.

- اخصاصي في تحاليل الاجناب بباريس.

- مقيم سابق بالمستشفيات الجامعية بالرباط و الدار البيضاء.

Prélèvement du : 15/05/2023 10:18

Dossier N° : 150523-104



Mr TADILI Sidi Hamid

Date de naissance : 16/07/1949

Prescripteur:

CIN : A24151

Page : 1 / 1

BIOCHIMIE Diasys® Respons-940

EXPLORATION DES ANOMALIES LIPIDIQUES:

Aspect du sérum	Normal		
Cholestérol Total (Technique : Enzymatique CHOD-PAP)	1,35 3,48	g/L mmol/L	(1,1 - 2) (4 - 5,16)
Triglycérides (Technique : Enzymatique au GPO)	0,78 0,89	g/l mmol/l	(0,5 - 1,5) (0,57 - 1,7)
HDL-Cholestérol (Technique : Enzymatique)	0,46 1,19	g/L mmol/L	

Valeurs usuelles (PNEC):

Facteur de risque cardio-vasculaire **majeur** si HDL < 0.4g/L ou 1.04mmol/L

Facteur de risque cardio-vasculaire **mineur** si HDL ≥ 0.6g/L ou 1.55mmol/L

LDL-Cholestérol (Technique : Formule de Friedwald)	0,73 1,88	g/l mmol/l
---	--------------	---------------

Valeurs souhaitables en fonction du risque Cardiovasculaire

- Risque très élevé :	<0.7 g/L ou 1.8 mmol/L
- Risque élevé :	<1.0 g/L ou 2.6 mmol/L
- Risque modéré :	<1.3 g/L ou 3.4 mmol/L
- Risque faible :	<1.9 g/L ou 4.9 mmol/L

TRANSAMINASES :

ASAT (Aspartate Aminotransférase) (Technique : Cinétique IFCC / Respons® 940)	15,60	UI/L	(Inférieur à 35)
ALAT (Alanine Aminotransférase) (Technique : IFCC / Respons® 940)	12,30	UI/L	(Inférieur à 41)

Bilan validé Biologiquement

Prélèvement à Domicile

LABORATOIRES BIOCONNECT
Dr. ARJI Soufiane
N°40, Bd. Ibn Toumerte
les Orangers - Rabat

40 Boulevard Ibn Toumerte les Orangers Rabat

05 37 70 26 27

IF: 48583818

Labo.bioconnect@gmail.com

TP: 25707579

40 شارع ابن تومرت الليمون الرباط

www.bioconnect.ma

ICE: 002693333000036

INPE: 103064424

Dr. Maha RAISSOUNI
Cardiologue



- Ex Professeur de la Faculté de Médecine de Rabat
- Ex medecin Colonel
- Ancien Chef du service de cardiologie clinique à l'Hôpital Militaire Méd V, Rabat

- أستاذة سابقة بكلية الطب والصيدلة بالرباط
- دكتور كولونيل سابق
- طبيبة رئيسة سابقة لمصلحة القلب بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط

Nom et Prénom :

Rabat, le 23/05/2023

ORDONNANCE

M' TADIL Sidi Hamdi

Chlor, UO, HOL, T6
GOT, GPT

LABORATOIRES BIOCONNECT
Dr. ARJI Soufiane
N°40, Bd. Ibn Toumerte
les Orangers - Rabat

Dr. Maha RAISSOUNI
Professeur de Cardiologie
36, Angle Av. Abtal et Oum Rabii
Appt. N° 9, Agdal - Rabat



Dr. Arji Soufiane

Spécialiste en Biologie Médicale et de la reproduction

-Diplômé de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat.
-Diplômé en Médecine et Biologie de la Reproduction à Paris V.
-Ex-Interne et Résident des CHU de Rabat et de Casablanca.

**24h/7j
URGENCES**

الدكتور عرجي سفيان

اختصاصي في التحاليل الطبية وبيولوجيا الإنجاب

-خريج كلية الطب و الصيدلة بالرباط.

-الخبير في تحاليل الانجاب بباريس.

-مقيم سابق بالمستشفيات الجامعية بالرباط و الدار البيضاء.

Facture

N° facture 23-0920

Rabat, le 15/05/2023

Date de prélèvement 15/05/2023

Mr TADILI Sidi Hamid

Code Acte	Designation Acte	Cotation
BL	Bilan lipidique	190 B
TR	Transaminases	100 B
	Déplacement	B

Total B	290	B
Total en dirhams	420,00	DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre cent vingt dirhams***

*LABORATOIRES BIOCONNECT
Dr. ARJI Soufiane
N°40, Bd. Ibn Toumerte
les Orangers - Rabat*

*LABORATOIRES BIOCONNECT
Dr. ARJI Soufiane
N°40, Bd. Ibn Toumerte
les Orangers - Rabat*

Prélèvement à Domicile

40 Boulevard Ibn Toumerte Les Orangers Rabat

05 37 70 26 27

IF: 48583818

Labo.bioconnect@gmail.com

TP: 25707579

شارع ابن تومرت الليمون الرباط

www.bioconnect.ma

ICE: 002693333000036

INPE: 103064424

BIPROL POLYMEDIC® 10 mg

Comprimés pelliculés quadréscables

Boîtes de 30

Bisoprolol fumarate

- * Veiller à médicament
- * Garder à portée de main
- * Si vous avez des doutes, demander à votre pharmacien
- * Ce médicament n'est pas destiné aux enfants
- * Si l'un de vos proches a des réactions indésirables, faire immédiatement appel à un professionnel de la santé

IDENTIFICATION

Composition

Bisoprolol fumarate

Excipients

Excipient à éviter

Sans objet

Classe pharmaco-thérapeutique

La substance active dans ce médicament a pour nom le Fumarate de Bisoprolol. Le fumarate de Bisoprolol appartient à un groupe de médicaments appelés les bêtabloquants.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans :

- * Le traitement de l'hypertension artérielle,
- * La prévention des crises d'angor d'effort (variété de crise d'angine de poitrine).

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie doit être adaptée individuellement. La dose habituelle pour les adultes est d'un comprimé de BIPROL POLYMEDIC 10 mg, une fois par jour. Dans les cas sévères, la dose peut être augmentée à 20 mg une fois par jour. Le traitement par le Bisoprolol doit être instauré à faible dose et augmenté progressivement. Votre médecin décidera de l'augmentation de la dose à appliquer en général selon le schéma suivant :

- * 1,25 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- * 2,5 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- * 3,75 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- * 5 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
- * 7,5 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
- * 10 mg de Bisoprolol une fois par jour en traitement d'entretien

Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou rénale : Aucune adaptation posologique n'est généralement nécessaire chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale de sévérité légère à modérée.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min) et chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction hépatique la dose maximale est de 10 mg par jour.

Posologie chez les personnes âgées

Le traitement doit être initié avec des faibles doses (5 mg) et sous surveillance étroite.

Posologie chez l'enfant :

En l'absence d'étude sur les effets du bisoprolol chez l'enfant, l'utilisation de BIPROL POLYMEDIC 10 mg comprimé pelliculé n'est donc pas recommandée dans ce groupe d'âge.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

BIPROL POLYMEDIC 10 mg, comprimé pelliculé quadréscable doit être pris le matin, avec ou sans nourriture. Avalez le ou les comprimé(s) entier(s) avec un peu d'eau sans le(s) croquer ou l'(es) écraser.

DUREE DE TRAITEMENT :

Le traitement par BIPROL POLYMEDIC 10 mg, comprimé pelliculé quadréscable est habituellement un traitement de longue durée.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais BIPROL POLYMEDIC 10 mg, comprimé pelliculé quadréscable dans les cas suivants :

- * Allergie (hypersensibilité) au Bisoprolol ou à l'un des autres composants.
- * Asthme sévère ou problèmes respiratoires chroniques sévères.

* Troubles sévères de la circulation sanguine dans les membres (de phénomène de Raynaud), pouvant provoquer des picotements dans les doigts ou les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu.

- * Phéochromocytome non traité : tumeur rare de la glande surrénale.
- * Acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang.
- * Insuffisance cardiaque aiguë non contrôlée médicalement.

* Aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant des injections intraveineuses de médicaments qui augmentent la force de contraction du cœur.

- * Rythme cardiaque lent.

* Pression artérielle basse.

* Certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent irrégulier (bloc auriculo-ventriculaire de 2^{me} ou 3^{me} degré, sino-auriculaire, maladie du sinus).

* Choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFECTS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, BIPROL POLYMEDIC 10 mg, comprimé pelliculé quadréscable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Pour éviter la survenue d'une réaction grave, parlez à un médecin si un effet indésirable se produit soudainement ou s'aggrave rapidement. Les effets indésirables les plus graves sont liés à la fonction cardiaque :

* Ralentissement du rythme cardiaque (affecte plus d'1 patient sur 10 chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique et moins d'1 patient sur 10 chez les patients souffrant d'hypertension ou d'angor).

* Aggravation de l'insuffisance cardiaque (affecte plus d'1 patient sur 100 chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique et moins d'1 patient sur 100 chez les patients souffrant d'hypertension ou d'angor).

* Battements cardiaques irréguliers (affecte moins d'1 patient sur 100).

* Aggravation des symptômes de blocage du vaisseau sanguin principal alimentant les jambes, en particulier au début du traitement (fréquence indéterminée).

Si vous ressentez des étourdissements ou une faiblesse ou si vous avez des difficultés pour respirer, veuillez contacter votre médecin aussitôt que possible. Les autres effets indésirables sont présentés ci-dessous en fonction de leur fréquence :

Effets fréquents (affectent moins d'1 patient sur 10) :

- * Fatigue*, sensation de faiblesse (chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique), vertiges*, maux de tête*.

* Sensation de refroidissement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds.

- * Pression artérielle basse.

* Troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée et constipation.

Effets peu fréquents (affectent moins d'1 patient sur 100) :

- * Troubles du sommeil.

* Dépression.

* Vertiges lors du passage à la position debout.

* Gêne respiratoire chez les personnes ayant un asthme ou des problèmes respiratoires chroniques.

* Faiblesse musculaire, crampes.

Effets rares (affectent moins d'1 patient sur 1000) :

- * Troubles de l'audition.

* Rhinite allergique.

* Diminution de la sécrétion de larmes.

* Inflammation du foie pouvant causer un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux.

* Résultats d'analyses anormaux.

* Réactions allergiques à type de démangeaisons, bouffées de chaleur, éruption cutanées.

* Troubles de l'érection.

* Cauchemars, hallucinations.

* Perte de connaissance.

Effets très rares (affectent moins d'1 patient sur 10 000) :

- * Irritation et rougeur des yeux (conjonctivite).

* Chute des cheveux.

* Apparition ou aggravation d'une éruption cutanée squameuse (psoriasis).

65,20

BIPROL POLYMEDIC® 10 mg

Comprimés pelliculés quadréscables

Boîtes de 30

Bisoprolol fumarate

- * Veiller à médicament
- * Garder à portée de main
- * Si vous avez des doutes, demander à votre pharmacien
- * Ce médicament n'est pas destiné aux enfants
- * Si l'un de vos proches a des réactions indésirables, faire immédiatement appel à un professionnel de la santé

IDENTIFICATION

Composition

Bisoprolol fumarate

Excipients

Excipient à éviter

Sans objet

Classe pharmaco-thérapeutique

La substance active dans ce médicament a pour nom le Fumarate de Bisoprolol. Le fumarate de Bisoprolol appartient à un groupe de médicaments appelés les bêtabloquants.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué dans :

- * Le traitement de l'hypertension artérielle,
- * La prévention des crises d'angor d'effort (variété de crise d'angine de poitrine).

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

POSOLOGIE :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La posologie doit être adaptée individuellement. La dose habituelle pour les adultes est d'un comprimé de BIPROL POLYMEDIC 10 mg, une fois par jour. Dans les cas sévères, la dose peut être augmentée à 20 mg une fois par jour. Le traitement par le Bisoprolol doit être instauré à faible dose et augmenté progressivement. Votre médecin décidera de l'augmentation de la dose à appliquer en général selon le schéma suivant :

- * 1,25 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- * 2,5 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- * 3,75 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant une semaine
- * 5 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
- * 7,5 mg de Bisoprolol une fois par jour pendant quatre semaines
- * 10 mg de Bisoprolol une fois par jour en traitement d'entretien

Posologie chez les patients présentant une insuffisance hépatique et/ou rénale : Aucune adaptation posologique n'est généralement nécessaire chez les patients présentant des troubles de la fonction hépatique ou rénale de sévérité légère à modérée.

Chez les patients atteints d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 20 ml/min) et chez les patients présentant des troubles sévères de la fonction hépatique la dose maximale est de 10 mg par jour.

Posologie chez les personnes âgées

Le traitement doit être initié avec des faibles doses (5 mg) et sous surveillance étroite.

Posologie chez l'enfant

En l'absence d'étude sur les effets du bisoprolol chez l'enfant, l'utilisation de BIPROL POLYMEDIC 10 mg comprimé pelliculé n'est donc pas recommandée dans ce groupe d'âge.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

BIPROL POLYMEDIC 10 mg, comprimé pelliculé quadréscable doit être pris le matin, avec ou sans nourriture. Avalez le ou les comprimé(s) entier(s) avec un peu d'eau sans le(s) croquer ou l'(es) écraser.

DUREE DE TRAITEMENT :

Le traitement par BIPROL POLYMEDIC 10 mg, comprimé pelliculé quadréscable est habituellement un traitement de longue durée.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ne prenez jamais BIPROL POLYMEDIC 10 mg, comprimé pelliculé quadréscable dans les cas suivants :

- * Allergie (hypersensibilité) au Bisoprolol ou à l'un des autres composants.
- * Asthme sévère ou problèmes respiratoires chroniques sévères.

* Troubles sévères de la circulation sanguine dans les membres (de phénomène de Raynaud), pouvant provoquer des picotements dans les doigts ou les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu.

* Phéochromocytome non traité : tumeur rare de la glande surrénale. * Acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang.

* Insuffisance cardiaque aiguë non contrôlée médicalement.

* Aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant des injections intraveineuses de médicaments qui augmentent la force de contraction du cœur.

* Rythme cardiaque lent.

* Pression artérielle basse.

* Certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent irrégulier (bloc auriculo-ventriculaire de 2^{me} ou 3^{me} degré, sino-auriculaire, maladie du sinus).

* Choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFECTS NON SOUHAITES ET GENANTS

Comme tous les médicaments, BIPROL POLYMEDIC 10 mg, comprimé pelliculé quadréscable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Pour éviter la survenue d'une réaction grave, parlez à un médecin si un effet indésirable se produit soudainement ou s'aggrave rapidement. Les effets indésirables les plus graves sont liés à la fonction cardiaque :

* Ralentissement du rythme cardiaque (affecte plus d'1 patient sur 10 chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique et moins d'1 patient sur 10 chez les patients souffrant d'hypertension ou d'angor).

* Aggravation de l'insuffisance cardiaque (affecte plus d'1 patient sur 100 chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique et moins d'1 patient sur 100 chez les patients souffrant d'hypertension ou d'angor).

* Battements cardiaques irréguliers (affecte moins d'1 patient sur 100).

* Aggravation des symptômes de blocage du vaisseau sanguin principal alimentant les jambes, en particulier au début du traitement (fréquence indéterminée).

Si vous ressentez des étourdissements ou une faiblesse ou si vous avez des difficultés pour respirer, veuillez contacter votre médecin aussitôt que possible. Les autres effets indésirables sont présentés ci-dessous en fonction de leur fréquence :

Effets fréquents (affectent moins d'1 patient sur 10) :

- * Fatigue*, sensation de faiblesse (chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque chronique), vertiges*, maux de tête.

* Sensation de refroidissement ou d'engourdissement dans les mains et les pieds.

* Pression artérielle basse.

* Troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, diarrhée et constipation.

Effets peu fréquents (affectent moins d'1 patient sur 100) :

- * Troubles du sommeil.
- * Dépression.

* Vertiges lors du passage à la position debout.

* Gêne respiratoire chez les personnes ayant un asthme ou des problèmes respiratoires chroniques.

* Faiblesse musculaire, crampes.

Effets rares (affectent moins d'1 patient sur 1000) :

- * Troubles de l'audition.
- * Rhinite allergique.

* Diminution de la sécrétion de larmes.

* Inflammation du foie pouvant causer un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux.

* Résultats d'analyses anormaux.

* Réactions allergiques à type de démangeaisons, bouffées de chaleur, éruption cutanées.

* Troubles de l'érection.

* Cauchemars, hallucinations.

* Perte de connaissance.

Effets très rares (affectent moins d'1 patient sur 10 000) :

- * Irritation et rougeur des yeux (conjonctivite).

* Chute des cheveux.

* Apparition ou aggravation d'une éruption cutanée squameuse (psoriasis).

PPV (DH) :

LOT N° :

UT.AV. :

LOT:211543
PER:05-2024
PPV:140,00DH

PPV (DH) :

LOT N° :

UT.AV. :

LOT:211542
PER:05-2024
PPV:140,00DH

14210

14210

14210

PPV: 147DH10
PER: 03/25
LOT: M333-2

PPV: 147DH10
PER: 03/25
LOT: M333-2

PPV: 147DH10
PER: 03/25
LOT: M333-2

