

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

M22- 0047561

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 00991 Société : Ram

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : EL HATIBI n'BARKA 161603


Date de naissance : 07/01/1957

Adresse : DALAMANE BLOC CD 5 JEMMONI

Tél. : 0634614776 Total des frais engagés : 1000000 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 10/05/2023

Nom et prénom du malade : El Hatibi n'Barka Age : 66

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète + Hypertension

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 10/05/2023 / /

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhésion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05.05.23	C2	300	300	1er Etg - Casablanca 1er Etg - Casablanca 1er Etg - Casablanca Tél: 05 22 63 62 79
10.05.23	C	0	0	1er Etg - Casablanca 1er Etg - Casablanca 1er Etg - Casablanca Tél: 05 22 63 62 79

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE DU PARADIS GASA Bld. L. N° 8, Hay Mohammadi - Casablanca Tél: 05 22 61 23 00	10/05/23	395,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
12 Bd La Grange - Casablanca Hay Mohammadi - Casablanca laboratoire populaire Fixe: 05 22 61 23 00 Fixe: 08 08 52 55 00 Fixe: 06 61 22 11 00 GSM: 06 62 22 11 00	05/05/23		240,00 HT

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
<img alt="Dental chart showing teeth numbered 1 to 8 in a standard layout with				

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie-
 Cholestérol- Traitement de L'obésité - Maigreur
 Glande Thyoïde- Surrénales- Sein - Stérilité
 -Médecine Fonctionnelle et Métabolique
 -Pied Diabétique
 -Plaies et Cicatrisation
 -Retard de Croissance

- أخصائية في أمراض السكري.
- الغدد، السمنة والهرمونات
- الطب الغذائي والوظيفي
- قدم السكري
- تأخر النمو



NO 15 / 2023:

Dr Bchatibi M Borka:

1445 - B SAC 20 aug 2023



Ngel 1j

HC 2 mois

33p

Ths Gon cp




2 cp x 2 1/2 1003

73p - Parc as



395p - Ngel x 3 1/2 1003



05 22 63 62 79 حكم 1 شارع ابن تاشفين رقم 464. الطابق الأول - الدار البيضاء - الهاتف:

Hakam 1, Boulevard Ibn Tachfin N° 464 1er étage - Casablanca - Tél : 05 22 63 62 79



2305050042 – Mme ECHATIBI Mbarka

10-03-2023

1.17

Triglycérides :


(Enzymatique–colorimétrique)

0.85 g/L

(<2.00)

Normal :	< 2g/L
Risque modéré :	2 - 4 g/L
Risque élevé :	> 4 g/L

Validé par : Dr. SENHAJI RHAZI FATIMA ZAHRA



Date du prélèvement : 05-05-2023 10:22

Code patient : 2109280050

Né(e) le : 01-01-1957 (66 ans)

Mme ECHATIBI Mbarka

Dossier N° : 2305050042

Prescripteur : Dr ADOUAN ILHAM



BIOCHIMIE SANGUINE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE

Urée : 0.31 g/L (0.17-0.43) 10-03-2023 0.44
(Enzymatique) 5.08 mmol/L (2.79-7.05)

Cholestérol total : 2.50 g/L (<2.00) 10-03-2023 2.77
(Enzymatique-colorimétrique-Trinder) 6.46 mmol/l (<5.17)

Normal	< 2 g/L	5.17 mmol/L
Risque modéré	2-2.39 g/L	5.17-6.18 mmol/L
Risque élevé	>=2.40 g/L	6.21 mmol/L

HDL-Cholestérol : 0.71 g/L (>0.35) 10-03-2023 0.69
(Enzymatique-Colorimétrique) 1.83 mmol/L (>0.90)

LDL-Cholestérol 1.62 g/L 10-03-2023 1.85
(Calculée) 4.17 mmol/L

Acceptable	< 1.30g/L	3.4 mmol/L
Limite de risque	1.30-1.60 g/L	3.4 - 4.1 mmol/L
Risque Elevé	> 1.60 g/L	> 4.1 mmol/L

Windows 2 Pro

10 / 05 / 2023

Spécialiste en Endocrinologie - Diabétologie-
Cholestérol- Traitement de L'obésité - Maigreur
Glande Thyoïde- Surrénales- Sein - Stérilité
-Médecine Fonctionnelle et Métabolique
-Pied Diabétique
-Plaies et Cicatrisation
-Retard de Croissance

أخصائية في أمراض السكري.
الغدد، السمنة والهرمونات
- الطب الغذائي والوظيفي
- قدم السكري
- تأخير النمو

Casablanca le :

DR. ADOUAN ILHAM
Endocrinologist - Diabetologist - Nutritionist
Hakam 1, Bd. Ibn Tachfin, N° 464
1er Etg - Casablanca
Tél: 05 22 63 62 79

Dr. ADOUAN ILHAM
Endocrinologist - Diabetologist - Nutritionist
Hakam 1, Bd. Ibn Tachfin, N° 464
1er Etg - Casablanca
Tél: 05 22 63 62 79

- لـ لـ ، نـ لـ ، تـ .
- عـ ئـ ،

DR. ADOUAN ILHAM
Endocrinologist - Diabetologist - Nutritionist
Hakam 1, Bd. Ibn Tachfin, N° 464
1er Etg - Casablanca
Tél: 05 22 63 62 79

Laboratoire Populaire
12 Bd La Grande Peinture
Hay Mohammadi, Casablanca
laboratoirepopulaire@ipam.ma
Fixe1: 05 22 61 33 34
Fixe2: 08 08 52 55 33
GSM: 06 61 23 03 33
GSM: 06 62 22 43 11

LABORATOIRE POPULAIRE D'ANALYSES MEDICALES

12 Bd la grande ceinture Hay Mohammadi Casablanca

Tél : 05 22 61 33 34 / 08 08 52 55 39 - Fax : 05 22 61 33 35

ICE : 002331414000069Patente : 30300440IF : 96513170**FACTURE N° : 230500121**

CASABLANCA le 05-05-2023

Mme ECHATIBI Mbarka

Récapitulatif des analyses			
CN	Analyse	Clé	Coefficient
0106	Cholestérol total	B	30
0108	Cholestérol H D L	B	50
0134	Triglycérides	B	60
0135	Urée	B	30
	LDL calculé	B	30

TOTAL DOSSIER : 240.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : deux cent quarante dirhams .



ازك 20 مل

لدو البالغين
- علاج فرقعة الأذني عشر في حالة العدوى بسبب بكتيريا تدعى هيليكوبكتير بيلوري:
الجرعة الاعتدادية هي 20 مل ملحة مخصوصة بمضادات حيوان (أموكسيسل) و كلارازينوميسين 500 مل ملتر في اليوم لدعة 7 أيام.

- علاج فرقعة المعدة الناتجة عن تناول أدوية مضادة للالتهاب والألم
الجرعة الاعتدادية هي 20 مل ملحة في اليوم. مدة العلاج تزداد بين 4 إلى 8 أسابيع.

- الوقاية من فرقعة المعدة والآذني عشر الناتجة عن تناول أدوية مضادة للالتهاب
20 مل ملتر في اليوم.

لا يجب استعمال إزك من طرف الأطفال الذين تقل عمرهم عن 12 سنة في غياب الشروط
الضرورية.

الذئبة بكتيريا طيوبيكيرميك هي حالة الشلل لا تترددا في استشارة.
في حالة تناول جرعة من إزك 20 مل ملحة أعلى من الموصوف
أعلموا قورا طيوبيكيرميك أو الصودي

في حالة نسيان تناول إزك 20 مل
تناولوا جرعة مضادة لبعض الجرعة التي نسيتها، بل

وأصلوا علاجكم كالمعتاد.

فرقعة غير معروفة فيها
كثيراً دواء مشتبه به، قد ينبع عن هذا الدواء، لدى بعض الأشخاص، تأثيرات جانبية، تكون خطيرة
على الجسم وتحتاج إلى علاج.

تأثيرات شائعة
(الدي 1 إلى 10% من المرضى المعالجين):
الآلام الرأس، إسهال، غثيان، قيء، آلام البطن، تراكم الغازات في البطن.

تأثيرات غير شائعة
(الدي أقل من 1% من المرضى المعالجين):
تشعُّر الدوار، وغثيان، جانبية، مدل (شعور غير طبيعى في منطقة الجلد أو داخلية)، الخمول، الأرق،
ارتفاع أثير البدىء، اضطرابات حلبة (التهاب جذري، الطفح، الحكة)

تأثيرات نادرة
(الدي أقل من 0.1% من المرضى المعالجين):
حاط عقلي عما يحيى، ارتجاف، الاتكاث، والهلوسة، لدى الأشخاص المصابة بأمراض خطيرة،
تدنى ال الرجال (ارتفاع الدرينين لدى الرجال)، هجاف الدم، التهاب القم، داء المبيضات المعدية المعدية المعدية
(عدوى انتانية عن القطر)، انتشار بكتيريا طيوبيكيرميك في منطقة الجلد أو داخلية، الكريات البيضاء،
الصافحة الدموية)، اعتلال دماغي لدى الآلام المفاجئ أو المفاجئ، انتشار بكتيريا طيوبيكيرميك،
الضروري، انتشار جلدية (اداء انتفاخات، تناقض العروق، الوجه، التفتت، الحال،
وأو السنان، تشنج تصفيي، صدمة أرجوحة، دماغي، التهاب الكثيبي الحالى، التعرق الكثيف، اضطرابات
العصير، اضطرابات الدور، وانتفاخات نسبة الصوديوم في الدم).

أخيرها طيوبيكيرميك أو الصودي يتأثر جانبية ظهر ولم تذكرها ضمن هذه النشرة.
إرشادات استعمال الأنابيب المعدية

من المهم أن يتم استعمال الأنابيب المعدية من طرف شخص متربص ذي درجة كافية ليتحقق من
أن الأدوات المستعملة (أنابيب و حقن) مناسبة لهذا النوع من العمليات.

وتحذير من الأدواء غير الغاري يمكن استعماله.
لا يجب استعمال أي سائل آخر.

يجب تنظيف الأنابيب بالماء قبل الاستعمال.

1- ضعوا محتوى البرشة في حفنة ثم تلقي هذه الأخيرة بحوالي 25 مل من الماء و 5 مل من
الهوا.

تنطلب بعض الأنابيب حجم 50 مل من الماء لتزويج المبيضات و تفادي انتباس الأنابيب.
2- حرروا قورا المعدة لمدة دقيقة تقدرها بتفريح المبيضات المسيرة.

3- انتواكوا المعدة في الهواء و تأكروا من أن قورها غير مصعد.
4- صلو الأنابيب بالحقنة مع الحفاظ على الوضعيّة أعلاه.

5- حرروا المعدة ثم شعروا بحر الأسلق، احتفوا قورا 5-10 مل داخل الأنابيب.
بعد ذلك أرغموا المعدة و حرروا (وضعيّة الحقنة يجب أن تكون نحو الأعلى لتفادي انتباس).

6- أعادوا الحقنة إلى الأسلق و احتفوا قورا من جديد 5-10 مل داخل الأنابيب. أعدوا العملية حتى
تفريغ الحقنة.

7- أملأوا الحقنة من جديد ب 25 مل من الماء و 5 مل من الهوا و كبروا العملية 5 رقم إذا نطلب
الأنابيب حتى لا تفيق هناك أي روابس. تناخ بعض الأنابيب 50 مل من الماء.

شكل الهواء و تفريغه

علبة من 7 برشاش، و علب من 14 و من 28 برشاش.

الجدول (C) (القائمة II)

الاحتياط بـ إزك 20 مل
يتحذير به في درجة حرارة لا تتعدي 30°. داخل عليه الخارجية الأصلية، بعيدا عن متناول
الأطفال.

لا يستعمل بعد انتهاء مدة صلاحية التي تظهر على ظهر العلبة.

معلومات هامة
على كل إزك هيليكوبكتير بيلوري قبل استعمال هذا الدواء احتظنوا بها، فقد تحتاجون لراجعتها لاحقا إذا
كان لديكم أي استفسار أو شك فاستشيروا طبيبك أو الصيدلي.
تم وصف هذه الدواء خصيصا لحالتكم فلا تقدموه لأي شخص آخر مما تشابه الأعراض فقد
يسببه له في نتائج سلبية.

إزك هيلاريول 20 مل
إزك هيلاريول المذكور تباهد.

ساع ما فيه أساكازور بما يكتفي برشاش واحدة
ماه إزك 20 مل و متي يجي استعماله؟

هذا الدواء هو عبارة عن برشاش تنتهي على بعييات صغيرة تحمي المعدة.
إذك ينتمي إلى مجموعة الأدوية المطلية لمضحة البرتون، هذا الدواء يقلص إفراز الحمض على
مستوى المعدة.

دواعي الاستعمال:
- علاج التهاب المريء، الموكول بالجزء (التهاب المريء).

- الوقاية من نكبات بعض الالتهابات المرئية.

- علاج أمراض النكبات المعدية المرئية (حروق و تصادم المعدة).

- علاج متلازمة زواجر البرتون.

- علاج فرقعة المعدة الناتجة عن تناول أدوية مضادة للالتهاب والألم.

معلومات ضرورية قبل تناول إزك 20 مل

يجب بضوره إخبار طبيبك أو الصيدلي بأي علاج آخر تتعونه وإن يكن بدون وصفة طيبة.

لا يجب استعمال هذا الدواء إزك 20 مل في الحالات التالية

- الصالحة من أحد مركبات إزك.

- تناول دواء يحتوى على الأنزامينول المستعمل لعلاج مرض فدان المعانة المكتسب.

يجب تجنبه عند تناول إزك 20 مل في الحالات التالية:

- تناول إدوية أخرى كالبروكاتازور أو بيكوتوكاتازور (المعدة الفطرية) ديزابيم (شد القلق)،
فيكتينورين (الصرع) وارزابير (اضطرابات تنافس الدم) أو سيرابير (اضطرابات المعدة بتأثير
النخاع من البروبيولين).

- مشكال حالة في الكبد. يجب إخبار الطبيب عنها، يمكنه تقليلosis المعدة.

- مشكال حالة على مادة أساكازور، يجب إخبار الطبيب عنها.

- يجب إخبار طبيبك إذا تم وصف هذا الدواء لكم مع أدوية أخرى للتخليص من هيليكوبكتير
بيلوري أو في حالة تناولكم إزك في إطار علاج تحد الطبل، كما يجب إخباره بذلك بأي دواء آخر

فيه استعمال.

في حالة تناولكم إزك في إطار علاج تحد الطبل، يجب إخبار طبيبك بأي تغير في الأعراض.

يجب احتفاظه على مادة أساكازور، لا يجب استعمال هذا الدواء في حالة عدم تحمل الفريكتون.

متلازمة سوء الامتصاص الفلاوكور أو الفلاكلاتور أو سيرابير ماتالز أمراض استقلابية
نادرة

الحمل

أخير طبيبك في حالة الحمل أو الرضاعة قبل تناول إزك في هذه الحالات لا يستعمل هذا الدواء إلا
باتباع نصائح الطبيب.

الرضاعة

لا يجب استعمال هذا الدواء أثناء فترة الرضاعة، استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

تناول أو استعمال أدوية أخرى

تناول أو استعمال أدوية أخرى عن أي دواء قد يزيد استعمال أو تم استعماله حدتها
إيتوكاتازور أو بيكوتوكاتازور، ديزابيم، فيكتينورين، وارزابير، أنانافير، كلاريتوكور،
أو سيرابير أو دواء آخر غيره دون وصفة طيبة.

يذكر طبيبك في بعد البرشات الواجب تناولها ومتى يجب تناولها.

ترتبط جرعة البرشات الواجب تناولها ومتى يجب تناولها من الماء، يمكن وضع المحتوى في نصف كأس من الماء غير القاربي، لا يجب

استعمال أي سائل آخر تفريغ المبيضات المغيرة أو حلال 30 دقيقة، حرروا دوما قبل الشرب.

أنظفوا الكأس بعاصفة نصف كأس من الماء وأسروا بعده، يجب بلع جميع المبيضات دون مضغ.

للمرضى الذين يعانون من صعوبات في البلع، يمكنهم إذابة محتوى البرشات في الماء غير غازى
وبلعه على طرق أنابيب معدية.

البرشة المقنطرة هي

للبالغين والأطفال من 12 سنة

- علاج التهاب المريء

4 مل ملحة في اليوم لمدة 4 أسابيع، عند بعض المرضى، يتعين زيادة مدة العلاج الشفاء التام.

- الوقاية من نكبات التهاب المريء

20 مل مرة في اليوم

- علاج أمراض النكبات المعدية المرئية (حروق و تصادم المعدة)

20 مل مرة في اليوم

في حالة استمرار الأعراض بعد 4 أسابيع، استشيري طبيبك.

بعد ذلك، قد يصف لكم طبيبك تناول برشاش 20 مل في اليوم بحسب احتياجاته.

لا ينصح بالعلاج تحت الطبل، أو بحسب الاحتياجات لدى المرضى الذين يتعون على علاجا بالأدوية

المضادة للالتهاب، والذي قد يتسبب في مضاعفة فرقعة المعدة والإلزامي.

ESAC® 20 mg

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

Composition

Esoméprazole..... 20,00 mg
Sous forme d'esomeprazole magnésium trihydraté.

Excipients dont et saccharose : q.s.p 1 gélule gastrorésistante

Qu'est-ce qu'ESAC 20 mg et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament se présente sous forme de gélules contenant des microgranules gastro-résistants.

ESAC est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

ESAC est utilisé dans :

- le traitement de l'oesophagite érosive par reflux (inflammation de l'oesophage),
- la prévention des rechutes de certaines oesophagites (brûlures et remontées acides),
- le traitement de l'ulcère du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée Helicobacter pylori,
- le traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS),
- la prévention des ulcères de l'estomac et du duodénum associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

Quelles sont les informations nécessaires avant de prendre ESAC 20 mg ?

Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

Ne pas utiliser ESAC 20 mg dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à l'un des constituants d'ESAC,
 - si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons,
 - si vous prenez un médicament contenant de l'atazanavir (utilisé dans le traitement du VIH).
- Prendre des précautions particulières avec ESAC 20 mg dans les cas suivants :**
- si vous prenez d'autres médicaments comme l'itraconazole ou le kétocoazole (pour les infections fongiques), le diazépam (contre l'anxiété), la phénytoïne (pour l'épilepsie), la warfarine (pour des troubles de la coagulation sanguine), ou le cisapride (pour des troubles liés à un retard de l'évacuation gastrique).
 - si vous avez des problèmes hépatiques graves. Vous devez en discuter avec votre médecin, il peut réduire la posologie.
 - si vous avez des problèmes rénaux graves. Vous devez en discuter avec votre médecin.

- si une association de médicaments vous est prescrite pour l'éradication de Helicobacter pylori avec ESAC ou si vous prenez ESAC dans le cadre d'un traitement à la demande, vous devez informer votre médecin des autres médicaments que vous prenez.

En cas de traitement à la demande, vous devez informer votre médecin de toutes modifications des symptômes.

En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en sucrase isomaltase (maladies métaboliques rares).

Grossesse

Si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, ou si vous allaitez, dites-le à votre médecin avant de prendre ESAC.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Prise ou utilisation d'autres médicaments.

Il est important d'indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament notamment l'itraconazole ou le kétocoazole, le diazépam, la phénytoïne, la warfarine, l'atazanavir, la clarithromycine ou le cisapride, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Comment prendre ESAC 20 mg ?

Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et quand vous devez les prendre.

Le dosage des gélules que vous prenez et la durée du traitement dépendront de l'importance des symptômes dont vous souffrez.

Vous pouvez prendre vos gélules au cours d'un repas ou à jeun. Les gélules ne doivent pas être mâchées ni croquées.

Elles doivent être avalées entières avec un demi-verre d'eau.

Si vous avez des difficultés pour avaler, le contenu des gélules peut être mis dans un demi-verre d'eau non gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

Vous pouvez alors boire la solution contenant des petits granules immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours avant de boire.

Rincez ensuite le verre en ajoutant le contenu d'un demi-verre d'eau et le boire.

Tous les granules doivent être avalés sans être mâchés ni croqués.

Pour les patients ne pouvant pas avaler, le contenu des gélules peut être dispersés dans de l'eau non gazeuse et administrés par sonde gastrique.

La posologie habituelle est :

Adultes et enfants à partir de 12 ans :

- Traitement de l'oesophagite :

40 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Chez certains patients, un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

- Prévention des rechutes des oesophagites :

20 mg une fois par jour.

- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides)

20 mg une fois par jour.

Si vous avez des difficultés pour avaler, le contenu des gélules peut être mis dans un demi-verre d'eau non gazeuse. Aucun autre liquide ne doit être utilisé.

Adultes :

- Traitement de l'oesophagite :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Prévention des rechutes des oesophagites :

La dose quotidienne est de 10 mg.

- Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien (brûlures et remontées acides) :

La dose quotidienne est de 10 mg.

- Traitement de l'ulcère du duodénum :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement des symptômes de l'ulcère de l'estomac :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

- Traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum associé à l'anti-inflammatoire non stéroïde :

La dose quotidienne est de 20 mg.

-

موسهوف 80 ملغم

Deva Pharmaceutique

فلوغوكلسنول



- الوجه فراءة النشرة كاملاً وبعدها قبل الماء تناول الدواء
- احتفظ بهذه النشرة فقد تحتاج إلى فراغتها من جديد
- إذا كان لديك إستهلاك آخر أو شكل أطلب المزيد من المعلومات إلى طبيبك أو الصيدلي
- وصف هذه الدواء لا يخصك أفرج عن شخص آخر حتى ولو كان لديه نفس الأعراض التي لديك لأنه من الممكن أن يضر به
- إذا أصبحت بعض الآثار الجانبية خطيرة أو لا حظتم أثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة فالرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي

التعريف بالدواء

النسمية

ميسفون 80 ملغم. فرض ينحل عن طريق الفم

التركيب :

فلوغوكلسنول نباتي التمبه 80.00 ملغم

كمية تعادل من فلوغوكلسنول عدم الماء 62.25 ملغم

يتم تناوله عن طريق الفم

اسوغا : لاكتوز، سبليوز دقيق البلاورات، كروسبوفيدون، بوفيدون ك 90، مغبزيوم ستيارات، أسبارتم.

الشكل الصيدلي :

فرض منحل عن طريق الفم

علبة من 10 أو 20 أو 30 فرض منحل

التصنيف الصيدلي - العلاجي :

(A : الجهاز الهضمي والإستقلاب).

(G : الجهاز التناسلي - البولي)

ماهي الحالات التي يستعمل فيها الدواء؟

يوصى هذا الدواء لمعالجة الألام التشنجية في المعدة والسائل الصفراوية والثانية والرحم

تحذير :

موانع الإستعمال :

لا يجوز استخدام هذا الدواء في حال وجود حساسية إتجاه أحد مكوناته في حال الشك، من الضروري أن تطلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

احتياطات الإستعمال :

في حال الشك، لا تترددوا في طلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

التدخلات بين الأدوية والتدخلات الأخرى :

لتفادي التفاعلات المحتملة بين عدة أدوية، يجب تلقائيا إشعار الطبيب أو الصيدلي في حال تلقي أي علاج آخر.

الحمل والإرضاع :

لا يجوز استخدام هذا الدواء أثناء الحمل إلا عند الضرورة.

لا يوصى بإعطاء هذا الدواء للمرأة المرضعة.

يشكل عام، ينبغي دائمًا أثناء الحمل أو الإرضاع طلب رأي الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.

اسوغا ذات تأثير معلوم :

أسبارتم، لاكتوز

طريقة الإستعمال :

الجرعات :

لدى البالغ الجرعات المعتادة في اليوم هي عبارة عن قرصين إثنين للتناول عن طريق الفم، حيث يتم التناول عند حدوث التوبة. تحدد في حالة النشجات الهمامة.

لدى الأطفال: يذاب الفرض في كأس من الماء.

طريقة ووسيلة التناول :

عن طريق الفم

لدى البالغ ينبغي إذابة الأقراص المعدة للتناول عن طريق الفم في كوب من الماء أو تركها تذوب تحت اللسان للحصول على مفعول سريع.

لدى الطفل ينبغي إذابة القرص المعد للتناول عن طريق الفم في كوب من الماء.

الآثار غير المرغوب فيها والمزعجة :

مثل كل مستحضر نشط قد يؤدي تناول هذا الدواء لدى بعض الأشخاص إلى حدوث ردات فعل متفاوتة الإزعاج.

• ردات فعل جلدية حساسية نادرة جدا.

يجب أن تبلغ الطبيب أو الصيدلي في حال حدوث أي رد فعل غير مرغوب فيها أو مزعجة لم ذكر في هذه النشرة.

• يسبب وجود اللكتوز: يجب ألا يتناول هذا الدواء المرضى الذين يعانون من الأمراض الوراثية النادرة مثل فقدان القدرة على تحمل اللكتوز أو نقص اللكتاز أو سوء إمتصاص الكلوكوز أو الكلكتوز.

• تحتوي الأقراص على الأسبارتم الذي يستقلب إلى فيبنيل الأدين الذي يمكن أن يكون مضرًا للمرضى الذين يعانون من بيلة القبضيل سينفون.

الحفظ :

لا يجوز تخطي التاريخ الأقصى للإستعمال المذكور على التوضيب الخارجي.

احتياطات حفظ خاصة :

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 م، بعيدا عن الرطوبة.



Mus...

Phloroglu

LOT : M0932
PER : 01/2026
PPU : 33,00 DH

YC
pharmaceutique

armacien.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à une autre personne.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Dénomination du médicament :

MUSFON® 80 mg, 10, 20 ou 30 comprimés orodispersibles

2. Composition du médicament

Phloroglucinol dihydraté 80 mg

Quantité correspondant en phloroglucinol anhydre à 62,25 mg

Excipients : Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidone K90, stéarate de magnésium, aspartam (E951).qsp un comprimé.

Excipients à effet notoire : aspartame, lactose

3. Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A : appareil digestif et métabolisme)

(G : système génito-urinaire)

4. Indications thérapeutique

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spastiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

5. Posologie :

- Mode et voies d'administration : Voie orale.

Chez l'adulte : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau ou à laisser fondre sous la langue pour obtenir un effet rapide.

Chez l'enfant : les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d'eau.

Posologie

Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 2 comprimés orodispersibles par jour, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.

Chez l'enfant : 1 comprimé orodispersible 2 fois par jour.

6. Contre-indications :

Ne prenez jamais MUSFON 80 mg, comprimés orodispersibles, en cas d'allergie à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Faites attention avec MUSFON 80 mg, comprimés orodispersibles :

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, MUSFON 80 mg, comprimés orodispersibles est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques : éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

en raison de la présence du lactose, les patients atteints de maladies héréditaires rares telles que l'intolérance au galactose, déficit en lactase ou malabsorption du glucose ou du galactose ne doivent pas prendre ce médicament.

les comprimés orodispersibles contiennent de l'aspartam, qui se métabolise en phénylalanine, pouvant être nocif chez les personnes présentant une phénylcétonurie.

8. Mise en garde spéciales et précautions particulières d'emploi

Faites attention avec MUSFON 80 mg, comprimés orodispersibles :

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

9. Interactions :

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

10. Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement

Grossesse et allaitement

L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allait.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

11. Les effets possibles du traitement sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser certaines machines

Sans objet.

12. Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Sans objet.

13. Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Sans objet

Médicament non soumis à prescription médicale.

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine à l'abri de l'humidité. A conserver à une

température ne dépassant pas 30°C.

Tenir hors de la portée des enfants

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Présentations :

Musfon - 80 mg comprimé orodispersible : Boîte de 10 comprimés

Musfon - 80 mg comprimé orodispersible : Boîte de 20 comprimés

Musfon - 80 mg comprimé orodispersible : Boîte de 30 comprimés

Musfon, boîte de 10 comprimés, AMM n° 26/17 DMP/21/NNP

Musfon, boîte de 20 comprimés, AMM n° 24/17 DMP/21/NNP

Musfon, boîte de 30 comprimés, AMM n° 25/17 DMP/21/NNP

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est Janvier 2017



Gélule
Voie orale

Purcarb®

Extrait de séné - Extrait de rhubarbe - Cha

né - Extrait de rhubarbe

LOT : 220291

DLUO : 03/2025

73.00 DH

COMPOSITION

Extrait sec de feuille de séné (cassia angustifolia) 95 mg (extractum Rhei) 30 mg, charbon végétal activé 180 mg

PRESENTATIONS

Boîte de 15 gélules

Boîte de 30 gélules

Boîte de 60 gélules

PROPRIÉTÉS

Purcarb est un régulateur naturel de la fonction intestinale avec une **action unique** : adsorbe les gaz (réduit et soulage les sentiments de ballonnements); améliore et régule le transit intestinal (effet laxatif); possède des **propriétés** désintoxiquantes. Cette action repose sur la synergie d'action de la combinaison **des** actifs naturels.

VOIE D'ADMINISTRATION - INDICATIONS ET POSOLOGIE

Voie orale

Posologie chez l'adulte en fonction des effets recherchés :

- Effet adsorbant (en cas de digestion difficile et ballonnements par formation de gaz intestinaux) : 1 à 3 gélules par jour
- Effet régulateur du transit intestinal en favorisant la vidange du tube digestif (en cas de constipation) : 4 à 6 gélules par jour

Avaler avec un grand verre d'eau en dehors des repas

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Autorisation ministère de santé n° DA 20171612034DMP/20UCAv1



146-147, Zone Industrielle T3 Mellé - Casablanca