

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**Maladie**

**Dentaire**

**Optique**

**Autres**

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 11252

Société :

RAN

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : NADIF YASSIR

Date de naissance : 02/04/1977

Adresse : 1 Ka.Sbat ANNE 2 Im. 51 App. 9<sup>e</sup> G.H.1  
CASA

Tél. : 06.21.77.22.80 Total des frais engagés : ..... Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Abdellah MAMOU  
Neuro - psychiatre  
38, Bd. Rachidi - Casablanca  
Tél. 05 22 47 60 00 / 10

Date de consultation : 10/05/2023

Nom et prénom du malade : NADIF YASSIR Age : .....

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

trouble neurologique

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) : .....

#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
1/05/12 23	C3ND		100	<p><i>E. Abdellah NOUNAOUI</i>  <i>Névréopsychiatre</i>  <i>38, Bd. Rachdi - Casablanca</i>  <i>Tel: 05 22 47 60 00 / 10</i></p> <p><i>INP</i> <i>27136</i></p>

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 SARLAU IMM. 6 11/05/23 INPE 000067220 120-728752000096	00/05/23	1931,50

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000

## **(Création, remont, adjonction)**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

# الدكتور عبد الله مامو

## Docteur Abdellah MAMOU

NEURO - PSYCHIATRE  
 D.U. D'Angers  
 en expertise médicale  
 Ex. attaché des Hôpitaux de Paris  
 Médecin Expert auprès des Tribunaux



اختصاصي في الأمراض العقلية والنفسية  
 حائز من جامعة أنجي على دبلوم  
 الخبرة الطبية  
 ملحق سابق بمستشفيات باريس  
 طبيب محلف لدى المحاكم

Casablanca, Le ٤.٥٥.٢٣

اليلاربيضاء في

Yassir NADIF.

6800 X9

~~S. V.~~

~~N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23  
 N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23  
 N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23~~

150.60  
 X5

~~S. V.~~

~~N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23  
 N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23  
 N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23~~

113.30  
 X5

~~S. V.~~

~~N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23  
 N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23  
 N. 88262 SARLAU  
 Tél: 0522 65 42 23~~

1931.50

~~HARMACIE SADOUQ SARLAU  
 Kasbat Lamine2, Gh11, Imm.6  
 N°4, Lissasfa - Casablanca  
 Tél: 0522 65 42 23 - INPE 092067230  
 Tél: 0522 65 42 23 - INPE 092000096~~

~~Dr. Abdellah MAMOU  
 Neuro - Psychiatre  
 38, Bd. Rachidi - Casablanca  
 Tél: 05 22 47 60 00 / 10~~

Durée de Traitement ٣ mois

R.D.V. le ٠٣/٠٨/٢٠٢٣ à  
 16 H 30

**Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimés pelliculés**

quétiapine fumarate

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Cet effet aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice.

**Que contient cette notice:**

- Qu'est-ce que Seroquel
  - Quelles sont les informations sur Seroquel
  - Comment prendre Seroquel
  - Quels sont les effets indésirables
  - Comment conserver Seroquel
  - Contenu de l'emballage et autre
- 

**1. Qu'est-ce que Seroquel et dans quel cas est-il utilisé**

Seroquel contient une substance qui s'appelle la quétiapine. Cette substance appartient au groupe de médicaments appelés les antipsychotiques. Seroquel peut être utilisé pour traiter diverses maladies telles que :

- Schizophrénie : état dans lequel vous pouvez entendre ou sentir des choses qui ne sont pas présentes, croire des choses qui ne sont pas vraies ou vous sentir inhabituellement suspicieux, anxieux, confus, coupable, tendu ou déprimé.
- Manie : état dans lequel vous pouvez vous sentir très excité, exalté, agité, enthousiaste ou hyperactif ou avoir un mauvais jugement incluant le fait d'être agressif ou perturbateur.
- Dépression bipolaire : état dans lequel vous pouvez avoir un sentiment de tristesse ou vous pouvez vous sentir déprimé, vous sentir coupable, manquer d'énergie, perdre l'appétit ou ne pas parvenir à dormir.

Votre médecin peut continuer à vous prescrire Seroquel même lorsque vous vous sentez mieux.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Seroquel****Ne prenez jamais Seroquel si:**

- vous êtes allergique (hypersensible) à la quétiapine ou à l'un des autres composants contenus dans Seroquel (Voir rubrique 6: Informations supplémentaires).
- vous prenez un des médicaments suivants :
  - inhibiteurs de la protéase, tels que le nelfinavir (contre les infections par le VIH)
  - médicaments azolés (contre les infections par champignons)
  - médicaments pour les infections (comme l'érythromycine ou la clarithromycine)
  - néfazodone (contre la dépression)

Ne prenez pas Seroquel si ce qui précède s'applique à vous. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Seroquel.

**Faites attention avec Seroquel**

Avant de prendre Seroquel, faites attention avec Seroquel si :

**Si vous arrêtez de prendre Seroquel**

Si vous arrêtez brusquement de prendre Seroquel, vous pourriez être incapable de dormir (insomnies), vous sentir mal (nausées) ou souffrir de maux de tête, de diarrhées, de vomissements, de vertiges ou d'irritabilité. Votre médecin pourra vous proposer de réduire progressivement la dose avant d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, Seroquel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si l'un des événements suivants se produit, arrêtez de prendre Seroquel et contactez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche, car vous pourriez avoir besoin de soins médicaux d'urgence:

**Peu fréquent** (affecte moins de 1 personne sur 100):

- Convulsions ou attaques
- Réactions allergiques telles que boursouflures (marbrures), gonflement de la peau et gonflement autour de la bouche
- Mouvements incontrôlables, particulièrement au niveau du visage ou de la langue (dyskinésie tardive).

**Rare** (affecte moins de 1 personne sur 1000):

- Une température élevée (fièvre), maux de gorge persistants ou des ulcères buccaux, respiration plus rapide, transpiration, muscles rigides, une sensation de somnolence ou d'évanouissement, une augmentation importante de la tension artérielle ou du rythme cardiaque.
- Jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux).
- Priapisme (érection prolongée et douloureuse).
- Caillots sanguins dans les veines, en particulier dans les jambes (ces symptômes incluent gonflement, douleur et rougeur dans la jambe), qui peuvent traverser les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons, en causant des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

**Très rare** (affecte moins de 1 personne sur 10 000):

- Réaction allergique sévère pouvant provoquer des difficultés respiratoires, vertiges et collapsus.
- Hépatite (inflammation du foie).
- Gonflement rapide de la peau, généralement autour des yeux, des lèvres et de la gorge.

**D'autres effets secondaires possibles:**

**Très fréquent** (touche plus de 1 personne sur 10):

- Vertiges (pouvant conduire à des chutes), maux de tête, bouche sèche
- Somnolence (ceci peut disparaître après quelques temps lorsque vous continuez de prendre Seroquel) (pouvant conduire à des chutes)
- Symptômes d'interruption du traitement (symptômes qui apparaissent lorsque vous arrêtez de prendre Seroquel) incluent : être incapable de dormir (insomnies), se sentir mal (nausées), maux de tête, diarrhées, être mal (vomissements), vertiges et irritabilité. Un sevrage progressif sur une période d'au moins 1 à 2 semaines est souhaitable.
- Prise de poids.

**Fréquents** (affecte moins de 1 personne sur 10):

- Battements de cœur accélérés ou évanouissement
- Nez encombré.
- Constipation ou constipation.

**Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimés pelliculés**

quétiapine fumarate

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Cet effet aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice.

**Que contient cette notice:**

- Qu'est-ce que Seroquel
  - Quelles sont les informations sur Seroquel
  - Comment prendre Seroquel
  - Quels sont les effets indésirables
  - Comment conserver Seroquel
  - Contenu de l'emballage et autre
- 

**1. Qu'est-ce que Seroquel et dans quel cas est-il utilisé**

Seroquel contient une substance qui s'appelle la quétiapine. Cette substance appartient au groupe de médicaments appelés les antipsychotiques. Seroquel peut être utilisé pour traiter diverses maladies telles que :

- Schizophrénie : état dans lequel vous pouvez entendre ou sentir des choses qui ne sont pas présentes, croire des choses qui ne sont pas vraies ou vous sentir inhabituellement suspicieux, anxieux, confus, coupable, tendu ou déprimé.
- Manie : état dans lequel vous pouvez vous sentir très excité, exalté, agité, enthousiaste ou hyperactif ou avoir un mauvais jugement incluant le fait d'être agressif ou perturbateur.
- Dépression bipolaire : état dans lequel vous pouvez avoir un sentiment de tristesse ou vous pouvez vous sentir déprimé, vous sentir coupable, manquer d'énergie, perdre l'appétit ou ne pas parvenir à dormir.

Votre médecin peut continuer à vous prescrire Seroquel même lorsque vous vous sentez mieux.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Seroquel****Ne prenez jamais Seroquel si:**

- vous êtes allergique (hypersensible) à la quétiapine ou à l'un des autres composants contenus dans Seroquel (Voir rubrique 6: Informations supplémentaires).
- vous prenez un des médicaments suivants :
  - inhibiteurs de la protéase, tels que le nelfinavir (contre les infections par le VIH)
  - médicaments azolés (contre les infections par champignons)
  - médicaments pour les infections (comme l'érythromycine ou la clarithromycine)
  - néfazodone (contre la dépression)

Ne prenez pas Seroquel si ce qui précède s'applique à vous. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Seroquel.

**Faites attention avec Seroquel**

Avant de prendre Seroquel, faites attention avec Seroquel si :

**Si vous arrêtez de prendre Seroquel**

Si vous arrêtez brusquement de prendre Seroquel, vous pourriez être incapable de dormir (insomnies), vous sentir mal (nausées) ou souffrir de maux de tête, de diarrhées, de vomissements, de vertiges ou d'irritabilité. Votre médecin pourra vous proposer de réduire progressivement la dose avant d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, Seroquel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si l'un des événements suivants se produit, arrêtez de prendre Seroquel et contactez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche, car vous pourriez avoir besoin de soins médicaux d'urgence:

**Peu fréquent** (affecte moins de 1 personne sur 100):

- Convulsions ou attaques
- Réactions allergiques telles que boursouflures (marbrures), gonflement de la peau et gonflement autour de la bouche
- Mouvements incontrôlables, particulièrement au niveau du visage ou de la langue (dyskinésie tardive).

**Rare** (affecte moins de 1 personne sur 1000):

- Une température élevée (fièvre), maux de gorge persistants ou des ulcères buccaux, respiration plus rapide, transpiration, muscles rigides, une sensation de somnolence ou d'évanouissement, une augmentation importante de la tension artérielle ou du rythme cardiaque.
- Jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux).
- Priapisme (érection prolongée et douloureuse).
- Caillots sanguins dans les veines, en particulier dans les jambes (ces symptômes incluent gonflement, douleur et rougeur dans la jambe), qui peuvent traverser les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons, en causant des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

**Très rare** (affecte moins de 1 personne sur 10 000):

- Réaction allergique sévère pouvant provoquer des difficultés respiratoires, vertiges et collapsus.
- Hépatite (inflammation du foie).
- Gonflement rapide de la peau, généralement autour des yeux, des lèvres et de la gorge.

**D'autres effets secondaires possibles:**

**Très fréquent** (touche plus de 1 personne sur 10):

- Vertiges (pouvant conduire à des chutes), maux de tête, bouche sèche
- Somnolence (ceci peut disparaître après quelques temps lorsque vous continuez de prendre Seroquel) (pouvant conduire à des chutes)
- Symptômes d'interruption du traitement (symptômes qui apparaissent lorsque vous arrêtez de prendre Seroquel) incluent : être incapable de dormir (insomnies), se sentir mal (nausées), maux de tête, diarrhées, être mal (vomissements), vertiges et irritabilité. Un sevrage progressif sur une période d'au moins 1 à 2 semaines est souhaitable.
- Prise de poids.

**Fréquents** (affecte moins de 1 personne sur 10):

- Battements de cœur accélérés ou évanouissement
- Nez encombré.
- Constipation ou constipation.

**Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimés pelliculés**

quétiapine fumarate

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Cet effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice.

**Que contient cette notice:**

- Qu'est-ce que Seroquel
  - Quelles sont les informations sur Seroquel
  - Comment prendre Seroquel
  - Quels sont les effets indésirables
  - Comment conserver Seroquel
  - Contenu de l'emballage et autre
- 

**1. Qu'est-ce que Seroquel et dans quel cas est-il utilisé**

Seroquel contient une substance qui s'appelle la quétiapine. Cette substance appartient au groupe de médicaments appelés les antipsychotiques. Seroquel peut être utilisé pour traiter diverses maladies telles que :

- Schizophrénie : état dans lequel vous pouvez entendre ou sentir des choses qui ne sont pas présentes, croire des choses qui ne sont pas vraies ou vous sentir inhabituellement suspicieux, anxieux, confus, coupable, tendu ou déprimé.
- Manie : état dans lequel vous pouvez vous sentir très excité, exalté, agité, enthousiaste ou hyperactif ou avoir un mauvais jugement incluant le fait d'être agressif ou perturbateur.
- Dépression bipolaire : état dans lequel vous pouvez avoir un sentiment de tristesse ou vous pouvez vous sentir déprimé, vous sentir capable, manquer d'énergie, perdre l'appétit ou ne pas parvenir à dormir.

Votre médecin peut continuer à vous prescrire Seroquel même lorsque vous vous sentez mieux.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Seroquel****Ne prenez jamais Seroquel si:**

- vous êtes allergique (hypersensible) à la quétiapine ou à l'un des autres composants contenus dans Seroquel (Voir rubrique 6: Informations supplémentaires).
- vous prenez un des médicaments suivants :
  - inhibiteurs de la protéase, tels que le nelfinavir (contre les infections par le VIH)
  - médicaments azolés (contre les infections par champignons)
  - médicaments pour les infections (comme l'érythromycine ou la clarithromycine)
  - néfazodone (contre la dépression)

Ne prenez pas Seroquel si ce qui précède s'applique à vous. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Seroquel.

**Faites attention avec Seroquel**

Avant de prendre Seroquel, faites attention avec Seroquel si :

**Si vous arrêtez de prendre Seroquel**

Si vous arrêtez brusquement de prendre Seroquel, vous pourriez être incapable de dormir (insomnies), vous sentir mal (nausées) ou souffrir de maux de tête, de diarrhées, de vomissements, de vertiges ou d'irritabilité. Votre médecin pourra vous proposer de réduire progressivement la dose avant d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, Seroquel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si l'un des événements suivants se produit, arrêtez de prendre Seroquel et contactez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche, car vous pourriez avoir besoin de soins médicaux d'urgence:

**Peu fréquent** (affecte moins de 1 personne sur 100):

- Convulsions ou attaques
- Réactions allergiques telles que boursouflures (marbrures), gonflement de la peau et gonflement autour de la bouche
- Mouvements incontrôlables, particulièrement au niveau du visage ou de la langue (dyskinésie tardive).

**Rare** (affecte moins de 1 personne sur 1000):

- Une température élevée (fièvre), maux de gorge persistants ou des ulcères buccaux, respiration plus rapide, transpiration, muscles rigides, une sensation de somnolence ou d'évanouissement, une augmentation importante de la tension artérielle ou du rythme cardiaque.
- Jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux).
- Priapisme (érection prolongée et douloureuse).
- Caillots sanguins dans les veines, en particulier dans les jambes (ces symptômes incluent gonflement, douleur et rougeur dans la jambe), qui peuvent traverser les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons, en causant des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

**Très rare** (affecte moins de 1 personne sur 10 000):

- Réaction allergique sévère pouvant provoquer des difficultés respiratoires, vertiges et collapsus.
- Hépatite (inflammation du foie).
- Gonflement rapide de la peau, généralement autour des yeux, des lèvres et de la gorge.

**D'autres effets secondaires possibles:**

**Très fréquent** (touche plus de 1 personne sur 10):

- Vertiges (pouvant conduire à des chutes), maux de tête, bouche sèche
- Somnolence (ceci peut disparaître après quelques temps lorsque vous continuez de prendre Seroquel) (pouvant conduire à des chutes)
- Symptômes d'interruption du traitement (symptômes qui apparaissent lorsque vous arrêtez de prendre Seroquel) incluent : être incapable de dormir (insomnies), se sentir mal (nausées), maux de tête, diarrhées, être mal (vomissements), vertiges et irritabilité. Un sevrage progressif sur une période d'au moins 1 à 2 semaines est souhaitable.
- Prise de poids.

**Fréquents** (affecte moins de 1 personne sur 10):

- Battements de cœur accélérés ou évanouissement
- Nez encombré.
- Constipation ou constipation.

**Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimés pelliculés**

quétiapine fumarate

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Cet effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice.

**Que contient cette notice:**

- Qu'est-ce que Seroquel
  - Quelles sont les informations sur Seroquel
  - Comment prendre Seroquel
  - Quels sont les effets indésirables
  - Comment conserver Seroquel
  - Contenu de l'emballage et autre
- 

**1. Qu'est-ce que Seroquel et dans quel cas est-il utilisé**

Seroquel contient une substance qui s'appelle la quétiapine. Cette substance appartient au groupe de médicaments appelés les antipsychotiques. Seroquel peut être utilisé pour traiter diverses maladies telles que :

- Schizophrénie : état dans lequel vous pouvez entendre ou sentir des choses qui ne sont pas présentes, croire des choses qui ne sont pas vraies ou vous sentir inhabituellement suspicieux, anxieux, confus, coupable, tendu ou déprimé.
- Manie : état dans lequel vous pouvez vous sentir très excité, exalté, agité, enthousiaste ou hyperactif ou avoir un mauvais jugement incluant le fait d'être agressif ou perturbateur.
- Dépression bipolaire : état dans lequel vous pouvez avoir un sentiment de tristesse ou vous pouvez vous sentir déprimé, vous sentir capable, manquer d'énergie, perdre l'appétit ou ne pas parvenir à dormir.

Votre médecin peut continuer à vous prescrire Seroquel même lorsque vous vous sentez mieux.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Seroquel****Ne prenez jamais Seroquel si:**

- vous êtes allergique (hypersensible) à la quétiapine ou à l'un des autres composants contenus dans Seroquel (Voir rubrique 6: Informations supplémentaires).
- vous prenez un des médicaments suivants :
  - inhibiteurs de la protéase, tels que le nelfinavir (contre les infections par le VIH)
  - médicaments azolés (contre les infections par champignons)
  - médicaments pour les infections (comme l'érythromycine ou la clarithromycine)
  - néfazodone (contre la dépression)

Ne prenez pas Seroquel si ce qui précède s'applique à vous. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Seroquel.

**Faites attention avec Seroquel**

Avant de prendre Seroquel, faites attention avec Seroquel si :

**Si vous arrêtez de prendre Seroquel**

Si vous arrêtez brusquement de prendre Seroquel, vous pourriez être incapable de dormir (insomnies), vous sentir mal (nausées) ou souffrir de maux de tête, de diarrhées, de vomissements, de vertiges ou d'irritabilité. Votre médecin pourra vous proposer de réduire progressivement la dose avant d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, Seroquel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si l'un des événements suivants se produit, arrêtez de prendre Seroquel et contactez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche, car vous pourriez avoir besoin de soins médicaux d'urgence:

**Peu fréquent** (affecte moins de 1 personne sur 100):

- Convulsions ou attaques
- Réactions allergiques telles que boursouflures (marbrures), gonflement de la peau et gonflement autour de la bouche
- Mouvements incontrôlables, particulièrement au niveau du visage ou de la langue (dyskinésie tardive).

**Rare** (affecte moins de 1 personne sur 1000):

- Une température élevée (fièvre), maux de gorge persistants ou des ulcères buccaux, respiration plus rapide, transpiration, muscles rigides, une sensation de somnolence ou d'évanouissement, une augmentation importante de la tension artérielle ou du rythme cardiaque.
- Jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux).
- Priapisme (érection prolongée et douloureuse).
- Caillots sanguins dans les veines, en particulier dans les jambes (ces symptômes incluent gonflement, douleur et rougeur dans la jambe), qui peuvent traverser les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons, en causant des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

**Très rare** (affecte moins de 1 personne sur 10 000):

- Réaction allergique sévère pouvant provoquer des difficultés respiratoires, vertiges et collapsus.
- Hépatite (inflammation du foie).
- Gonflement rapide de la peau, généralement autour des yeux, des lèvres et de la gorge.

**D'autres effets secondaires possibles:**

**Très fréquent** (touche plus de 1 personne sur 10):

- Vertiges (pouvant conduire à des chutes), maux de tête, bouche sèche
- Somnolence (ceci peut disparaître après quelques temps lorsque vous continuez de prendre Seroquel) (pouvant conduire à des chutes)
- Symptômes d'interruption du traitement (symptômes qui apparaissent lorsque vous arrêtez de prendre Seroquel) incluent : être incapable de dormir (insomnies), se sentir mal (nausées), maux de tête, diarrhées, être mal (vomissements), vertiges et irritabilité. Un sevrage progressif sur une période d'au moins 1 à 2 semaines est souhaitable.
- Prise de poids.

**Fréquents** (affecte moins de 1 personne sur 10):

- Battements de cœur accélérés ou évanouissement
- Nez encombré.
- Constipation ou constipation.

**Seroquel 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimés pelliculés**

quétiapine fumarate

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Cet effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice.

**Que contient cette notice:**

- Qu'est-ce que Seroquel
  - Quelles sont les informations sur Seroquel
  - Comment prendre Seroquel
  - Quels sont les effets indésirables
  - Comment conserver Seroquel
  - Contenu de l'emballage et autre
- 

**1. Qu'est-ce que Seroquel et dans quel cas est-il utilisé**

Seroquel contient une substance qui s'appelle la quétiapine. Cette substance appartient au groupe de médicaments appelés les antipsychotiques. Seroquel peut être utilisé pour traiter diverses maladies telles que :

- Schizophrénie : état dans lequel vous pouvez entendre ou sentir des choses qui ne sont pas présentes, croire des choses qui ne sont pas vraies ou vous sentir inhabituellement suspicieux, anxieux, confus, coupable, tendu ou déprimé.
- Manie : état dans lequel vous pouvez vous sentir très excité, exalté, agité, enthousiaste ou hyperactif ou avoir un mauvais jugement incluant le fait d'être agressif ou perturbateur.
- Dépression bipolaire : état dans lequel vous pouvez avoir un sentiment de tristesse ou vous pouvez vous sentir déprimé, vous sentir capable, manquer d'énergie, perdre l'appétit ou ne pas parvenir à dormir.

Votre médecin peut continuer à vous prescrire Seroquel même lorsque vous vous sentez mieux.

**2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Seroquel****Ne prenez jamais Seroquel si:**

- vous êtes allergique (hypersensible) à la quétiapine ou à l'un des autres composants contenus dans Seroquel (Voir rubrique 6: Informations supplémentaires).
- vous prenez un des médicaments suivants :
  - inhibiteurs de la protéase, tels que le nelfinavir (contre les infections par le VIH)
  - médicaments azolés (contre les infections par champignons)
  - médicaments pour les infections (comme l'érythromycine ou la clarithromycine)
  - néfazodone (contre la dépression)

Ne prenez pas Seroquel si ce qui précède s'applique à vous. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Seroquel.

**Faites attention avec Seroquel**

Avant de prendre Seroquel, faites attention avec Seroquel si :

**Si vous arrêtez de prendre Seroquel**

Si vous arrêtez brusquement de prendre Seroquel, vous pourriez être incapable de dormir (insomnies), vous sentir mal (nausées) ou souffrir de maux de tête, de diarrhées, de vomissements, de vertiges ou d'irritabilité. Votre médecin pourra vous proposer de réduire progressivement la dose avant d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. Quels sont les effets indésirables éventuels**

Comme tous les médicaments, Seroquel peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si l'un des événements suivants se produit, arrêtez de prendre Seroquel et contactez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus proche, car vous pourriez avoir besoin de soins médicaux d'urgence:

**Peu fréquent** (affecte moins de 1 personne sur 100):

- Convulsions ou attaques
- Réactions allergiques telles que boursouflures (marbrures), gonflement de la peau et gonflement autour de la bouche
- Mouvements incontrôlables, particulièrement au niveau du visage ou de la langue (dyskinésie tardive).

**Rare** (affecte moins de 1 personne sur 1000):

- Une température élevée (fièvre), maux de gorge persistants ou des ulcères buccaux, respiration plus rapide, transpiration, muscles rigides, une sensation de somnolence ou d'évanouissement, une augmentation importante de la tension artérielle ou du rythme cardiaque.
- Jaunisse (coloration jaune de la peau et des yeux).
- Priapisme (érection prolongée et douloureuse).
- Caillots sanguins dans les veines, en particulier dans les jambes (ces symptômes incluent gonflement, douleur et rougeur dans la jambe), qui peuvent traverser les vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons, en causant des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires.

**Très rare** (affecte moins de 1 personne sur 10 000):

- Réaction allergique sévère pouvant provoquer des difficultés respiratoires, vertiges et collapsus.
- Hépatite (inflammation du foie).
- Gonflement rapide de la peau, généralement autour des yeux, des lèvres et de la gorge.

**D'autres effets secondaires possibles:**

**Très fréquent** (touche plus de 1 personne sur 10):

- Vertiges (pouvant conduire à des chutes), maux de tête, bouche sèche
- Somnolence (ceci peut disparaître après quelques temps lorsque vous continuez de prendre Seroquel) (pouvant conduire à des chutes)
- Symptômes d'interruption du traitement (symptômes qui apparaissent lorsque vous arrêtez de prendre Seroquel) incluent : être incapable de dormir (insomnies), se sentir mal (nausées), maux de tête, diarrhées, être mal (vomissements), vertiges et irritabilité. Un sevrage progressif sur une période d'au moins 1 à 2 semaines est souhaitable.
- Prise de poids.

**Fréquents** (affecte moins de 1 personne sur 10):

- Battements de cœur accélérés ou évanouissement
- Nez encombré.
- Constipation ou constipation.



#### NOTICE : INFORMATIONS DE L'UTILISATEUR

## Dépakine® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

#### acide valproïque et valproate de sodium

SANOFI

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

#### MISE EN GARDE

**DEPAKINE CHRONO PEUT NUIRE GRAVEMENT A L'ENFANT A  
NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSETE**

NAITRE SI LE PÈRE EST PRÉS L'ENDANT LA GROSSESSE.  
Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
  - si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

#### Si du valproate vous

sanofi-aventis Maroc une femme

Route de Rabat - R.P.1-  
Ain Sebaâ 20250 - Casablanca  
DEPAKINE CHRONO 500MG CP PEL B30  
D.N. : 113DH30

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Ce qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

## Quel contenu cette notice :

1. Qu'est-ce que Dépakine Chrono
  2. Quelles sont les informations à connaitre sur Dépakine Chrono
  3. Comment prendre Dépakine Chrono
  4. Quels sont les effets indésirables de Dépakine Chrono
  5. Comment conserver Dépakine Chrono
  6. Contenu de l'emballage et autres

## 1. QU'EST-CE QUE DEPAKINE CHROMOLYSE UTILISE

Classe pharmacothérapeutique : ANT  
Dépakine Chrono appartient à une famille d'anticonvulsifs.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A PRENDRE DE LA KINE CHRONO

#### Centre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono

- si vous êtes enceinte, sauf si aucun autre traitement de l'épilepsie n'est efficace pour vous (voir rubrique « allaitement et fertilité - Conseils pour les femmes »),
  - si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que aucun autre traitement de l'épilepsie n'est efficace pour vous (vous êtes capable de respecter toutes les mesures de prévention pour éviter une grossesse - voir rubrique « allaitement et fertilité - Conseils pour les femmes »).
  - si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants de la pilule mentionnés dans la rubrique 6,
  - si vous êtes allergique à un médicament contenant le valproate (divalproate, valpromide),
  - si vous avez une maladie du foie (voir rubrique 6),
  - si vous ou un membre de votre famille avez une maladie grave notamment liée à la prise de médicaments,
  - si vous souffrez d'une porphyrie héréditaire (voir rubrique 6),
  - si vous avez un problème génétique mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS),
  - si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 6),
  - si vous prenez en même temps des médicaments pour traiter la dépression).



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Dépakine® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

acide valproïque et valproate de sodium

SANOFI

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

## MISE EN GARDE

**DEPAKINE CHRONO PEUT NUIRE GRAVEMENT A L'ENFANT A NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.**

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
- si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

Si du valproate vous en âge d'avoir des enfants :

- utiliser au moins sans interruption traitement par D cela avec vous même donnés à la rubrique 6. prendre rendez-vous avec votre médecin spécialiste si vous êtes enceinte.
- ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Ce qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Dépakine Chrono ?
2. Quelles sont les informations à connaître sur Dépakine Chrono ?
3. Comment prendre Dépakine Chrono ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Dépakine Chrono ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations pratiques.

## 1. QU'EST-CE QUE DÉPAKINE CHRONO UTILISE

Classe pharmacothérapeutique : ANTIÉPILEPSIQUES. Dépakine Chrono appartient à une famille d'antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS PRÉSENTES SUR LA BOÎTE DE DÉPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono si :

- si vous êtes enceinte, sauf si aucun autre traitement n'est efficace pour vous (épilepsie n'est pas efficace pour vous). Allaitement et fertilité - Conseils pour les femmes »),
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que aucun autre traitement de l'épilepsie n'est efficace et que vous êtes capable de respecter toutes les mesures de prévention pour éviter une grossesse (épilepsie n'est pas efficace pour vous). Allaitement et fertilité - Conseils pour les femmes »).
- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants de la boîte de Dépakine Chrono, mentionnés dans la rubrique 6,
- si vous êtes allergique à un médicament contenant du valproate (valproate de sodium, valproate de divalproate, valproate de potassium),
- si vous avez une maladie du foie (hépatite),
- si vous ou un membre de votre famille avez une maladie grave notamment liée à la prise de valproate (maladie de porphyrie héréditaire),
- si vous souffrez d'une porphyrie héréditaire (maladie du foie),
- si vous avez un problème génétique mitochondrial (par ex. le syndrome de Leigh),
- si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 6),
- si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

# Dépakine® Chrono 500 mg,

comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

acide valproïque et valproate de sodium

SANOFI

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.

## MISE EN GARDE

**DEPAKINE CHRONO PEUT NUIRE GRAVEMENT A L'ENFANT A NAITRE S'IL EST PRIS PENDANT LA GROSSESSE.**

Les enfants exposés *in utero* au valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement (intellectuel et moteur) et du comportement (jusqu'à 30 à 40 % des cas) et/ou de malformations (environ 10 % des cas).

Si vous êtes une fille, une adolescente, une femme en âge d'avoir des enfants :

- votre médecin spécialiste ne pourra pas vous prescrire de valproate, sauf en cas d'inefficacité ou d'intolérance aux autres traitements ;
- si aucun autre traitement n'est possible, le valproate vous sera prescrit et dispensé sous des conditions très strictes d'un programme de prévention de la grossesse ayant pour but d'éviter toute grossesse.

Si du valproate vous en âge d'avoir des enfants :

- utiliser au moins sans interruption traitement par D cela avec vous même donnés à la rubrique 6. prendre rendez-vous spécialiste si vous enceinte.
- ne pas arrêter de prendre Dépakine Chrono sans que votre médecin ne vous l'ait demandé; cela pourrait aggraver votre maladie.

Assurez-vous d'avoir lu et compris la brochure d'information patiente et d'avoir signé le formulaire annuel d'accord de soins qui vous sera remis par votre médecin spécialiste expérimenté dans la prise en charge de l'épilepsie.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Ce qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Dépakine Chrono ?
2. Quelles sont les informations à connaître sur Dépakine Chrono ?
3. Comment prendre Dépakine Chrono ?
4. Quels sont les effets indésirables ?
5. Comment conserver Dépakine Chrono ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations pratiques.

## 1. QU'EST-CE QUE DÉPAKINE CHRONO UTILISE

Classe pharmacothérapeutique : ANTIÉPILEPSIQUES. Dépakine Chrono appartient à une famille d'antiépileptiques.

Ce médicament est utilisé pour le traitement de l'épilepsie chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 17 kg.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS PRÉSENTES SUR LA BOÎTE DE DÉPAKINE CHRONO

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Dépakine Chrono si :

- si vous êtes enceinte, sauf si aucun autre traitement n'est efficace pour vous (épilepsie n'est pas efficace pour vous). Allaitement et fertilité - Conseils pour les femmes »),
- si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants et que aucun autre traitement de l'épilepsie n'est efficace et que vous êtes capable de respecter toutes les mesures de prévention pour éviter une grossesse (épilepsie n'est pas efficace pour vous). Allaitement et fertilité - Conseils pour les femmes »).
- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants de la boîte de Dépakine Chrono, mentionnés dans la rubrique 6,
- si vous êtes allergique à un médicament contenant du valproate (valproate de sodium, valproate de divalproate, valproate de potassium),
- si vous avez une maladie du foie (hépatite),
- si vous ou un membre de votre famille avez une maladie grave notamment liée à la prise de médicaments (maladie de la porphyrine),
- si vous souffrez d'une porphyrine hépatique (maladie de la porphyrine),
- si vous avez un problème génétique mitochondrial (par ex. le syndrome de MELAS),
- si vous avez un trouble du métabolisme du cycle de l'urée (voir rubrique 6),
- si vous prenez en même temps d'autres médicaments pour traiter la dépression).



# SYNNAX® 25mg, 50mg, 100 mg - Comprimé Boîte de 30 et de 60 Lamotrigine

Veuillez lire attentivement l'entier de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Quel contient cette notice :

- Qu'est-ce que SYNNAX® Comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Comment prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SYNNAX® Comprimé ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SYNNAX® COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AA09

SYNNAX® appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies : l'épilepsie et les troubles bipolaires.

SYNNAX® traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. SYNNAX® peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, SYNNAX® peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

SYNNAX® traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appellés maniax-depression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment SYNNAX® agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Ne prenez jamais SYNNAX® Comprimé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas SYNNAX®.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SYNNAX® :

- si vous avez des problèmes de reux
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie
- si vous avez présenté une éruption cutanée ou un coup de soleil après avoir pris de la lamotrigine et après vous être exposé au soleil ou à une lumière artificielle (par exemple, un solarium). Votre médecin vérifiera votre traitement et pourra vous conseiller d'éviter toute exposition au soleil ou de vous protéger contre le soleil (par exemple, l'utilisation d'un écran solaire ou port de vêtements de protection).

- si vous avez déjà développé une ménigrité après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)
- si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine.

- si vous souffrez du syndrome de Brugada, ou d'autres problèmes cardiaques. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin. Il pourra décaler de diminuer la dose ou que SYNNAX® ne vous convienne pas.

probabilité que certaines personnes en aient les effets indésirables. Ils incluent :

- Le valproate, utilisé pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La carbamazépine, utilisée pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La phénytoïne, la primaquine ou le phénobarbital, utilisé pour traiter l'épilepsie
- La rispéridone, utilisée pour traiter des troubles psychiatriques
- La lamotrigine, qui est un antibiotique
- des médicaments utilisés pour traiter l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VH) (une association de lopinavir et de ritonavir ou d'atazanavir et de ritonavir)
- les contraceptifs hormonaux, comme la pilule (voir ci-dessous).

→ Prévenez votre médecin si vous prenez, commencez à prendre ou arrêtez de prendre l'une d'entre eux.

Les contraceptifs hormonaux (comme la pilule) peuvent perturber l'action de SYNNAX®.

Votre médecin peut vous recommander d'utiliser un type particulier de contraceptif hormonal, ou une autre méthode de contraception, comme le préservatif, un diaphragme ou un stérilet. Si vous utilisez un contraceptif hormonal comme la pilule, votre médecin peut prélever des échantillons de votre sang pour contrôler le taux de SYNNAX®. Si vous prenez un contraceptif hormonal ou si vous envisagez de commencer à en prendre :

→ Parlez-en à votre médecin, qui discutera avec vous des méthodes de contraception pourront vous convenir.

SYNNAX® peut également perturber le mode d'action des contraceptifs hormonaux, bien qu'il soit peu probable qu'il en diminue leur efficacité. Si vous utilisez un contraceptif hormonal et si vous remarquez tout changement dans votre cycle menstruel, comme un saignement ou de légères périodes vénitaines sanguinolentes entre les règles :

→ Parlez-en à votre médecin. Ceux-ci peuvent être le signe que SYNNAX® perturbe le mode d'action de votre contraceptif.

## Grossesse et allaitement

→ Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

→ Vous ne devez pas arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Cela est particulièrement important si vous avez une épilepsie.

La grossesse peut modifier l'efficacité de SYNNAX®, de sorte que vous pourrez avoir besoin d'effectuer des prises de sang et votre dose de SYNNAX® pourra être ajustée.

Il existe un faible risque d'apparition de malformations congénitales incluant des fentes labiales ou des lèvres pectinées, si SYNNAX® est pris au cours des 3 premiers mois de grossesse.

Votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément en acide folique si vous envisagez une grossesse et pendant votre grossesse.

→ Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La substance active de SYNNAX® passe dans le lait maternel et peut affecter votre bébé. Votre médecin discutera des risques et des bénéfices de l'allaitement si vous êtes traitée par SYNNAX®. Si vous décidez d'allaiter, il examinera régulièrement votre bébé en cas de somnolence, d'éruption cutanée ou d'une perte de poids insuffisante. Informez votre médecin si vous observez une de ces symptômes chez votre bébé.

## Conduite de véhicules et utilisation de machines

SYNNAX® peut provoquer des sensations vertigineuses et une vision double.

→ Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que certain de ne pas être affecté.

Si vous avez une épilepsie, parlez à votre médecin de la conduite de machines.

SYNNAX® Comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains s de prendre ce médicament.

SYNNAX® Comprimé contient du Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium qui est essentiellement « sans sodium ».

## 3. COMMENT PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement ce que votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès pharmacien en cas de doute.

Quelle quantité de SYNNAX® prendre ?

Cela peut prendre un moment avant de trouver la meilleure dose de vous.

La dose que vous prendrez dépendra de :

• votre âge

• si vous prenez SYNNAX® avec d'autres médicaments

• si vous avez des problèmes de reux ou de foie.

Votre médecin vous prescrira pour commencer une dose faible et augmentera

l'efficacité ou une éruption cutanée étendue avec atteinte du foie, du sang ou d'autres organes (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques aussi appelé syndrome d'hypersensibilité (DRESS))

• des ulcères de la bouche, de la gorge, du nez ou des organes génitaux

• une irritation de la bouche ou des yeux rouges ou enflés (conjonctivite)

• une température élevée (fièvre), des symptômes pseudo-grippaux ou une somnolence

• des bleus ou des saignements inattendus ou les doigts qui deviennent bleus

• une gêne douloureuse ou plus d'infections que d'habitude (comme des rhumes)

• des augmentations des enzymes du foie observées dans les tests sanguins

• une augmentation d'un type de globules blancs (les eosinophiles)

• un gonflement des ganglions lymphatiques

• une atteinte d'autres organes comme le foie ou les reins.

Dans beaucoup de cas, ces symptômes seront les signes d'effets indésirables moins graves. Mais vous devez être conscient qu'ils peuvent potentiellement mettre en jeu le pronostic vital et peuvent se transformer en problèmes plus graves, comme la défaillance d'organes, si ils ne sont pas traités. Si vous remarquez l'un de ces symptômes :

→ Consultez immédiatement un médecin. Votre médecin peut décider d'effectuer des tests sur votre foie, vos reins ou votre sang et peut vous dire d'arrêter de prendre SYNNAX®. Dans le cas où vous avez développé le syndrome de Stevens-Johnson ou de nécrose épidermique toxique, votre médecin vous préviendra que vous ne devez jamais plus utiliser la lamotrigine.

Lymphohistiozyse hémophagocyttaire (LHH) (voir rubrique 2 : Quelles sont les

informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé)

Effets indésirables très fréquents

Ils affectent plus d'1 personne sur 10 :

maux de tête, éruption cutanée.

Effets indésirables fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 :

agressivité ou irritabilité, envie de dormir, sensation de vertiges, frissons ou tremblements, difficultés à dormir (insomnie), sensation d'agitation, diarrhée, bouche sèche, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables peu fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 100 :

maladresses et manque de coordination (ataxie), vision double ou vision floue, perte

inhalatoire ou nécrose des cheveux (alopecie), éruption cutanée ou coup de soleil

ou nécrose cutanée mettant au jeu la mort (syndrome de Stevens-Johnson) :

• un coup de soleil ou nécrose cutanée mettant au jeu la mort (syndrome de Stevens-Johnson) :

• un état épileptique

• un essa

ne, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 1000 :

• une réaction cutanée mettant au jeu le syndrome de Stevens-Johnson (syndrome de Stevens-Johnson) :

• un état épileptique

• un essa

ne, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables très rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10000 :

• une réaction cutanée mettant au jeu le syndrome de Stevens-Johnson (syndrome de Stevens-Johnson) :

• un état épileptique

• un essa

ne, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

SYNNAX 25mg

30 comprimés



LOT : 221790

EXP : 12/2024

PPV : 68,00DH

modifications qui peuvent se voir dans les analyses de sang, incluant une diminution du nombre de globules rouges (anémie), une diminution du nombre de globules blancs

et une diminution du nombre de plaquettes (thrombopénie).



# SYNNAX® 25mg, 50mg, 100 mg - Comprimé Boîte de 30 et de 60 Lamotrigine

Veuillez lire attentivement l'entier de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Quel contient cette notice :

- Qu'est-ce que SYNNAX® Comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Comment prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SYNNAX® Comprimé ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SYNNAX® COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AA09

SYNNAX® appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies : l'épilepsie et les troubles bipolaires.

SYNNAX® traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. SYNNAX® peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, SYNNAX® peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

SYNNAX® traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appellés maniax-depression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment SYNNAX® agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Ne prenez jamais SYNNAX® Comprimé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas SYNNAX®.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SYNNAX® :

- si vous avez des problèmes de reux
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie

si vous avez présenté une éruption cutanée ou un coup de soleil après avoir pris de la lamotrigine et après vous être exposé au soleil ou à une lumière artificielle (par exemple, un solarium). Votre médecin vérifiera votre traitement et pourra vous conseiller d'éviter toute exposition au soleil ou de vous protéger contre le soleil (par exemple, l'utilisation d'un écran solaire ou port de vêtements de protection).

si vous avez déjà développé une ménigrité après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)

si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine.

si vous souffrez du syndrome de Brugada, ou d'autres problèmes cardiaques. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin. Il pourra décaler de diminuer la dose ou que SYNNAX® ne vous convienne pas.

probabilité que certaines personnes en aient les effets indésirables. Ils incluent :

- Le valproate, utilisé pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La carbamazépine, utilisée pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La phénytoïne, la primaquine ou le phénobarbital, utilisé pour traiter l'épilepsie
- La rispéridone, utilisée pour traiter des troubles psychiatriques
- La lamotrigine, qui est un antibiotique
- des médicaments utilisés pour traiter l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VH) (une association de lopinavir et de ritonavir ou d'atazanavir et de ritonavir)
- les contraceptifs hormonaux, comme la pilule (voir ci-dessous).

→ Prévenez votre médecin si vous prenez, commencez à prendre ou arrêtez de prendre l'une d'entre eux.

Les contraceptifs hormonaux (comme la pilule) peuvent perturber l'action de SYNNAX®.

Votre médecin peut vous recommander d'utiliser un type particulier de contraceptif hormonal, ou une autre méthode de contraception, comme le préservatif, un diaphragme ou un stérilet. Si vous utilisez un contraceptif hormonal comme la pilule, votre médecin peut prélever des échantillons de votre sang pour contrôler le taux de SYNNAX®. Si vous prenez un contraceptif hormonal ou si vous envisagez de commencer à en prendre :

→ Parlez-en à votre médecin, qui discutera avec vous des méthodes de contraception pourront vous convenir.

SYNNAX® peut également perturber le mode d'action des contraceptifs hormonaux, bien qu'il soit peu probable qu'il en diminue leur efficacité. Si vous utilisez un contraceptif hormonal et si vous remarquez tout changement dans votre cycle menstruel, comme un saignement ou de légères périodes vénitaines sanguinolentes entre les règles :

→ Parlez-en à votre médecin. Ceux-ci peuvent être le signe que SYNNAX® perturbe le mode d'action de votre contraceptif.

## Grossesse et allaitement

→ Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

→ Vous ne devez pas arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Cela est particulièrement important si vous avez une épilepsie.

La grossesse peut modifier l'efficacité de SYNNAX®, de sorte que vous pourrez avoir besoin d'effectuer des prises de sang et votre dose de SYNNAX® pourra être ajustée.

Il existe un faible risque d'ulcération de malformations congénitales incluant des fentes labiales ou des lèvres pectinées, si SYNNAX® est pris au cours des 3 premiers mois de grossesse.

Votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément en acide folique si vous envisagez une grossesse et pendant votre grossesse.

→ Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La substance active de SYNNAX® passe dans le lait maternel et peut affecter votre bébé. Votre médecin discutera des risques et des bénéfices de l'allaitement si vous êtes traitée par SYNNAX®. Si vous décidez d'allaiter, il examinera régulièrement votre bébé en cas de somnolence, d'éruption cutanée ou d'une perte de poids insuffisante. Informez votre médecin si vous observez une de ces symptômes chez votre bébé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SYNNAX® peut provoquer des sensations vertigineuses et une vision double.

→ Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que certain de ne pas être affecté.

Si vous avez une épilepsie, parlez à votre médecin de la conduite de machines.

SYNNAX® Comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains s de prendre ce médicament.

SYNNAX® Comprimé contient du Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium qui est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exacte

→ votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès pharmacien en cas de doute.

Quelle quantité de SYNNAX® prendre ?

Cela peut prendre un moment avant de trouver la meilleure de vous. La dose que vous prendrez dépendra de :

- votre âge
- si vous prenez SYNNAX® avec d'autres médicaments

si vous avez des problèmes de reux ou de foie.

Votre médecin vous prescrira pour commencer une dose table et augmentera

laitue) ou une éruption cutanée étendue avec atteinte du foie, du sang ou d'autres organes (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques aussi appelé syndrome d'hypersensibilité (DRESS))

- des ulcères de la bouche, de la gorge, du nez ou des organes génitaux
- une irritation de la bouche ou des yeux rouges ou émiettes (conjonctivite)
- une température élevée (fièvre), des symptômes pseudo-grippaux ou une somnolence
- un gonflement autour du visage ou des glandes salivaires au niveau du cou, de l'œil ou de l'oreille
- des bleus ou des saignements inhabituels ou les doigts qui deviennent bleus
- une gêne douloureuse ou plus d'infections que d'habitude (comme des rhumes)
- des augmentations des enzymes du foie observées dans les tests sanguins
- une augmentation d'un type de globules blancs (les eosinophiles)
- un gonflement des glandes lymphatiques

une atteinte d'autres organes comme le foie ou les reins.

Dans beaucoup de cas, ces symptômes seront les signes d'effets indésirables moins graves. Mais vous devez être conscient qu'ils peuvent potentiellement mettre en jeu le pronostic vital et peuvent se transformer en problèmes plus graves, comme la défaillance d'organes, si elles ne sont pas traités. Si vous remarquez l'un de ces symptômes :

→ Consultez immédiatement un médecin. Votre médecin peut décider d'effectuer des tests sur votre foie, vos reins ou votre sang et peut vous dire d'arrêter de prendre SYNNAX®. Dans le cas où vous avez développé le syndrome de Stevens-Johnson ou de nécrose épidermique toxique, votre médecin vous préviendra que vous ne devez jamais plus utiliser la lamotrigine.

Lymphohistiocytose hémophagocyttaire (LHH) (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé)

Effets indésirables très fréquents

Ils affectent plus d'1 personne sur 10 :

maux de tête, éruption cutanée.

Effets indésirables fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 :

agressivité ou irritabilité, envie de dormir, sensation de vertiges, frissons ou tremblements, difficultés à dormir (insomnie), sensation d'agitation, diarrhée, bouche sèche, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables peu fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 100 :

maladresses et manque de coordination (ataxie), vision double ou vision floue, perte inhabituelle ou réfraction des cheveux (alopecie), éruption cutanée ou coup de soleil après une exposition au soleil ou à la lumière artificielle (photosensibilité).

Effets indésirables rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

une réaction cutanée mettant au jeu le syndrome de Stevens-Johnson (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé) : instabilité extrême des environs, environs 1 disparaissent avant, contactez

SYNNAX 25mg

30 comprimés



LOT : 221790

EXP : 12/2024

PPV : 68,00DH

modifications qui peuvent se voir dans les analyses de sang, incluant une diminution du nombre de globules rouges (anémie), une diminution du nombre de globules blancs

4) :  
5) :  
6) :  
7) :  
8) :  
9) :  
10) :  
11) :  
12) :  
13) :  
14) :  
15) :  
16) :  
17) :  
18) :  
19) :  
20) :  
21) :  
22) :  
23) :  
24) :  
25) :  
26) :  
27) :  
28) :  
29) :  
30) :  
31) :  
32) :  
33) :  
34) :  
35) :  
36) :  
37) :  
38) :  
39) :  
40) :  
41) :  
42) :  
43) :  
44) :  
45) :  
46) :  
47) :  
48) :  
49) :  
50) :  
51) :  
52) :  
53) :  
54) :  
55) :  
56) :  
57) :  
58) :  
59) :  
60) :  
61) :  
62) :  
63) :  
64) :  
65) :  
66) :  
67) :  
68) :  
69) :  
70) :  
71) :  
72) :  
73) :  
74) :  
75) :  
76) :  
77) :  
78) :  
79) :  
80) :  
81) :  
82) :  
83) :  
84) :  
85) :  
86) :  
87) :  
88) :  
89) :  
90) :  
91) :  
92) :  
93) :  
94) :  
95) :  
96) :  
97) :  
98) :  
99) :  
100) :  
101) :  
102) :  
103) :  
104) :  
105) :  
106) :  
107) :  
108) :  
109) :  
110) :  
111) :  
112) :  
113) :  
114) :  
115) :  
116) :  
117) :  
118) :  
119) :  
120) :  
121) :  
122) :  
123) :  
124) :  
125) :  
126) :  
127) :  
128) :  
129) :  
130) :  
131) :  
132) :  
133) :  
134) :  
135) :  
136) :  
137) :  
138) :  
139) :  
140) :  
141) :  
142) :  
143) :  
144) :  
145) :  
146) :  
147) :  
148) :  
149) :  
150) :  
151) :  
152) :  
153) :  
154) :  
155) :  
156) :  
157) :  
158) :  
159) :  
160) :  
161) :  
162) :  
163) :  
164) :  
165) :  
166) :  
167) :  
168) :  
169) :  
170) :  
171) :  
172) :  
173) :  
174) :  
175) :  
176) :  
177) :  
178) :  
179) :  
180) :  
181) :  
182) :  
183) :  
184) :  
185) :  
186) :  
187) :  
188) :  
189) :  
190) :  
191) :  
192) :  
193) :  
194) :  
195) :  
196) :  
197) :  
198) :  
199) :  
200) :  
201) :  
202) :  
203) :  
204) :  
205) :  
206) :  
207) :  
208) :  
209) :  
210) :  
211) :  
212) :  
213) :  
214) :  
215) :  
216) :  
217) :  
218) :  
219) :  
220) :  
221) :  
222) :  
223) :  
224) :  
225) :  
226) :  
227) :  
228) :  
229) :  
230) :  
231) :  
232) :  
233) :  
234) :  
235) :  
236) :  
237) :  
238) :  
239) :  
240) :  
241) :  
242) :  
243) :  
244) :  
245) :  
246) :  
247) :  
248) :  
249) :  
250) :  
251) :  
252) :  
253) :  
254) :  
255) :  
256) :  
257) :  
258) :  
259) :  
260) :  
261) :  
262) :  
263) :  
264) :  
265) :  
266) :  
267) :  
268) :  
269) :  
270) :  
271) :  
272) :  
273) :  
274) :  
275) :  
276) :  
277) :  
278) :  
279) :  
280) :  
281) :  
282) :  
283) :  
284) :  
285) :  
286) :  
287) :  
288) :  
289) :  
290) :  
291) :  
292) :  
293) :  
294) :  
295) :  
296) :  
297) :  
298) :  
299) :  
300) :  
301) :  
302) :  
303) :  
304) :  
305) :  
306) :  
307) :  
308) :  
309) :  
310) :  
311) :  
312) :  
313) :  
314) :  
315) :  
316) :  
317) :  
318) :  
319) :  
320) :  
321) :  
322) :  
323) :  
324) :  
325) :  
326) :  
327) :  
328) :  
329) :  
330) :  
331) :  
332) :  
333) :  
334) :  
335) :  
336) :  
337) :  
338) :  
339) :  
340) :  
341) :  
342) :  
343) :  
344) :  
345) :  
346) :  
347) :  
348) :  
349) :  
350) :  
351) :  
352) :  
353) :  
354) :  
355) :  
356) :  
357) :  
358) :  
359) :  
360) :  
361) :  
362) :  
363) :  
364) :  
365) :  
366) :  
367) :  
368) :  
369) :  
370) :  
371) :  
372) :  
373) :  
374) :  
375) :  
376) :  
377) :  
378) :  
379) :  
380) :  
381) :  
382) :  
383) :  
384) :  
385) :  
386) :  
387) :  
388) :  
389) :  
390) :  
391) :  
392) :  
393) :  
394) :  
395) :  
396) :  
397) :  
398) :  
399) :  
400) :  
401) :  
402) :  
403) :  
404) :  
405) :  
406) :  
407) :  
408) :  
409) :  
410) :  
411) :  
412) :  
413) :  
414) :  
415) :  
416) :  
417) :  
418) :  
419) :  
420) :  
421) :  
422) :  
423) :  
424) :  
425) :  
426) :  
427) :  
428) :  
429) :  
430) :  
431) :  
432) :  
433) :  
434) :  
435) :  
436) :  
437) :  
438) :  
439) :  
440) :  
441) :  
442) :  
443) :  
444) :  
445) :  
446) :  
447) :  
448) :  
449) :  
450) :  
451) :  
452) :  
453) :  
454) :  
455) :  
456) :  
457) :  
458) :  
459) :  
460) :  
461) :  
462) :  
463) :  
464) :  
465) :  
466) :  
467) :  
468) :  
469) :  
470) :  
471) :  
472) :  
473) :  
474) :  
475) :  
476) :  
477) :  
478) :  
479) :  
480) :  
481) :  
482) :  
483) :  
484) :  
485) :  
486) :  
487) :  
488) :  
489) :  
490) :  
491) :  
492) :  
493) :  
494) :  
495) :  
496) :  
497) :  
498) :  
499) :  
500) :  
501) :  
502) :  
503) :  
504) :  
505) :  
506) :  
507) :  
508) :  
509) :  
510) :  
511) :  
512) :  
513) :  
514) :  
515) :  
516) :  
517) :  
518) :  
519) :  
520) :  
521) :  
522) :  
523) :  
524) :  
525) :  
526) :  
527) :  
528) :  
529) :  
530) :  
531) :  
532) :  
533) :  
534) :  
535) :  
536) :  
537) :  
538) :  
539) :  
540) :  
541) :  
542) :  
543) :  
544) :  
545) :  
546) :  
547) :  
548) :  
549) :  
550) :  
551) :  
552) :  
553) :  
554) :  
555) :  
556) :  
557) :  
558) :  
559) :  
560) :  
561) :  
562) :  
563) :  
564) :  
565) :  
566) :  
567) :  
568) :  
569) :  
570) :  
571) :  
572) :  
573) :  
574) :  
575) :  
576) :  
577) :  
578) :  
579) :  
580) :  
581) :  
582) :  
583) :  
584) :  
585) :  
586) :  
587) :  
588) :  
589) :  
590) :  
591) :  
592) :  
593) :  
594) :  
595) :  
596) :  
597) :  
598) :  
599) :  
600) :  
601) :  
602) :  
603) :  
604) :  
605) :  
606) :  
607) :  
608) :  
609) :  
610) :  
611) :  
612) :  
613) :  
614) :  
615) :  
616) :  
617) :  
618) :  
619) :  
620) :  
621) :  
622) :  
623) :  
624) :  
625) :  
626) :  
627) :  
628) :  
629) :  
630) :  
631) :  
632) :  
633) :  
634) :  
635) :  
636) :  
637) :  
638) :  
639) :  
640) :  
641) :  
642) :  
643) :  
644) :  
645) :  
646) :  
647) :  
648) :  
649) :  
650) :  
651) :  
652) :  
653) :  
654) :  
655) :  
656) :  
657) :  
658) :  
659) :  
660) :  
661) :  
662) :  
663) :  
664) :  
665) :  
666) :  
667) :  
668) :  
669) :  
670) :  
671) :  
672) :  
673) :  
674) :  
675) :  
676) :  
677) :  
678) :  
679) :  
680) :  
681) :  
682) :  
683) :  
684) :  
685) :  
686) :  
687) :  
688) :  
689) :  
690) :  
691) :  
692) :  
693) :  
694) :  
695) :  
696) :  
697) :  
698) :  
699) :  
700) :  
701) :  
702) :  
703) :  
704) :  
705) :  
706) :  
707) :  
708) :  
709) :  
710) :  
711) :  
712) :  
713) :  
714) :  
715) :  
716) :  
717) :  
718) :  
719) :  
720) :  
721) :  
722) :  
723) :  
724) :  
725) :  
726) :  
727) :  
728) :  
729) :  
730) :  
731) :  
732) :  
733) :  
734) :  
735) :  
736) :  
737) :  
738) :  
739) :  
740) :  
741) :  
742) :  
743) :  
744) :  
745) :  
746) :  
747) :  
748) :  
749) :  
750) :  
751) :  
752) :  
753) :  
754) :  
755) :  
756) :  
757) :  
758) :  
759) :  
760) :  
761) :  
762) :  
763) :  
764) :  
765) :  
766) :  
767) :  
768) :  
769) :  
770) :  
771) :  
772) :  
773) :  
774) :  
775) :  
776) :  
777) :  
778) :  
779) :  
780) :  
781) :  
782) :  
783) :  
784) :  
785) :  
786) :  
787) :  
788) :  
789) :  
790) :  
791) :  
792) :  
793) :  
794) :  
795) :  
796) :  
797) :  
798) :  
799) :  
800) :  
801) :  
802) :  
803) :  
804) :  
805) :  
806) :  
807) :  
808) :  
809) :  
810) :  
811) :  
812) :  
813) :  
814) :  
815) :  
816) :  
817) :  
818) :  
819) :  
820) :  
821) :  
822) :  
823) :  
824) :  
825) :  
826) :  
827) :  
828) :  
829) :  
830) :  
831) :  
832) :  
833) :  
834) :  
835) :  
836) :  
837) :  
838) :  
839)

# SYNNAX® 25mg, 50mg, 100 mg - Comprimé Boîte de 30 et de 60 Lamotrigine

Veuillez lire attentivement l'entier de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur faire du mal, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Quel contient cette notice :

- Qu'est-ce que SYNNAX® Comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Comment prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SYNNAX® Comprimé ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SYNNAX® COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AA09

SYNNAX® appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies : l'épilepsie et les troubles bipolaires.

SYNNAX® traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. SYNNAX® peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, SYNNAX® peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

SYNNAX® traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appellés maniax-depression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment SYNNAX® agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Ne prenez jamais SYNNAX® Comprimé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas SYNNAX®.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SYNNAX® :

- si vous avez des problèmes de reux
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie

si vous avez présenté une éruption cutanée ou un coup de soleil après avoir pris de la lamotrigine et après vous être exposé au soleil ou à une lumière artificielle (par exemple, un solarium). Votre médecin vérifiera votre traitement et pourra vous conseiller d'éviter toute exposition au soleil ou de vous protéger contre le soleil (par exemple, l'utilisation d'un écran solaire ou port de vêtements de protection).

si vous avez déjà développé une ménigrité après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)

si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine.

si vous souffrez du syndrome de Brugada, ou d'autres problèmes cardiaques. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin. Il pourra décaler de diminuer la dose ou que SYNNAX® ne vous convienne pas.

probabilité que certaines personnes en aient les effets indésirables. Ils incluent :

- Le valproate, utilisé pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La carbamazépine, utilisée pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La phénytoïne, la primaquine ou le phénobarbital, utilisé pour traiter l'épilepsie
- La rispéridone, utilisée pour traiter des troubles psychiatriques
- La lamotrigine, qui est un antibiotique
- des médicaments utilisés pour traiter l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VH) (une association de lopinavir et de ritonavir ou d'atazanavir et de ritonavir)
- les contraceptifs hormonaux, comme la pilule (voir ci-dessous).

→ Prévenez votre médecin si vous prenez, commencez à prendre ou arrêtez de prendre l'une d'entre eux.

Les contraceptifs hormonaux (comme la pilule) peuvent perturber l'action de SYNNAX®.

Votre médecin peut vous recommander d'utiliser un type particulier de contraceptif hormonal, ou une autre méthode de contraception, comme le préservatif, un diaphragme ou un stérilet. Si vous utilisez un contraceptif hormonal comme la pilule, votre médecin peut prélever des échantillons de votre sang pour contrôler le taux de SYNNAX®. Si vous prenez un contraceptif hormonal ou si vous envisagez de commencer à en prendre :

→ Parlez-en à votre médecin, qui discutera avec vous des méthodes de contraception pourront vous convenir.

SYNNAX® peut également perturber le mode d'action des contraceptifs hormonaux, bien qu'il soit peu probable qu'il en diminue leur efficacité. Si vous utilisez un contraceptif hormonal et si vous remarquez tout changement dans votre cycle menstruel, comme un saignement ou de légères périodes vénitaines sanguinolentes entre les règles :

→ Parlez-en à votre médecin. Ceux-ci peuvent être le signe que SYNNAX® perturbe le mode d'action de votre contraceptif.

## Grossesse et allaitement

→ Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

→ Vous ne devez pas arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Cela est particulièrement important si vous avez une épilepsie.

La grossesse peut modifier l'efficacité de SYNNAX®, de sorte que vous pourrez avoir besoin d'effectuer des prises de sang et votre dose de SYNNAX® pourra être ajustée.

Il existe un faible risque d'ulcération de malformations congénitales incluant des fentes labiales ou des lèvres pectinées, si SYNNAX® est pris au cours des 3 premiers mois de grossesse.

Votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément en acide folique si vous envisagez une grossesse et pendant votre grossesse.

→ Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La substance active de SYNNAX® passe dans le lait maternel et peut affecter votre bébé. Votre médecin discutera des risques et des bénéfices de l'allaitement si vous êtes traitée par SYNNAX®. Si vous décidez d'allaiter, il examinera régulièrement votre bébé en cas de somnolence, d'éruption cutanée ou d'une perte de poids insuffisante. Informez votre médecin si vous observez une de ces symptômes chez votre bébé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SYNNAX® peut provoquer des sensations vertigineuses et une vision double.

→ Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que certain de ne pas être affecté.

Si vous avez une épilepsie, parlez à votre médecin de la conduite de machines.

SYNNAX® Comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains s de prendre ce médicament.

SYNNAX® Comprimé contient du Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium qui est essentiellement « sans sodium ».

## 3. COMMENT PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement ce que votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès pharmacien en cas de doute.

Quelle quantité de SYNNAX® prendre ?

Cela peut prendre un moment avant de trouver la meilleure dose de vous. La dose que vous prenez dépendra de :

• votre âge

• si vous prenez SYNNAX® avec d'autres médicaments

• si vous avez des problèmes de reux ou de foie.

Votre médecin vous prescrira pour commencer une dose faible et augmentera

l'efficacité ou une éruption cutanée étendue avec atteinte du foie, du sang ou d'autres organes (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques aussi appelé syndrome d'hypersensibilité (DRESS))

- des ulcères de la bouche, de la gorge, du nez ou des organes génitaux
- une irritation de la bouche ou des yeux rouges ou émiettes (conjonctivite)
- une température élevée (fièvre), des symptômes pseudo-grippaux ou une somnolence
- un gonflement autour du visage ou des glandes salivaires au niveau du cou, de l'œil ou de l'oreille
- des bleus ou des saignements inattendus ou les doigts qui deviennent bleus
- une gêne douloureuse ou plus d'infections que d'habitude (comme des rhumes)
- des augmentations des enzymes du foie observées dans les tests sanguins
- une augmentation d'un type de globules blancs (les eosinophiles)
- un gonflement des glandes lymphatiques

• une atteinte d'autres organes comme le foie ou les reins.

Dans beaucoup de cas, ces symptômes seront les signes d'effets indésirables moins graves. Mais vous devez être conscient qu'ils peuvent potentiellement mettre en jeu le pronostic vital et peuvent se transformer en problèmes plus graves, comme la défaillance d'organes, si elles ne sont pas traités. Si vous remarquez l'un de ces symptômes :

→ Consultez immédiatement un médecin. Votre médecin peut décider d'effectuer des tests sur votre foie, vos reins ou votre sang et peut vous dire d'arrêter de prendre SYNNAX®. Dans le cas où vous avez développé le syndrome de Stevens-Johnson ou de nécrose épidermique toxique, votre médecin vous préviendra que vous ne devez jamais plus utiliser la lamotrigine.

Lymphohistiocytose hémophagocyttaire (LHH) (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé)

Effets indésirables très fréquents

Ils affectent plus d'1 personne sur 10 :

mauvaise haleine, éruption cutanée.

Effets indésirables fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 :

agressivité ou irritabilité, envie de dormir, sensation de vertiges, frissons ou tremblements, difficultés à dormir (insomnie), sensation d'agitation, diarrhée, bouche sèche, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables peu fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 100 :

maladresses et manque de coordination (ataxie), vision double ou vision floue, perte inhabituelle ou réfraction des cheveux (alopecie), éruption cutanée ou coup de soleil après une exposition au soleil ou à la lumière artificielle (photosensibilité).

Effets indésirables rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

- une réaction cutanée mettant au jeu le syndrome de Stevens-Johnson (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé) :
  - un érythème, une peau rouge et épaissie
  - un épanchement liquide dans la peau
  - des bulles ou des éruptions
  - des ulcères dans la peau

SYNNAX 25mg

30 comprimés



LOT : 221790

EXP : 12/2024

PPV : 68,00DH

modifications qui peuvent se voir dans les analyses de sang, incluant une diminution du nombre de globules rouges (anémie), une diminution du nombre de globules blancs

et une diminution du nombre de plaquettes (thrombopénie).

# SYNNAX® 25mg, 50mg, 100 mg - Comprimé Boîte de 30 et de 60 Lamotrigine

Veuillez lire attentivement l'entier de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Quel contient cette notice :

- Qu'est-ce que SYNNAX® Comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Comment prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SYNNAX® Comprimé ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SYNNAX® COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AA09

SYNNAX® appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies : l'épilepsie et les troubles bipolaires.

SYNNAX® traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. SYNNAX® peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, SYNNAX® peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

SYNNAX® traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appellés maniax-depression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment SYNNAX® agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Ne prenez jamais SYNNAX® Comprimé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas SYNNAX®.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SYNNAX® :

- si vous avez des problèmes de retraite
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie

si vous avez présenté une éruption cutanée ou un coup de soleil après avoir pris de la lamotrigine et après vous être exposé au soleil ou à une lumière artificielle (par exemple, un solarium). Votre médecin vérifiera votre traitement et pourra vous conseiller d'éviter toute exposition au soleil ou de vous protéger contre le soleil (par exemple, l'utilisation d'un écran solaire ou port de vêtements de protection).

si vous avez déjà développé une ménigrité après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)

si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine.

si vous souffrez du syndrome de Brugada, ou d'autres problèmes cardiaques. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin. Il pourra décaler de diminuer la dose ou que SYNNAX® ne vous convienne pas.

probabilité que certaines personnes en aient les effets indésirables. Ils incluent :

- Le valproate, utilisé pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La carbamazépine, utilisée pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La phénytoïne, la primaquine ou le phénobarbital, utilisé pour traiter l'épilepsie
- La rispéridone, utilisée pour traiter des troubles psychiatriques
- La lamotrigine, qui est un antibiotique
- des médicaments utilisés pour traiter l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VH) (une association de lopinavir et de ritonavir ou d'atazanavir et de ritonavir)
- les contraceptifs hormonaux, comme la pilule (voir ci-dessous).

→ Prévenez votre médecin si vous prenez, commencez à prendre ou arrêtez de prendre l'une d'entre eux.

Les contraceptifs hormonaux (comme la pilule) peuvent perturber l'action de SYNNAX®.

Votre médecin peut vous recommander d'utiliser un type particulier de contraceptif hormonal, ou une autre méthode de contraception, comme le préservatif, un diaphragme ou un stérilet. Si vous utilisez un contraceptif hormonal comme la pilule, votre médecin peut prélever des échantillons de votre sang pour contrôler le taux de SYNNAX®. Si vous prenez un contraceptif hormonal ou si vous envisagez de commencer à en prendre :

→ Parlez-en à votre médecin, qui discutera avec vous des méthodes de contraception pourront vous convenir.

SYNNAX® peut également perturber le mode d'action des contraceptifs hormonaux, bien qu'il soit peu probable qu'il en diminue leur efficacité. Si vous utilisez un contraceptif hormonal et si vous remarquez tout changement dans votre cycle menstruel, comme un saignement ou de légères périodes vénitaines sanguinolentes entre les règles :

→ Parlez-en à votre médecin. Ceux-ci peuvent être le signe que SYNNAX® perturbe le mode d'action de votre contraceptif.

## Grossesse et allaitement

→ Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

→ Vous ne devez pas arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Cela est particulièrement important si vous avez une épilepsie.

La grossesse peut modifier l'efficacité de SYNNAX®, de sorte que vous pourrez avoir besoin d'effectuer des prises de sang et votre dose de SYNNAX® pourra être ajustée.

Il existe un faible risque d'ulcération de malformations congénitales incluant des fentes labiales ou des lèvres pectinées, si SYNNAX® est pris au cours des 3 premiers mois de grossesse.

Votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément en acide folique si vous envisagez une grossesse et pendant votre grossesse.

→ Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La substance active de SYNNAX® passe dans le lait maternel et peut affecter votre bébé. Votre médecin discutera des risques et des bénéfices de l'allaitement si vous êtes traitée par SYNNAX®. Si vous décidez d'allaiter, il examinera régulièrement votre bébé en cas de somnolence, d'éruption cutanée ou d'une perte de poids insuffisante. Informez votre médecin si vous observez une de ces symptômes chez votre bébé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SYNNAX® peut provoquer des sensations vertigineuses et une vision double.

→ Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que certain de ne pas être affecté.

Si vous avez une épilepsie, parlez à votre médecin de la conduite de machines.

SYNNAX® Comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains s de prendre ce médicament.

SYNNAX® Comprimé contient du Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium qui est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exacte

→ votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès pharmacien en cas de doute.

Quelle quantité de SYNNAX® prendre ?

Cela peut prendre un moment avant de trouver la meilleure de vous. La dose que vous prendrez dépendra de :

→ votre âge

→ si vous prenez SYNNAX® avec d'autres médicaments

→ si vous avez des problèmes de retraite ou de foie.

Votre médecin vous prescrira pour commencer une dose table et augmentera

laitue) ou une éruption cutanée étendue avec atteinte du foie, du sang ou d'autres organes (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques aussi appelé syndrome d'hypersensibilité (DRESS))

- des ulcères de la bouche, de la gorge, du nez ou des organes génitaux
- une irritation de la bouche ou des yeux rouges ou émiettes (corinches)
- un gonflement autour du visage ou des gonglions lymphatiques
- une augmentation des enzymes du foie observées dans les tests sanguins
- une augmentation d'un type de globules blancs (les eosinophiles)
- un gonflement des gonglions lymphatiques
- une atteinte d'autres organes comme le foie ou les reins.

Dans beaucoup de cas, ces symptômes seront les signes d'effets indésirables moins graves. Mais vous devrez être conscient qu'ils peuvent potentiellement mettre en jeu le pronostic vital et peuvent se transformer en problèmes plus graves, comme la défaillance d'organes, si elles ne sont pas traités. Si vous remarquez l'un de ces symptômes :

→ Consultez immédiatement un médecin. Votre médecin peut décider d'effectuer des tests sur votre foie, vos reins ou votre sang et peut vous dire d'arrêter de prendre SYNNAX®. Dans le cas où vous avez développé le syndrome de Stevens-Johnson ou de nécrose épidermique toxique, votre médecin vous préviendra que vous ne devrez jamais plus utiliser la lamotrigine.

Lymphohistioctose hémophagocytatoire (LHH) (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé)

Effets indésirables très fréquents

Ils affectent plus d'1 personne sur 10 :

mauvaise haleine, éruption cutanée.

Effets indésirables fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 :

agressivité ou irritabilité, envie de dormir, sensation de vertiges, frissons ou tremblements, difficultés à dormir (insomnie), sensation d'agitation, diarrhée, bouche sèche, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables peu fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 100 :

maladresses et manque de coordination (ataxie), vision double ou vision floue, perte

inhalatoire ou nécrose des cheveux (alopecie), éruption cutanée ou coup de soleil

ou sensibilité aux lumières artificielles (photosensibilité).

Effets indésirables rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

une réaction cutanée mettant au jeu le syndrome de Stevens-Johnson (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé) : (notamment la lamotrigine) :

→ un éczema, une éruption cutanée, une nécrose des cheveux (alopecie), éruption cutanée ou coup de soleil

ou sensibilité aux lumières artificielles (photosensibilité).

instabilité extrême

chez les enfants enceignant 1 disparaissent avant, contactez

SYNNAX 25mg

30 comprimés



LOT : 221790

EXP : 12/2024

PPV : 68,00DH

modifications qui peuvent se voir dans les analyses de sang, incluant une diminution du

nombre de globules rouges (anémie), une diminution du nombre de globules blancs



# SYNNAX® 25mg, 50mg, 100 mg - Comprimé Boîte de 30 et de 60 Lamotrigine

Veuillez lire attentivement l'entier de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Quel contient cette notice :

- Qu'est-ce que SYNNAX® Comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Comment prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SYNNAX® Comprimé ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SYNNAX® COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AA09

SYNNAX® appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies : l'épilepsie et les troubles bipolaires.

SYNNAX® traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. SYNNAX® peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, SYNNAX® peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

SYNNAX® traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appellés maniax-depression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment SYNNAX® agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Ne prenez jamais SYNNAX® Comprimé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas SYNNAX®.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SYNNAX® :

- si vous avez des problèmes de reux
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie

si vous avez présenté une éruption cutanée ou un coup de soleil après avoir pris de la lamotrigine et après vous être exposé au soleil ou à une lumière artificielle (par exemple, un solarium). Votre médecin vérifiera votre traitement et pourra vous conseiller d'éviter toute exposition au soleil ou de vous protéger contre le soleil (par exemple, l'utilisation d'un écran solaire ou port de vêtements de protection).

si vous avez déjà développé une ménigrité après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)

si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine.

si vous souffrez du syndrome de Brugada, ou d'autres problèmes cardiaques. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin. Il pourra décaler de diminuer la dose ou que SYNNAX® ne vous convienne pas.

probabilité que certaines personnes en aient les effets indésirables. Ils incluent :

- Le valproate, utilisé pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La carbamazépine, utilisée pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La phénytoïne, la primaquine ou le phénobarbital, utilisé pour traiter l'épilepsie
- La rispéridone, utilisée pour traiter des troubles psychiatriques
- La lamotrigine, qui est un antibiotique
- des médicaments utilisés pour traiter l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VH) (une association de lopinavir et de ritonavir ou d'atazanavir et de ritonavir)
- les contraceptifs hormonaux, comme la pilule (voir ci-dessous).

→ Prévenez votre médecin si vous prenez, commencez à prendre ou arrêtez de prendre l'une d'entre eux.

Les contraceptifs hormonaux (comme la pilule) peuvent perturber l'action de SYNNAX®.

Votre médecin peut vous recommander d'utiliser un type particulier de contraceptif hormonal, ou une autre méthode de contraception, comme le préservatif, un diaphragme ou un stérilet. Si vous utilisez un contraceptif hormonal comme la pilule, votre médecin peut prélever des échantillons de votre sang pour contrôler le taux de SYNNAX®. Si vous prenez un contraceptif hormonal ou si vous envisagez de commencer à en prendre :

→ Parlez-en à votre médecin, qui discutera avec vous des méthodes de contraception pourront vous convenir.

SYNNAX® peut également perturber le mode d'action des contraceptifs hormonaux, bien qu'il soit peu probable qu'il en diminue leur efficacité. Si vous utilisez un contraceptif hormonal et si vous remarquez tout changement dans votre cycle menstruel, comme un saignement ou de légères périodes vénitaines sanguinolentes entre les règles :

→ Parlez-en à votre médecin. Ceux-ci peuvent être le signe que SYNNAX® perturbe le mode d'action de votre contraceptif.

## Grossesse et allaitement

→ Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

→ Vous ne devez pas arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Cela est particulièrement important si vous avez une épilepsie.

La grossesse peut modifier l'efficacité de SYNNAX®, de sorte que vous pourrez avoir besoin d'effectuer des prises de sang et votre dose de SYNNAX® pourra être ajustée.

Il existe un faible risque d'ulcération de malformations congénitales incluant des fentes labiales ou des lèvres pectinées, si SYNNAX® est pris au cours des 3 premiers mois de grossesse.

Votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément en acide folique si vous envisagez une grossesse et pendant votre grossesse.

→ Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La substance active de SYNNAX® passe dans le lait maternel et peut affecter votre bébé. Votre médecin discutera des risques et des bénéfices de l'allaitement si vous êtes traitée par SYNNAX®. Si vous décidez d'allaiter, il examinera régulièrement votre bébé en cas de somnolence, d'éruption cutanée ou d'une perte de poids insuffisante. Informez votre médecin si vous observez une de ces symptômes chez votre bébé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SYNNAX® peut provoquer des sensations vertigineuses et une vision double.

→ Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que certain de ne pas être affecté.

Si vous avez une épilepsie, parlez à votre médecin de la conduite de machines.

SYNNAX® Comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains s de prendre ce médicament.

SYNNAX® Comprimé contient du Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium qui est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exacte

→ votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès pharmacien en cas de doute.

Quelle quantité de SYNNAX® prendre ?

Cela peut prendre un moment avant de trouver la meilleure dose de vous. La dose que vous prendrez dépendra de :

→ votre âge

→ si vous prenez SYNNAX® avec d'autres médicaments

→ si vous avez des problèmes de reux ou de foie.

Votre médecin vous prescrira pour commencer une dose faible et augmentera

l'efficacité ou une éruption cutanée étendue avec atteinte du foie, du sang ou d'autres organes (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques aussi appelé syndrome d'hypersensibilité (DRESS))

- des ulcères de la bouche, de la gorge, du nez ou des organes génitaux
- une irritation de la bouche ou des yeux rouges ou émiettes (corinches)
- un gonflement autour du visage ou des gonglions lymphatiques
- des bleus ou des saignements inattendus ou les doigts qui deviennent bleus
- une gêne douloureuse ou plus d'infections que d'habitude (comme des rhumes)
- des augmentations des enzymes du foie observées dans les tests sanguins
- une augmentation d'un type de globules blancs (les eosinophiles)
- un gonflement des gonglions lymphatiques

une atteinte d'autres organes comme le foie ou les reins.

Dans beaucoup de cas, ces symptômes seront les signes d'effets indésirables moins graves. Mais vous devez être conscient qu'ils peuvent potentiellement mettre en jeu le pronostic vital et peuvent se transformer en problèmes plus graves, comme la défaillance d'organes, si elles ne sont pas traités. Si vous remarquez l'un de ces symptômes :

→ Consultez immédiatement un médecin. Votre médecin peut décider d'effectuer des tests sur votre foie, vos reins ou votre sang et peut vous dire d'arrêter de prendre SYNNAX®. Dans le cas où vous avez développé le syndrome de Stevens-Johnson ou de nécrose épidermique toxique, votre médecin vous préviendra que vous ne devez jamais plus utiliser la lamotrigine.

Lymphohistiocytose hémophagocytatoire (LHH) (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé)

Effets indésirables très fréquents

Ils affectent plus d'1 personne sur 10 :

- maux de tête, éruption cutanée.
- Effets indésirables fréquents
- Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 :
  - agressivité ou irritabilité, envie de dormir, sensation de vertiges, frissons ou tremblements, difficultés à dormir (insomnie), sensation d'agitation, diarrhée, bouche sèche, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables peu fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 100 :

- maladresses et manque de coordination (ataxie), vision double ou vision floue, perte inhabituelle ou réfraction des cheveux (alopecie), éruption cutanée ou coup de soleil après une exposition au soleil ou à la lumière artificielle (photosensibilité).

Effets indésirables rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

- une réaction cutanée mettant au jeu le syndrome de Stevens-Johnson (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé) :
  - un érythème
  - un épanchement
  - une hémorragie
  - une nécrose
  - une éruption cutanée mettant au jeu le syndrome de Steven-Johnson) :
    - un érythème
    - un épanchement
    - une hémorragie
    - une nécrose

instabilité extrême

les environs

1 disparaissent avant, contactez

SYNNAX 25mg

30 comprimés



LOT : 221790

EXP : 12/2024

PPV : 68,00DH

→ modifications qui peuvent se voir dans les analyses de sang, incluant une diminution du nombre de globules rouges (anémie), une diminution du nombre de globules blancs

→ évitez de prendre SYNNAX® si vous avez une maladie de l'hépatite ou une maladie de l'œsophage.

# SYNNAX® 25mg, 50mg, 100 mg - Comprimé Boîte de 30 et de 60 Lamotrigine

Veuillez lire attentivement l'entier de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Quel contient cette notice :

- Qu'est-ce que SYNNAX® Comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Comment prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SYNNAX® Comprimé ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SYNNAX® COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AA09

SYNNAX® appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies : l'épilepsie et les troubles bipolaires.

SYNNAX® traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. SYNNAX® peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, SYNNAX® peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

SYNNAX® traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appellés maniax-depression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment SYNNAX® agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Ne prenez jamais SYNNAX® Comprimé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas SYNNAX®.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SYNNAX® :

- si vous avez des problèmes de reux
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie

si vous avez présenté une éruption cutanée ou un coup de soleil après avoir pris de la lamotrigine et après vous être exposé au soleil ou à une lumière artificielle (par exemple, un solarium). Votre médecin vérifiera votre traitement et pourra vous conseiller d'éviter toute exposition au soleil ou de vous protéger contre le soleil (par exemple, l'utilisation d'un écran solaire ou port de vêtements de protection).

si vous avez déjà développé une ménigrité après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)

si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine.

si vous souffrez du syndrome de Brugada, ou d'autres problèmes cardiaques. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin. Il pourra décaler de diminuer la dose ou que SYNNAX® ne vous convienne pas.

probabilité que certaines personnes en aient les effets indésirables. Ils incluent :

- Le valproate, utilisé pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La carbamazépine, utilisée pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La phénytoïne, la primaquine ou le phénobarbital, utilisé pour traiter l'épilepsie
- La rispéridone, utilisée pour traiter des troubles psychiatriques
- La lamotrigine, qui est un antibiotique
- des médicaments utilisés pour traiter l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VH) (une association de lopinavir et de ritonavir ou d'atazanavir et de ritonavir)
- les contraceptifs hormonaux, comme la pilule (voir ci-dessous).

→ Prévenez votre médecin si vous prenez, commencez à prendre ou arrêtez de prendre l'une d'entre eux.

Les contraceptifs hormonaux (comme la pilule) peuvent perturber l'action de SYNNAX®.

Votre médecin peut vous recommander d'utiliser un type particulier de contraceptif hormonal, ou une autre méthode de contraception, comme le préservatif, un diaphragme ou un stérilet. Si vous utilisez un contraceptif hormonal comme la pilule, votre médecin peut prélever des échantillons de votre sang pour contrôler le taux de SYNNAX®. Si vous prenez un contraceptif hormonal ou si vous envisagez de commencer à en prendre :

→ Parlez-en à votre médecin, qui discutera avec vous des méthodes de contraception pourront vous convenir.

SYNNAX® peut également perturber le mode d'action des contraceptifs hormonaux, bien qu'il soit peu probable qu'il en diminue leur efficacité. Si vous utilisez un contraceptif hormonal et si vous remarquez tout changement dans votre cycle menstruel, comme un saignement ou de légères périodes vénitaines sanguinolentes entre les règles :

→ Parlez-en à votre médecin. Ceux-ci peuvent être le signe que SYNNAX® perturbe le mode d'action de votre contraceptif.

## Grossesse et allaitement

→ Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

→ Vous ne devez pas arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Cela est particulièrement important si vous avez une épilepsie.

La grossesse peut modifier l'efficacité de SYNNAX®, de sorte que vous pourrez avoir besoin d'effectuer des prises de sang et votre dose de SYNNAX® pourra être ajustée.

Il existe un faible risque d'ulcération de malformations congénitales incluant des fentes labiales ou des lèvres pectinées, si SYNNAX® est pris au cours des 3 premiers mois de grossesse.

Votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément en acide folique si vous envisagez une grossesse et pendant votre grossesse.

→ Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La substance active de SYNNAX® passe dans le lait maternel et peut affecter votre bébé. Votre médecin discutera des risques et des bénéfices de l'allaitement si vous êtes traitée par SYNNAX®. Si vous décidez d'allaiter, il examinera régulièrement votre bébé en cas de somnolence, d'éruption cutanée ou d'une perte de poids insuffisante. Informez votre médecin si vous observez une de ces symptômes chez votre bébé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SYNNAX® peut provoquer des sensations vertigineuses et une vision double.

→ Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que certain de ne pas être affecté.

Si vous avez une épilepsie, parlez à votre médecin de la conduite de machines.

SYNNAX® Comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains s de prendre ce médicament.

SYNNAX® Comprimé contient du Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium qui est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exacte

→ votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès pharmacien en cas de doute.

Quelle quantité de SYNNAX® prendre ?

Cela peut prendre un moment avant de trouver la meilleure de vous. La dose que vous prendrez dépendra de :

• votre âge

• si vous prenez SYNNAX® avec d'autres médicaments

• si vous avez des problèmes de reux ou de foie.

Votre médecin vous prescrira pour commencer une dose table et augmentera

laitue) ou une éruption cutanée étendue avec atteinte du foie, du sang ou d'autres organes (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques aussi appelé syndrome d'hypersensibilité (DRESS))

- des ulcères de la bouche, de la gorge, du nez ou des organes génitaux
- une irritation de la bouche ou des yeux rouges ou émiettes (corinches)
- un gonflement autour du visage ou des gonglions lymphatiques
- une augmentation des globules blancs (les leucémophiles)
- un gonflement des gonglions lymphatiques
- une atteinte d'autres organes comme le foie ou les reins.

Dans beaucoup de cas, ces symptômes seront les signes d'effets indésirables moins graves. Mais vous devrez être conscient qu'ils peuvent potentiellement mettre en jeu le pronostic vital et peuvent se transformer en problèmes plus graves, comme la défaillance d'organes, si elles ne sont pas traités. Si vous remarquez l'un de ces symptômes :

→ Consultez immédiatement un médecin. Votre médecin peut décider d'effectuer des tests sur votre foie, vos reins ou votre sang et peut vous dire d'arrêter de prendre SYNNAX®. Dans le cas où vous avez développé le syndrome de Stevens-Johnson ou de nécrose épidermique toxique, votre médecin vous préviendra que vous ne devrez jamais plus utiliser la lamotrigine.

Lymphohistioctose hémophagocytatoire (LHH) (voir rubrique 2 : Quelles sont les

informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé)

Effets indésirables très fréquents

Ils affectent plus d'1 personne sur 10 :

maux de tête, éruption cutanée.

Effets indésirables fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 :

- agressivité ou irritabilité, envie de dormir, sensation de vertiges, frissons ou tremblements, difficultés à dormir (insomnie), sensation d'agitation, diarrhée, bouche sèche, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables peu fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 100 :

- maladresses et manque de coordination (ataxie), vision double ou vision floue, perte

inhalatoire ou nécrose des cheveux (alopecie), éruption cutanée ou coup de soleil

ou sensibilité aux lumières artificielles (photosensibilité).

Effets indésirables rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

- une réaction cutanée mettant au jeu le syndrome de Stevens-Johnson (voir rubrique 2 : Quelles sont les

modifications qui peuvent se voir dans les analyses de sang, incluant une diminution du

nombre de globules rouges (anémie), une diminution du nombre de globules blancs

SYNNAX 25mg

30 comprimés



LOT : 221790

EXP : 12/2024

PPV : 68,00DH

4) :  
5) :  
6) :  
7) :  
8) :  
9) :  
10) :  
11) :  
12) :  
13) :  
14) :  
15) :  
16) :  
17) :  
18) :  
19) :  
20) :  
21) :  
22) :  
23) :  
24) :  
25) :  
26) :  
27) :  
28) :  
29) :  
30) :  
31) :  
32) :  
33) :  
34) :  
35) :  
36) :  
37) :  
38) :  
39) :  
40) :  
41) :  
42) :  
43) :  
44) :  
45) :  
46) :  
47) :  
48) :  
49) :  
50) :  
51) :  
52) :  
53) :  
54) :  
55) :  
56) :  
57) :  
58) :  
59) :  
60) :  
61) :  
62) :  
63) :  
64) :  
65) :  
66) :  
67) :  
68) :  
69) :  
70) :  
71) :  
72) :  
73) :  
74) :  
75) :  
76) :  
77) :  
78) :  
79) :  
80) :  
81) :  
82) :  
83) :  
84) :  
85) :  
86) :  
87) :  
88) :  
89) :  
90) :  
91) :  
92) :  
93) :  
94) :  
95) :  
96) :  
97) :  
98) :  
99) :  
100) :  
101) :  
102) :  
103) :  
104) :  
105) :  
106) :  
107) :  
108) :  
109) :  
110) :  
111) :  
112) :  
113) :  
114) :  
115) :  
116) :  
117) :  
118) :  
119) :  
120) :  
121) :  
122) :  
123) :  
124) :  
125) :  
126) :  
127) :  
128) :  
129) :  
130) :  
131) :  
132) :  
133) :  
134) :  
135) :  
136) :  
137) :  
138) :  
139) :  
140) :  
141) :  
142) :  
143) :  
144) :  
145) :  
146) :  
147) :  
148) :  
149) :  
150) :  
151) :  
152) :  
153) :  
154) :  
155) :  
156) :  
157) :  
158) :  
159) :  
160) :  
161) :  
162) :  
163) :  
164) :  
165) :  
166) :  
167) :  
168) :  
169) :  
170) :  
171) :  
172) :  
173) :  
174) :  
175) :  
176) :  
177) :  
178) :  
179) :  
180) :  
181) :  
182) :  
183) :  
184) :  
185) :  
186) :  
187) :  
188) :  
189) :  
190) :  
191) :  
192) :  
193) :  
194) :  
195) :  
196) :  
197) :  
198) :  
199) :  
200) :  
201) :  
202) :  
203) :  
204) :  
205) :  
206) :  
207) :  
208) :  
209) :  
210) :  
211) :  
212) :  
213) :  
214) :  
215) :  
216) :  
217) :  
218) :  
219) :  
220) :  
221) :  
222) :  
223) :  
224) :  
225) :  
226) :  
227) :  
228) :  
229) :  
230) :  
231) :  
232) :  
233) :  
234) :  
235) :  
236) :  
237) :  
238) :  
239) :  
240) :  
241) :  
242) :  
243) :  
244) :  
245) :  
246) :  
247) :  
248) :  
249) :  
250) :  
251) :  
252) :  
253) :  
254) :  
255) :  
256) :  
257) :  
258) :  
259) :  
260) :  
261) :  
262) :  
263) :  
264) :  
265) :  
266) :  
267) :  
268) :  
269) :  
270) :  
271) :  
272) :  
273) :  
274) :  
275) :  
276) :  
277) :  
278) :  
279) :  
280) :  
281) :  
282) :  
283) :  
284) :  
285) :  
286) :  
287) :  
288) :  
289) :  
290) :  
291) :  
292) :  
293) :  
294) :  
295) :  
296) :  
297) :  
298) :  
299) :  
300) :  
301) :  
302) :  
303) :  
304) :  
305) :  
306) :  
307) :  
308) :  
309) :  
310) :  
311) :  
312) :  
313) :  
314) :  
315) :  
316) :  
317) :  
318) :  
319) :  
320) :  
321) :  
322) :  
323) :  
324) :  
325) :  
326) :  
327) :  
328) :  
329) :  
330) :  
331) :  
332) :  
333) :  
334) :  
335) :  
336) :  
337) :  
338) :  
339) :  
340) :  
341) :  
342) :  
343) :  
344) :  
345) :  
346) :  
347) :  
348) :  
349) :  
350) :  
351) :  
352) :  
353) :  
354) :  
355) :  
356) :  
357) :  
358) :  
359) :  
360) :  
361) :  
362) :  
363) :  
364) :  
365) :  
366) :  
367) :  
368) :  
369) :  
370) :  
371) :  
372) :  
373) :  
374) :  
375) :  
376) :  
377) :  
378) :  
379) :  
380) :  
381) :  
382) :  
383) :  
384) :  
385) :  
386) :  
387) :  
388) :  
389) :  
390) :  
391) :  
392) :  
393) :  
394) :  
395) :  
396) :  
397) :  
398) :  
399) :  
400) :  
401) :  
402) :  
403) :  
404) :  
405) :  
406) :  
407) :  
408) :  
409) :  
410) :  
411) :  
412) :  
413) :  
414) :  
415) :  
416) :  
417) :  
418) :  
419) :  
420) :  
421) :  
422) :  
423) :  
424) :  
425) :  
426) :  
427) :  
428) :  
429) :  
430) :  
431) :  
432) :  
433) :  
434) :  
435) :  
436) :  
437) :  
438) :  
439) :  
440) :  
441) :  
442) :  
443) :  
444) :  
445) :  
446) :  
447) :  
448) :  
449) :  
450) :  
451) :  
452) :  
453) :  
454) :  
455) :  
456) :  
457) :  
458) :  
459) :  
460) :  
461) :  
462) :  
463) :  
464) :  
465) :  
466) :  
467) :  
468) :  
469) :  
470) :  
471) :  
472) :  
473) :  
474) :  
475) :  
476) :  
477) :  
478) :  
479) :  
480) :  
481) :  
482) :  
483) :  
484) :  
485) :  
486) :  
487) :  
488) :  
489) :  
490) :  
491) :  
492) :  
493) :  
494) :  
495) :  
496) :  
497) :  
498) :  
499) :  
500) :  
501) :  
502) :  
503) :  
504) :  
505) :  
506) :  
507) :  
508) :  
509) :  
510) :  
511) :  
512) :  
513) :  
514) :  
515) :  
516) :  
517) :  
518) :  
519) :  
520) :  
521) :  
522) :  
523) :  
524) :  
525) :  
526) :  
527) :  
528) :  
529) :  
530) :  
531) :  
532) :  
533) :  
534) :  
535) :  
536) :  
537) :  
538) :  
539) :  
540) :  
541) :  
542) :  
543) :  
544) :  
545) :  
546) :  
547) :  
548) :  
549) :  
550) :  
551) :  
552) :  
553) :  
554) :  
555) :  
556) :  
557) :  
558) :  
559) :  
560) :  
561) :  
562) :  
563) :  
564) :  
565) :  
566) :  
567) :  
568) :  
569) :  
570) :  
571) :  
572) :  
573) :  
574) :  
575) :  
576) :  
577) :  
578) :  
579) :  
580) :  
581) :  
582) :  
583) :  
584) :  
585) :  
586) :  
587) :  
588) :  
589) :  
590) :  
591) :  
592) :  
593) :  
594) :  
595) :  
596) :  
597) :  
598) :  
599) :  
600) :  
601) :  
602) :  
603) :  
604) :  
605) :  
606) :  
607) :  
608) :  
609) :  
610) :  
611) :  
612) :  
613) :  
614) :  
615) :  
616) :  
617) :  
618) :  
619) :  
620) :  
621) :  
622) :  
623) :  
624) :  
625) :  
626) :  
627) :  
628) :  
629) :  
630) :  
631) :  
632) :  
633) :  
634) :  
635) :  
636) :  
637) :  
638) :  
639) :  
640) :  
641) :  
642) :  
643) :  
644) :  
645) :  
646) :  
647) :  
648) :  
649) :  
650) :  
651) :  
652) :  
653) :  
654) :  
655) :  
656) :  
657) :  
658) :  
659) :  
660) :  
661) :  
662) :  
663) :  
664) :  
665) :  
666) :  
667) :  
668) :  
669) :  
670) :  
671) :  
672) :  
673) :  
674) :  
675) :  
676) :  
677) :  
678) :  
679) :  
680) :  
681) :  
682) :  
683) :  
684) :  
685) :  
686) :  
687) :  
688) :  
689) :  
690) :  
691) :  
692) :  
693) :  
694) :  
695) :  
696) :  
697) :  
698) :  
699) :  
700) :  
701) :  
702) :  
703) :  
704) :  
705) :  
706) :  
707) :  
708) :  
709) :  
710) :  
711) :  
712) :  
713) :  
714) :  
715) :  
716) :  
717) :  
718) :  
719) :  
720) :  
721) :  
722) :  
723) :  
724) :  
725) :  
726) :  
727) :  
728) :  
729) :  
730) :  
731) :  
732) :  
733) :  
734) :  
735) :  
736) :  
737) :  
738) :  
739) :  
740) :  
741) :  
742) :  
743) :  
744) :  
745) :  
746) :  
747) :  
748) :  
749) :  
750) :  
751) :  
752) :  
753) :  
754) :  
755) :  
756) :  
757) :  
758) :  
759) :  
760) :  
761) :  
762) :  
763) :  
764) :  
765) :  
766) :  
767) :  
768) :  
769) :  
770) :  
771) :  
772) :  
773) :  
774) :  
775) :  
776) :  
777) :  
778) :  
779) :  
780) :  
781) :  
782) :  
783) :  
784) :  
785) :  
786) :  
787) :  
788) :  
789) :  
790) :  
791) :  
792) :  
793) :  
794) :  
795) :  
796) :  
797) :  
798) :  
799) :  
800) :  
801) :  
802) :

# SYNNAX® 25mg, 50mg, 100 mg - Comprimé Boîte de 30 et de 60 Lamotrigine

Veuillez lire attentivement l'entier de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Quel contient cette notice :

- Qu'est-ce que SYNNAX® Comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Comment prendre SYNNAX® Comprimé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver SYNNAX® Comprimé ?
- Informations supplémentaires.

## 1. QU'EST-CE QUE SYNNAX® COMPRIME ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : N03AA09

SYNNAX® appartient au groupe de médicaments appelés anti-épileptiques. Il est utilisé pour traiter 2 maladies : l'épilepsie et les troubles bipolaires.

SYNNAX® traite l'épilepsie en bloquant les signaux du cerveau qui déclenchent les crises d'épilepsie (convulsions).

Chez les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour traiter l'épilepsie. SYNNAX® peut également être utilisé avec d'autres médicaments pour traiter les crises survenant dans une maladie appelée syndrome de Lennox-Gastaut.

Chez les enfants âgés de 2 à 12 ans, SYNNAX® peut être utilisé avec d'autres médicaments, pour traiter ces maladies. Il peut être utilisé seul pour traiter un type d'épilepsie appelé crises d'absences typiques.

SYNNAX® traite également les troubles bipolaires.

Les personnes ayant des troubles bipolaires (parfois appellés maniax-depression) ont des variations d'humeur extrêmes, avec des périodes maniaques (excitation ou euphorie) alternant avec des périodes de dépression (profonde tristesse ou désespoir). Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, SYNNAX® peut être utilisé seul ou avec d'autres médicaments, pour prévenir les périodes de dépression qui surviennent dans les troubles bipolaires. On ne sait pas encore comment SYNNAX® agit dans le cerveau pour avoir cet effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Ne prenez jamais SYNNAX® Comprimé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la lamotrigine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin et ne prenez pas SYNNAX®.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre SYNNAX® :

- si vous avez des problèmes de reux
- si vous avez déjà développé une éruption cutanée après avoir pris de la lamotrigine ou tout autre médicament pour les troubles bipolaires ou l'épilepsie

si vous avez présenté une éruption cutanée ou un coup de soleil après avoir pris de la lamotrigine et après vous être exposé au soleil ou à une lumière artificielle (par exemple, un solarium). Votre médecin vérifiera votre traitement et pourra vous conseiller d'éviter toute exposition au soleil ou de vous protéger contre le soleil (par exemple, l'utilisation d'un écran solaire ou port de vêtements de protection).

si vous avez déjà développé une ménigrité après avoir pris de la lamotrigine (lisez le descriptif des symptômes dans la rubrique 4 de cette notice : effets indésirables rares)

si vous prenez déjà un médicament contenant de la lamotrigine.

si vous souffrez du syndrome de Brugada, ou d'autres problèmes cardiaques. Le syndrome de Brugada est une maladie génétique entraînant une activité électrique anormale du cœur. Ces anomalies de l'électrocardiogramme (ECG), pouvant entraîner des arythmies (rythme cardiaque anormal), peuvent être déclenchées par la lamotrigine. Parlez-en à votre médecin si vous pensez avoir cette maladie.

Si vous êtes concerné :

→ Parlez-en à votre médecin. Il pourra décaler de diminuer la dose ou que SYNNAX® ne vous convienne pas.

probabilité que certaines personnes en aient les effets indésirables. Ils incluent :

- Le valproate, utilisé pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La carbamazépine, utilisée pour traiter l'épilepsie et des troubles psychiatriques
- La phénytoïne, la primaquine ou le phénobarbital, utilisé pour traiter l'épilepsie
- La rispéridone, utilisée pour traiter des troubles psychiatriques
- La lamotrigine, qui est un antibiotique
- des médicaments utilisés pour traiter l'infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VH) (une association de lopinavir et de ritonavir ou d'atazanavir et de ritonavir)
- les contraceptifs hormonaux, comme la pilule (voir ci-dessous).

→ Prévenez votre médecin si vous prenez, commencez à prendre ou arrêtez de prendre l'une d'entre eux.

Les contraceptifs hormonaux (comme la pilule) peuvent perturber l'action de SYNNAX®.

Votre médecin peut vous recommander d'utiliser un type particulier de contraceptif hormonal, ou une autre méthode de contraception, comme le préservatif, un diaphragme ou un stérilet. Si vous utilisez un contraceptif hormonal comme la pilule, votre médecin peut prélever des échantillons de votre sang pour contrôler le taux de SYNNAX®. Si vous prenez un contraceptif hormonal ou si vous envisagez de commencer à en prendre :

→ Parlez-en à votre médecin, qui discutera avec vous des méthodes de contraception pourront vous convenir.

SYNNAX® peut également perturber le mode d'action des contraceptifs hormonaux, bien qu'il soit peu probable qu'il en diminue leur efficacité. Si vous utilisez un contraceptif hormonal et si vous remarquez tout changement dans votre cycle menstruel, comme un saignement ou de légères périodes vénitaines sanguinolentes entre les règles :

→ Parlez-en à votre médecin. Ceux-ci peuvent être le signe que SYNNAX® perturbe le mode d'action de votre contraceptif.

## Grossesse et allaitement

→ Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

→ Vous ne devez pas arrêter le traitement sans en avoir parlé à votre médecin. Cela est particulièrement important si vous avez une épilepsie.

La grossesse peut modifier l'efficacité de SYNNAX®, de sorte que vous pourrez avoir besoin d'effectuer des prises de sang et votre dose de SYNNAX® pourra être ajustée.

Il existe un faible risque d'ulcération de malformations congénitales incluant des fentes labiales ou des lèvres pectinées, si SYNNAX® est pris au cours des 3 premiers mois de grossesse.

Votre médecin peut vous conseiller de prendre un supplément en acide folique si vous envisagez une grossesse et pendant votre grossesse.

→ Si vous allaitez ou envisagez d'allaiter demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La substance active de SYNNAX® passe dans le lait maternel et peut affecter votre bébé. Votre médecin discutera des risques et des bénéfices de l'allaitement si vous êtes traitée par SYNNAX®. Si vous décidez d'allaiter, il examinera régulièrement votre bébé en cas de somnolence, d'éruption cutanée ou d'une perte de poids insuffisante. Informez votre médecin si vous observez une de ces symptômes chez votre bébé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

SYNNAX® peut provoquer des sensations vertigineuses et une vision double.

→ Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines à moins que certain de ne pas être affecté.

Si vous avez une épilepsie, parlez à votre médecin de la conduite de machines.

SYNNAX® Comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à certains s de prendre ce médicament.

SYNNAX® Comprimé contient du Sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium qui est essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE SYNNAX® COMPRIME ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement ce que votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès pharmacien en cas de doute.

Quelle quantité de SYNNAX® prendre ?

Cela peut prendre un moment avant de trouver la meilleure dose de vous. La dose que vous prendrez dépendra de :

- votre âge
- si vous prenez SYNNAX® avec d'autres médicaments

si vous avez des problèmes de reux ou de foie.

Votre médecin vous prescrira pour commencer une dose faible et augmentera

l'efficacité ou une éruption cutanée étendue avec atteinte du foie, du sang ou d'autres organes (syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse avec éosinophilie et symptômes systémiques aussi appelé syndrome d'hypersensibilité (DRESS))

- des ulcères de la bouche, de la gorge, du nez ou des organes génitaux
- une irritation de la bouche ou des yeux rouges ou émiettes (conjonctivite)
- une température élevée (fièvre), des symptômes pseudo-grippaux ou une somnolence
- un gonflement autour du visage ou des glandes salivaires au niveau du cou, de l'œil ou de l'oreille
- des bleus ou des saignements inhabituels ou les doigts qui deviennent bleus
- une gêne douloureuse ou plus d'infections que d'habitude (comme des rhumes)
- des augmentations des enzymes du foie observées dans les tests sanguins
- une augmentation d'un type de globules blancs (les eosinophiles)
- un gonflement des glandes lymphatiques

une atteinte d'autres organes comme le foie ou les reins.

Dans beaucoup de cas, ces symptômes seront les signes d'effets indésirables moins graves. Mais vous devez être conscient qu'ils peuvent potentiellement mettre en jeu le pronostic vital et peuvent se transformer en problèmes plus graves, comme la défaillance d'organes, si elles ne sont pas traités. Si vous remarquez l'un de ces symptômes :

- Consultez immédiatement un médecin. Votre médecin peut décider d'effectuer des tests sur votre foie, vos reins ou votre sang et peut vous dire d'arrêter de prendre SYNNAX®. Dans le cas où vous avez développé le syndrome de Stevens-Johnson ou de nécrose épidermique toxique, votre médecin vous préviendra que vous ne devez jamais plus utiliser la lamotrigine.
- Lymphohistiocytose hémophagocyttaire (LHH) (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé)

Effets indésirables très fréquents

Ils affectent plus d'1 personne sur 10 :

maux de tête, éruption cutanée.

Effets indésirables fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 10 :

agressivité ou irritabilité, envie de dormir, sensation de vertiges, frissons ou tremblements, difficultés à dormir (insomnie), sensation d'agitation, diarrhée, bouche sèche, nausées ou vomissements, sensation de fatigue, douleur du dos ou des articulations ou ailleurs.

Effets indésirables peu fréquents

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 100 :

maladresses et manque de coordination (ataxie), vision double ou vision floue, perte inhabituelle ou réfraction des cheveux (alopecie), éruption cutanée ou coup de soleil après une exposition au soleil ou à la lumière artificielle (photosensibilité).

Effets indésirables rares

Ils affectent jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

une réaction cutanée mettant au jeu le syndrome de Stevens-Johnson (voir rubrique 2 : Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SYNNAX®, comprimé) : instabilité extrême des environs, environs 1 disparaissent avant, contactez

SYNNAX 25mg

30 comprimés



LOT : 221790

EXP : 12/2024

PPV : 68,00DH

modifications qui peuvent se voir dans les analyses de sang, incluant une diminution du nombre de globules rouges (anémie), une diminution du nombre de globules blancs

et une diminution de la teneur en protéines dans le sang.