

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

## Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 247 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

ESSOURIRI JAMILA

Date de naissance :

22 MAI 2023

Adresse :

M 10014 C.M.A

Tél. : Total des frais engagés :

Dhs

## Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

الدكتور عمر نور  
Docteur OMAR NOUR  
77, Rue Ghrib Hay Laayouna  
Casa - Tél. : 05 22 82 68 68  
Aut. : 10740

INPE N°:  
**91115840**

Date de consultation :

16.10.2023

Nom et prénom du malade :

Saïri JAMILA

Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Dental

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :



**Déclaration de Maladie**

M23-007186

161503

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/05/2023	12	100	الدكتور عمر نور Docteur Omar NOUR 77, Rue Gharb Hay Laouane Casa - Tél.: 05 22 82 68 68 Aut.: 10740	

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
         	16/05/23	180.80

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

		MONTANT DES TRAVAUX															
<p><b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		MONTANTS DES SOINS															
		DATE DU DEVIS															
		DATE DE L'EXECUTION															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D ————— G</td> </tr> <tr> <td colspan="2">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">35533411 11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D ————— G		00000000		35533411 11433553		B			
H																	
25533412	21433552																
00000000	00000000																
D ————— G																	
00000000																	
35533411 11433553																	
B																	

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

OMNIPRATICIEN

Diplôme Universitaire en Echographie Chirique.

Diplôme Universitaire Diététique Médicale et Nutrition.

Diplôme Universitaire en Diabétologie

Faculté de Médecine Montpellier- FRANCE.

**ELECTROCARDIOGRAMME**

Médecine Générale

Souïqi  
Jemâa

Casablanca, le : 16.05.92.93 الدار البيضاء، في

99,00 1) Magmine vt 86  
  
 100,00 2) An del m  
  
 27,70 3) Condus AF 100  
  
 44,80 4) Fenac 50  
  
 180,80

الدكتور نور عمر  
 Docteur Nour Nour  
 77, Rue Gharb Hay Laâyoun  
 Casa Tél.: 05 22 82 68 68  
 Aut.: 0740

28, Av. Cdt. Driss El Hatti  
 Janâa 3 - Cité Djemâa  
 Tél.: 0522 37 36 37 - CASABLANCA

Tél.: 05 22 82 68 68 - 05 20 01 01 07

زنقة الغرب حي العيون درب السلطان الفداء 77

77, Rue El Garb Hay Laâyoun (en Face Marché Jemeâa) - Casablanca

# Magmine

Magnésium 300 mg  
Vitamine B<sub>6</sub>

SANS SUCRES, SANS SEL ET SANS GLUTEN

## COMPOSITION

Par comprimé :

Oxyde de magnésium d'origine marine	300 mg
Soit un apport en magnésium élément de	.....
Vitamine B <sub>6</sub> .....	2mg

## PROPRIETES

Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement du cœur, des nerfs, des muscles et des différentes phases du métabolisme de l'organisme. MAGMINE à base de 300 mg de magnésium et de vitamine B<sub>6</sub>, permet de couvrir les besoins quotidiens en magnésium dans certaines situations :

- Effort physique intense
- Crampes et tensions musculaires, fatigue physique,
- Alimentation déséquilibrée, avec carence nutritionnelle chez les personnes âgées, chez l'adolescent et en cas de régime alimentaire pendant des cures d'amaigrissement
- Surmenage, activité intellectuelle intense
- Stress, lassitude, difficulté d'endormissement
- Croissance chez l'adolescent

## CONSEILS D'UTILISATION

- Prendre 1 comprimé par jour, à avaler, en buvant un verre d'eau.

## PRESENTATION

Boite de 30 comprimés  
Boite de 45 comprimés

Complément alimentaire. N'est pas un médicament.



Laboratoire  
8, rue Christophe Colomb  
Importé par  
Résidence CASA I 282 Bd de la

LABORATOIRES  
JUVA SANTE

# ANDOL® 500 mg, comprimé

Boîte de 20

(DCI : Paracétamol)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous sentez moins bien après 3 jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

Quel contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ANDOL 500 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ANDOL 500 mg, comprimé ?
3. Comment prendre ANDOL 500 mg, comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ANDOL 500 mg, comprimé ?
6. Informations supplémentaires :

1. Qu'est-ce que ANDOL 500 mg, comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmaco-thérapeutique : Autres analgésiques et antipyrétiques anti-inflammatoires : code ATC : N02B01.

ANDOL est un antalgique (calme la douleur) et un antipyrétique (fait baisser la fièvre).

La substance active de ce médicament est le paracétamol.

Il est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre par exemple en cas de maux de tête, d'état grippal, de douleurs dentaires, de courbatures, de règles douloureuses.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg (soit à partir d'environ 8 ans). **Lez attentionne la rubrique Posologie.**

Pour les enfants ayant un poids inférieur à 27 kg, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ANDOL 500 mg, comprimé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais ANDOL 500 mg, comprimé :

- si vous êtes allergique (hypersensible) au paracétamol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique composition ;
- Si vous avez une maladie grave du foie.
- Pour traiter un enfant de moins de 6 ans, car il peut avaler de travers et s'étouffer. Utilisez une autre forme.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent.

Vérifiez que vous ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription.

Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée.

(voir « Posologie » et « Symptômes et Instructions en cas de surdosage »)

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ANDOL 500 mg, comprimé.

### Faites attention avec ANDOL

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'effacement important ou de survenue de tout autre signe, ne continuez pas le traitement sans l'avis de votre médecin.

La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du fonctionnement du foie.

Vous devez demander l'avis de votre médecin avant de prendre ce médicament :

- Si vous prenez moins de 50 kg.
- Si vous avez une maladie du foie ou maladie grave des reins.
- Si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment.
- Si vous souffrez de déshydratation.
- Si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique, si vous êtes en période de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des maladies de longue durée, si vous êtes atteints du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).
- Si vous êtes allergique à l'aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

En cas de suravage récent d'un alcoolisme chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré.

En cas d'administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « Comment prendre ANDOL 500 mg, comprimé »).

En cas d'hépatite virale aigüe, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

### Analyses de sang

Prévenez votre médecin si vous prenez ANDOL et que vous devez faire un test sanguin car ce médicament peut fausser les résultats de votre taux d'acide urique (uricémie) et de sucre (glycémie) dans le sang.

**EN CAS DE DOUTE NE HÉSITEZ À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

**Autres médicaments et ANDOL 500 mg, comprimé**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

**Ne prenez pas d'autres médicaments contenant du paracétamol. Vous risqueriez un surdosage.**

Si vous suivez un traitement anticoagulant par voie orale (par warfarine ou AIV), la prise d'ANDOL aux doses maximales (4 g/jour) pendant plus de 4 jours nécessite une surveillance renforcée des examens biologiques dont notamment de l'INR. Dans ce cas, consultez votre médecin.

L'efficacité du paracétamol peut être diminuée si vous prenez simultanément

des résines chélantes – médicament qui diminue le taux de cholestérol dans le sang (respectez un intervalle de plus de 2 heures entre les 2 prises).

Si vous recevez en même temps que du paracétamol, un traitement par fluclorolidine (un antibiotique), vous risquez de présenter une acidose métabolique (sang trop acide à l'origine d'une accélération de la fréquence respiratoire).

La toxicité du paracétamol peut être augmentée, si vous prenez :

- Des médicaments potentiellement toxiques pour le foie.
- Des médicaments qui favorisent la production du métabolite toxique du paracétamol, tels que les médicaments anticonvulsifs (phénobarbital, phénitoina, carbamazépine, topiramate).
- De la rifampicine (un antibiotique).

- En même temps de l'alcool.

**ANDOL 500 mg, comprimé avec des aliments, boissons et de l'alcool**

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Grossesse et allaitement

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Utilisez la dose minimale permettant de réduire votre douleur et/ou votre fièvre, pendant une durée aussi courte que possible et le moins fréquemment possible. Contactez votre médecin ou votre sage-femme si la douleur et/ou fièvre ne diminue pas si vous ou si vous êtes susceptible de prendre ce médicament plus fréquemment au cours de votre grossesse.

### Fertilité

Il est possible que le paracétamol puisse altérer la fertilité des femmes, de façon réversible à l'arrêt du traitement.

### Sans objet

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

### Sans objet

### Mentions relatives aux excipients à effet notable :

Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

Ce médicament contient du « sulfite » et peut provoquer des réactions allergiques sévères et une gêne respiratoire.

### 3. Comment prendre ANDOL 500 mg, comprimé ?

### Posologie

Respectez toujours la dose prescrite par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à partir de 27 kg (à partir d'environ 8 ans).

### Chez l'enfant

La posologie du paracétamol dépend du poids de l'enfant; les âges sont mentionnés à titre d'information.

Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.

Le paracétamol existe sous de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.

La dose quotidienne de paracétamol recommandée dépend du poids de l'enfant : elle est d'environ 60 mg/kg par jour à répartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures.

La posologie usuelle est de :

Pour les enfants de moins de 27 kg, de 27 à 40 kg (environ 8 à 13 ans), la posologie est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures, sans dépasser 4 comprimés par jour.

Pour les enfants ayant un poids de 41 à 50 kg (environ 12 à 15 ans), la posologie est de 1 comprimé à 500 mg par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 comprimés par jour.

Pour les adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg (à partir d'environ 15 ans) :

La posologie usuelle est de 1 ou 2 comprimés à 500 mg par prise (selon l'intensité de la douleur), à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum.

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3 g de paracétamol par jour, soit 6 comprimés par jour.

Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur conseil de votre médecin ou de votre pharmacien, la dose totale peut être augmentée jusqu'à 4 g par jour, soit 8 comprimés par jour. Si vous avez l'impression que l'effet d'ANDOL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Attention :

- Les dosages supérieurs à 3 g de paracétamol par jour nécessitent un avis médical.

- NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMES DE PARACETAMOL PAR JOUR

(en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur composition).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises doivent être espacées de 8 heures, et la dose totale par jour ne doit pas dépasser 6 comprimés (3 g).

### Situtions particulières

La dose maximale journalière ne doit pas excéder 60 mg/kg (sans dépasser 3 g) par jour dans les situations suivantes :

- adultes de moins de 50 kg

- si vous avez une maladie du foie ou une maladie grave des reins.

- si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez arrêté de boire de l'alcool récemment.

- si vous souffrez de déshydratation,

- si vous souffrez par exemple de malnutrition

de jeûne, si vous avez perdu beaucoup de poids au cours de 75 ans ou si vous avez plus de 65 ans et de longue durée, si vous êtes atteints du virus de l'hépatite virale chronique, si vous souffrez de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire caractérisée notamment par des infections respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

- Si vous êtes allergique à l'aspirine et/ou aux anti-inflammatoires non stéroïdiens.

La consommation de boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.

En cas de suravage récent d'un alcoolisme chronique, le risque d'atteinte hépatique est majoré.

En cas d'administration chez un enfant, la dose dépend de son poids (voir rubrique « Comment prendre ANDOL 500 mg, comprimé »).

En cas d'hépatite virale aigüe, arrêtez votre traitement et consultez votre médecin.

### Fréquence d'administration

Des prises régulières permettent d'éviter que la douleur ou la fièvre ne revienne : voir rubrique « Posologie ».

Chacun l'enfant, les prises doivent être régulièrement espacées, y compris la prise de préférence de 6 heures, et au moins 4 heures.

Chacun l'adulte, les prises doivent être régulièrement espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), vous devez attendre au moins 6 heures entre chaque prise.

Si vous avez l'impression que l'effet d'ANDOL est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### Durée du traitement

Sauf avis médical, la durée du traitement est limitée.

- à 5 jours en cas de douleurs,

- à 3 jours en cas de fièvre.

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, si elles s'aggravent, ne continuez le traitement sans l'avoir de votre médecin.

**Si vous avez pris plus d'ANDOL 500 mg, comprimé que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou les urgences médicales.

Le surdosage peut également entraîner : une atteinte du pancréas (pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation du taux d'amylase dans le sang), une maladie des reins (insuffisance rénale aiguë), et un problème de coagulation (maladie hémorragique).

Les personnes qui ont une maladie des reins (insuffisance rénale aiguë), les globules blancs et les plaquettes sont très réduits en nombre ce qui entraîne :

- une fatigue, un souffle court et une peine à respirer,
- des infections fréquentes accompagnées de fièvre et de frissons importants, des maux de gorge ou des ulcères de la bouche ;
- une tendance à saigner ou à présenter des ecchymoses spontanées, des saignements de nez ou de genoux.

**Si vous oubliez de prendre ANDOL 500 mg, comprimé :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre ANDOL 500 mg, comprimé :**

Sans objet.

### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Rarement, une réaction allergique peut survenir :

- boutons et/ou des rougeurs sur la peau,
- urticaire,

- brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer (œdème de Quincke).

Si une allergie survient, vous devez immédiatement arrêter de prendre ce médicament et consulter rapidement votre médecin. A l'avoir, vous ne devrez plus jamais prendre de médicaments contenant du paracétamol.

- En très rares cas d'effets indésirables graves, les personnes qui ont une maladie hépatique peuvent diminuer le nombre de certains types de globules blancs (leucémie) et augmenter le nombre de certains types de globules rouges dans le sang (anémie hémolytique) ; leur couleur devient jaune et leur taille réduite. Ces effets peuvent être temporaires ou permanents et peuvent entraîner des complications (thrombopénie pigmentée fine), douleur localisée dans la poitrine qui peut irradier vers l'épaule gauche et la mâchoire d'origine allergique (syndrome de Kounis), difficulté à respirer (bronchospasme). Dans ce cas, consultez un médecin.

### Déclaration des effets indésirables :

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.

### 5. Comment conserver ANDOL 500 mg, comprimé ?

Pas de précautions particulières de conservation.

### 6. Informations supplémentaires :

- Que contient ANDOL 500 mg comprimé ?

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnésium, Talc, Silice colloïdale dissoute, Lauryl sulfate de sodium

### Liste des Excipients à effet notable : Maltobiose de sodium

Principe actif : Paracétamol 500,00 mg

Excipients : Amidon de maïs, Maltobiose de sodium, Le bromocryptine lamidonide (type A), Povidone K20, Stéarate de magnés

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# **CARDIOASPIRINE®**

## **100 mg, comprimés gastro-résistants**

®

MFD

BT17XZ1 04 2022  
04 2027

EXP

Cardioaspirine 100 mg/30cps  
Acide acétysalicylique

P.P.V. : 27,70 DH  
Bayer S.A.



6 118001 090280

**Dans cette notice :**

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

**1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétysalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un entrobâge résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine

# Fenac® Promopharm 50 mg

Comprimé gastro-résistant

Diclofénac sodique

Boîte de 30 comprimés

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que Fenac promopharm 50 mg, comprimé gastro-résistant et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Fenac promopharm 50 mg, comprimé gastro-résistant ?
- Comment prendre Fenac promopharm 50 mg, comprimé gastro-résistant ?
- Quels sont effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver Fenac promopharm 50 mg, comprimé gastro-résistant ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.
- Qu'est-ce que Fenac promopharm 50 mg, comprimé gastro-résistant et dans quels cas est-il utilisé ?

Fenac promopharm Classe pharmacothérapeutique - code ATC : anti-inflammatoires, antirhumatismaux, non stéroïdiens - M01AB05  
Fenac promopharm, comprimé gastro-résistant contient du diclofénac, une substance qui appartient à la famille des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Ces médicaments diminuent l'inflammation, la douleur et la fièvre.

## Chez l'enfant de plus de 35 Kg (Soit environ 12 ans) :

Fenac promopharm 50 mg, comprimé gastro-résistant est utilisé uniquement pour traiter des rhumatismes.

## Chez l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans :

Fenac promopharm, comprimé gastro-résistant est utilisé

### En traitement de courte durée :

- Si vous avez une inflammation au niveau d'une articulation (épaule, douleur, tendinite ou inflammation des tendons, bursite ou inflammation de l'enveloppe de l'articulation),
- Si vous avez une inflammation des articulations causée par un dépôt de cristaux (la goutte par exemple),
- Si vous avez des douleurs ponctuelles dues à votre arthrose,
- Si vous avez des douleurs ponctuelles dues au bas du dos (douleurs lombaires aiguës),
- Si vous avez des douleurs ponctuelles liées à l'irritation d'un nerf (les sciatiques par exemple),
- Si vous avez des règles douloureuses.

### En traitement de longue durée :

- Si vous avez fréquemment des rhumatismes dus à des inflammations,
- Si vous avez une usure du cartilage entraînant des douleurs fréquentes aux articulations et gênant vos mouvements (arthroses sévères).

## 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Fenac promopharm 50 mg, comprimé gastro-résistant ?

Si vous avez des problèmes au niveau du foie, des reins ou des anomalies au niveau du sang, il vous sera demandé de faire des analyses de sang afin d'adapter votre traitement ou de l'arrêter.

## Ne prenez jamais Fenac promopharm, comprimé gastro-résistant :

- Si vous êtes allergique au diclofénac ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines d'aménorrhée),
- En cas d'antécédent d'allergie (tels que urticaire, angio-oedème, rhinite aiguë) ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique (aspirine),
- En cas d'antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs parAINS,
- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant,
- En cas d'hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours,
- En cas de maladie grave du foie (insuffisance hépatique),
- En cas de maladie grave du rein (insuffisance rénale);
- En cas de maladie cardiaque et/ou de maladie vasculaire cérébrale avérée, par exemple si vous avez été victime d'une crise cardiaque, d'un accident vasculaire cérébral (AVC), d'un accident ischémique transitoire (AIT) ou d'une obstruction des vaisseaux sanguins irriguant le cœur ou le cerveau ou si vous avez été opéré pour éliminer ou court-circuiter cette obstruction;
- En cas d'antécédents de troubles de la circulation sanguine ou de troubles actifs (arthropathie périphérique).
- Enfant de moins de 35 kg (en raison de la forme pharmaceutique inadaptée de ce médicament).
- Si vous prenez un médicament contenant une substance active appelée mifamurtide pour traiter certaines tumeurs osseuses.

## Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre Fenac promopharm, comprimé gastro-résistant.  
Les médicaments tels que Fenac promopharm, comprimé gastro-résistant pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (= infarctus du myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement. Si vous êtes une femme, Fenac promopharm, comprimé gastro-résistant peut altérer votre fertilité. Son utilisation n'est pas recommandée chez les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes qui présentent des difficultés pour procréer ou chez lesquelles des examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez-en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Fenac promopharm, comprimé gastro-résistant.

Les sujets âgés, notamment les patients âgés fragiles ou de faible poids corporel, présentent un risque plus élevé d'effets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées.

44120  
0 7 2 2 1 3 1  
E 3 7 2 5  
4 4 0 H 1 3

