

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie, orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.


N° W21-788524

161500

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Maladie | <input type="checkbox"/> Dentaire | <input type="checkbox"/> Optique | <input type="checkbox"/> Autres |
| Cadre réservé à l'adhérent (e) | | | |
| Matricule : | 7674 | Société : | |
| <input type="checkbox"/> Actif | <input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e) | <input type="checkbox"/> Autre : | |
| Nom & Prénom : RADI ARDELLI | | | |
| Date de naissance : 26/10/1962 | | | |
| Adresse : Pot Riyyad es Salam n° 119 Moharradat | | | |
| Tél. : 065835981 | Total des frais engagés : Dhs | | |

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

| | |
|---|---|
| Cachet du médecin : | MLD |
| Date de consultation : | |
| Nom et prénom du malade : | |
| Lien de parenté : | <input type="checkbox"/> Lui-même <input type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant |
| Nature de la maladie : | |
| En cas d'accident préciser les causes et circonstances : | |
| Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle. | |

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
Fait à : Le :
Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| | | | | INP : |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien et du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|---|----------|-----------------------|
|  PHARMACIE JARDIN DES ORCHIDÉES Dr. JALALE TARIK MOHAMMED MEDIA - Tel : 05 23 30 12 24 | 97/02/23 | 2200,20 |

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICALS

| Cachet et signature du Particulier | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|---------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VOLET ADHERENT

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | INP : <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------|-------------|--|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|--|
| | | | | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | FIN D'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| O.D.F PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p> | | | | H | 25533412 | 21433552 | D | 00000000 | 00000000 | B | 00000000 | 00000000 | G | 35533411 | 11433553 | COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/> |
| H | 25533412 | 21433552 | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 00000000 | 00000000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 35533411 | 11433553 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | MONTANTS DES SOINS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DATE DU DEVIS <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur BENNANI Saïd

Médecine Générale

Echographie Clinique

Diplômé de l'Université de Montpellier

Visite médicale pour Permis de Conduire

Expert Assermenté près des tribunaux



Essaâda 1 - Bd. Chorafa

N° 18 - El Alia - Mohammedia

Tél.: 05 23 28 10 06

Urgences: 0661 52 40 53

الدكتور بناني سعيد

الطب العام

الفحص بالصدى

بكلية الطب بمومنولي

الفحص الطبي لرخصة السيارة

خبير محلق لدى المحاكم

السعادة 1 شارع الشرفاء

رقم 18 العالية - المحمدية

الماتف: 05 23 28 10 06

المستعجلات: 0661 52 40 53

Mohammedia, le: 25/02/2013
الحمدية في

DR RANDI ABDELILAH

| | |
|---------------------|----------------|
| Seatinol 200 mg | 37,80 |
| x 9 | |
| Exfoliante | 310,00 |
| x 6 | |
| | <u>2290,20</u> |
| Tratamiento de Guas | |

AV. MED VI - RESID LES ORCHIDEES
MOHAMMEDIA - TEL: 05 23 30 12 36

PHARMACIE JARDIN DES ORCHIDEES
Dr. Jihane TARIK

Dr. BENNANI Saïd
E-mail: drbennani.said@gmail.com
Essaâda 1 - Bd. Chorafa
N° 18 - El Alia - Mohammedia
Tél: 05 23 28 10 06

سكترال® 200 ملغ

كلورهيدرات أسيبتوولول

أعراض مغلفة

- إذا كان قلب يتبضّع بشكل غير منتظم.
 - إذا كان قلب يتبضّع ببطء مزدوج (أقل من 45 إلى 50 نبضة في الدقيقة).
 - إذا كانت تعانى من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).
 - إذا كانت تعانى من ورم القوام غير المتعال (رمض في الغدة الموجودة فوق الكلى).
 - إذا كانت تعانى من المخاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).
 - إذا عانت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.
 - إذا كانت تعانى من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض) والسعال.
 - إذا كانت مرضعة.
 - إذا كانت تعانى من حساسية تجاه التجمّع حيث أن هذا الدواء يحتوى على نشا القمح.
 - التضيّبات والاحتياطات عند الاستعمال:
- تحذّث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة.
- يجب أن توقف عن علاج كلّ شكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك لأنّ إيقافه فجأة قد يعرّض جسمك للخطر.

- إذا كانت متضاخة لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك بأنك تتناول هذا الدواء.
- يجب عليك أيضًا إعلام طبيبك:

 - إذا كنت مصابة بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج.
 - إذا كانت تعانى من عدم حدوث صفر سكر الدم.
 - إذا كانت تعانى من مرض كلوى (فشل كلوى) أو مرض كبدى (فشل كبدى).
 - إذا كانت تعانى من أي مرض جلدي (الصدفية).
 - إذا عانت في السابق من الحساسية.
 - إذا كانت تعانى من ظاهرة رينود أهلي في الدورة الدموية على مستوى الأصابع، أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).
 - إذا كانت تعانى من رد فعل نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (الجسم الدرقي).

الدواء الآخر و سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة:

لا يجب تناول سكترال في نفس الوقت مع ديليتازيم أو فيراباميل (دواء للقلب) أو فينجوليمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ اضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروفة بأنها تؤخر هذه الآثار الجانبية.

تم الإبلاغ عن تزايد حفظ الذاكرة والكتابات عند تناول هذا الدواء مع ديليتازيم.

إذا كانت تتناول أو تناولت مخذّل آخر أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحتّد إلى طبيبك أو الصيدلاني.

- الحمل والإرضاع:**
- الحمل: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.
- إذا تم تناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبعض أيام، لأنّ بعض آثار العلاج ظهر في أياً عرض حدثي الولادة (يتأثّر ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).
- الإرضاع: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يتعلق هذا الدواء بحليب الأم المرضع، لذلك، تمنع الرعاية الطبيعية أثناء العلاج.
- القيادة واستعمال الآلات:**
- قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتعب أو تعب، إذا عانت من قبل أو كنت تعانى من هذه الآثار، فيجب عليك الحذر عندقيادة المركبات أو استعمال الآلات.

تحتوى هذه النشرة على معلومات هامة من أجلك، يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة فيها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

هذا الدواء وصف لأجلان، فلا تقم بوصله للأفراد الذين يضر بهم، حتى وإن كانوا يعالون من نفس الأعراض التي تعانى منها.

في حال تناولت أحد الأعراض الجانبية أو لاحظت أيّ أعراض جانبية غير مردورة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

متى تحتوي هذه النشرة؟

1. ما هو سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة و ماهي دواعي استعماله؟
2. سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة



استعماله ٤
C07AB04 : ATC
تنبيء إلى فئة حاصرات بيتا.
غضّ أمراض القلب.

- لعلاج بعض الصفرات المتعددة، مثل:
- لمنع توسيع الدبغة الصدرية المؤلمة التي تحدث أثناء بدء الجهد، البحبة الصدرية هي لمسؤولة عن ظهور آلم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والفك.
- عدّ توبة قلبية (اشتباخ غلقة القلب).
2. ما هي المعلومات الواجب عرفها قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟
- إذا أدرك طبيبك بأنك تعانى من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

- لا تتناول أبداً سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة في الحالات التالية:
- إذا كانت تعانى من الحساسية لـ أسيبتوولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (جهازات بيتا)، أو لأى من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
 - إذا كانت تعانى من احتقان شديد في القصبات الهوائية والرئتين (مرض الانسداد الرئوي المزمن).
 - إذا كان قلبك لا يحصل بشكل صحيح (فشل القلب) على الرغم من تلقى العلاج.
 - إذا كانت تعانى من قلل حاد في القلب (صدمة قلبية).
 - إذا كانت تعانى من اضطرابات في الشاطئ الكولي للقلب مما قد يؤدي إلى بطيء ضربات القلب، أو ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (اعتراض اذيني يعطى من الدرجة الثانية والثالثة).
 - إذا كانت تعانى من ذبحة برذميatal (شكل آخر من البحبة الصدرية محلّاة للذبحة الصدرية).

سكترال® 200 ملغ

كلورهيدرات أسيبتوولول

أعراض مغلفة

- إذا كان قلب يتبضّع بشكل غير منتظم.
 - إذا كان قلب يتبضّع ببطء مزدوج (أقل من 45 إلى 50 نبضة في الدقيقة).
 - إذا كانت تعانى من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شريان الساقين).
 - إذا كانت تعانى من ورم القوام غير المتعال (رمض في الغدة الموجودة فوق الكلى).
 - إذا كانت تعانى من المخاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).
 - إذا عانت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.
 - إذا كانت تعانى من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض) والسعال.
 - إذا كانت مرضعة.
 - إذا كانت تعانى من حساسية تجاه التجمّع حيث أن هذا الدواء يحتوى على نشا القمح.
 - التضيّبات والاحتياطات عند الاستعمال:
- تحذّث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة.
- يجب أن توقف عن علاج كلّ شكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك لأنّ إيقافه فجأة قد يعرّض جسمك للخطر.

- إذا كانت متضاخة لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك بأنك تتناول هذا الدواء.
- يجب عليك أيضًا إعلام طبيبك:

 - إذا كنت مصابة بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج.
 - إذا كانت تعانى من عدم حدوث صفر سكر الدم.
 - إذا كانت تعانى من مرض كلوى (فشل كلوى) أو مرض كبدى (فشل كبدى).
 - إذا كانت تعانى من أي مرض جلدي (الصدفية).
 - إذا عانت في السابق من الحساسية.
 - إذا كانت تعانى من ظاهرة رينود أهلي في الدورة الدموية على مستوى الأصابع، أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شريان الساقين).
 - إذا كانت تعانى من رد فعل نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (الجسم الدرقي).

الدواء الآخر و سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة:

لا يجب تناول سكترال في نفس الوقت مع ديليتازيم أو فيراباميل (دواء للقلب) أو فينجوليمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ اضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروفة بأنها تؤخر هذه الآثار الجانبية.

تم الإبلاغ عن تزايد حفظ الذاكرة والكتابات عند تناول هذا الدواء مع ديليتازيم.

إذا كانت تتناول أو تناولت مخذّل آخر أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحتّد إلى طبيبك أو الصيدلاني.

- الحمل والإرضاع:**
- الحمل: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.
- إذا تم تناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبعض أيام، لأنّ بعض آثار العلاج تظهر أيضًا عند حديثي الولادة (يتأثّر ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).
- الإرضاع:** استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يتعلق هذا الدواء بحليب الأم المرضع، لذلك، تمنع الرعاية الطبيعية أثناء العلاج.
- القيادة واستعمال الآلات:**
- قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتعب أو تعب، إذا عانت من قبل أو كنت تعانى من هذه الآثار، فيجب عليك الحذر عندقيادة المركبات أو استعمال الآلات.

تحتوى هذه النشرة على معلومات هامة من أجلك، يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة فيها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أستهلاك إضافي، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

هذا الدواء وصف لأجلان، فلا تقم بوصفة للأخررين قد يضر بهم، حتى وإن كانوا يعالون من نفس الأعراض التي تعانى منها.

في حال تناولت إحدى الأعراض الجانبية أو لاحظت أيّة أعراض جانبية غير مردورة في هذه النشرة يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

متى تحتوي هذه النشرة؟

1. ما هو سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة و ماهي دواعي استعماله؟
2. سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟



مفعول سكترال الدائم الشريطي،

• لعلاج بعض الصفرات المتعددة،

• بلع نوبات الذهمة الصدرية المؤقتة التي تحدث أثناء بدء الجهد، الذهمة الصدرية هي لمسؤولة عن ظهور ألم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والفك،

• عد نوبة قلبة (اشدّة، غلطة القلب)،

2. ما هي المعلومات الواجب عرفها قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟

إذا أدرك طبيبك بأنك تعانى من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة في الحالات التالية:

• إذا كانت تعانى من الحساسية لـ أسيبتوولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (جهازات

بيتا)، أو لأى من المكونات الأخرى لهذا الدواء،

• إذا كانت تعانى من الربو أو إذا كانت تعانى من احتقان شديد في القصص الهوائية والرتين (مرض الانسداد الرئوي المزمن)،

• إذا كان قلبك لا يحصل بشكل صحيح (فشل القلب) على الرغم من تلقى العلاج،

• إذا كانت تعانى من قلّ حاد في القلب (صدمة قلبية)،

• إذا كانت تعانى من قلّ حاد في الشاطئ الكبوي للقلب مما قد يؤدي إلى بطيء ضربات

القلب، وليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (جهاز آذيني يعطيك من الدرجة الثانية والثالثة)،

• إذا كانت تعانى من ذبحة برذميال (شكل آخر من الذهمة الصدرية مخالفة للذهبة الصدرية

سكترال® 200 ملغ

كلورهيدرات أسيبتوولول

أعراض مغلفة

- إذا كان قلب يتبضّع بشكل غير منتظم.
 - إذا كان قلب يتبضّع ببطء مزدوج (أقل من 45 إلى 50 نبضة في الدقيقة).
 - إذا كانت تعانى من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شريان الساقين).
 - إذا كانت تعانى من ورم القوام غير المتعال (رمض في الغدة الموجودة فوق الكلى).
 - إذا كانت تعانى من المخاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).
 - إذا عانت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.
 - إذا كانت تعانى من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض) والسعال.
 - إذا كانت مرضعة.
 - إذا كانت تعانى من حساسية تجاه التجمّع حيث أن هذا الدواء يحتوى على نشا القمح.
 - التضيّبات والاحتياطات عند الاستعمال:
- تحذّث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة.
- يجب أن توقف عن علاج كلّ شكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك لأنّ إيقافه فجأة قد يعرّض جسمك للخطر.

- إذا كانت متضاخة لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك بأنك تتناول هذا الدواء.
- يجب عليك أيضًا إعلام طبيبك:

 - إذا كنت مصابة بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج.
 - إذا كانت تعانى من عدم حدوث صفر سكر الدم.
 - إذا كانت تعانى من مرض كلوى (فشل كلوى) أو مرض كبدى (فشل كبدى).
 - إذا كانت تعانى من أي مرض جلدي (الصدفية).
 - إذا عانت في السابق من الحساسية.
 - إذا كانت تعانى من ظاهرة رينود أهلي في الدورة الدموية على مستوى الأصابع، أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شريان الساقين).
 - إذا كانت تعانى من رد فعل نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (الجسم الدرقي).

الدواء الآخر و سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة:

لا يجب تناول سكترال في نفس الوقت مع ديليتازيم أو فيراباميل (دواء للقلب) أو فينجوليمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ اضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروفة بأنها تؤخر هذه الآثار الجانبية.

تم الإبلاغ عن تزايد حفظ الذاكرة والكتابات عند تناول هذا الدواء مع ديليتازيم.

إذا كانت تتناول أو تناولت مخذّل آخر أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحتّد إلى طبيبك أو الصيدلاني.

- الحمل والإرضاع:**
- الحمل: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.
- إذا تم تناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبعض أيام، لأنّ بعض آثار العلاج تظهر أيضًا عند حديثي الولادة (يتأثّر ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).
- الإرضاع:** استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يتعلق هذا الدواء بحليب الأم المرضع، لذلك، تمنع الرضاعة الطبيعية أثناء العلاج.
- القيادة واستعمال الآلات:**
- قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتعب أو تعب، إذا عانت من قبل أو كنت تعانى من هذه الآثار، فيجب عليك الحذر عندقيادة المركبات أو استعمال الآلات.

تحتوى هذه النشرة على معلومات هامة من أجلك، يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة فيها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أستهلاك إضافي، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

هذا الدواء وصف لأجلان، فلا تقم بوصفة للأخررين قد يضر بهم، حتى وإن كانوا يعالون من نفس الأعراض التي تعانى منها.

في حال تناولت أحد الأغذية الجانية أو لاحظت آية أعراض جانبية غير مردجة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

متى تحتوي هذه النشرة؟

1. ما هو سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة و ماهي دواعي استعماله؟
2. سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟



تحتوى سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة على:

• لعلاج بعض الصفرات المحددة مثل:

• ملطف ثوبات البحة الصدرية المؤلمة التي تحدث أثناء بدء الجهد، البحة الصدرية هي لمسؤولة عن ظهور آلم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والفك.

• عد نوبة قلبة (اشدّة، غلطة القلب).

2. ما هي المعلومات الواجب عرفها قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟
- إذا أدرك طبيبك بأنك تعانى من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة في الحالات التالية:

- إذا كانت تعانى من الحساسية لـ أسيبتوولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (جهازات بيبيا) أو لأى من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
- إذا كانت تعانى من الارتفاع شديد في القصبات الهوائية والرئتين (مرض الانسداد الرئوي المزمن).

إذا كان قلبك لا يحصل بشكل صحيح (فشل القلب) على الرغم من تلقى العلاج.

- إذا كانت تعانى من قلّ حاد في القلب (صدمة قلبية).
- إذا كانت تعانى من اضطرابات في الشاطئ الكولي للقلب مما قد يؤدي إلى بطيء ضربات القلب و ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (اصمار اذيني يعطي من الدرجة الثانية والثالثة).

إذا كانت تعانى من ذبحة برذميال (شكل آخر من البحة الصدرية مخالفة للبحة الصدرية

سكترال® 200 ملغ

كلورهيدرات أسيبتوولول

أعراض مغلفة

- إذا كان قلب يتبضّع بشكل غير منتظم.
 - إذا كان قلب يتبضّع ببطء مزدوج (أقل من 45 إلى 50 نبضة في الدقيقة).
 - إذا كانت تعانى من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شريان الساقين).
 - إذا كانت تعانى من ورم القوام غير المتعال (رمض في الغدة الموجودة فوق الكلى).
 - إذا كانت تعانى من المخاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).
 - إذا عانت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.
 - إذا كانت تعانى من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض) والسعال.
 - إذا كانت مرضعة.
 - إذا كانت تعانى من حساسية تجاه التجمّع حيث أن هذا الدواء يحتوى على نشا القمح.
 - التضيّبات والاحتياطات عند الاستعمال:
- تحذّث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة.
- يجب أن توقف عن علاج كلّ شكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك لأنّ إيقافه فجأة قد يعرّض جسمك للخطر.

- إذا كانت متضاخة لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك بأنك تتناول هذا الدواء.
- يجب عليك أيضًا إعلام طبيبك:

 - إذا كنت مصابة بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج.
 - إذا كانت تعانى من عدم حدوث صفر سكر الدم.
 - إذا كانت تعانى من مرض كلوى (فشل كلوى) أو مرض كبدى (فشل كبدى).
 - إذا كانت تعانى من أي مرض جلدي (الصدفية).
 - إذا عانت في السابق من الحساسية.
 - إذا كانت تعانى من ظاهرة رينود أهلي في الدورة الدموية على مستوى الأصابع، أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شريان الساقين).
 - إذا كانت تعانى من رد فعل نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (الجسم الدرقي).

الدواء الآخر و سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة:

لا يجب تناول سكترال في نفس الوقت مع ديليتازيم أو فيراباميل (دواء للقلب) أو فينجوليمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ اضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروفة بأنها تؤخر هذه الآثار الجانبية.

تم الإبلاغ عن تزايد حفظ الذاكرة والكتابات عند تناول هذا الدواء مع ديليتازيم.

إذا كانت تتناول أو تناولت مخذّل آخر أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحتّد إلى طبيبك أو الصيدلاني.

- الحمل والإرضاع:**
- الحمل: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.
- إذا تم تناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبعض أيام، لأنّ بعض آثار العلاج تظهر أيضًا عند حديثي الولادة (يتأثّر ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).
- الإرضاع:** استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يتعلق هذا الدواء بحليب الأم المرضع، لذلك، تمنع الرعاية الطبيعية أثناء العلاج.
- القيادة واستعمال الآلات:**
- قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتعب أو تعب، إذا عانت من قبل أو كنت تعانى من هذه الآثار، فيجب عليك الحذر عندقيادة المركبات أو استعمال الآلات.

تحتوى هذه النشرة على معلومات هامة من أجلك، يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة فيها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أسئلة إضافية، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

هذا الدواء وصف لأجلان، فلا تقم بوصله للأفراد الذين يضر بهم، حتى وإن كانوا يعالون من نفس الأعراض التي تعانى منها.

في حال تناولت أحد الأعراض الجانبية أو لاحظت أيّة أعراض جانبية غير مردجة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

متى تتحوّل هذه النشرة؟

1. ما هو سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة و ماهي دواعي استعماله؟
2. سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟



استعماله ٤
C07AB04 : ATC
تنبيء إلى فئة حاصرات بيتا.
غضّ أمراض القلب.

• لعلاج بعض الصفرات المتعددة، مثل:

• بلع ثوبات الريحمة الصدرية المؤلمة التي تحدث أثناء بدء الجهد، الريحمة الصدرية هي المسؤولة عن ظهور آلم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والفك.

• بعد تونة قلبية (اشدّة، غلطة القلب).

2. ما هي المعلومات الواجب عرفها قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟

إذا أدرك طبيبك بأنك تعانى من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة في الحالات التالية:

- إذا كانت تعانى من الحساسية لـ أسيبتوولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (جهازات بيتا)، أو لأى من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
- إذا كانت تعانى من احتقان شديد في القصص الهوائية والرتين (مرض الانسداد الرئوي المزمن).
- إذا كان قلبك لا يحصل بشكل صحيح (فشل القلب) على الرغم من تلقى العلاج.
- إذا كانت تعانى من قلل حاد في القلب (صدمة قلبية).
- إذا كانت تعانى من اضطرابات في الشاطئ الكولي للقلب مما قد يؤدي إلى بطيء ضربات القلب، أو ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (اصصار اذيني يعطى من الدرجة الثانية والثالثة).
- إذا كانت تعانى من ذبحة برذميatal (شكل آخر من الريحمة الصدرية مخالفة للريحمة الصدرية).

سكترال® 200 ملغ

كلورهيدرات أسيبتوولول

أعراض مغلفة

- إذا كان قلب يتبضّع بشكل غير منتظم.
 - إذا كان قلب يتبضّع ببطء مزدوج (أقل من 45 إلى 50 نبضة في الدقيقة).
 - إذا كانت تعانى من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).
 - إذا كانت تعانى من ورم القوام غير المتعال (رمض في الغدة الموجودة فوق الكلى).
 - إذا كانت تعانى من المخاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).
 - إذا عانت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.
 - إذا كانت تعانى من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض) والسعال.
 - إذا كانت مرضعة.
 - إذا كانت تعانى من حساسية تجاه التجمّع حيث أن هذا الدواء يحتوى على نشا القمح.
 - التضيّبات والاحتياطات عند الاستعمال:
- تحذّث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة.
- يجب أن توقف عن علاج كلّ شكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك لأنّ إيقافه فجأة قد يعرّض جسمك للخطر.

- إذا كانت متضاخة لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك بأنك تتناول هذا الدواء.
- يجب عليك أيضًا إعلام طبيبك:

 - إذا كنت مصابة بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج.
 - إذا كانت تعانى من عدم حدوث صفر سكر الدم.
 - إذا كانت تعانى من مرض كلوى (فشل كلوى) أو مرض كبدى (فشل كبدى).
 - إذا كانت تعانى من أي مرض جلدي (الصدفية).
 - إذا عانت في السابق من الحساسية.
 - إذا كانت تعانى من ظاهرة رينود أهلي في الدورة الدموية على مستوى الأصابع، أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شرايين الساقين).
 - إذا كانت تعانى من رد فعل نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (الجسم الدرقي).

الدواء الآخر و سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة:

لا يجب تناول سكترال في نفس الوقت مع ديليتازيم أو فيراباميل (دواء للقلب) أو فينجوليمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ اضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروفة بأنها تؤثر هذه الآثار الجانبية.

تم الإبلاغ عن تزايد حفظ الذاكرة والكتابات عند تناول هذا الدواء مع ديليتازيم.

إذا كانت تتناول أو تناولت مخذّل آخر أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحتّد إلى طبيبك أو الصيدلاني.

- الحمل والإرضاع:**
- الحمل: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.
- إذا تم تناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبعض أيام، لأنّ بعض آثار العلاج تظهر أيضًا عند حديثي الولادة (يتأثّر ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).
- الإرضاع:** استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يتعلق هذا الدواء بحليب الأم المرضع، لذلك، تمنع الرعاية الطبيعية أثناء العلاج.
- القيادة واستعمال الآلات:**
- قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتعب أو تعب، إذا عانت من قبل أو كنت تعانى من هذه الآثار، فيجب عليك الحذر عندقيادة المركبات أو استعمال الآلات.

تحتوى هذه النشرة على معلومات هامة من أجلك، يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة فيها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أستهلاك إضافي، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

هذا الدواء وصف لأجلان، فلا تقم بوصفة للأخررين قد يضر بهم، حتى وإن كانوا يعالون من نفس الأعراض التي تعانى منها.

في حال تناولت إحدى الأعراض الجانبية أو لاحظت أيّة أعراض جانبية غير مردورة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

متى تحتوي هذه النشرة؟

1. ما هو سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة و ماهي دواعي استعماله؟
2. سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟



مفعول سكترال الدائم الشريطي،

• لعلاج بعض الصفرات المتعددة،

• بلع نوبات الذهمة الصدرية المؤقتة التي تحدث أثناء بدء الجهد، الذهمة الصدرية هي لمسؤولة عن ظهور ألم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والفك،

• عد نوبة قلبة (اشدّة، غلطة القلب)،

2. ما هي المعلومات الواجب عرفها قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟

إذا أدرك طبيبك بأنك تعانى من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

لا تتناول أبداً سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة في الحالات التالية:

• إذا كانت تعانى من الحساسية لـ أسيبتوولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (جهازات بيتا)، أو لأى من المكونات الأخرى لهذا الدواء.

• إذا كانت تعانى من الارتفاع شديد في القصبات الهوائية والرئتين (مرض الانسداد الرئوي المزمن)،

• إذا كان قلبك لا يحصل بشكل صحيح (فشل القلب) على الرغم من تلقى العلاج.

• إذا كانت تعانى من قلل حاد في القلب (صدمة قلبية)،

• إذا كانت تعانى من تشنجات في الشاطئ الكولي (القليل مما قد يؤدي إلى بطيء ضربات القلب، أو ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (حصار اذيني يطغى من الدرجة الثانية والثالثة)،

• إذا كانت تعانى من ذبحة برذميال (شكل آخر من الذهمة الصدرية مخالفة للذهبة الصدرية

سكترال® 200 ملغ

كلورهيدرات أسيبتوولول

أعراض مغلفة

- إذا كان قلب يتبضّع بشكل غير منتظم.
 - إذا كان قلب يتبضّع ببطء مزدوج (أقل من 45 إلى 50 نبضة في الدقيقة).
 - إذا كانت تعانى من شكل حاد من ظاهرة رينود (اضطراب في الدورة الدموية على مستوى الأصابع) أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شريان الساقين).
 - إذا كانت تعانى من ورم القوام غير المتعال (رمض في الغدة الموجودة فوق الكلى).
 - إذا كانت تعانى من المخاض في ضغط الدم (هبوط ضغط الدم).
 - إذا عانت في السابق من رد فعل تحسسي خطير.
 - إذا كانت تعانى من ارتفاع في حموضة الدم، مما يؤدي إلى تسارع في التنفس (الحماض) والاستقلالي.
 - إذا كانت مرضعة.
 - إذا كانت تعانى من حساسية تجاه التجمّع حيث أن هذا الدواء يحتوى على نشا القمح.
 - التضيّبات والاحتياطات عند الاستعمال:
- تحذّث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة.
- يجب أن توقف عن علاج كلّ شكل مفاجئ دون طلب مشورة طبيبك لأنّ إيقافه فجأة قد يعرّض جسمك للخطر.

- إذا كانت متضاخة لعملية جراحية، عليك إخبار طبيبك بأنك تتناول هذا الدواء.
- يجب عليك أيضًا إعلام طبيبك:

 - إذا كنت مصابة بمرض السكري: يجب مراقبة مستوى السكر في الدم بعناية شديدة في بداية العلاج.
 - إذا كانت تعانى من عدم حدوث صفر سكر الدم.
 - إذا كانت تعانى من مرض كلوى (فشل كلوى) أو مرض كبدى (فشل كبدى).
 - إذا كانت تعانى من أي مرض جلدي (الصدفية).
 - إذا عانت في السابق من الحساسية.
 - إذا كانت تعانى من ظاهرة رينود أهلي في الدورة الدموية على مستوى الأصابع)، أو التهاب الشريان (خلل في الدورة الدموية في شريان الساقين).
 - إذا كانت تعانى من رد فعل نشاط الغدة الدرقية الذي يسبب القلق، رعاش، تعرق، خفقان القلب، زيادة الشهية وفقدان الوزن (الجسم الدرقي).

الدواء الآخر و سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة:

لا يجب تناول سكترال في نفس الوقت مع ديليتازيم أو فيراباميل (دواء للقلب) أو فينجوليمود (دواء لعلاج التصلب المتعدد) ما لم يشر طبيبك بذلك.

قد تحدث حالات تباطؤ اضطراب في ضربات القلب عند تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى معروفة بأنها تؤخر هذه الآثار الجانبية.

تم الإبلاغ عن تزايد حفظ الذاكرة والكتابات عند تناول هذا الدواء مع ديليتازيم.

إذا كانت تتناول أو تناولت مخذّل آخر أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فتحتّد إلى طبيبك أو الصيدلاني.

- الحمل والإرضاع:**
- الحمل: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يجب عدم تناول هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إلا إذا رأى طبيبك أنه ضروري بالنسبة لك.
- إذا تم تناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإنه من الضروري وضع المولود تحت المراقبة الطبية لبعض أيام، لأنّ بعض آثار العلاج ظهر في أياً عرض حدثي الولادة (يتأثّر ضربات القلب، صعوبة في التنفس، نقص سكر الدم).
- الإرضاع: استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.
- يتعلق هذا الدواء بحليب الأم المرضع، لذلك، تمنع الرعاية الطبيعية أثناء العلاج.
- القيادة واستعمال الآلات:**
- قد يسبب تناول هذا الدواء الشعور بتعب أو تعب، إذا عانت من قبل أو كنت تعانى من هذه الآثار، فيجب عليك الحذر عندقيادة المركبات أو استعمال الآلات.

تحذّث هذه النشرة على معلومات هامة من أجلك، يرجى قراءة كافة المعلومات الواردة فيها بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء.

احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج لقرائتها مرة أخرى.

إذا كان لديك أي أستهلاك إضافي، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

هذا الدواء وصف لأجلان، فلا تقم بوصفة للأخررين قد يضر بهم، حتى وإن كانوا يعالون من نفس الأعراض التي تعانى منها.

في حال تناولت إحدى الأعراض الجانبية أو لاحظت أيّ أعراض جانبية غير مردورة في هذه النشرة، يرجى إعلام طبيبك أو الصيدلاني.

متى تتحوّل هذه النشرة؟

1. ما هو سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة و ماهي دواعي استعماله؟
2. سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة



استعماله ٤
C07AB04 : ATC
تنبيء إلى فئة حاصرات بيتا.
غضّ أمراض القلب.

- لعلاج بعض الصفرات المفاجئة للقلب.
- لمنع توسيع الدبغة الصدرية المؤلفة التي تحدث أثناء بدء الجهد، البحبة الصدرية هي لمسؤولة عن ظهور آلم موضعي في الصدر يمكن أن ينتشر إلى الكتف الأيسر والفك.
- عدّ توبة قلبية (اشتباخ غلقة القلب).
2. ما هي المعلومات الواجب عرفها قبل تناول سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة؟
 - إذا أدرك طبيبك بأنك تعانى من عدم تحمل بعض أنواع السكريات، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

- لا تتناول أبداً سكترال 200 ملغ أعراض مغلفة في الحالات التالية:
- إذا كانت تعانى من الحساسية لـ أسيبتوولول، أو لأدوية أخرى من نفس مجموعة (جهازات بيتا) أو لأى من المكونات الأخرى لهذا الدواء.
 - إذا كانت تعانى من احتقان شديد في القصبات الهوائية والرئتين (مرض الانسداد الرئوي المزمن).
 - إذا كان قلبك لا يحصل بشكل صحيح (فشل القلب) على الرغم من تلقى العلاج.
 - إذا كانت تعانى من قلل حاد في القلب (صدمة قلبية).
 - إذا كانت تعانى من اضطرابات في الشاطئ الكولي للقلب مما قد يؤدي إلى بطيء ضربات القلب و ليس لديك جهاز تنظيم ضربات القلب (اصصار اذيني يعطى من الدرجة الثانية والثالثة).
 - إذا كانت تعانى من ذبحة برذميatal (شكل آخر من البحبة الصدرية مخالفة للذبحة الصدرية).



Dénomination du médicament :

EXFORGE® HCT

5mg/160mg/12.5mg, 5mg/160mg/25mg, 10mg/160mg/12.5mg,
10mg/160mg/25mg

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Exforge HCT et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?
3. Comment prendre Exforge HCT ?
4. Quels sont les effets indésirables de Exforge HCT ?
5. Comment conserver Exforge HCT ?

1. Qu'est-ce que Exforge HCT ?

Votre médicament s'appelle Exforge HCT. Il s'agit de comprimés pelliculés dans lesquels trois substances sont combinées : l'amlopidine, le valsartan et l'hydrochlorothiazide. Ces trois substances baissent chacune à leur façon la tension artérielle.

Exforge HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, chez les patients chez qui un médicament contenant deux principes actifs ne permet pas de baisser suffisamment la tension artérielle, chez les patients recevant déjà les trois principes actifs, l'amlopidine, le valsartan et l'hydrochlorothiazide, mais sous forme de comprimés séparés.

Exforge HCT doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Une hypertension prolongée peut, par exemple, endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et finir par provoquer un accident vasculaire cérébral (attaque), un infarctus du myocarde ou une défaillance rénale. En réduisant votre tension artérielle à une valeur normale, on diminue le risque de développer ces maladies.



6118001030897

EXFORGE HCT

10mg/160mg/12.5mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 310.00 DH



Dénomination du médicament :

EXFORGE® HCT

5mg/160mg/12.5mg, 5mg/160mg/25mg, 10mg/160mg/12.5mg,
10mg/160mg/25mg

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Exforge HCT et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?
3. Comment prendre Exforge HCT ?
4. Quels sont les effets indésirables de Exforge HCT ?
5. Comment conserver Exforge HCT ?

1. Qu'est-ce que Exforge HCT ?

Votre médicament s'appelle Exforge HCT. Il s'agit de comprimés pelliculés dans lesquels trois substances sont combinées : l'amlopidine, un « antagoniste du calcium », l'valsartan, un « antagoniste de l'angiotensine II » et l'hydrochlorothiazide, un diurétique. Ces trois substances baissent chacune à leur façon la tension artérielle.

Exforge HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la pression dans les vaisseaux sanguins qui est élevée. Chez les patients chez qui un médicament contenant deux principes actifs ne permet pas de baisser suffisamment la tension artérielle, chez les patients recevant déjà les trois principes actifs, l'amlopidine, le valsartan et l'hydrochlorothiazide, mais sous forme de comprimés séparés.

Exforge HCT doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Une hypertension prolongée peut, par exemple, endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et finir par provoquer un accident vasculaire cérébral (attaque), un infarctus du myocarde ou une défaillance rénale. En réduisant votre tension artérielle à une valeur normale, on diminue le risque de développer ces maladies.



6118001030897

EXFORGE HCT

10mg/160mg/12.5mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 310.00 DH



Dénomination du médicament :

EXFORGE® HCT

5mg/160mg/12.5mg, 5mg/160mg/25mg, 10mg/160mg/12.5mg,
10mg/160mg/25mg

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Exforge HCT et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?
3. Comment prendre Exforge HCT ?
4. Quels sont les effets indésirables de Exforge HCT ?
5. Comment conserver Exforge HCT ?

1. Qu'est-ce que Exforge HCT ?

Votre médicament s'appelle Exforge HCT. Il s'agit de comprimés pelliculés dans lesquels trois substances sont combinées : l'amlopidine, un « antagoniste du calcium », l'valsartan, un « antagoniste de l'angiotensine II » et l'hydrochlorothiazide, un diurétique. Ces trois substances baissent chacune à leur façon la tension artérielle.

Exforge HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la pression dans les vaisseaux sanguins qui est élevée. Chez les patients chez qui un médicament contenant deux principes actifs ne permet pas de baisser suffisamment la tension artérielle, chez les patients recevant déjà les trois principes actifs, l'amlopidine, le valsartan et l'hydrochlorothiazide, mais sous forme de comprimés séparés.

Exforge HCT doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Une hypertension prolongée peut, par exemple, endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et finir par provoquer un accident vasculaire cérébral (attaque), un infarctus du myocarde ou une défaillance rénale. En réduisant votre tension artérielle à une valeur normale, on diminue le risque de développer ces maladies.



6118001030897

EXFORGE HCT

10mg/160mg/12.5mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 310.00 DH



Dénomination du médicament :

EXFORGE® HCT

5mg/160mg/12.5mg, 5mg/160mg/25mg, 10mg/160mg/12.5mg,
10mg/160mg/25mg

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Exforge HCT et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?
3. Comment prendre Exforge HCT ?
4. Quels sont les effets indésirables de Exforge HCT ?
5. Comment conserver Exforge HCT ?

1. Qu'est-ce que Exforge HCT ?

Votre médicament s'appelle Exforge HCT. Il s'agit de comprimés pelliculés dans lesquels trois substances sont combinées : l'amlopidine, un « antagoniste du calcium », l'valsartan, un « antagoniste de l'angiotensine II » et l'hydrochlorothiazide, un diurétique. Ces trois substances baissent chacune à leur façon la tension artérielle.

Exforge HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la pression dans les vaisseaux sanguins qui est élevée. Chez les patients chez qui un médicament contenant deux principes actifs ne permet pas de baisser suffisamment la tension artérielle, chez les patients recevant déjà les trois principes actifs, l'amlopidine, le valsartan et l'hydrochlorothiazide, mais sous forme de comprimés séparés.

Exforge HCT doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Une hypertension prolongée peut, par exemple, endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et finir par provoquer un accident vasculaire cérébral (attaque), un infarctus du myocarde ou une défaillance rénale. En réduisant votre tension artérielle à une valeur normale, on diminue le risque de développer ces maladies.



6118001030897

EXFORGE HCT

10mg/160mg/12.5mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 310.00 DH



Dénomination du médicament :

EXFORGE® HCT

5mg/160mg/12.5mg, 5mg/160mg/25mg, 10mg/160mg/12.5mg,
10mg/160mg/25mg

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Exforge HCT et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?
3. Comment prendre Exforge HCT ?
4. Quels sont les effets indésirables de Exforge HCT ?
5. Comment conserver Exforge HCT ?

1. Qu'est-ce que Exforge HCT ?

Votre médicament s'appelle Exforge HCT. Il s'agit de comprimés pelliculés dans lesquels trois substances sont combinées : l'amlopidine, un « antagoniste du calcium », l'valsartan, un « antagoniste de l'angiotensine II » et l'hydrochlorothiazide, un diurétique. Ces trois substances baissent chacune à leur façon la tension artérielle.

Exforge HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la pression dans les vaisseaux sanguins qui est élevée. Chez les patients chez qui un médicament contenant deux principes actifs ne permet pas de baisser suffisamment la tension artérielle, chez les patients recevant déjà les trois principes actifs, l'amlopidine, le valsartan et l'hydrochlorothiazide, mais sous forme de comprimés séparés.

Exforge HCT doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Une hypertension prolongée peut, par exemple, endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et finir par provoquer un accident vasculaire cérébral (attaque), un infarctus du myocarde ou une défaillance rénale. En réduisant votre tension artérielle à une valeur normale, on diminue le risque de développer ces maladies.



6118001030897

EXFORGE HCT

10mg/160mg/12.5mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 310.00 DH



Dénomination du médicament :

EXFORGE® HCT

5mg/160mg/12.5mg, 5mg/160mg/25mg, 10mg/160mg/12.5mg,
10mg/160mg/25mg

Comprimés pelliculés. Boîte de 28.

Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'information à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Exforge HCT et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?
3. Comment prendre Exforge HCT ?
4. Quels sont les effets indésirables de Exforge HCT ?
5. Comment conserver Exforge HCT ?

1. Qu'est-ce que Exforge HCT ?

Votre médicament s'appelle Exforge HCT. Il s'agit de comprimés pelliculés dans lesquels trois substances sont combinées : l'amlopidine, un « antagoniste du calcium », l'valsartan, un « antagoniste de l'angiotensine II » et l'hydrochlorothiazide, un diurétique. Ces trois substances baissent chacune à leur façon la tension artérielle.

Exforge HCT est utilisé pour traiter l'hypertension artérielle, c'est-à-dire la pression dans les vaisseaux sanguins qui est élevée. Chez les patients chez qui un médicament contenant deux principes actifs ne permet pas de baisser suffisamment la tension artérielle, chez les patients recevant déjà les trois principes actifs, l'amlopidine, le valsartan et l'hydrochlorothiazide, mais sous forme de comprimés séparés.

Exforge HCT doit être utilisé uniquement sur prescription médicale.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Exforge HCT ?

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement ?

Une hypertension prolongée peut, par exemple, endommager les vaisseaux sanguins du cerveau, du cœur et des reins et finir par provoquer un accident vasculaire cérébral (attaque), un infarctus du myocarde ou une défaillance rénale. En réduisant votre tension artérielle à une valeur normale, on diminue le risque de développer ces maladies.



6118001030897

EXFORGE HCT

10mg/160mg/12.5mg

28 comprimés pelliculés

PPV : 310.00 DH