

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019



Déclaration de Maladie

N° W21-774751

✓

<input checked="" type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule :	14112	Société :	RAM
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	BANQOUR TOUREYA
Nom & Prénom :			
Date de naissance :			
Adresse :			
Tél. : 0666593575 / 0524346031 Total des frais engagés : 569,00 Dhs			

Cadre réservé au Médecin Ophtalmology Laser Le Guéliz			
Pr RAHA ALITARIK Spécialiste ophtalmologie Business Allal Ben Abdellah Gueliz, Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My Rachid, 2 ^e étage N° 11, Marrakech Tel +212 0808536471			
Cachet du médecin :	Date de consultation :	Nom et prénom du malade :	
	15/08/2023	BANQOUR TOUREYA Age: 26/10/69	
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	Glaucome oculaire		
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles

Fait à : PARIS le 15/08/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 15/08/2023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
15/5/23	S		G.T	INP : 10511-B-800-A Dr. ALI TAJA Ophtalmologiste Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Avenue N° 11 Marrakech Téléphone : 0524-71

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	15-10-2002	549,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES TRAITS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
		H 25533412 21433552 00000000 00000000 ----- D 00000000 00000000 35533411 11433553 B		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

Marrakech le :

15 mai 2023

Mme BANQOUR Touriya

549,00

(91,50 x 6)

1/ ALPHAGAN 02 ./.: collyre cl

1 goutte 2 fois/jour; 8h30 et 20 heures30, dans les deux yeux,
 pendant 6 mois

PHARMACIE CENTRALE
 TÉL 00160648200000
 مراكش - المغرب
 Sté. Pharmacie Centrale SARL AU
 166, Bd. Mohammed V - Marrakech
 Tel: 05 24 43 05 59

Optimatology Laser Le Guéliz
 Pr BAHA ALI TARIK
 Spécialiste ophtalmologie
 Business Affairs Guéliz, intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11
 Tel: 05 24 43 05 59



Alphagan®

0,2 %, collyre

Brimonidine

ALLERGAN



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.



ALLERGAN



PPV 91DH50

Si vous avez besoin de la relire.
Si vous avez un doute, demandez plus
d'informations à votre pharmacien.
Ne le donnez pas à des personnes non
prescrites. Ne le donnez pas à des personnes
qui ne sont pas prescrites. Ne le donnez pas à des personnes
qui ont des signes de leur maladie
indésirable, parlez-en à votre médecin
aussi à tout effet indésirable qui ne serait

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0,2%, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0,2%, collyre ?
- Comment utiliser ALPHAGAN® 0,2%, collyre ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver ALPHAGAN® 0,2%, collyre ?
- Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0,2%, COLLYRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire élevée chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé soit seul quand un collyre bêta-bloquant est contre-indiqué, soit en association avec un autre collyre quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est le tartrate de brimonidine qui agit en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0,2%, COLLYRE ? N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0,2%, collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous prenez des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ou certains autres types d'antidépresseurs. Informez impérativement votre médecin si vous prenez un médicament antidépresseur.
- Si vous allaitez.
- Chez les nouveau-nés/nourrissons (jusqu'à l'âge de 2 ans).

Mises en garde et précautions d'emploi

Avant d'utiliser ce médicament, informez votre médecin :

si vous souffrez ou avez souffert de dépression, d'une réduction de vos capacités mentales, d'une réduction de la circulation sanguine au niveau du cerveau, de problèmes cardiaques, de troubles circulatoires au niveau des membres ou d'un trouble de la pression artérielle.

si vous souffrez ou avez souffert de maladies rénales (rein) ou hépatiques (foie).

cas d'administration à un enfant âgé de 2 à 12 ans, car ALPHAGAN® n'est pas recommandé pour cette tranche d'âge.

en raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

avant le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact souples avant application et mettre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souples.

Utilisation d'autres médicaments

Informez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

insomnie régulièrement de l'alcool ;

l'hémisubstitut et la réserpine ;

la clonazépam et la prazosine ;



0,2 %, collare
Brimonidine

Veuillez lire attentivement l'intégralité
de ce document avant de prendre ce médicament.



PPV-91DH50

0.2%
Brimonidine

oir besoin de la relire.
ous avez un doute, demandez plus
e pharmacien.
ement prescrit. Ne le donnez pas
e nocif, même si les signes de leur
ndésirable, parlez-en à votre médecin
ussi à tout effet indésirable qui ne serait

Dans cette notice :

- Dans cette notice :

 - Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?
 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0,2% COLLYRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire élevée chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé soit seul quand un collyre bêta-bloquant est contre-indiqué, soit en association avec un autre collyre quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est le tartrate de brimonidine qui agit en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil.

5. QU'EST-CE QUE LES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?

NE UTILISEZ JAMAIS ALPHAGAN® 0,3% COLLYRE DANS LES CAS SUIVANTS :

- N'utilisez jamais ALPHAGAN® 0,2 %, conjointement avec d'autres médicaments pour les yeux.**

 - Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
 - Si vous prenez des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ou certains autres types d'antidépresseurs. Informez impérativement votre médecin si vous prenez un médicament antidépresseur.
 - Si vous allaitez.
 - Chez les nouveau-nés/bourrissons (jusqu'à l'âge de 2 ans).

Mises en garde et précautions d'emploi

avant d'utiliser ce médicament, informez votre médecin :

tant d'utiliser ce médicament, informez votre pharmacien si vous souffrez ou avez souffert de dépression, d'une réduction de vos capacités mentales, d'une réduction de la circulation sanguine au niveau du cerveau, de problèmes cardiaques, de troubles circulatoires au niveau des membres ou d'un trouble de la pression artérielle.

vous souffrez ou avez souffert de maladies rénales (rein) ou hépatiques (foie).

sous souffrance ou avec souffrance importante de l'œil et de l'ensemble de l'appareil digestif chez les enfants de moins de 2 ans.

En cas d'administration à un enfant âgé de moins de 12 mois ou en cas de suspicion de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

lision de la prothèse de contact avec le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact souples avant application et au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souples.

Utilisation d'autres médicaments

meilleur état de santé. Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

nsommez régulièrement de l'alcool ;

Mphénidate et la réserpine ;
et la prazosine :



0,2 %, collare
Brimonidine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document avant de prendre ce médicament.



PPV-91DH50

0.2%
Brimonidine

oir besoin de la relire.
ous avez un doute, demandez plus
e pharmacien.
ement prescrit. Ne le donnez pas
e nocif, même si les signes de leur
ndésirable, parlez-en à votre médecin
ussi à tout effet indésirable qui ne serait

Dans cette notice :

- Dans cette notice :

 - Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?
 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0,2% COLLYRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire élevée chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé soit seul quand un collyre bêta-bloquant est contre-indiqué, soit en association avec un autre collyre quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est le tartrate de brimonidine qui agit en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil.

5. QU'EST-CE QUE LES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?

N'utilisez jamais AL RHAGAN® 0,2% collyre dans les cas suivants :

- N'utilisez jamais ALFRAGAN® 0,2 %, conjointement avec les médicaments suivants :**

 - Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
 - Si vous prenez des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ou certains autres types d'antidépresseurs. Informez impérativement votre médecin si vous prenez un médicament antidépresseur.
 - Si vous allaitez.
 - Chez les nouveau-nés/nourrissons (jusqu'à l'âge de 2 ans).

Mises en garde et précautions d'emploi

Il est recommandé de faire une échographie avant d'utiliser ce médicament. Informez votre médecin :

Si vous souffrez ou avez souffert de dépression, d'une réduction de vos capacités mentales, d'une réduction de la circulation sanguine au niveau du cerveau, de problèmes cardiaques, de troubles circulatoires au niveau des membres ou d'un trouble de la pression artérielle.

vous souffrez ou avez souffert de maladies rénales (rein) ou hépatiques (foie).

cas d'administration à un enfant âgé de 2 à 12 ans, car ALPHAGAN® n'est pas recommandé pour cette tranche d'âge.

aison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

Le contact avec les lentilles de contact soufflées. Retirer les lentilles de contact soufflées avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact soufflées.

Utilisation d'autres médicaments

Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

Consommez régulièrement de l'alcool ;

Mphénidate et la réserpine ;
et la prazosine :



0,2 %, collare
Brimonidine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document avant de prendre ce médicament.



PPV-91DH50

0.2%
Brimonidine

oir besoin de la relire.
ous avez un doute, demandez plus
e pharmacien.
ement prescrit. Ne le donnez pas
e nocif, même si les signes de leur
ndésirable, parlez-en à votre médecin
ussi à tout effet indésirable qui ne serait

Dans cette notice :

- Dans cette notice :

 - Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?
 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0,2% COLLYRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire élevée chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé soit seul quand un collyre bêta-bloquant est contre-indiqué, soit en association avec un autre collyre quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est le tartrate de brimonidine qui agit en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil.

5. QU'EST-CE QUE LES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0,2%, COLLYRE ?

N'utilisez jamais ALRHAGAN® 0,3% collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
 - Si vous prenez des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ou certains autres types d'antidépresseurs. Informez impérativement votre médecin si vous prenez un médicament antidépresseur.
 - Si vous allaitez.
 - Chez les nouveau-nés/nourrissons (jusqu'à l'âge de 2 ans).

Mises en garde et précautions d'emploi

avant d'utiliser ce médicament, informez votre médecin :

Si vous souffrez ou avez souffert de dépression, d'une réduction de vos capacités mentales, d'une réduction de la circulation sanguine au niveau du cerveau, de problèmes cardiaques, de troubles circulatoires au niveau des membres ou d'un trouble de la pression artérielle.

vous souffrez ou avez souffert de maladies rénales (rein) ou hépatiques (foie).

sas d'administration à un enfant âgé de 2 à 12 ans, car ALPHAGAN® n'est pas recommandé pour cette tranche d'âge.

nison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

Le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact souples avant application et

tre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact avec les larmes.

Utilisation d'autres médicaments

meilleur résultat. Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

Consommez régulièrement de l'alcool ;

Mphénidate et la réserpine ;
et la prazosine :



0,2 %, collare
Brimonidine

Veuillez lire attentivement l'intégralité
de ce document avant de prendre ce médicament.



PPV-91DH50

0.2%
Brimonidine

oir besoin de la relire.
ous avez un doute, demandez plus
e pharmacien.
ement prescrit. Ne le donnez pas
e nocif, même si les signes de leur
ndésirable, parlez-en à votre médecin
ussi à tout effet indésirable qui ne serait

Dans cette notice :

- Dans cette notice :

 - Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?
 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0,2% COLLYRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire élevée chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé soit seul quand un collyre bêta-bloquant est contre-indiqué, soit en association avec un autre collyre quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est le tartrate de brimonidine qui agit en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil.

5. QU'EST-CE QUE LES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2%, COLLYRE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0,3% collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
 - Si vous prenez des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ou certains autres types d'antidépresseurs. Informez impérativement votre médecin si vous prenez un médicament antidépresseur.
 - Si vous allaitez.
 - Chez les nouveau-nés/nourrissons (jusqu'à l'âge de 2 ans).

Mises en garde et précautions d'emploi

avant d'utiliser ce médicament, informez votre médecin :

tant d'utiliser ce médicament, informez votre pharmacien si vous souffrez ou avez souffert de dépression, d'une réduction de vos capacités mentales, d'une réduction de la circulation sanguine au niveau du cerveau, de problèmes cardiaques, de troubles circulatoires au niveau des membres ou d'un trouble de la pression artérielle.

vous souffrez ou avez souffert de maladies rénales (rein) ou hépatiques (foie).

sous souffrance ou avec souffrance importante de l'œil et de l'ensemble de l'appareil digestif chez les enfants de moins de 2 ans.

En cas d'administration à un enfant âgé de moins de 12 mois ou en cas de suspicion de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

lision de la prothèse de contact avec le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact souples avant application et au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de contact souples.

Utilisation d'autres médicaments

meilleur résultat.

nsommez régulièrement de l'alcool ;

• Phénidate et la réserpine :

Indicate et la résorption de la prazosine :



0,2 %, collare
Brimonidine

Veuillez lire attentivement l'intégralité
de ce document avant de prendre ce médicament.



PPV-91DH50

0.2%
Brimonidine

oir besoin de la relire.
ous avez un doute, demandez plus
e pharmacien.
ement prescrit. Ne le donnez pas
e nocif, même si les signes de leur
ndésirable, parlez-en à votre médecin
ussi à tout effet indésirable qui ne serait

Dans cette notice :

- Dans cette notice :

 - Qu'est-ce que ALPHAGAN® 0.2%, collyre et dans quel cas est-il utilisé ?
 - Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Comment utiliser ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - Comment conserver ALPHAGAN® 0.2%, collyre ?
 - Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ALPHAGAN® 0,2% COLLYRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALPHAGAN® est indiqué pour réduire la pression intraoculaire élevée chez les patients ayant un glaucome à angle ouvert ou une hypertension oculaire.

Il peut être utilisé soit seul quand un collyre bêta-bloquant est contre-indiqué, soit en association avec un autre collyre quand ce dernier ne parvient pas à réduire suffisamment la pression intraoculaire.

La substance active contenue dans ALPHAGAN® est le tartrate de brimonidine qui agit en réduisant la pression à l'intérieur de l'œil.

3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER ALPHAGAN® 0.2% COLLYRE ?

N'utilisez jamais AL PHAGAN® 0,2% collyre dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au tartrate de brimonidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
 - Si vous prenez des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) ou certains autres types d'antidépresseurs. Informez impérativement votre médecin si vous prenez un médicament antidépresseur.
 - Si vous allaitez.
 - Chez les nouveau-nés/nourrissons (jusqu'à l'âge de 2 ans).

Mises en garde et précautions d'emploi

Avant d'utiliser ce médicament, informez votre médecin :

Si vous souffrez ou avez souffert de dépression, d'une réduction de vos capacités mentales, d'une réduction de la circulation sanguine au niveau du cerveau, de problèmes cardiaques, de troubles circulatoires au niveau des membres ou d'un trouble de la pression artérielle.

vous souffrez ou avez souffert de maladies rénales (rein) ou hépatiques (foie).

cas d'administration à un enfant âgé de 2 à 12 ans, car ALPHAGAN® n'est pas recommandé pour cette tranche d'âge.

aison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer une irritation des yeux.

er le contact avec les lentilles de contact souple. Retirer les lentilles de contact souple avant application et
tre au moins 15 minutes avant de les remettre. Le chlorure de benzalkonium peut décolorer les lentilles de
t souple.

Utilisation d'autres médicaments

Consultez votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants :

...nsommez régulièrement de l'alcool ;

Mphénidate et la réserpine ;
et la prazosine :



A l'Attention Mme BANOUR Touns

FAX : (044) 44-60-02

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (*)
(A adresser à l'attention du Médecin Conseil, sous pli confidentiel)

JE SOUSSIGNE DOCTEUR :

CERTIFIE QUE MILLE, MME, MR

PRESENTÉ

NECESSITANT UN TRAITEMENT D'UNE DUREE DE :

DONT CI-JOINT L'ORDONNANCE

(A DEFAUT NOTER LE TRAITEMENT PRESCRIT)

Ophthalmology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialiste

Adulte & enfant

Cataracte, Strabisme, Paupières, Voies lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine, Chirurgie réfractive et Contactologie



طب العيون و الليزر جليز

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العين

الكتار والصغار

العيادة البيضاء المول لمرضى العين المسالك

المعوية النزلة، القرنية الشبكية.

الجراحة الانكسارية والعدسات الاصطناعية

Marrakech le :

15 mai 2023

Mme BANQOUR Touriya

549,00

(91,50 x 6)

1 goutte 2 fois/jour; 8h30 et 20 heures30, dans les deux yeux,
pendant 6 mois

PHARMACIE CENTRALE
SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE MAROCANA
Pr BAHA ALI TARIK
Spécialiste ophtalmologie
Boulevard Hassan II Gueliz, intersection Bd Abdelkrim El Khattabi
Société Pharmacie Centrale SARL AU
Sté. Pharmacie Gueliz V - Marrakech
156, Bd. Mohammed V - 40000 Marrakech
Tél : +212 0524 24 24 77 / +212 0524 24 24 77



Adresse : Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11

Téléphone : 0808536471 / 0664059999 Email : olgmarrakech@gmail.com