

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W21-728145

Compt

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : <u>1612</u>	Société : <u>PAM</u>		
<input type="checkbox"/> Actif	<input checked="" type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	<u>BANQUE TOUITYA</u>
Nom & Prénom : <u>BANQUE TOUITYA</u>		Date de naissance : <u>26/10/1949</u>	
Adresse : <u>163 KOUR ASNE 2 CLASSEUR</u>		Télé. : <u>0666 92 57 / 07434 6031</u>	
		Total des frais engagés : <u>4718,60</u> Dhs	

Cadre réservé au Médecin			
Cachet du médecin :			
Date de consultation : <u>13/03/2023</u>			
Nom et prénom du malade : <u>BANQUE TOUITYA</u> Age: <u>81</u>			
Lien de parenté :	<input checked="" type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie : <u>Glaucome oculaire</u>			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Ranaffef

Signature de l'adhérent(e) : J. J. J. J.

Le : 13/03/2023

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/12/23	S		300Dhs	INP : 0911032884

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE CENTRALE Bd. Mohamed V - 10000 - MAROC	13/12/23	24418,60

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	


RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				INP : []
				COEFFICIENT DES TRAVAUX []
				MONTANTS DES SOINS []
				DEBUT D'EXECUTION []
				FIN D'EXECUTION []
				COEFFICIENT DES TRAVAUX []
				MONTANTS DES SOINS []
				DATE DU DEVIS []
				DATE DE L'EXECUTION []




ODF PROTHESSES DENTAIRES

DENTERIE DENTOLOGIQUE ALGERIA

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

H 26533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000
35533411 11433553
G B



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Optical Ology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialisé

Adulte & enfant

Cataracte, Strabisme, Paupières, Voies lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine, Chirurgie réfractive et Contactologie

**طب العيون و الليزر جليز**

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العيون

الكبار والصغار

المياه البيضاء الحول، أمراض الجفن، المسالك

الدماغية، النزق، القرنية، الشبكية.

الجراحة الانكسارية والعدسات الاصطناعية

Marrakech le :**Reçu de caisse N° : 69076**

soukaina

Identifiant patient	Nom du patient	Date encaissement
PT170400492	BANQOUR Touriya	13/03/2023

Mode Règlement	Motif / Référence de paiement	Montant Dhs
Espèce	Consultation	300,00
Reçu établi par :		Total payé
		300,00

Optic Ology Laser Le Gueliz

Adresse : Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My rachid 2e étage N° 11

Téléphone : 0808536471 / 0664059999 Email : olgmarrakech@gmail.com

Ophthalmology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialisé

Adulte & enfant

Cataracte, Strabisme, Paupières, Voies lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine,
Chirurgie réfractive et Contactologie



طب العيون والليزر جليز

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العينين

الكتاب والصفار

المياه البيضاء الجول، أمراض الجفن الممساك

الدمعية، الزرق، القرنية، الشبكية.

الجراحة الانكسارية والعدسات اللاصقة

Marrakech le :

13 mars 2023

Mme BANQOUR Touriya

1921,00

(192,10 x 10)

1/ DUOTRAV 40 / 5 µg / mg collyre



collyre 1 fois par jour à 22h, dans les deux yeux

1237,60

2/ XOLA

(95,20 x 13)

1 GOUTTE 2X/J, dans les deux yeux

1260,00

3/ HYLOGEL collyre

(180,00 x 2)



1 goutte x4/j, dans les deux yeux

4/ LARMABAK collyre

F

1 goutte 4 / j et à la demande, dans les deux yeux

4418,60

Traitemet pendant : 6 Mois



Ophthalmology Laser Le Gueliz

Cabinet d'ophtalmologie spécialisé
Adulte & enfant
Cataracte, Strabisme, Paupières, Voies
lacrymales, Glaucome, Cornée, Rétine,
Chirurgie réfractive et Contactologie



طب العيون و الليزر جليز

عيادة متخصصة في أمراض وجراحة العيون
الكتار والصفار
المياه البيضاء حول أمراض الجفن، المسالك
الدماغية، الزرق، القرنية، الشبكية.
الجراحة الانكسارية والعدسات اللاصقة

Marrakech le :

13 mars 2023

Mme BANQOUR Touriya

(192,10 x 10)

1/ DUOTRAV 40 / 5 µg / mg collyre



collyre 1 fois par jour à 22h, dans les deux yeux

1237,60

2/ XOLA

(95,20 x 13)

1 GOUTTE 2X/J, dans les deux yeux

1260,00

3/ HYLOGEL collyre

(180,00)




1 goutte x4/j, dans les deux yeux

4/ LARMABAK collyre

1 goutte 4 / j et à la demande, dans les deux yeux

4418,60

Traitemenit pendant : 6 Mois



Adresse : Business Affaires Gueliz Intersection Bd Abdelkrim El Khattabi et Bd My Rachid 2e étage N° 11

Téléphone : 0808536471 / 0664059999 Email : olgmarrakech@gmail.com



Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO® GEL.

HYLO® GEL

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

Pour l'hydratation de l'œil en cas de secheresse oculaire chronique ainsi que

la surface oculaire sévèrement chirurgicale

Solution et sa

2 0 2 5 - 0 9 .

LOT

3 0 5 7 4 1 .

PPC:

1 8 0 D H .

180,00



Qu'est-ce que HYLO® GEL ?

HYLO® GEL est un collagène et des conservateurs pour utilisation injectable.

Composition :

1 ml d'HYLO® GEL contient 2 mg d'acide hyaluronique, du citrate de calcium, du citrate anhydre, du citrate de sodium et de l'eau pour préparation injectables.

À quoi sert HYLO® GEL ?

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de l'œil en cas de sécheresse oculaire chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Dans quels cas utiliser HYLO® GEL ?

HYLO® GEL contient le sel de sodium de l'acide hyaluronique, une substance naturelle, qui se trouve dans l'œil et dans d'autres parties du corps. Grâce à ses propriétés particulières, il forme un film hydratant régulier et stable et adhérant particulièrement longtemps sur la surface de l'œil, qui ne peut pas être éliminé rapidement. Grâce à cette caractéristique bioadhésive ajoutée aux larmes naturelles, la cornée et la conjonctive sont soignées et la lubrification est idéale pour le battement de paupières. HYLO® GEL contient une quantité particulièrement élevée d'acide hyaluronique et est donc très visqueux. L'œil est ainsi recouvert d'un film humide stable particulièrement intensif et durable. Les troubles continus ou plus importants sont soulagés et l'œil est durablement protégé contre les irritations.

En raison d'interventions chirurgicales ophtalmiques ou après des blessures oculaires, la sécrétion physiologique de larmes peut être diminuée. La régénération des tissus superficiels de l'œil exige continuellement une hydratation suffisante. L'utilisation de HYLO® GEL hydrate la cornée et la conjonctive pendant une longue période, soutenant ainsi le déroulement optimal du processus de guérison physiologique.

HYLO® GEL est sans conservateur, ainsi il est généralement très bien toléré.



URSAPHARM



Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO® GEL.

HYLO® GEL

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

Pour l'hydratation de l'œil en cas de secheresse oculaire chronique ainsi que

la surface oculaire sévèrement chirurgicale

Solution et sa

2 0 2 5 - 0 9 .

LOT

3 0 5 7 4 1 .

PPC:

1 8 0 D H .

180,00



Qu'est-ce que HYLO® GEL ?

HYLO® GEL est un collagène et des conservateurs pour utilisation injectable.

Composition :

1 ml d'HYLO® GEL contient 2 mg d'acide hyaluronique, du citrate de calcium, du citrate anhydre, du citrate de sodium et de l'eau pour préparation injectables.

À quoi sert HYLO® GEL ?

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de l'œil en cas de sécheresse oculaire chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Dans quels cas utiliser HYLO® GEL ?

HYLO® GEL contient le sel de sodium de l'acide hyaluronique, une substance naturelle, qui se trouve dans l'œil et dans d'autres parties du corps. Grâce à ses propriétés particulières, il forme un film hydratant régulier et stable et adhérant particulièrement longtemps sur la surface de l'œil, qui ne peut pas être éliminé rapidement. Grâce à cette caractéristique bioadhésive ajoutée aux larmes naturelles, la cornée et la conjonctive sont soignées et la lubrification est idéale pour le battement de paupières. HYLO® GEL contient une quantité particulièrement élevée d'acide hyaluronique et est donc très visqueux. L'œil est ainsi recouvert d'un film humide stable particulièrement intensif et durable. Les troubles continus ou plus importants sont soulagés et l'œil est durablement protégé contre les irritations.

En raison d'interventions chirurgicales ophtalmiques ou après des blessures oculaires, la sécrétion physiologique de larmes peut être diminuée. La régénération des tissus superficiels de l'œil exige continuellement une hydratation suffisante. L'utilisation de HYLO® GEL hydrate la cornée et la conjonctive pendant une longue période, soutenant ainsi le déroulement optimal du processus de guérison physiologique.

HYLO® GEL est sans conservateur, ainsi il est généralement très bien toléré.



URSAPHARM



Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO® GEL.

HYLO® GEL

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

Pour l'hydratation de l'œil en cas de sécheresse et chronique ainsi que

la surface oculaire sévèrement chirurgicale

Solution et sa

2 0 2 5 - 0 9 .

LOT

3 0 5 7 4 1 .

PPC:

1 8 0 D H .

180,00



Qu'est-ce que HYLO® GEL ?

HYLO® GEL est un collagène et des conservateurs pour utilisation injectable.

Composition :

1 ml d'HYLO® GEL contient 2 mg d'acide hyaluronique, du citrate de calcium, du citrate anhydre, du citrate de sodium et de l'eau pour préparation injectables.

À quoi sert HYLO® GEL ?

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de l'œil en cas de sécheresse oculaire chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Dans quels cas utiliser HYLO® GEL ?

HYLO® GEL contient le sel de sodium de l'acide hyaluronique, une substance naturelle, qui se trouve dans l'œil et dans d'autres parties du corps. Grâce à ses propriétés particulières, il forme un film hydratant régulier et stable et adhérant particulièrement longtemps sur la surface de l'œil, qui ne peut pas être éliminé rapidement. Grâce à cette caractéristique bioadhésive ajoutée aux larmes naturelles, la cornée et la conjonctive sont soignées et la lubrification est idéale pour le battement de paupières. HYLO® GEL contient une quantité particulièrement élevée d'acide hyaluronique et est donc très visqueux. L'œil est ainsi recouvert d'un film humide stable particulièrement intensif et durable. Les troubles continus ou plus importants sont soulagés et l'œil est durablement protégé contre les irritations.

En raison d'interventions chirurgicales ophtalmiques ou après des blessures oculaires, la sécrétion physiologique de larmes peut être diminuée. La régénération des tissus superficiels de l'œil exige continuellement une hydratation suffisante. L'utilisation de HYLO® GEL hydrate la cornée et la conjonctive pendant une longue période, soutenant ainsi le déroulement optimal du processus de guérison physiologique.

HYLO® GEL est sans conservateur, ainsi il est généralement très bien toléré.



URSAPHARM



Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO® GEL.

HYLO® GEL

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

Pour l'hydratation de l'œil en cas de sécheresse et chronique ainsi que

la surface oculaire sévèrement chirurgicale

Solution et sa

2 0 2 5 - 0 9 .

LOT

3 0 5 7 4 1 .

PPC:

1 8 0 D H .

180,00



Qu'est-ce que HYLO® GEL ?

HYLO® GEL est un collagène et des conservateurs pour utilisation injectable.

Composition :

1 ml d'HYLO® GEL contient 2 mg d'acide hyaluronique, du citrate de calcium, du citrate anhydre, du citrate de sodium et de l'eau pour préparation injectables.

À quoi sert HYLO® GEL ?

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de l'œil en cas de sécheresse oculaire chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Dans quels cas utiliser HYLO® GEL ?

HYLO® GEL contient le sel de sodium de l'acide hyaluronique, une substance naturelle, qui se trouve dans l'œil et dans d'autres parties du corps. Grâce à ses propriétés particulières, il forme un film hydratant régulier et stable et adhérant particulièrement longtemps sur la surface de l'œil, qui ne peut pas être éliminé rapidement. Grâce à cette caractéristique bioadhésive ajoutée aux larmes naturelles, la cornée et la conjonctive sont soignées et la lubrification est idéale pour le battement de paupières. HYLO® GEL contient une quantité particulièrement élevée d'acide hyaluronique et est donc très visqueux. L'œil est ainsi recouvert d'un film humide stable particulièrement intensif et durable. Les troubles continus ou plus importants sont soulagés et l'œil est durablement protégé contre les irritations.

En raison d'interventions chirurgicales ophtalmiques ou après des blessures oculaires, la sécrétion physiologique de larmes peut être diminuée. La régénération des tissus superficiels de l'œil exige continuellement une hydratation suffisante. L'utilisation de HYLO® GEL hydrate la cornée et la conjonctive pendant une longue période, soutenant ainsi le déroulement optimal du processus de guérison physiologique.

HYLO® GEL est sans conservateur, ainsi il est généralement très bien toléré.



URSAPHARM



Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO® GEL.

HYLO® GEL

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

Pour l'hydratation de l'œil en cas de secheresse oculaire chronique ainsi que

la surface oculaire sévèrement chirurgicale

Solution et sa

2025-09

LOT

305741

PPC:

180 DH

180,00



Qu'est-ce que HYLO® GEL ?

HYLO® GEL est un collagène et des conservateurs pour utilisation ophtalmique.

Composition :

1 ml d'HYLO® GEL contient 2 mg d'acide hyaluronique, du citrate de calcium, du citrate anhydre, du citrate de potassium et des conservateurs injectables.

À quoi sert HYLO® GEL ?

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de l'œil en cas de sécheresse oculaire chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Dans quels cas utiliser HYLO® GEL ?

HYLO® GEL contient le sel de sodium de l'acide hyaluronique, une substance naturelle, qui se trouve dans l'œil et dans d'autres parties du corps humain. Grâce à ses propriétés particulières, il forme un film hydratant régulier et stable et adhérant particulièrement longtemps sur la surface de l'œil, qui ne peut pas être éliminé rapidement. Grâce à cette caractéristique bioadhésive ajoutée aux larmes naturelles, la cornée et la conjonctive sont soignées et la lubrification est idéale pour le battement de paupières. HYLO® GEL contient une quantité particulièrement élevée d'acide hyaluronique et est donc très visqueux. L'œil est ainsi recouvert d'un film humide stable particulièrement intensif et durable. Les troubles continus ou plus importants sont soulagés et l'œil est durablement protégé contre les irritations.

En raison d'interventions chirurgicales ophtalmiques ou après des blessures oculaires, la sécrétion physiologique de larmes peut être diminuée. La régénération des tissus superficiels de l'œil exige continuellement une hydratation suffisante. L'utilisation de HYLO® GEL hydrate la cornée et la conjonctive pendant une longue période, soutenant ainsi le déroulement optimal du processus de guérison physiologique.

HYLO® GEL est sans conservateur, ainsi il est généralement très bien toléré.



URSAPHARM



Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO® GEL.

HYLO® GEL

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

Pour l'hydratation de l'œil en cas de sécheresse et chronique ainsi que

la surface oculaire sévèrement chirurgicale

Solution et sa

2 0 2 5 - 0 9 .

LOT

3 0 5 7 4 1 .

PPC:

1 8 0 D H .

180,00



Qu'est-ce que HYLO® GEL ?

HYLO® GEL est un collagène et des conservateurs pour utilisation injectable.

Composition :

1 ml d'HYLO® GEL contient 2 mg d'acide hyaluronique, du citrate de calcium, du citrate anhydre, du citrate de potassium et des conservateurs pour préparations injectables.

À quoi sert HYLO® GEL ?

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de l'œil en cas de sécheresse oculaire chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Dans quels cas utiliser HYLO® GEL ?

HYLO® GEL contient le sel de sodium de l'acide hyaluronique, une substance naturelle, qui se trouve dans l'œil et dans d'autres parties du corps. Grâce à ses propriétés particulières, il forme un film hydratant régulier et stable et adhérant particulièrement longtemps sur la surface de l'œil, qui ne peut pas être éliminé rapidement. Grâce à cette caractéristique bioadhésive ajoutée aux larmes naturelles, la cornée et la conjonctive sont soignées et la lubrification est idéale pour le battement de paupières. HYLO® GEL contient une quantité particulièrement élevée d'acide hyaluronique et est donc très visqueux. L'œil est ainsi recouvert d'un film humide stable particulièrement intensif et durable. Les troubles continus ou plus importants sont soulagés et l'œil est durablement protégé contre les irritations.

En raison d'interventions chirurgicales ophtalmiques ou après des blessures oculaires, la sécrétion physiologique de larmes peut être diminuée. La régénération des tissus superficiels de l'œil exige continuellement une hydratation suffisante. L'utilisation de HYLO® GEL hydrate la cornée et la conjonctive pendant une longue période, soutenant ainsi le déroulement optimal du processus de guérison physiologique.

HYLO® GEL est sans conservateur, ainsi il est généralement très bien toléré.



URSAPHARM



Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement HYLO® GEL.

HYLO® GEL

Hyaluronate de sodium 2 mg/ml

Pour l'hydratation de l'œil en cas de secheresse oculaire chronique ainsi que

la surface oculaire sévèrement chirurgicale

Solution et sa

2025-09

LOT

305741

PPC:

180 DH

180,00



Qu'est-ce que HYLO® GEL ?

HYLO® GEL est un collagène et des conservateurs pour utilisation oculaire.

Composition :

1 ml d'HYLO® GEL contient 2 mg de sodium de l'acide hyaluronique, du citrique anhydre, du citrate de sodium et de l'eau pour préparations injectables.

À quoi sert HYLO® GEL ?

Pour l'hydratation intensive, thérapeutique de l'œil en cas de sécheresse oculaire chronique ainsi qu'après une intervention chirurgicale ophtalmique.

Dans quels cas utiliser HYLO® GEL ?

HYLO® GEL contient le sel de sodium de l'acide hyaluronique, une substance naturelle, qui se trouve dans l'œil et dans d'autres parties du corps. Grâce à ses propriétés particulières, il forme un film hydratant régulier et adhérant particulièrement longtemps sur la surface de l'œil, qui ne peut pas être éliminé rapidement. Grâce à cette caractéristique bioadhésive ajoutée aux larmes naturelles, la cornée et la conjonctive sont soignées et la lubrification est idéale pour le battement de paupières. HYLO® GEL contient une quantité particulièrement élevée d'acide hyaluronique et est donc très visqueux. L'œil est ainsi recouvert d'un film humide stable particulièrement intensif et durable. Les troubles continus ou plus importants sont soulagés et l'œil est durablement protégé contre les irritations.

En raison d'interventions chirurgicales ophtalmiques ou après des blessures oculaires, la sécrétion physiologique de larmes peut être diminuée. La régénération des tissus superficiels de l'œil exige continuellement une hydratation suffisante. L'utilisation de HYLO® GEL hydrate la cornée et la conjonctive pendant une longue période, soutenant ainsi le déroulement optimal du processus de guérison physiologique.

HYLO® GEL est sans conservateur, ainsi il est généralement très bien toléré.



URSAPHARM



NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL
Collyre en solution**

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité car elle contient des informations importantes que vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vo-
à votre médecin, ou à votre pharmacie.
Ce médicament vous a été personnelle
d'autre, cela pourrait lui être nocif, mêm
aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave et non mentionné dans cette notice, parlez-en à un professionnel de la santé.

Qui contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et dans quels cas est-il utilisé ?
 - 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
 - 3- Comment utiliser DuoTrav ?
 - 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - 5- Comment conserver DuoTrav ?
 - 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE DIT LE DOCUMENT DANS LE FICHIER ESTABLISSEMENT



Si vous avez utilisé plus de DuoTray que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTray

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTray

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav
Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

MA 41. LES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Enchis scoulargy

Bougeur de l'œil

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets indésirables

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision trouble, œil enflé, rougeur oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (sensibilité à la lumière, perte de vision).

(1 personne sur 100)



NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL
Collyre en solution**

Travoprost/Timolol

Flacon de 2.5 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité car elle contient des informations importantes que vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vous
allez à votre médecin, ou à votre pharmacie.
Ce médicament vous a été prescrit par
un autre, cela pourrait lui être nocif, même
aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave non mentionné dans cette notice, parlez-en

Qui contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et dans quels cas est-il utilisé ?
 - 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
 - 3- Comment utiliser DuoTrav ?
 - 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - 5- Comment conserver DuoTrav ?
 - 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE DIT LE DOCUMENT DANS LE FICHIER ESTABLISSEMENT



Si vous avez utilisé plus de DuoTray que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTray

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTray

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav
Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

MA QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Enchis selon les
Bonneur de l'œil

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision trouble, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire.

(1 personne sur 100)



NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL
Collyre en solution**

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité car elle contient des informations importantes que vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vo-
à votre médecin, ou à votre pharmacie.
Ce médicament vous a été personnelle
d'autre, cela pourrait lui être nocif, mêm
aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave non mentionné dans cette notice, parlez-en

Qui contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et dans quels cas est-il utilisé ?
 - 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
 - 3- Comment utiliser DuoTrav ?
 - 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - 5- Comment conserver DuoTrav ?
 - 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE DIT LE CODE DANS CE FICHIER XML ?



Si vous avez utilisé plus de DuoTray que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTray

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTray

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav
Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

MA 41. LES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Enchis scoulargy

Bougeur de l'œil

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets indésirables

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision trouble, œil enflé, rougeur oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire (sensibilité à la lumière, perte de vision).

(1 personne sur 100)



NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL
Collyre en solution**

Travoprost/Timolol

Flacon de 2,5 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité car elle contient des informations importantes que vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, si vo-
à votre médecin, ou à votre pharmacie.
Ce médicament vous a été personnelle
d'autre, cela pourrait lui être nocif, mêm
aux vôtres.

Si l'un des effets indésirables devient grave non mentionné dans cette notice, parlez-en

Qui contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et dans quels cas est-il utilisé ?
 - 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
 - 3- Comment utiliser DuoTrav ?
 - 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - 5- Comment conserver DuoTrav ?
 - 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE DIT LE CODE DANS LA FICHE SAC ESTABLIE ?



Si vous avez utilisé plus de DuoTray que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTray

Si vous oubliez de mettre DuoTrav, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTray

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav
Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

MA QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Ensis scutatus Bougeur de l'œil

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets indésirables

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision trouble, œil pâle, signes et symptômes d'irritation oculaire (sensibilité, goutteux, etc.).

(1 personne sur 100)



NOVARTIS

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL
Collyre en solution**

Travoprost/Timolol

Flacon de 2.5 ml

Veuillez lire attentivement l'intégralité car elle contient des informations importantes que vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si l'un des effets indésirables devient grave non mentionné dans cette notice, parlez-en

Qui contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav et dans quels cas est-il utilisé ?
 - 2- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DuoTrav ?
 - 3- Comment utiliser DuoTrav ?
 - 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 - 5- Comment conserver DuoTrav ?
 - 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE DIT LE CODE DANS CE FICHIER XML ?



Si vous avez utilisé plus de DuoTray que vous n'auriez dû

Si vous avez mis trop de DuoTrav dans les yeux, rincez-les avec de l'eau tiède. Ne mettez pas d'autres gouttes jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser DuoTray

Si vous oubliez de mettre DuoTray, continuez avec la goutte suivante comme prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. La posologie ne doit pas excéder une goutte par jour dans l'œil (les yeux) atteint(s).

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTray

Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav
Si vous arrêtez d'utiliser DuoTrav sans en parler à votre médecin, la pression de votre œil ne sera pas contrôlée, ce qui pourrait provoquer une perte de la vue.

Si vous utilisez un autre collyre en plus de DuoTrav, attendez au moins 5 minutes entre DuoTrav et l'autre collyre.

vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n'utilisez pas le collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, attendez 15 minutes avant de remettre vos lentilles.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

MA 41 LES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à utiliser le collyre, à moins que les effets soient graves. Si vous vous inquiétez, contactez votre médecin ou votre pharmacien. N'interrompez pas l'utilisation de DuoTrav sans en parler à votre médecin.

Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 personne sur 10)

Effets oculaires

Bougeur de l'œil

Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

Effets indésirables

Inflammation de la surface de l'œil avec atteinte superficielle, douleur oculaire, vision floue, vision trouble, gêne oculaire, signes et symptômes d'irritation oculaire.

(1 personne sur 100)

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une fois consulté votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va être utilisé pour les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas vos parents.

- Si l'un des effets secondaires que vous remarquez dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubliez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas nocif, même si elles sont vos enfants.
- Si l'un des effets secondaires que vous remarquez de mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

• Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubliez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas à votre nocif, même si elles sont vos enfants.

• Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubliez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas à votre nocif, même si elles sont vos enfants.

• Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubliez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas à votre nocif, même si elles sont vos enfants.

• Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®?

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubiez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne pas avoir oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, instillez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas nocif, même si elles sont vos enfants.

• Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubiez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme suit par votre médecin.
es avez oublié d'instiller une goutte à l'heure vise, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux. Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une fois consulté votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va être utilisé pour les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas vos parents.

- Si l'un des effets secondaires que vous remarquez dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubliez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une fois consulté votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va être utilisé pour les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas vos parents.

- Si l'un des effets secondaires que vous remarquez dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubliez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas nocif, même si elles sont vos enfants.
- Si l'un des effets secondaires que vous remarquez de mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

• Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubliez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne vous avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas nocif, même si elles sont vos enfants.

• Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubiez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne pas avoir oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas nocif, même si elles sont vos enfants.

• Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubiez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas nocif, même si elles sont vos enfants.

• Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubiez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.

Xola® 20 mg/ml, Collyre en solution

Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation de ce médicament. Gardez cette notice pour la relire.

- Si vous avez d'au moins une question pour votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament va dans les yeux. Ne le donnez pas à des personnes qui ne sont pas à votre nocif, même si elles sont vos enfants.

• Si l'un des effets indésirables mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xola® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xola® collyre.

1. Qu'est-ce que Xola® collyre et dans quels cas est-il utilisé ?

Xola® collyre est une solution stérile de gouttes pour les yeux. Xola® collyre contient le dorzolamide en tant que principe actif, un composé apparenté aux sulfamides.

Xola® est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique ophthalmique qui réduit la pression au niveau de l'œil.

Il est indiqué dans le traitement de la pression intraoculaire élevée dans des conditions telles que l'hypertension oculaire et le glaucome (glaucome à angle ouvert, glaucome pseudo-exfoliatif). Xola® collyre peut être utilisé seul ou en association avec d'autres médicaments qui réduisent la pression intraoculaire (appelés bêtabloquants).

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Xola®

Ne pas utiliser Xola® collyre si vous :
• êtes allergique (hypersensible) à Xola®, des autres composants de cette solution.

زنلا
Xola®

Lot: YM 0221

Fab: 11 21

Exp: 11 23

P.P.V: 95 DH 20

ne oubiez d'utiliser Xola® collyre important d'utiliser Xola® collyre comme prescrit par votre médecin. Ne avez oublié d'instiller une goutte à l'heure prescrite, installez-la dès que vous vous souvenez. Néanmoins, s'il est presque l'heure de l'instillation suivante, reprenez votre médicament normalement à l'heure habituelle suivante. Ne prenez jamais deux doses pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Ne pas arrêtez d'utiliser Xola® collyre

Xola® collyre devraient être utilisés chaque jour pour fonctionner correctement. Si vous devez arrêter le traitement, contactez immédiatement votre médecin. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Xola® collyre est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous développez des réactions allergiques, arrêtez immédiatement ce médicament et consulter rapidement votre médecin. Les symptômes de réactions allergiques sont les suivantes :

- gonflement du visage, des lèvres, de la langue, et / ou de la gorge qui peut provoquer des difficultés à respirer ou à avaler.
 - réactions cutanées sévères avec des cloques sur la peau qui peuvent affecter la bouche, les yeux et les organes génitaux.
 - urticaire.
- Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xola® collyre :
• brûlure et picotement des yeux.
Commun (affecte entre 1 et 10 sur 100 personnes)
• maladie de la couche superficielle de l'œil.



A l'Attention Mme BANQOUR Tous

FAX : (044) 44 - 60 - 02

DECLARATION DE MALADIE CHRONIQUE (*)
(A adresser à l'attention du Médecin Conseil, sous pli confidentiel)

JE SOUSSIGNE DOCTEUR

CERTIFIE QUE MLE, MME, MR

PRESENTÉ

NECESSITANT UN TRAITEMENT D'UNE DUREE DE :

DONT CI-JOINT L'ORDONNANCE

(A DEFAUT NOTER LE TRAITEMENT PRÉSCRIT)