

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-796769

16/19/78

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1600 Société : RAM

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : LOUDGHIRI ABDELLAH

Date de naissance : 21/3/1948

Adresse : LOT CHANTIMAR - IMPASSE Rue 1 - N° 24

CASABLANCA

Tél : 06 61 31 00 04 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin : Sara LOUDGHIRI

Cachet du médecin :
Médecin Spécialiste en
Hépatogastroentérologie
Angle rue Rais Marsil, et Omar Slaoui
Imm N°7, Appt 14, Kébibate - Rabat
Tél : 05 37 69 69 24
WhatsApp : 06 61 90 63 34

Date de consultation : 16/19/78

Nom et prénom du malade : LOUDGHIRI ABDELLAH Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : DEX P-S RGD

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 16/19/78

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				INP : <u>100800</u> Dr. Sara LOUDCHIRI Médecin Spécialiste en Hépatogastroentérologie Angle rue Raïs/Marsil, et Omar Slaoui Immeuble N°7, Appartement 14, Kébibate - Rabat Tél : 06 57 69 69 24 WhatsApp : 06 61 99 83 34

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
MAJIPHARMA SARL AU PHARMACE HYPER Centre Commercial LABELVIE Rabat - Tél : 06 27 75 55 55	14/04/23	190,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRES ANALYSES Mme. KADIR HASSAN - Agadir 65, Hamoudi - Agadir Tél : 05 22 39 53 73 Fax : 06 61 45 73 73	14/04/23	B1310x126 DR RAS	1780,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <u> </u>
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>


O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H	
25533412		21433552
00000000		00000000
D		G
00000000		00000000
35533411		11433553
	B	

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel Thérapeutique, nécessaire à la profession



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Laboratoire d'analyses médicales du Complexe Sportif

مختبر التحليلات الطبية للمركب الرياضي

Dr KADIRI HASSANI Fatima
Pharmacien biologiste
Diplômée de l'université de Lille II France

Référence : 30417340

17/04/2023

Mr. LOUDGHIRI ABDELLAH



1CB1114

Médecin: Dr. LOUDGHIRI SARA

MARQUEURS TUMORAUX

Analyses	Résultats	Unités	Normes	Antécédents
----------	-----------	--------	--------	-------------

DOSAGE DE LA PSA TOTALE :

(Enzyme Linked Fluorescent Assay) VIDAS

Résultat.....: 69.08 ng/ml.

Interprétation :

#	Inf	à	40	ans	:	0.21	à	1.72
#	40	à	49	ans	:	0.27	à	2.19
#	50	à	59	ans	:	0.27	à	3.42
#	60	à	69	ans	:	0.22	à	6.16
#	Sup	à	69	ans	:	0.21	à	6.77

LABORATOIRE D'ANALYSES
MEDICALES DU COMPLEXE SPORTIF
Mme. KADIRI HASSANI Fatima
63, Mamoun Mohamed - Maarif
Tél. : 05 22 39 53 73
GSM : 06 61 45 73 98

🕒 Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendre de 7h45 à 18h30 / le samedi de 7h45 à 12h30

☎ Tél. : 05 22 39 53 73 / 06 62 79 43 88 - Fax.: 05 22 39 53 73 ✉ laboratoireducomplexe@gmail.com

📍 63, Rue Mamoun Mohamed - Maarif - Casablanca



Laboratoire d'analyses médicales du Complexe Sportif

مختبر التحليلات الطبية للمركب الرياضي

Dr KADIRI HASSANI Fatima
Pharmacien biologiste
Diplômée de l'université de Lille II France

Référence : 30417340

17/04/2023

Mr. LOUDGHIRI ABDELLAH



1CB1114

Médecin: Dr. LOUDGHIRI SARA

H O R M O N O L O G I E

Analyses	Résultats	Unités	Normes	Antécédents
----------	-----------	--------	--------	-------------

DOSAGE DE LA T.S.H Ultrasensible :
(Enzyme Linked Fluorescent Assay)VIDAS

Résultat.....: 2.06 pUI/ml. (0.25 à 5.00)

DOSAGE DE LA THYROXINE LIBRE (T4L) :
(Enzyme Linked Fluorescent Assay)VIDAS

Résultat.....: 16.24 pmol/l (10.6 à 19.4)

LABORATOIRE D'ANALYSES
MEDICALES DU COMPLEXE SPORTIF
Mme. KADIRI HASSANI Fatima
63, Mamoun Mohamed - Maârif
Tél. : 05 22 39 53 73
GSM : 06 61 45 73 98

🕒 Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendre de 7h45 à 18h30 / le samedi de 7h45 à 12h30

☎ Tél. : 05 22 39 53 73 / 06 62 79 43 88 - Fax.: 05 22 39 53 73 ✉ laboratoireducomplexe@gmail.com

📍 63, Rue Mamoun Mohamed - Maârif - Casablanca



Laboratoire d'analyses médicales du Complexe Sportif

مختبر التحليلات الطبية للمركب الرياضي

Dr KADIRI HASSANI Fatima
Pharmacien biologiste
Diplômée de l'université de Lille II France

Référence : 30417340

17/04/2023

Mr. LOUDGHIRI ABDELLAH

Médecin: Dr. LOUDGHIRI SARA



1CB1114

BIOCHIMIE SANGUINE

Analyses	Résultats	Unités	Normes	Antécédents
Urée.....	0.26	g/l	(0.10 à 0.50)	
Créatinine.....	11.33	mg/l	(inf à 13)	
Férritine.....	68.82	ng/ml	(50 à 350)	
(Enzyme Linked Fluorescent Assay) VIDAS				

EXAMENS SEROLOGIQUES

SEROLOGIE DE L'HELICOBACTER PYLORI (IgG) :
(Enzyme Linked Fluorescent Assay) VIDAS

Résultat.....: POSITIF.
Titre.....: 6.30

Interprétation :

#	NEGATIF	:	<	à	0.75
#	EQUIVOQUE	:	0.75	à	1.00
#	POSITIF	:	>	à	1.00

LABORATOIRE D'ANALYSES
MEDICALES DU COMPLEXE SPORTIF
Mme. KADIRI HASSANI Fatima
63, Mamoun Mohamed - Maarif
Tél. : 05 22 39 53 73
GSM : 06 61 45 73 98

🕒 Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendre de 7h45 à 18h30 / le samedi de 7h45 à 12h30

☎ Tél. : 05 22 39 53 73 / 06 62 79 43 88 - Fax.: 05 22 39 53 73 ✉ laboratoireducomplexe@gmail.com

📍 63, Rue Mamoun Mohamed - Maarif - Casablanca

Dr. Sara LOUDGHIRI

**Médecin spécialiste des maladies
de l'appareil digestif et du foie**

Échographie abdominale
Fibroscopie - Coloscopie
Proctologie



د. سارة الودغيري

**طبيبة أخصائية في أمراض
الجهاز الهضمي والكبد
الفحص بالصدى
المنظار الداخلي
أمراض الشرج والبواسير**

Rabat, le **14/04/2023**



101181550

Mr LOUDGHIRI ABDELLAH Né (e) le **21/03/1948**

Bilan biologique

Faire S.V.P:

FERRITNE

SEROLOGIE HP

TSH US T 4 L

UREE CREAT

PSA

Dr. Sara LOUDGHIRI

**Médecin Spécialiste en
Hépatogastro Entérologie**

Angle rue Rais Marsil, et Omar Slaoui
Imm N°7, Appt 14, Kébibate - Rabat

Tél : 05 37 69 69 24

WhatsApp : 06 61 99 53 34

**LABORATOIRE D'ANALYSES
MEDICALES DU COMPLEXE SPORTIF**

Mme. KADIRI HASSANI
63, Mamoun Mohamed - Maarif
Tél : 05 22 39 53 73
GSM : 06 61 45 73 98

زاوية زنقة عمر السلوي والرايس مرسيل، العمارة رقم 7، الشقة 14، القبيبات - الرباط

Angle rue Omar Slaoui - Rais Marsil, Imm N°7, Appt 14, Kébibate - Rabat

Tél : 05 37 69 69 24 : الهاتف

E-mail : dr.saraloudghiri@gmail.com

Dr. Sara LOUDGHIRI

**Médecin spécialiste des maladies
de l'appareil digestif et du foie**

Échographie abdominale
Fibroskopie - Coloscopie
Proctologie



د. سارة الودغيري

**طبيبة أخصائية في أمراض
الجهاز الهضمي والكبد**

الفحص بالصدى
المنظار الداخلي
أمراض الشرج والبواسير

Rabat, le14/04/2023...



101181550

Mr LOUDGHIRI ABDELLAH Né (e) le 21/03/1948

ORDONNANCE

199,00

1) INESO 40 MG

1 gelule le matin 30 min avant le repas x 01 mois

2) CURACID FAST

1 cp 3 fois par jour apres le repas x 15 jours

MAJIPHARMA SARL AU
PHARMACIE HYPER
Centre Commercial L'ABELVIE
Rabat - Tél: 05 37 75 55 55

Dr. Sara LOUDGHIRI
Médecin Spécialiste en
Hépatogastroentérologie
Angle rue Rais Marsil, et Omar Slaoui
Imm N°7, Appt 14, Kébibate - Rabat
Tél : 05 37 69 69 24
WhatsApp : 06 61 99 63 34

زاوية زنقة عمر السلوي والرايس مرسيل، العمارة رقم 7، الشقة 14، القبيبات - الرباط
Angle rue Omar Slaoui - Rais Marsil, Imm N°7, Appt 14, Kébibate - Rabat
Tél : 05 37 69 69 24 : الهاتف E-mail : dr.saraloudghiri@gmail.com



Laboratoire d'analyses médicales du Complexe Sportif

مختبر التحليلات الطبية للمركب الرياضي

Dr KADIRI HASSANI Fatima
Pharmacien biologiste
Diplômée de l'université de Lille II France

Facture 56996

INP:093003150

Le : 17/04/2023
Analyses effectuées le: 17/04/2023
Pour.....: **Mr. LOUDGHIRI ABDELLAH**
Sur prescription du : Dr LOUDGHIRI SARA
Code.....: ICB1114
Organisme.....:

I.C.E:
002943067000076

Bilan:

FERRI=B250 HEPY=B250 TSH=B250 T4L=B200
UREE=B30 CREAT=B30 PSA=B300

Total : B 1310

Montant Net : 1780.00 Dh

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :
MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT Dhs 00 Cts

LABORATOIRE D'ANALYSES
MEDICALES DU COMPLEXE SPORTIF
Mme KADIRI HASSANI Fatima
63, Mamoun Mohamed - Maârif
Tél. : 05 22 39 53 73
GSM : 06 61 45 73 98

🕒 Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendredi de 7h45 à 18h30 / le samedi de 7h45 à 12h30

☎ Tél. : 05 22 39 53 73 / 06 62 79 43 88 - Fax.: 05 22 39 53 73 ✉ laboratoireducomplexe@gmail.com

📍 63, Rue Mamoun Mohamed - Maârif - Casablanca

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.

LISTE DES INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT LA PRISE DU MEDICAMENT

Sans objet.

CONTRAINDICATIONS

- Si vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
 - Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons, (par exemple : pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, oméprazole).
 - Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir.
- Il est particulièrement important d'informer votre médecin si vous prenez d'autres médicaments, même ceux sans prescription médicale.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPECIALES

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant toute administration d'Inéso :

- si vous avez des problèmes hépatiques sévères.
- si vous avez des problèmes rénaux sévères.

Si vous prenez Inéso vous devez informer immédiatement votre médecin si : "vous perdez du poids sans raison et vous avez des problèmes pour avaler, "vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion, "vous vomissez de la nourriture ou du sang, "vous avez des selles noires teintées de sang.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel qu'Inéso, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, ou si vous avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

Vous ne devez pas prendre Inéso si vous prenez le médicament suivant : nelfinavir (utilisé dans le traitement de l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants : atazanavir, dolutegravir, kétoconazole, itraconazole ou voriconazole, élotinib, citalopram, imipramine ou clomipramine, diazépam, phénytoïne, warfarine, clobazam, cisapride, digoxine, méthotrexate, tacrolimus, rifampicine, millepertuis.

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

Vous pouvez prendre vos gélules avec de la nourriture ou à jeun.

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE OU THERAPIES ALTERNATIVES :

Sans objet.

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'ALLAITEMENT

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre Inéso pendant cette période.

On ne sait pas si Inéso passe dans le lait maternel; en conséquence, vous demandez conseil à votre médecin ou pharmacien lorsque vous allaitez.

Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg une fois par jour.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

• En cas d'infection par la bactérie appelée Helicobacter pylori, traitement de l'ulcère du duodénum et prévention de la récurrence de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 20 mg deux fois par jour pendant une semaine. Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques par exemple de l'amoxicilline et de la clarithromycine.

Inéso 40 mg

- Adultes âgés de 18 ans et plus :

• Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides)

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète. Si vous avez une maladie hépatique grave, votre médecin peut vous donner une dose plus faible.

• Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû au syndrome de Zollinger-Ellison.

La dose recommandée est d'une gélule d'Inéso 40 mg deux fois par jour. Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de traitement selon les besoins. La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

La dose recommandée est d'une gélule de 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

- Utilisation chez les adolescents (âgés de 12 ans et plus) :

• Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides)

Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'Inéso une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète.

Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

MODE D'ADMINISTRATION

- Vous pouvez prendre vos gélules à n'importe quel moment de la journée. Pendant ou en dehors des repas. Avez vos gélules entières avec un verre d'eau.

ENFANTS AGES DE MOINS DE 12 ANS

Inéso 20 mg et 40 mg, gélules gastro-résistantes n'est pas recommandé chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

SUJETS AGES

Un ajustement de la posologie n'est pas nécessaire chez les sujets âgés.

manuscrits visuels, sensoriels ou auditifs. Troubles rénaux sévères entraînant une insuffisance rénale et une inflammation du cerveau. Apparition soudaine d'éruptions cutanées sévères, bulles ou desquamations importantes (réactions bulleuses) pouvant être associées à une fièvre et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell) - faiblesse musculaire. Troubles rénaux sévères. Gonflement des seins chez l'homme.

-Effets indésirables de fréquence indéterminée (ne peut pas être estimée à partir des données disponibles).

Si vous prenez l'ésoméprazole pendant plus de trois mois, il est possible que le taux de magnésium dans votre sang diminue. De faibles taux de magnésium peuvent se traduire par une fatigue, des contractions musculaires involontaires, une désorientation, des convulsions, des sensations vertigineuses, une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles taux de magnésium peuvent également entraîner une diminution des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin pourra décider d'effectuer des examens sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium. Inflammation de l'intestin (entraînant des diarrhées).

L'ésoméprazole peut dans de très rares cas affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire. Vous devez consulter votre médecin dès que possible si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec une fatigue générale très importante, ou de la fièvre avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs dans le cou, la gorge, la bouche, ou des difficultés à uriner. Si vous avez ces symptômes, un déficit de globules blancs (agranulocytose) pourra être éliminé par un test sanguin. Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments dans ce cas.

CONDITIONS DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C et à l'abri de l'humidité.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce qui contient Inéso 20 mg, gélule gastro-résistante : chaque gélule gastro-résistante contient 20 mg d'ésoméprazole.

Ce qui contient Inéso 40 mg, gélule gastro-résistante : chaque gélule gastro-résistante contient 40 mg d'ésoméprazole.

Excipient(s) à effet notoire : saccharose

Conditions de prescription et de délivrance : Tableau C (Liste II)

Ce médicament est disponible en forme de gélules sous plaquette(Aluminium) sous les présentations suivantes :

Inéso 20 mg :

Boîtes : de 7 gélules / AMM n° 177/18 DMP/21/NCN

Boîtes : de 14 gélules / AMM n° 178/18 DMP/21/NCN

Boîtes : de 28 gélules / AMM n° 179/18 DMP/21/NCN

Inéso 40 mg :

Boîtes : de 7 gélules / AMM n° 180/18 DMP/21/NCN

Boîtes : de 14 gélules / AMM n° 181/18 DMP/21/NCN

Boîtes : de 28 gélules / AMM n° 182/18 DMP/21/NCN

Deva Pharmaceutique
J.OUAJDI Pharmacien Responsable

Deva
Pharmaceutique
140-147, Zone Industrielle TS Metit - Casablanca

Code : AC2 - 00088



Gélule
Microgranules
gastro-résistants
Par voie orale

Ineso

ésoméprazole

Deva
Pharmaceutique

- Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Ineso contient une substance appelée **ésoméprazole**. C'est un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la sécrétion acide au niveau de l'estomac.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ineso 20 mg, gélule gastro-résistante est utilisé dans le traitement des maladies suivantes :

- Adultes**
- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
 - L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser,
 - Le traitement et la prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Ineso peut aussi être utilisé pour stopper la formation d'ulcères si vous prenez des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
 - Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO) lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures,
- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum en cas d'infection par une bactérie appelée *Helicobacter pylori*. Si vous êtes dans cette situation votre médecin pourra également vous prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de cicatriser.

Ineso 40 mg, gélule gastro-résistante est utilisé dans le traitement des maladies suivantes

- Adultes**
- Le traitement de l'œsophagite érosive par reflux lorsque l'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage et entraîne une douleur, une inflammation et des brûlures.
 - Un excès d'acide dans l'estomac dû à un syndrome de Zollinger-Ellison.

Adolescents âgés de 12 ans et plus



LES EFFETS INDÉSIRABLES A EFFET NOTABLE

Saccharose

POSOLOGIE, MODE ET/OU VOIE(S) D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D'ADMINISTRATION ET DUREE DU TRAITEMENT

Ineso 20 MG :

Adultes âgés de 18 ans et plus :

- **Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides)**
Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'Ineso une fois par jour pendant 4 semaines. Un traitement supplémentaire de 4 semaines peut être nécessaire pour obtenir une guérison complète. La dose recommandée après cicatrisation de l'œsophage est une gélule d'Ineso 20 mg une fois par jour. Si votre œsophage ne présente pas d'inflammation, la dose recommandée est d'une gélule d'Ineso 20 mg une fois par jour. Une fois le contrôle des symptômes obtenu, votre médecin peut vous recommander de prendre une gélule d'Ineso 20 mg une fois par jour, en fonction de vos besoins. Si vous avez de graves problèmes hépatiques, il est possible que votre médecin vous donne une dose plus faible.

- **En cas d'infection par la bactérie appelée *Helicobacter pylori*, traitement de l'ulcère du duodénum et prévention de la récurrence de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum.**
La dose recommandée est d'une gélule d'Ineso 20 mg deux fois par jour pendant une semaine. Votre médecin vous demandera également de prendre des antibiotiques, par exemple de l'arnoxicilline et de la clarithromycine.


- **Traitement des ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens**
La dose recommandée est d'une gélule d'Ineso 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

- **Prévention des ulcères associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens**
La dose recommandée est d'une gélule d'Ineso 20 mg une fois par jour.

- **Traitement de l'excès d'acide dans l'estomac dû au syndrome de Zollinger-Ellison.**
La dose recommandée est Ineso 40mg deux fois par jour. Votre médecin vous indiquera la dose et la durée de traitement en fonction de vos besoins. La dose maximale est de 80 mg deux fois par jour.

Utilisation chez les adolescents (âgés de 12 ans et plus)

- **Traitement des symptômes du reflux gastro-œsophagien (brûlures et remontées acides)**
Si votre médecin diagnostique une inflammation de l'œsophage, la dose recommandée est de 40 mg d'Ineso une



EN CAS DE SURDOSAGE

Si vous n'auriez dû ; consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
EN CAS D'UNE OU DE PLUSIEURS DOSES
Prenez-le dès que possible. Cependant, si vous êtes à proximité du moment de prendre la dose que vous avez oubliée, mais poursuivez votre traitement.

Compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

RISQUE DE SYNDROME DE SEVRAGE

Sans objet.

EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. Si vous remarquez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre ce médicament et contactez un médecin immédiatement :

Apparition soudaine d'une respiration sifflante, gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ou du corps, éruptions cutanées, perte de connaissance et difficultés à avaler (réactions allergiques graves).
Rougeurs de la peau avec des bulles ou une desquamation. Parfois, les bulles peuvent être importantes et s'accompagner d'un saignement au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez ou des parties génitales. Ceci peut correspondre à un syndrome de Stevens-Johnson ou à une destruction toxique de la peau.
Jaunisse, urines foncées et fatigue peuvent être des symptômes d'une maladie du foie.
Ces effets sont rares et peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000.

Les autres effets indésirables sont :

- **Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :**
Maux de tête. - Effets sur l'estomac ou l'intestin : diarrhée, douleurs à l'estomac, constipation, flatulence. Nausées, vomissements.
- **Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :**
Gonflement des pieds et des chevilles. Troubles du sommeil (insomnie). Etourdissements, fourmillements, somnolence. Vertiges. Sécheresse de la bouche. Augmentation dans le sang des enzymes du foie. Eruptions cutanées, urticaire et démangeaisons. Fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres (si Ineso 20 mg et 40mg, gélules gastro-résistantes est utilisé à des doses élevées et sur une longue période).
- **Effets indésirables rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)**
Troubles sanguins tels qu'une diminution du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ces effets peuvent provoquer une faiblesse, des ecchymoses et faciliter la survenue d'infections. Diminution du taux de sodium dans le sang. Celle-ci peut provoquer une faiblesse, des nausées, des vomissements et des crampes. Agitation, confusion, dépression. Troubles du goût. Troubles de la vue, tels que vision trouble. Respiration sifflante ou souffle court (bronchospasme). Inflammation de l'intérieur de la bouche. Infection de l'intestin liée à un champignon (candidose gastro-intestinale). Troubles hépatiques induisant la jaunisse, pouvant entraîner une peau colorée en jaune, des urines sombres et de la fatigue. Perte de cheveux (alopécie). Eruption cutanée lors d'exposition au soleil. Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie). Sensation de faiblesse et manque d'énergie. Augmentation de la sueur.
- **Effets indésirables très rares (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)**
Modification du nombre de cellules du sang incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs). Aggravité.