

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com  
 Prise en charge : pec@mupras.com  
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-796053

161960

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 16.00

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

LOUDGHIRI Abdellah

Date de naissance :

21 / 3 / 1948

Adresse :

LOT CHANTIMAR - IMPASSE Rue 1 - N° 24

CASABLANCA  
Tél. 06 61 31 00 04

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. ATMANI Najat  
CARDIOLOGUE  
9 CP CH. Hassan II RDC  
Appt 4 GH2 - Oulfa - Casablanca  
Tél: 05 22 65 35 35  
23/04/2023

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Age:

Nature de la maladie :

Zonfissure mitiale severe

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 13 / 04 / 2023



#### **RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/04/2023	ATMANI Najar Cardiologue ESSIAN RDC Oulata Sénégal	210000	210000	INP : P91493683 ATMANI Najar Cardiologue ESSIAN RDC Oulata Sénégal

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<p style="text-align: right; transform: rotate(-15deg);">Pharmacie du Complexe Sportif Mme KADIR ASSASSANI Fatima 2, Rue Mouloud un Mohamed Tél : 05 22 36 05 07</p>	13/04/03	144,30

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....
	.....					.....

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

#### **Important :**


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				Coefficient des travaux <input type="text"/>
				Montants des soins <input type="text"/>
				Début d'exécution <input type="text"/>
				Fin d'exécution <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des travaux <input type="text"/>
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	Montants des soins <input type="text"/>
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Date du devis <input type="text"/>
				Date de l'exécution <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

CABINET DE  
CARDILOGIE



عيادة أمراض  
القلب و الشرايين

Dr ATMANI Najat  
06 66 13 58 43

13/04/2023

ORDONNANCE

Casablanca, le .....

LOUDGHIRI ABDELLAH


OG : diametre : 39 mm	Surface : cm <sup>2</sup>	Volume : 90 ml
A ascendante : 31 mm 17mm	Os : 20 mm	Diametre A :
VG : 56/33 /mm 0.83mm	SIVd : 0.76 mm	PPVGd .
FE : 72 %	SIMPSON : 71 %	Sa : 8.61 cm/s
E/A : 0.80	E/Ea : 10.92	Ea lat : 7.97cm/s
SM : cm <sup>2</sup>	PHT : ms	Vmax mitr: 3.52m/s
ITV A :	ITV SA :	Surface A : 2.85 cm <sup>2</sup>
Vmax A : m/s mmhg	Grad moy A : 0.75 mmhg	Grad moy PULM : 072
PAPs : 23.4 mmhg	DVD diast : 28 mm	Sa VD : 14.82cm/s
VCI : 18 mm		

COMMENTAIRE :

Insuffisance mitrale Severe sur les prépa  
ol. la petite valve mitrale Vmax : 3.82 m/s  
- ou obstrue libe stenose (digam fait)  
- 16 mm obstrue : une embolie  
globale et récurrente  
Brucce et systolique sur les postero inférieurs



- Es fehlt - mit 2P nicht Glasbombe
- Dazu elekts
- Damit es in Ordnung: Bauw. f. RSTV
- HTML mindestens Class (Bsp. highlight)
- VCL Implementierung in RSTV
- Lernende Kc



# CABINET DE CARDIOLOGIE



عيادة أمراض  
القلب و الشرايين

Dr ATMAMI Najat

05 22 65 35 35

## ORDONNANCE

Casablanca, le : .....13/04/2023.....

## Facture

LOUDGHIRI ABDELLAH

Acte	Honoraire
Echo doppler Cardiaque	800.00 Dh
Total	800.00 Dh

Arrêté la présente facture à la somme de :  
800.00 Dirhams

Dr. ATMAMI Najat  
Cabinet de Cardiologie  
9 Op Cite Essalam Etg rd Appt 4 GH 2 - Oulfa - Casablanca  
Tel: 05 22 65 35 35

9 Op Cite Essalam Etg rd Appt 4 GH 2 - Oulfa - Casablanca  
Tél.: 05 22 65 35 35 - E-mail : najatatmani20@gmail.com

# CABINET DE CARDIOLOGIE



عيادة أمراض  
القلب و الشرايين

Dr ATMANI Najat  
05 22 65 35 35  
ORDONNANCE

Casablanca, le : .....13/04/2023.....

LOUDGHIRI ADELLAH

Pharmacie du Complexe Sportif  
Mme KADIRI HASSANI Fatima  
63, Rue Mamoun Mohamed  
Tél: 05 22 36 05 07

• Esidrex 25 mg

1/2 Comprimé, matin, après les repas, pendant , 3 mois

Cardioaspirine 100 mg

1 Comprimé, midi, après les repas, pendant , 3 mois

• Alora 5 mg

1 Comprimé, soir, après les repas, pendant , 7 jours

Pharmacie du Complexe Sportif  
Mme KADIRI HASSANI Fatima  
63, Rue Mamoun Mohamed  
Tél: 05 22 36 05 07

9 Op Cite Essalam Etg rd Appt 4 GH 2 - Oulfa - Casablanca  
Dr. ATMANI Najat  
Tél.: 05 22 65 35 35 - E-mail : najatatmani20@gmail.com

9 Op Cite Essalam Etg rd Appt 4 GH 2 - Oulfa - Casablanca  
Tél.: 05 22 65 35 35 - E-mail : najatatmani20@gmail.com

# ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de 20.

## Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :  
Pour toute demande d'atténouement, l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament et car elle contient des informations importantes pour vous.

\* Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

\* Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

\* Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à une autre personne. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

\* Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé :

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

\* Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques. Ce médicament réduit la quantité d'eau éliminée par les urines.

\* Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

- Pour traiter des gonflements (œdèmes).

- Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

\* Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucres, contactez-le afin de prendre ce médicament.

\* Contraindications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorothiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique "Ingrédients".

- Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie).

- Si vous avez une insuffisance rénale sévère.

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

Si vous êtes dans l'une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin ou de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

\* Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

- Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

- Si vous avez une maladie de la peau ou des vaisseaux sanguins (sauf si vous avez les deux reins ou un rein normal).

- Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

- Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

- Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

\* Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

\* Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

\* Si votre taux de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des pulsées des voies respiratoires, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

\* Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

\* Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être des symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les premiers ou les derniers mois qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

\* Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

\* Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

\* Vous prenez tout autre médicament.

\* Vous souhaitez ou déjetez débuter une grossesse.

\* Votre état de santé ou de réaction au soleil ou aux UV.

\* Si vous avez déjà eu des réactions à ce médicament, et que votre

\* Vous souhaitez poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des

Ce médicament contient du Lactose. patients présentant une intolérance au lactose ou au syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

Ce médicament peut être administré d'absorption du gluten (par l'intestin). L'absorption du gluten est dépendante à l'état de tracé, et est donc atteint d'une maladie de celiac.

## 3. COMMENT PRENDRE ESIDREX 2

\* Instruction pour un bon usage.

\* Posologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament par votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien.

\* Posologie :

Il faut toujours prendre ce médicament comme notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

\* Doses :

La dose habituelle en début de traitement est de 2 comprimés sécables par jour mais votre médecin peut décider de l'augmenter à 4, voire 5 comprimés sécables par jour.

La dose quotidienne peut être réduite à 1 comprimé sécable par jour.

La dose recommandée est de 1 comprimé sécable tous les jours prendre ce médicament par votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien.

\* Mode d'administration :

Le comprimé est à prendre par voie orale.

Ayez le(s) comprimé(s) sec(s).

\* Fréquence d'administration :

Ce médicament a un effet diurétique.

Compte tenu de cet effet, il est dans la journée, afin d'éviter d'avoir à matin vous devez prendre vos comprimés.

\* Durée du traitement :

Votre médecin vous dira par quel moyen.

Votre médecin fera régulièrement, entraîne les effets attendus.

Si vous avez des questions sur la durée à votre pharmacien.

\* Symptômes et conduite à tenir en cas de :

\* Si vous avez pris plus de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû prendre :

Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaissable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

\* Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre ce médicament, prenez-le le plus rapidement possible le jour même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

\* Si vous arrêtez de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

N'arrêtez pas de prendre ESIDREX 25 mg sauf si votre médecin vous le demande. Si vous interrompez le traitement, votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

\* Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ce surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

\* Effets nécessitant l'arrêt du traitement :

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

si vous faites une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

\* Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

- Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

- Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

\* Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

- Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhées.

- Incapacité à cotoner ou à maintenir une érection (impotencie).

- Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

- Augmentation du taux d'acide urique dans le sang (hyperuricémie).

\* Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

- Aggravation d'un diabète.

- Sensibilité augmentée de la peau au soleil.

Esidrex® 25 mg  
Hydrochlorothiazide

20 comprimés sécables



6 118000 181194

PPV : 30,60

Exp :

N° Lot :



ou

à votre pharmacien.

Si vous avez des questions sur la

durée à votre pharmacien.

Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

# ESIDREX® 25 mg, Comprimés sécables, Boîte de 20.

## Hydrochlorothiazide

Pour les médicaments soumis à la prescription médicale :  
Pour toute demande d'atténouement, l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament et car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été prescrit personnellement prescrit. Ne le donnez pas à une autre personne. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Que contient cette notice :

2. Qu'est-ce que ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables et dans quels cas est-il utilisé :

3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

4. Comment prendre ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

5. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

6. Comment conserver ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

7. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE ESIDREX® 25 mg, COMPRIMES SECABLES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE :

• Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :  
ESIDREX appartient à une classe de médicaments appelée diurétiques thiazidiques.  
• Indication : réduire la quantité d'eau éliminée par les urines.

(Code ATC : C03AA03).

• Indications thérapeutiques :

Ce médicament est utilisé :

• Pour traiter des gonflements (œdèmes).

• Pour traiter une tension artérielle élevée. Dans ce cas il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables ?

• Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolerance à certains sucres, contactez-le afin de prendre ce médicament.

• Contre indications :

Ne prenez jamais ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables dans les cas suivants :

• Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'hydrochlorthiazide) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique "Ingrédients".

• Si vous êtes incapable d'uriner (présentez une anurie).

• Si vous avez une insuffisance rénale sévère.

• Si vous êtes allergique (hypersensible) au blé, en raison de la présence d'amidon de blé.

• Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, prévenez votre médecin ou de prendre ESIDREX® 25 mg, comprimé sécable.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec ESIDREX® 25 mg, comprimés sécables :

Avant de prendre le traitement, prévenez votre médecin :

• Si vous avez une maladie grave des reins ou du foie.

• Si vous avez une maladie de la peau ou des vaisseaux sanguins (sauf si vous avez les deux reins ou un rein normal).

• Si vous avez un diabète (taux élevé de sucre dans le sang).

• Si votre taux sanguin de cholestérol ou de triglycérides est élevé.

• Si vous avez ou avez déjà eu une maladie appelée "lupus erythémateux" (appelée également "lupus" ou "LED").

• Si votre taux sanguin de potassium est trop bas (avec ou sans symptômes tels qu'une faiblesse musculaire, des spasmes musculaires ou un rythme cardiaque abnormal).

• Si votre taux sanguin de sodium est trop bas (avec ou sans symptômes tels de la fatigue, un état confusionnel, des contractions musculaires ou des convulsions).

• Si votre taux de calcium est élevé (avec ou sans symptômes tels que des pulsées des voies respiratoires, une constipation, des douleurs à l'estomac, une envie fréquente d'uriner, une sensation de soif, une faiblesse musculaire ou des contractions musculaires).

• Si vous souffrez de crises de goutte (cristaux d'acide urique dans les articulations).

• Si vous ressentez une douleur dans l'œil ou une baisse de la vision. Ce pourrait être des symptômes d'une augmentation de la pression dans votre œil pouvant survenir dans les jours ou semaines qui suivent la prise d'ESIDREX. Ceci peut entraîner des troubles permanents de la vision, en l'absence de traitement.

• Si vous souffrez d'allergie ou d'asthme.

• Si vous présentez des réactions cutanées telles qu'une éruption après une exposition au soleil.

• Vous prenez tout autre médicament.

• Vous souhaitez ou déjetez débuter une grossesse.

3. Action au soleil ou aux UV :

• Si vous avez déjà eu des réactions à ce médicament, et que vous

• souhaitez poursuivre le traitement, vous devez protéger votre peau des

Ce médicament contient du Lactose. patients présentant une intolérance au lactose ou au syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.

Ce médicament peut être administré d'absorption du gluten (par l'intestin). L'absorption du gluten est dépendante à l'état de tracé, et est donc atteint d'une maladie cœliaque.

3. COMBIEN DE PRENDRE ESIDREX 2

3.1 Instruction pour un bon usage.

Possologie et mode d'administration

Veuillez à toujours prendre ce médicament par votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien.

Posologie : Veuillez à toujours prendre ce médicament par votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

• Doses :

La dose habituelle en début de traitement est de 2 comprimés sécables par jour mais

votre médecin peut décider de l'augmenter à 4, voire 5 comprimés sécables par jour.

• Durée :

La dose recommandée est de 1 comprimé sécable par jour.

• Dosage recommandé est de 1 comprimé sécable par jour.

• Consulter votre pharmacien.

• Avez le(s) comprimé(s) secable(s).

• Fréquence d'administration :

Ce médicament a un effet diurétique.

• Compte tenu de cet effet, il est dans la journée, afin d'éviter d'avoir à matin vous devez prendre vos comprimés.

• Durée du traitement :

Votre médecin vous dira par quel moyen.

• Votre médecin fera régulièrement, entraîne les effets attendus.

• Si vous avez des questions sur la durée

à votre pharmacien.

• Symptômes et conduite à tenir en cas de :

• Si vous avez pris plus de ESIDREX 25 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

• Consultez immédiatement votre médecin ou les urgences si vous ressentez des nausées, une somnolence, des contractions musculaires, des troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque), une tension artérielle basse (reconnaissable par des vertiges), un état confusionnel ou des troubles urinaires.

• Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

• Si vous avez oublié de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable le plus rapidement possible le jour

même et continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

• Si vous arrêtez de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable :

• N'oubliez pas de prendre ESIDREX 25 mg, comprimé sécable si votre tension artérielle ne sera plus contrôlée (voir aussi le paragraphe "Durée du traitement").

• Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

• Ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ce surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

• Effets nécessitant l'arrêt du traitement :

Vous devez interrompre le traitement et consulter un médecin ou les urgences

si vous faites une réaction aux rayons du soleil (réaction sur la peau).

• Effets indésirables très fréquents (peuvent affecter plus de 1 patient sur 10) :

• Diminution du taux de potassium dans le sang (hypokaliémie).

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Augmentation du taux d'acide urique dans le sang (hyperurémie).

• Effets indésirables peu fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

• Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

• Aggravation d'un diabète.

• Sensibilité augmentée de la peau au soleil

• Eruption cutanée avec démangeaisons (urticaire) et autres formes d'éruptions cutanées.

• Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrées.

• Incapacité à cotoiner ou à maintenir une érection (impuissance).

• Diminution du taux de magnésium dans le sang (hypomagnésémie).

• Diminution du taux de potassium dans le sang (hypopotasémie).

• Diminution du taux de sodium dans le sang (hyponatrémie).

• Effets indésirables fréquents (peuvent affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

• Insuffisance rénale aigüe (diminution importante du débit urinaire).

• Aggravation d'un diabète.

• Sensibilité augmentée de la peau au soleil

6.1 Esidrex® 25 mg

Hydrochlorothiazide

20 comprimés sécables



6 118000 181194

PPV : 30,60

Exp :

N° Lot :



ou

Cardioaspirine 100 mg/30cpr  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

## 100 mg, comprimés gastro-résistants

### Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Cardio Aspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe à doses thérapeutiques l'activité de l'enzyme cyclooxygénase qui joue un rôle dans la formation des substances inflammatoires et douleur-gêne.

Cardioaspirine 100 mg/30cpr  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

100 mg, comprimés gastro-résistants

## Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Cardio Aspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe à doses thérapeutiques l'activité de l'enzyme cyclooxygénase qui joue un rôle dans la formation des substances inflammatoires et douleur-générateures.

Cardioaspirine 100 mg/30cpr  
Acide acétylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

## 100 mg, comprimés gastro-résistants

### Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

### 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Cardio Aspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe à doses thérapeutiques l'activité de l'enzyme cyclooxygénase qui joue un rôle dans la formation des substances inflammatoires et douleur-gêne.