

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : **0005365** Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre : **Décédé**

Nom & Prénom : **Sahmoud Abderrahman**

Date de naissance : **24/03/1958**

Adresse : **26 pass zineb annafzaoui bay ezzahra Berrechid**

Tél. : **06.72.17.40.41** Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : **11/05/2023**

Nom et prénom du malade : **Rabah Sahmoud** Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : **AFFection Neurologique**

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Berrechid**

Le : **11/05/2023**

Signature de l'adhérent(e) : 



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/05/2023	Cure	3000h		Dr. HARRIZI Iham Neurologue 333, Bd. Mohamed 5, Casablanca, Maroc Télé: 0522 080 399, Gsm: 0642 890 050

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023
16/05/23	16/05/23	16/05/23
16/05/23	16/05/23	16/05/23

ANALYSES - RADIOPHARMACIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>ABC D'Analyses Médicales Dr. SEKHAT Med Université N° 12 Bemetchia</i>	11/05/23		250,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

<p>O.D.F PROTHESES DENTAIRES</p> 	<p>DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">D</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">00000000 00000000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">35533411 11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">D</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>	H	G	25533412	21433552	00000000	00000000	D		00000000 00000000		35533411 11433553		B	D	<p>CŒFFICIENT DES TRAVAUX</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div> <p>MONTANTS DES SOINS</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div> <p>DATE DU DEVIS</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div> <p>DATE DE L'EXECUTION</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div>
H	G															
25533412	21433552															
00000000	00000000															
D																
00000000 00000000																
35533411 11433553																
B	D															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur. HARRIZI Ilham

Neurologue
Adultes et enfants

Ancien médecin du CHU Ibn Rochd de Casablanca et CHR de Benimellal
Electro-Encéphalo-Graphie (Vidéo-EEG)
Electro-Neuro-Myo-Graphie (ENMG)



الدكتورة حريزي إلهام

الاعصاب والأمراض الدماغية في اختصاصية

العمود الفقري والعضلات - الكبار و الصغار

طبية سابقة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

وبالمستشفى الجهوي بنی ملال

الخطيط الكهربائي للدماغ - الشبكة

التخطيط الكهربائي للأعصاب والعضلات

برشید فی: Berrechid le:

فی : ۱۸/۰۵/۲۰۲۳

Mme Rakeeb Sahmud

TS has
Fernline mil

Dr. HARRIZI Ilham
Spesialis GIGE/EEG-FNMG
Jl. Bintangor Raya No. 121190050
138 Bintangor Samarinda
Telp: 0522-20399-0500 / 082890050
NPE: 121190604

333 شارع محمد الخامس، اقامة نصر الله، الطابق الثاني، الرقم 8 برشد «أمام كارفور»

333, Boulevard Mohamed 5, Lot. Nasr Allah 2ème étage N°8 - Berrechid (En Face de Carrefour)
ICE: 002816744000083 - INPE: 121196604 0522 030 399 0642 890 050 @neuro.ilham@gmail.com

Laboratoire Sekkat d'analyses médicales

Docteur Mohamed Sekkat
Médecin Biologiste en analyses médicales

Adresse : N°12 Lot. El Yousser II, intersection rue Mohamed V et rue Moqawama, à coté de BMCE bank, Berrechid
Tél. : 05 22 51 77 81 / Email : laboratoiresekkat@gmail.com
Urgences : 06 25 63 42 71

Biochimie - Hématologie - Virologie - Bactériologie - Parasitologie - Mycologie -
Immunologie - Hormonologie - Toxicologie - Biologie de la reproduction

Facture

N° facture : 2023-06269

Patient : Mlle SAHMOUD Rababe

Edité le : 26/05/2023

Date prélèvement : 11/05/2023

Analyses	Valeur en B	Montant
Ferritinémie	250	250,00
TSH-us : Thyréostimuline-Hormone	250	250,00
Total B	500	500,00
APB	1,0	0,00
Total de Remise effectuée		150,00
Total		350,00

Arrêtée la présente facture à la somme de : Trois cent cinquante dirhams***

LABORATOIRE
D'Analyses
Dr. MOHAMED SEKKAT
Lot El Yousser II N° 12 berrechid



Berrechid le:

برشید فی: ۱۱/۰۵/۲۰۲۳

Melle Rabab Sahmud

1/ Avlacardyl 40g $\frac{1}{4}$ S PDT 2ij
164 Soit PDT 2ij
 $(m^2 \cdot 1/4) \times 2ij$ PDT / Amostra

63 20 ZZAHIRATUSSALAH SAR
PAAD SAHIL SAR
32, Bd Hassan Ichou, Boraouchid - Tel. 02 32 80 39

2/ Stressan $\frac{1}{2}$ S
38 20 Agibile x 3 1/ m

3/ Calibronat & S $\frac{1}{2}$ S PDT do jato

FUMAFER® 66mg, boîte de 100 comprimés

Fumarate ferreux

Pour les médicaments non soumis à prescription médical :

Irrite ferreux 200 mg
valent à 66 mg de fer)

<Vé com Vou info Gar Ade Si v pha not Vo an PPV 25.10.04 LOT L0230 PER 02/27
comprimés solide

- 1- Qu'est-ce que FUMAFER ?
2- Qu'est-ce que l'ordre de prise ?
3- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser FUMAFER, comprimé ?
4- Comment utiliser FUMAFER, comprimé ?
5- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
6- Comment conserver FUMAFER, comprimé ?
7- Informations Supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE FUMAFER COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité :

Antianémique, fumarate de fer par voie orale (code ATC : B03AA02 ; B : sang et organes hématopoïétiques).

Indications thérapeutiques :

- Anémie par carence martiale.
- Traitement préventif de la carence martiale de la femme enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER FUMAFER, comprimé ?

Liste des informations nécessaires à connaître avant la prise du médicament

Contre indication :

- Ne prenez jamais Fumafer, comprimé dans les cas suivants :
- Surcharge martiale, en particulier anémie normo ou hypersidérémique telle que thalassémie, anémie réfractaire, anémie par insuffisance médullaire.
 - Allergie à la substance active ou à l'un des composants.

Mises en garde spéciales et Précautions particulières d'emploi :

Faites attention avec Fumafer, comprimé, EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Mise en garde :

- L'hyposidérémie associée aux syndromes inflammatoires n'est pas sensible au traitement martial.
- Le traitement martial doit, dans la mesure du possible, être associé au traitement étiologique.

Précautions d'emploi :

- La prévention de la carence martiale du nourrisson repose sur l'introduction précoce d'une alimentation diversifiée.
- La consommation importante de thé inhibe l'absorption de fer.
- Un contrôle de l'efficacité est utile après 3 mois de traitement ; il doit porter sur la correction de l'anémie (Hb, VGM) et sur la restauration des stocks de fer (fer sérique et saturation de la sidérophilinne).

Interactions avec d'autres médicaments :

Nécessitant des précautions d'emploi :

- Cyclines (voie orale) : diminution de l'absorption digestive des cyclines (formation de complexes). Prendre les sels de fer à distance des cyclines (plus de 2 heures, si possible).
- Diphosphonates (voie orale) : diminution de l'absorption des diphosphonates. Prendre les sels de fer à distance des diphosphonates (plus de 2 heures, si possible).
- Fluoroquinolones : diminution de la biodisponibilité des fluoroquinolones par chélation et par un effet non spécifique sur la capacité d'absorption du tube digestif. Prendre les sels de fer à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible).
- Pénicillamine : diminution de l'absorption digestive de la pénicillamine. Prendre les sels de fer à distance de la pénicillamine (plus de 2 heures, si possible).
- Sels, oxydes et hydroxydes de magnésium, d'aluminium et de calcium (topiques gastro-intestinaux) : diminution de l'absorption digestive des sels de fer. Prendre les topiques gastro-intestinaux à distance des sels de fer (plus de 2 heures, si possible).

- Thyroxine : diminution de l'absorption digestive de la thyroxine et hypothyroxinémie. Prendre les sels de fer à distance de la thyroxine (plus de 2 heures, si possible).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEUX MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives :

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement :

Grossesse :

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être prescrit pendant la grossesse.

Allaitement :

Le passage de fumarate de fer dans le lait maternel n'a pas été évalué. Cependant, compte tenu de la nature de la molécule, l'administration de ce médicament est possible chez la femme qui allait.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSEZ OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Sportifs :

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines :

Sans objet.

Excipients à effet notable :

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER FUMAFER, comprimé ?

INSTRUCTION POUR UN BON USAGE :

Posologie, Mode et voie d'administration :

Voie orale

Réservez à l'adulte et à l'enfant à partir de 10 ans.

Traitement curatif :

Adulte et enfant à partir de 30 kg (environ 10 ans) : 100 à 200 mg de fer métal par jour, soit 2 à 3 comprimés par jour.

Traitemen préventif :

Femme enceinte : 1 comprimé par jour, pendant les deux derniers trimestres de la grossesse (ou à partir du 4e mois).

L'horaire de la prise et la répartition sont à adapter en fonction de la tolérance digestive.

Afin de limiter les effets indésirables, il est conseillé de fractionner la dose en plusieurs prises quotidiennes.

Durée du traitement :

Elle doit être suffisante (3 à 6 mois) pour corriger l'anémie et restaurer les réserves en fer, chez l'adulte sont d'environ 1 g.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage :

Si vous avez pris plus que FUMAFER, comprimé que vous n'auriez dû, des cas de surdosage ont été rapportés, en particulier chez l'enfant de moins de 2 ans ; la symptomatologie comporte des signes d'irritation intense ou de nécrose des muqueuses digestives entraînant douleurs abdominales, vomissements, diarrhées souvent sanguinolentes pouvant s'accompagner d'état de choc avec insuffisance rénale aigüe, atteinte hépatique, coma souvent convulsif.

A distance de l'intoxication, des sténoses digestives sont possibles.

Le traitement doit intervenir le plus tôt possible en réalisant un lavage gastrique avec une solution de bicarbonate de sodium à 1 %.

L'utilisation d'un agent chélateur est efficace, le plus spécifique étant la déféroxamine, principalement lorsque la concentration en fer sérique est supérieure à 5 µg/ml. L'état de choc, la déshydratation et les anomalies acido-basiques sont traités de façon classique.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous avez oublié de prendre FUMAFER, comprimé, ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Mention, si nécessaire, d'un risque de syndrome de sevrage :

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.

- Possibilité de troubles gastro-intestinaux à type de nausées, constipation ou diarrhée.
- Coloration habituelle des selles en noir ou gris-noir.
- Réactions Allergiques Possibles.

N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien et à signaler tout effet non souhaité et gênant.

5. COMMENT CONSERVER FUMAFER Comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte, (La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois mentionné).

Condition de conservation :

Pas de précautions particulières de conservation.

« Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût » ni avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus.

Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient FUMAFER Comprimé ?

Composition qualitative et quantitative en substance(s) active(s) par unité de prise ; Fumarate Ferreux 200 mg

(Quantité correspondante en fer 66 mg)

Composition qualitative en excipient : Carboxyméthylamidon sodique, Amidon de maïs, Stéarate de magnésium, Povidone K 90, Docustate sodique.

Nom et adresse de l'EPI titulaire de l'AMM au Maroc

LABORATOIRES SYNTHEMEDIC

20-22, Rue Zoubeir bnou Al Aouam

Roches Noires

20300 Casablanca

Maroc.

Nom et adresse du fabricant (quand celui-ci n'est pas le titulaire de l'AMM)

Sans objet

Conditions de prescription et de délivrance

Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : 01/2017



ALPRAZ 0.5 mg et 1 mg

Comprimés sécables

Veuillez lire attentivement l'intégralité

LOT 230101
EXP 2015
PPV 35-70



symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALPRAZ, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALPRAZ, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique ANXIOLYTIQUE

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants, ou en prévention et/ou traitement des manifestations liées à un sevrage alcoolique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALPRAZ, comprimé sécable ?

Contre-indications

Si votre médecin vous a informé(e) d'une maladie ou d'un état qui pourraient empêcher l'utilisation de ce médicament, contactez le avant

omprimé

s :
le produits
dicament,
à,
eil (pauses
meil),
grave,

- myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi et Mises en garde spéciales

Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

Mises en garde

Si une perte d'efficacité survient lors de l'utilisation répétée du médicament, n'augmentez pas la dose.

Risque de DÉPENDANCE : ce traitement peut entraîner, surtout en cas d'utilisation prolongée, un état de dépendance physique et psychique. Divers facteurs semblent favoriser la survenue de la dépendance :

- durée du traitement,
- dose,
- antécédents d'autres dépendances médicamenteuses ou non, y compris alcoolique.

La dépendance peut survenir même en l'absence de ces facteurs favorisants.

Pour plus d'information, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Arrêter BRUTALEMENT ce traitement peut provoquer l'apparition d'un phénomène de SEVRAGE. Celui-ci se caractérise par l'apparition, en quelques heures ou en quelques jours, de signes tels que anxiété importante, insomnie, douleurs musculaires,

mais on peut observer également une agitation, une irritabilité, des maux de tête, un engourdissement ou des picotements des extrémités, une sensibilité anormale au bruit, à la lumière ou aux contacts physiques, etc... *

Les modalités de l'arrêt du traitement doivent être définies avec votre médecin.

La diminution très PROGRESSIVE des doses et l'espacement des prises représentent la meilleure prévention de ce phénomène de sevrage. Cette période sera d'autant plus longue que le traitement aura été prolongé. Malgré la décroissance progressive des doses, un phénomène de REBOND sans gravité peut se produire, avec réapparition TRANSITOIRE des symptômes (anxiété) qui avaient justifié la mise en route du traitement.

Des troubles de mémoire ainsi que des altérations des fonctions psychomotrices sont susceptibles d'apparaître dans les heures qui suivent la prise du médicament. Chez certains sujets, ce médicament peut provoquer des réactions contraires à l'effet recherché : insomnie, cauchemars, agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité, tension, modifications de la conscience, voire des comportements potentiellement dangereux (agressivité envers soi-même ou son entourage, ainsi que des troubles du comportement et des actes automatiques).

Si une ou plusieurs de ces réactions surviennent, contactez le plus rapidement possible votre médecin.

Les benzodiazépines et produits apparentés doivent être utilisés avec prudence chez le sujet âgé, en raison du risque de somnolence et/ou de relâchement musculaire qui peuvent favoriser les chutes, avec des conséquences souvent graves dans cette population.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

Précautions d'emploi

La prise de ce médicament nécessite un suivi médical renforcé notamment en cas d'insuffisance rénale, de maladie chronique du foie, d'alcoolisme et d'insuffisance respiratoire.

Ce médicament Chez le sujet p il ne doit pas être la dépression compte avec du risque suici La prise d'a déconseillée traitemen En cas de dou demander l'a de votre pharm

Interactions av

Si vous pren un autre médicament parlez-en à v pharmacien.

Utilisation p l'allaitement

Grossesse

Ce médicament grossesse que médecin. Si v êtes enceinte, lui seul peut poursuivre le tr Demandez con votre pharmac médicament.

Allaitement

Ce médicament en conséquence. Demandez con votre pharmac médicament.

Effets sur l'a véhicules ou à

L'attention est et la baisse de l'emploi de ce m L'association av sédatifs ou hyp avec l'alcool, e conduite autom machines.

Si la durée de s risque d'altérala encore accru.

Liste des ex lactose monohy

3. COMMENT comprimé sécable

Réservez à l'adu

Docteur. HARRIZI Ilham
Neurologue
Adultes et enfants

Ancien médecin du CHU Ibn Rochd de Casablanca et CHR de Benimellal
Electro-Encéphalo-Graphie (Vidéo-EEG)
Electro-Neuro-Myo-Graphie (ENMG)

الدكتورة حريزي الهام

اختصاصية في أمراض الدماغ، الأعصاب
العمود الفقري والعضلات - الكبار و الصغار



طبيبة سابقة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

وبالمستشفى الجهوي بن ملال

التخطيط الكهربائي للدماغ - الشكبة

التخطيط الكهربائي للأعصاب و العضلات

Berrechid le:

16/05/2023 برشيد في:

Mme Rabah Sahmoud

EZZAHRA TOP

PI 121

62-Bz Hassani

Berrechid

N° 0522 890 39

SAI / AU

16/05/23

8888

328039

3780

1/ Alpraz 0,5 S

1/4 - 1/4 - 1/2 (10ज)

1/4 - 0 - 1/2 (10ज)

0 - 0 - 1/4 (10ज)

M 1/4 cp 802 (10ज)

M Anet

شارع محمد الخامس، إقامة نصر الله، الطابق الثاني، الرقم 8 برشيد «أمام كارفور» 333

333, Boulevard Mohamed 5, Lot. Nasr Allah 2ème étage N°8 - Berrechid (En Face de Carrefour)
ICE: 002816744000083 - INPE: 121196604 0522 030 399 0642 890 050 @neuro.ilham@gmail.com

2/Fumajri:



2010

100 x 31

for (30 in a set of 3)

328 M

DR. HABIBI Iham

Neuherbergstr. 32
82078 München

Tel: 089/32 80 39

62 Bd Hasselmannstr 10
80539 München

EZZAHRA TOP SANTE SE, JBL

EZZAHRA TOP SANTE SE, JBL

INPE: 121196604
TAI: 05220303355 - GSM: 0642890050

33018 - Neuherbergstr. 32 - 82078 München

20. Februar 2010

33018 - Neuherbergstr. 32 - 82078 München

20. Februar 2010

Stresam®

CHLORHYDRATE D'ETIFOXINE

Lot : 3680
Mfg: 11 2022
EXP.: 11 2025
BIOCODEX MAROC PPV : 63,20 DH

de prendre ce
tantes pour vous.
ire.
nédecin ou votre

ne le donnez pas à
si les signes de leur

- Si vous avez des effets indésirables, rappelez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que STRESAM, gélule et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre STRESAM, gélule ?
3. Comment prendre STRESAM, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver STRESAM, gélule ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE STRESAM, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANXIOLYTIQUE - code ATC : N05BX03.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé pour diminuer les diverses réactions émotionnelles et corporelles qui accompagnent l'anxiété.

السيبرونات 2®

أقراص فانثا

برومو - كالاكتوكليكونات الكالسيوم

التركيز :

يحتوي القرص على 2 غرام من برومـو - كالاكتوكليكونات الكالسيوم

السواـغ: الساـكارـون، بيكارـونـات الصـودـيـوم، حامـضـ الـسيـتـيكـ الـلـامـانيـ، ماـكـروـكـولـ 4000ـ.

الشكل الصـيدـلـيـ :

علبة تحتوي على 20 قرصـاـ فـانـثـاـ.

الصنـفـ الصـيدـلـيـ العـلاـجـيـ :

مـوـمـ وـمـسـكـنـ

(الـجـهـازـ الـعـصـيـنـ الـمـرـكـزـيـ)

حالـاتـ إـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ

بـوـصـىـ بـهـذـاـ دـوـاءـ فـيـ اـضـطـرـابـاتـ النـوـمـ الـخـفـيفـ،ـ القـلـقـ،ـ توـرـ الأـعـصـابـ

الـنـفـاثـاـ:

حالـاتـ مـنـ إـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ

لـاـيـجـبـ إـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ فـيـ الـحـالـاتـ التـالـيـةـ

• حـبـ الشـباـبـ

• الـطـفـلـ الـذـيـ لـاـيـجـاـزـ 30ـ شـهـراـ

• الـشـخـصـ الـمـسـنـ نـاقـصـ التـقـدـيـةـ وـ/أـوـ عـنـدـ نـقـصـ فـيـ كـمـيـةـ المـاءـ

• إـرـتـفـاعـ نـسـبـةـ الـكـالـسـيـوـمـ فـيـ الدـمـ

• ليـتـيـاـرـاـكـالـسـيـكـ (ـحـصـاصـ مـنـ الـكـالـسـيـوـمـ)

• اـرـتـفـاعـ نـسـبـةـ الـكـالـسـيـوـمـ فـيـ الـبـولـ

• الـنـكـلـ (ـنـرـسـ الـكـالـسـيـوـمـ)ـ فـيـ الـكـلـيـتـيـنـ

• مـرضـ الـكـلـيـ الـكـيـبـيـ الـمـزـمـنـ (ـمـرضـ الـكـلـيـتـيـنـ)،ـ

• يـسـبـ وـجـودـ السـاـكـارـونـ،ـ لـاـيـجـبـ إـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ فـيـ حـالـةـ دـمـ تـحـمـلـ الـفـريـكـتوـنـ،ـ أـعـراضـ قـلـةـ اـمـتـصـاصـ الـكـلـوـكـوزـ

ـفـيـ نـقـصـ مـنـ الـسـوـكـارـونـ،ـ لـاـيـجـبـ إـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ فـيـ حـالـةـ دـمـ تـحـمـلـ الـفـريـكـتوـنـ،ـ أـعـراضـ قـلـةـ اـمـتـصـاصـ الـكـلـوـكـوزـ

ـوـعـوـمـاـ لـاـيـجـبـ إـسـتـعـمـالـ هـذـاـ دـوـاءـ فـيـ حـالـةـ دـمـ تـحـمـلـ الـفـريـكـتوـنـ،ـ أـعـراضـ قـلـةـ اـمـتـصـاصـ الـكـلـوـكـوزـ

ـفـيـ حـالـةـ الشـكـ يـجـبـ إـسـتـشـارـةـ الـطـبـيـبـ أوـ الـصـيدـلـيـ

ـتـحـذـيرـاتـ خـاصـةـ

ـفـيـ حـالـةـ ظـهـورـ اـضـطـرـابـاتـ نـفـسـيـةـ عـصـيـقـةـ (ـانـظـرـ الـأـثـارـ غـيرـ الـمـرـغـوبـ فـيـهـاـ)،ـ اـحـمـارـ أـوـ حـكـةـ الـجـلدـ،ـ يـجـبـ وـقـفـ الـعـلاـجـ

ـوـاسـتـشـارـةـ الـطـبـيـبـ

ـاحـتـياـطـاتـ الـاستـعـمـالـ

ـيـنـصـبـ بـالـمـعـنـعـ كـلـياـ عـنـ شـربـ الـكـحـولـ خـالـلـ فـتـرـةـ الـعـلاـجـ

ـفـيـ حـالـةـ حـمـيـةـ قـيـرـفـيـةـ مـنـ الـطـلـعـ،ـ يـجـبـ مـرـاعـاتـ نـسـبـةـ الصـودـيـوـمـ فـيـ الـقـرـصـ الـوـاحـدـ 241ـ مـلـ.

ـيـحـتـويـ كـلـ قـرـصـ عـلـىـ 3ـ غـ تـقـرـيبـاـ مـنـ السـكـرـ يـجـبـ أـخـذـ ذـلـكـ بـعـدـ ذـلـكـ بـعـدـ الـإـعـتـارـ فـيـ الـوـجـةـ الـيـوـمـيـةـ فـيـ حـالـةـ حـمـيـةـ قـيـرـفـيـةـ

ـالـسـكـرـ اوـ مـرـضـ السـكـرـ

ـتـدـاخـلـ مـكـنـ وـقـوعـ عـنـ مـعـاـبـرـ الـكـلـوـرـورـ فـيـ الدـمـ

ـفـيـ حـالـةـ الشـكـ،ـ لـاـتـرـدـدـ فـيـ اـسـتـشـارـةـ الـطـبـيـبـ اوـ الـصـيدـلـيـ

Calcibronat® 2 g

20 COMPRIMES
EFFERVESCENTS

Lot: 1

لـدىـ الـكـلـاـرـ

يـتجاوزـ وزـنـهـ 30ـ كـلـغـ

يـأتـرـينـ اـثـنـيـنـ فـيـ الـمـوـمـ

30ـ كـلـغـ:ـ قـرـصـ وـاحـدـ فـيـ الـبـوـمـ

ـوقـلـ:

لـدىـ الـكـلـاـرـ

لـدىـ الـأـطـنـالـ الـذـيـنـ يـتـجاـوزـ وزـنـهـ 30ـ كـلـغـ

وـفـيـ جـمـيعـ الـحـالـاتـ،ـ يـجـبـ إـبـتـالـ لـوـصـفـ الـطـبـيـبـ

ـكـيـفـيـةـ وـطـرـقـ الـإـسـتـعـمـالـ

ـعـنـ طـرـقـ الـقـلمـ

ـتـنـ إـذـيـةـ الـقـرـصـ فـيـ نـصـ كـأسـ مـنـ الـمـاءـ

ـمـدـةـ الـعـلاـجـ

ـلـاـيـجـبـ تـجـاـوزـ ثـلـاثـةـ أـسـبـعـ مـنـ الـعـلاـجـ

ـمـاـيـجـيـ الـقـيـامـ بـهـ عـنـ تـجـاـوزـ الـبـرـغـةـ

ـيـجـبـ إـشـارـةـ الـطـبـيـبـ بـسـرـعـةـ

ـمـاـيـجـيـ الـقـيـامـ بـهـ عـنـ نـسـيـانـ أـخـذـ جـرـعـةـ وـاحـدـةـ أـوـ عـدـدـ جـرـعـاتـ

ـيـنـتـيـقـ أـخـذـ الـدـوـاءـ فـيـ السـاعـةـ الـمـعـتـادـةـ لـاـيـجـبـ مـضـاعـةـ كـيـةـ الـجـرـعـاتـ

ـالـأـثـارـ غـيرـ الـمـرـغـوبـ فـيـهـاـ وـالـمـفـقـةـ

ـيـمـكـنـ لـهـذـاـ دـوـاءـ كـيـقـيـ الـمـاـوـاـ النـشـطـةـ أـنـ يـؤـدـيـ لـدـيـ عـدـدـ أـثـارـ مـفـقـةـ

ـالـنـوـمـ فـيـ النـهـارـ،ـ الـقـلـقـ،ـ فـقـدـانـ الـوـجـهـ،ـ الـخـيـلـ،ـ الـهـذـيـانـ،ـ تـمـ مـلـاـحـظـةـ هـذـهـ الـأـعـرـاضـ خـصـوصـاـ عـنـ الـمـسـنـ وـعـنـ أـخـذـ

ـجـرـعـاتـ كـبـيرـةـ

ـفـقـدـانـ الـشـهـيـدـةـ،ـ الـإـمـساـكـ

ـوـنـادـرـاـ:ـ إـصـابـاتـ جـلـديـةـ (ـأـحـمـارـ،ـ حـكـةـ)

ـيـجـبـ إـشـارـةـ الـطـبـيـبـ أـوـ الـصـيدـلـيـ بـكـلـ أـثـارـ غـيرـ مـرـغـوبـ فـيـهـاـ وـمـقـلـقـةـ غـيرـ مـبـيـتـةـ فـيـ هـذـهـ الـبـيـانـ

ـالـحـقـقـةـ

ـيـجـبـ تـجـاـوزـ تـارـيـخـ الـأـقـصـىـ لـاـسـتـعـمـالـ الـمـبـيـنـ فـيـ الـغـلـافـ الـخـارـجيـ

مخابر المستحضرات الصيدلانية لشمال إفريقيا

لـابـرـوـفـانـ شـ.ـمـ.ـ 21ـ،ـ زـنـقـةـ الـأـوـدـيـاـ،ـ الدـارـ الـبـيـضاـءـ

AVLOCARDYL®

PROPRANOLOL

40 mg

Veuillez li-
médicam-
pour vous

PER : 21/02/2024
LOT : 21E012

AVLOCARDYL 40 MG
CP SEC B50

P.P.V : 41DH80



6 118000 010227

• Gardez vos pharmacie. • Si vous avez une tension artérielle élevée, • pour éviter des douleurs au niveau de la poitrine (crises douloureuses de l'angine de poitrine), • après une crise cardiaque (infarctus du myocarde), • pour des maladies du cœur et des vaisseaux causées par un taux élevé d'hormones thyroïdiennes dans le sang, • pour traiter certaines maladies du cœur et notamment certains troubles du rythme cardiaque, • pour éviter des migraines, • pour traiter certains types de tremblements, • pour éviter des palpitations liées à une situation stressante (tel que le trac), • pour éviter des saignements digestifs chez les personnes qui souffrent d'une maladie grave du foie (cirrhose).

1. QU'EST-CE QUE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient une substance active, le propranolol qui appartient à la famille des bêta-bloquants. Il agit en diminuant la tension artérielle, en réduisant les troubles du rythme cardiaque et en ralentissant le cœur.

Ce médicament est utilisé principalement : • pour traiter une tension artérielle élevée, • pour éviter des douleurs au niveau de la poitrine (crises douloureuses de l'angine de poitrine), • après une crise cardiaque (infarctus du myocarde), • pour des maladies du cœur et des vaisseaux causées par un taux élevé d'hormones thyroïdiennes dans le sang, • pour traiter certaines maladies du cœur et notamment certains troubles du rythme cardiaque, • pour éviter des migraines, • pour traiter certains types de tremblements, • pour éviter des palpitations liées à une situation stressante (tel que le trac), • pour éviter des saignements digestifs chez les personnes qui souffrent d'une maladie grave du foie (cirrhose).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (le propranolol) ou à l'un des composants contenus dans ce médicament. Vous trouverez la liste des composants à la section 6. • Si vous êtes asthmatique ou si vous avez un encombrement des bronches et des poumons (bronchopneumopathie chronique obstructive). • Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque non contrôlée par un traitement. • Si vous avez eu un problème cardiaque grave (choc cardiogénique). • Si votre tension artérielle élevée est causée par une maladie d'une glande située au-dessus du rein (phéochromocytome non traité). • Si vous souffrez d'une certaine forme d'angine de poitrine appelée angor de Prinzmetal (reconnaissable par des douleurs au niveau de la poitrine). • Si votre cœur bat trop lentement (moins de 45-50 battements par minute). • Si vous souffrez de troubles de la conduction : blocs auriculo-ventriculaires des second et troisième

degrés, bloc sino-auriculaire. • Si vous avez des problèmes de circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements (maladie de Raynaud). • Si vous avez une maladie très grave du foie. • Si vous avez une tension artérielle basse. • Si vous avez une prédisposition à faire de l'hypoglycémie (taux de sucre trop bas dans le sang).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable.

Vous devez prévenir votre médecin : • Si vous avez un taux de sucre élevé dans le sang (diabète), • Si vous avez une maladie grave du foie et/ou du rein, • Si vous avez une maladie de la peau (psoriasis), • Si vous avez déjà eu des allergies, • Si vous avez une maladie de la circulation sanguine (telle que la maladie de Raynaud). • Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, • Si vous avez des antécédents cardiaques.

Vous ne devez jamais arrêter brutalement votre traitement sans avoir demandé, au préalable, l'avis de votre médecin.

• Si vous devez subir une opération, vous devez prévenir votre anesthésiste que vous prenez ce médicament.

Patients devant faire attention au risque d'hypoglycémie

Une hypoglycémie est un taux trop bas de sucre dans le sang. Ce médicament peut aggraver une hypoglycémie en particulier, chez les personnes souffrant de diabète et les personnes non diabétiques mais qui sont prédisposées à l'hypoglycémie (le nourrisson, l'enfant, la personne âgée, les personnes souffrant d'une maladie du foie, les personnes sous dialyse, les personnes qui ont fait un jeûne ou les personnes qui ont pris trop de comprimés).

Cette hypoglycémie peut conduire à des convulsions ou un coma. Vous reconnaîtrez les signes annonciateurs d'une hypoglycémie par une faiblesse, des sueurs, une fringale, des tremblements, une somnolence, des vertiges, des maux de tête, des troubles de la vision, mangez ou buvez quelque chose de sucré. Si l'un de ces signes survient, mangez ou buvez quelque chose de sucré et contactez votre médecin.

La substance active de ce médicament (le propranolol) peut provoquer un test positif lors d'un contrôle antidopage.

Autres médicaments et AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable

Sauf avis contraire de votre médecin, n'utilisez pas AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable avec certains médicaments pour le cœur (les antagonistes du calcium : bépridil, diltiazem, vérapamil et gingolimod). Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

En cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours, si certains effets du traitement se manifestent aussi chez l'enfant.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence,