

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0023372

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10174

Société : Ra ram

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : merri mohamed

A63384

Date de naissance :

Adresse : mamor Adem N22 tisir 1

Tél. : 06.69.33.41.06 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. EN-NOQOBI Jamal
Cardiologue Interventionnel
INPE: 03 122 80 18

Cachet du médecin :

Date de consultation :

madil Dorgae 105/23

Nom et prénom du malade : madil Dorgae Age : 1979

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie : ALC

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/01/23	CS	1.	200,00	 Dr EN-NOURI Jamal Cardiologue Interventionnel INPE: 03 122 80 18
19/01/23	CS	6	600,00	 Dr EN-NOURI Jamal Cardiologue Interventionnel INPE: 03 122 80 18

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 HARMASIE YASSINE 77 RUE EL HOUJ NAFIS BP 22533 31880 TUNIS	19/05/2023	316,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> </table>		H	G	D	B
	H	G				
D	B					
25533412 00000000 35533411	21433552 00000000 11433553					
<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>						
<p>COEFFICIENT DES TRAVAUX</p>						
<p>MONTANTS DES SOINS</p>						
<p>DATE DU DEVIS</p>						
<p>DATE DE L'EXECUTION</p>						

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr EN-NOQOBI Jamal

Cardiologue Interventionnel

Lauréat de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca

Ancien médecin interne du CHU Ibn Rochd Casablanca

Ancien médecin à l'Hôpital Pitié-Salpêtrière Paris - France

Ancien médecin assistant des Hôpitaux de Liège - Belgique



الدكتور جمال النقوبي

أخصائي في أمراض القلب والقسطرة

خريج كلية الطب و الصيدلة

بالدار البيضاء

طبيب داخلي سابق بالمستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

طبيب سابق بالمستشفى الجامعي سالترير بباريس - فرنسا

طبيب سابق بالمستشفى الجامعي بلجيا - بلجيكا

ORDONNANCE

وصفة طبية

Berrechid, Le 19/08/123 : برشيد ، في

Rue N° del Wafee.

- Dipropfen 500 mg 1-0-0
11/30x(2)

- Diprogost 80 mg 1-0-0
43/70x(2)

- AMS 8 mg 0-0-1

(1's)

(1's)

0-0-1,

Dr. EN-NOQOBI Jamal
Cardiologue Interventionnel
T: 03 122 80 18

د. جمال
النقوبي



DENOMINATION, FORMES ET COMPOSITIONS

AM-5®, boîtes de 10 et 30 comprimés

Amlodipine
(sous forme d'amlopodipine bésylate)
Excipients q.s.p.

AM-10®, boîtes de 10 et 30 comprimés

Amlodipine
(sous forme d'amlopodipine bésylate)
Excipients q.s.p.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Inhibiteur calcique sélectif à effet vasculaire

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Traitement préventif des

angor: angor d'effort, angor spontané (dont l'angor de Prinzmetal).

POSOLOGIE ET MO

- Hypertension artérielle

La dose initiale est de au traitement.

- Angine de poitrine

La dose initiale est de au traitement.

La dose quotidienne

- Chez le sujet âgé

L'amlopodipine, utilisée

- Chez l'insuffisant rénal

Le traitement peut être d'insuffisance rénale diurétiques thiazidiq

AM-5® 5 mg
30 comprimés



6 118000 200615

augmentée à 10 mg par

augmentée à 10 mg par

s jeune, est tolérée de la m

ations des concentrations nécessaire d'ajuster les doses de conversion de l'angiot

**LOT:22158 PER:11/2025
PPV:43,70 DH**

CONTRE-INDICATIONS

- Ce médicament ne doit jamais être utilisé en cas d'hypersensibilité aux dihydropyridines.
- Ce médicament est généralement déconseillé en cas d'association au dantrolène.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde spéciales

- L'efficacité et la tolérance de l'amlopodipine n'ayant pas été étudiées chez l'enfant, son utilisation chez
- En cas de survenue de signes cliniques (asthénie, anorexie, nausées persistantes), il est recommandé de des taux et, à plus forte raison, en cas d'ictère, le traitement doit être interrompu.

Précautions d'emploi

- Insuffisance hépatique: La demi-vie de l'amlopodipine est prolongée chez l'insuffisant hépatique. Les recommand



DENOMINATION, FORMES ET COMPOSITIONS

AM-5®, boîtes de 10 et 30 comprimés

Amlodipine
(sous forme d'amlopodipine bésylate)
Excipients q.s.p.

AM-10®, boîtes de 10 et 30 comprimés

Amlodipine
(sous forme d'amlopodipine bésylate)
Excipients q.s.p.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Inhibiteur calcique sélectif à effet vasculaire

INDICATIONS

- Hypertension artérielle.
- Traitement préventif des

angor: angor d'effort, angor spontané (dont l'angor de Prinzmetal).

POSOLOGIE ET MO

- Hypertension artérielle

La dose initiale est de au traitement.

- Angine de poitrine

La dose initiale est de au traitement.

La dose quotidienne

- Chez le sujet âgé

L'amlopodipine, utilisée

- Chez l'insuffisant rénal

Le traitement peut être d'insuffisance rénale diurétiques thiazidiq

AM-5® 5 mg
30 comprimés



6 118000 200615

augmentée à 10 mg par

augmentée à 10 mg par

s jeune, est tolérée de la m

ations des concentrations nécessaire d'ajuster les doses de conversion de l'angiot

**LOT:22158 PER:11/2025
PPV:43,70 DH**

CONTRE-INDICATIONS

- Ce médicament ne doit jamais être utilisé en cas d'hypersensibilité aux dihydropyridines.
- Ce médicament est généralement déconseillé en cas d'association au dantrolène.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Mises en garde spéciales

- L'efficacité et la tolérance de l'amlopodipine n'ayant pas été étudiées chez l'enfant, son utilisation chez
- En cas de survenue de signes cliniques (asthénie, anorexie, nausées persistantes), il est recommandé de des taux et, à plus forte raison, en cas d'ictère, le traitement doit être interrompu.

Précautions d'emploi

- Insuffisance hépatique: La demi-vie de l'amlopodipine est prolongée chez l'insuffisant hépatique. Les recommand

DIPREZAR®

Losartan 50 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé, boîte de

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Qu'est-ce que DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé et DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
Cessez pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - code ATC : C09DA01
DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de l'angiotensine II dans les artères et les vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, empêchant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Cela contribue également à réduire la pression artérielle.
DIPREZAR® est indiquée dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés ?

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamidés (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antidiabétiques, certains sulfamoxolamoxizide) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin.
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® en début de grossesse - voir rubrique « Grossesse »).
- Si vous avez une maladie cardiaque ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'insuline.

EN CAS DE DOUCE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé :

Mises en garde et précautions particulières d'emploi :

Adresssez-vous à votre médecin, votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou suspectez de devenir) enceinte. DIPREZAR® est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

- Il est recommandé de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® :
- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
 - Si vous prenez des diurétiques,
 - Si vous faites un régime sans sel,
 - Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,
 - Si vous avez une insuffisance cardiaque,
 - Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé »).
 - Si vous avez un rétrécissement des artères rénaliennes (sténose artérielle rénale) ou avez un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,
 - Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque),
 - Si vous avez une sténose des valves auriculaire ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque),
 - Si vous avez des diarrhées chroniques,
 - Si vous avez eu de la goutte,
 - Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé),
 - Si vous avez un taux élevé de calcium ou de sel de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium,
 - Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale ou si vous allez faire une visite chez votre dentiste, informez votre médecin ou l'équipe médicale que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide,
 - Si vous avez une hyperaldoستéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostéron suite à une anomalie des glandes surrénales),
 - Si vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle élevée :
 - Un IEC (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux liés au diabète et/ou à l'insuffisance rénale,
 - Hormones.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle, et les taux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.

Les patients qui prennent de l'HTCT seul ou en association avec d'autres médicaments ont un risque de cancer de la peau non mélanome et il est donc important de détecter toute nouvelle lésion ou modification suspecte.

PPV : 114DH30

PER : 07/25

LOT : L2452



...remarques, mais que l'hydrochlorothiazide, co...
médicaments.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas faire l'objet de surveillance stricte de votre médecin.

Des précautions particulières (telles que contrôles supplémentaires, substituts de sel contenant du potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, médicaments pour contrôler le rythme cardiaque) ou le suivi sont importante pour votre médecin de savoir.

D'autres médicaments pour abaisser votre pression artérielle :

- Des stéroïdes,
- Des médicaments pour le traitement du cancer,
- Des antalgiques,
- Des médicaments pour le traitement d'infections,
- Des médicaments contre l'arthrose,
- Des médicaments pour lutter contre un taux insuffisant de sucre dans le sang,
- Des médicaments myorelaxants,
- Des somnifères,
- Des opioïdes tels que la morphine,
- Des « amines pressives » telles que l'adrénaline,
- Des médicaments antidiabétiques oraux ou du glucose.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose. Si vous prenez un IEC ou l'alsikiren (voir également la rubrique « Grossesse ») et à l'avenir, informez aussi votre médecin que vous prenez DIPREZAR® et recevez des produits de contraste iodés.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en prenant DIPREZAR®. Il peut augmenter les effets de l'alcool d'eau. Des quantités excessives de sel dans l'alimentation au cours ou en dehors des repas.

Grossesse et allaitement :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte. Il vous recommandera normalement d'arrêter de prendre DIPREZAR® si vous êtes enceinte. Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant. Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes déscolarisée pour les femmes qui allaitent et votre souhaitera allaiter.

Sportifs :

Le diurétique contenu dans ce médicament peut être utilisé comme antidopage.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, attention particulière (telles que la conduite d'une voiture) : vous ne savez pas comment vous tolérez ce médicament.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés
Si votre médecin vous a informé d'une intolérance au médicament.

3. COMMENT PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien si la posologie appropriée de DIPREZAR® en fonction de votre état de santé.

Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® pour permettre un contrôle régulier de votre pression artérielle.

Hyper tension :
La posologie habituelle pour la plupart des patients est de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une autre posologie, votre dose peut être augmentée à 2 comprimés une fois par jour ou diminuée à 1 comprimé par jour de DIPREZAR®. Le dosage peut être augmenté progressivement. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 100 mg, prenez 2 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 150 mg, prenez 3 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 200 mg, prenez 4 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 250 mg, prenez 5 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 300 mg, prenez 6 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 350 mg, prenez 7 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 400 mg, prenez 8 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 450 mg, prenez 9 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 500 mg, prenez 10 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 550 mg, prenez 11 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 600 mg, prenez 12 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 650 mg, prenez 13 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 700 mg, prenez 14 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 750 mg, prenez 15 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 800 mg, prenez 16 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 850 mg, prenez 17 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 900 mg, prenez 18 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 950 mg, prenez 19 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1000 mg, prenez 20 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1050 mg, prenez 21 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1100 mg, prenez 22 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1150 mg, prenez 23 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1200 mg, prenez 24 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1250 mg, prenez 25 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1300 mg, prenez 26 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1350 mg, prenez 27 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1400 mg, prenez 28 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1450 mg, prenez 29 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1500 mg, prenez 30 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1550 mg, prenez 31 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1600 mg, prenez 32 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1650 mg, prenez 33 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1700 mg, prenez 34 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1750 mg, prenez 35 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1800 mg, prenez 36 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1850 mg, prenez 37 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1900 mg, prenez 38 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 1950 mg, prenez 39 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2000 mg, prenez 40 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2050 mg, prenez 41 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2100 mg, prenez 42 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2150 mg, prenez 43 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2200 mg, prenez 44 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2250 mg, prenez 45 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2300 mg, prenez 46 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2350 mg, prenez 47 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2400 mg, prenez 48 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2450 mg, prenez 49 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2500 mg, prenez 50 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2550 mg, prenez 51 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2600 mg, prenez 52 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2650 mg, prenez 53 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2700 mg, prenez 54 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2750 mg, prenez 55 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2800 mg, prenez 56 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2850 mg, prenez 57 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2900 mg, prenez 58 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 2950 mg, prenez 59 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3000 mg, prenez 60 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3050 mg, prenez 61 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3100 mg, prenez 62 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3150 mg, prenez 63 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3200 mg, prenez 64 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3250 mg, prenez 65 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3300 mg, prenez 66 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3350 mg, prenez 67 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3400 mg, prenez 68 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3450 mg, prenez 69 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3500 mg, prenez 70 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3550 mg, prenez 71 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3600 mg, prenez 72 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3650 mg, prenez 73 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3700 mg, prenez 74 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3750 mg, prenez 75 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3800 mg, prenez 76 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3850 mg, prenez 77 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3900 mg, prenez 78 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 3950 mg, prenez 79 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4000 mg, prenez 80 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4050 mg, prenez 81 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4100 mg, prenez 82 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4150 mg, prenez 83 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4200 mg, prenez 84 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4250 mg, prenez 85 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4300 mg, prenez 86 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4350 mg, prenez 87 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4400 mg, prenez 88 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4450 mg, prenez 89 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4500 mg, prenez 90 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4550 mg, prenez 91 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4600 mg, prenez 92 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4650 mg, prenez 93 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4700 mg, prenez 94 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4750 mg, prenez 95 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4800 mg, prenez 96 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4850 mg, prenez 97 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4900 mg, prenez 98 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 4950 mg, prenez 99 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5000 mg, prenez 100 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5050 mg, prenez 101 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5100 mg, prenez 102 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5150 mg, prenez 103 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5200 mg, prenez 104 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5250 mg, prenez 105 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5300 mg, prenez 106 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5350 mg, prenez 107 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5400 mg, prenez 108 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5450 mg, prenez 109 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5500 mg, prenez 110 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5550 mg, prenez 111 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5600 mg, prenez 112 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5650 mg, prenez 113 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5700 mg, prenez 114 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5750 mg, prenez 115 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5800 mg, prenez 116 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5850 mg, prenez 117 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5900 mg, prenez 118 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 5950 mg, prenez 119 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6000 mg, prenez 120 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6050 mg, prenez 121 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6100 mg, prenez 122 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6150 mg, prenez 123 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6200 mg, prenez 124 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6250 mg, prenez 125 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6300 mg, prenez 126 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6350 mg, prenez 127 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6400 mg, prenez 128 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6450 mg, prenez 129 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6500 mg, prenez 130 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6550 mg, prenez 131 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6600 mg, prenez 132 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6650 mg, prenez 133 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6700 mg, prenez 134 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6750 mg, prenez 135 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6800 mg, prenez 136 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6850 mg, prenez 137 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6900 mg, prenez 138 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 6950 mg, prenez 139 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7000 mg, prenez 140 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7050 mg, prenez 141 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7100 mg, prenez 142 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7150 mg, prenez 143 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7200 mg, prenez 144 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7250 mg, prenez 145 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7300 mg, prenez 146 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7350 mg, prenez 147 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7400 mg, prenez 148 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7450 mg, prenez 149 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7500 mg, prenez 150 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7550 mg, prenez 151 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7600 mg, prenez 152 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7650 mg, prenez 153 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7700 mg, prenez 154 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7750 mg, prenez 155 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7800 mg, prenez 156 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7850 mg, prenez 157 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7900 mg, prenez 158 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 7950 mg, prenez 159 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8000 mg, prenez 160 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8050 mg, prenez 161 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8100 mg, prenez 162 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8150 mg, prenez 163 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8200 mg, prenez 164 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8250 mg, prenez 165 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8300 mg, prenez 166 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8350 mg, prenez 167 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8400 mg, prenez 168 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8450 mg, prenez 169 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8500 mg, prenez 170 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8550 mg, prenez 171 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8600 mg, prenez 172 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8650 mg, prenez 173 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8700 mg, prenez 174 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8750 mg, prenez 175 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8800 mg, prenez 176 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8850 mg, prenez 177 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8900 mg, prenez 178 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 8950 mg, prenez 179 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9000 mg, prenez 180 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9050 mg, prenez 181 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9100 mg, prenez 182 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9150 mg, prenez 183 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9200 mg, prenez 184 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9250 mg, prenez 185 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9300 mg, prenez 186 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9350 mg, prenez 187 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9400 mg, prenez 188 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9450 mg, prenez 189 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9500 mg, prenez 190 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9550 mg, prenez 191 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9600 mg, prenez 192 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9650 mg, prenez 193 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9700 mg, prenez 194 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9750 mg, prenez 195 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9800 mg, prenez 196 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9850 mg, prenez 197 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9900 mg, prenez 198 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 9950 mg, prenez 199 comprimés une fois par jour. Si votre médecin vous a prescrit une dose quotidienne de 10000 mg, prenez 200 comprimés une fois par jour.

Mode d'administration

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau. Si vous avez pris plus de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg, une fois que vous avez pris une surdose, vous devez consulter immédiatement un médecin. Une surdose peut provoquer une chute de la pression artérielle, des changements de la composition du sang.

DIPREZAR®

Losartan 50 mg + Hydrochlorothiazide 12,5 mg

Comprimé pelliculé, boîte de

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez des questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Qu'est-ce que DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés ?
3. Comment prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé et DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
Cessez pharmacothérapeutique : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques - code ATC : C09DA01
DIPREZAR® est une combinaison d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (losartan) et d'un diurétique (hydrochlorothiazide). L'angiotensine II est une substance produite par votre organisme qui se lie aux récepteurs de l'angiotensine II dans les artères et les vaisseaux sanguins entraînant leur contraction. Cela induit une augmentation de la pression artérielle. Le losartan empêche la liaison de l'angiotensine II à ces récepteurs, empêchant la dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la pression artérielle. L'hydrochlorothiazide permet aux reins d'éliminer plus d'eau et de sel. Cela contribue également à réduire la pression artérielle.
DIPREZAR® est indiquée dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle (pression sanguine élevée).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés ?

Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique au losartan, à l'hydrochlorothiazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique aux autres dérivés sulfamidés (par exemple autres diurétiques thiazidiques, certains antidiabétiques, certains sulfamoxolamoxizide) ; si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre médecin.
- Si votre fonction hépatique est gravement altérée.
- Si vous avez un faible taux de potassium ou de sodium ou un taux élevé de calcium qui ne peuvent pas être corrigés par un traitement.
- Si vous souffrez de goutte.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (il est également préférable d'éviter de prendre DIPREZAR® en début de grossesse - voir rubrique « Grossesse »).
- Si vous avez une maladie cardiaque ou si vos reins ne produisent plus d'urine.
- Si vous souffrez de diabète ou d'insuffisance rénale et que vous êtes traité par un médicament destiné à réduire la pression artérielle contenant de l'lisinopril.

EN CAS DE DOUCE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé :

Mises en garde et précautions particulières d'emploi :

Adresssez-vous à votre médecin, votre pharmacien avant de prendre DIPREZAR®.

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou suspectez de devenir) enceinte. DIPREZAR® est déconseillé en début de grossesse et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

- Il est recommandé de prévenir votre médecin avant de prendre DIPREZAR® :
- Si vous avez déjà eu un gonflement du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue,
 - Si vous prenez des diurétiques,
 - Si vous faites un régime sans sel,
 - Si vous avez ou avez eu des vomissements importants et/ou des diarrhées,
 - Si vous avez une insuffisance cardiaque,
 - Si votre fonction hépatique est altérée (voir rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé »).
 - Si vous avez un rétrécissement des artères rénaliennes (sténose artérielle rénale) ou avez un rein fonctionnel unique, ou si vous avez récemment reçu une transplantation rénale,
 - Si vous avez un rétrécissement des artères (athérosclérose), de l'angine de poitrine (douleur thoracique du fait d'une mauvaise fonction cardiaque),
 - Si vous avez une sténose des valves auriculaire ou mitrale (rétrécissement des valves du cœur) ou une cardiomyopathie hypertrophique (une maladie induisant un épaissement du muscle cardiaque),
 - Si vous avez des diarrhées chroniques,
 - Si vous avez eu de la goutte,
 - Si vous avez ou avez eu des problèmes allergiques, d'asthme ou une maladie donnant des douleurs des articulations, un rash cutané et de la fièvre (lupus érythémateux disséminé),
 - Si vous avez un taux élevé de calcium ou de sel de potassium, ou si vous suivez un régime pauvre en potassium,
 - Si vous devez subir une anesthésie (même chez le dentiste) ou une intervention chirurgicale ou si vous allez faire une visite chez votre dentiste, informez votre médecin ou l'équipe médicale que vous prenez des comprimés de losartan potassique et d'hydrochlorothiazide,
 - Si vous avez une hyperaldostéronisme primaire (un syndrome associé à une augmentation de la sécrétion d'aldostéron suite à une anomalie des glandes surrénales),
 - Si vous prenez un des médicaments suivants destinés à traiter la pression artérielle élevée :
 - Un IEC (par exemple énalapril, lisinopril, ramipril), en particulier si vous avez des problèmes rénaux liés au diabète et/ou à l'insuffisance rénale,
 - Furosemide.

Votre médecin pourra être amené à vérifier votre fonction rénale, votre pression artérielle, et les taux d'électrolytes (du potassium, par exemple) dans votre sang à intervalles réguliers.

Les patients qui prennent de l'HTCT seul ou en association avec d'autres médicaments ont un risque de cancer de la peau non mélanome et il est donc important de détecter toute nouvelle lésion ou modification suspecte.

PPV : 114DH30

PER : 07/25

LOT : L2452



...remarques, mais que l'hydrochlorothiazide, co...
médicaments.

Les préparations à base de lithium ne doivent pas faire l'objet de surveillance stricte de votre médecin.

Des précautions particulières (telles que contrôles supplémentaires, substituts de sel contenant du potassium, d'autres diurétiques, certains laxatifs, médicaments pour contrôler le rythme cardiaque) ou le suivi sont importante pour votre médecin de suivre.

D'autres médicaments pour abaisser votre pression artérielle :

- Des stéroïdes,
- Des médicaments pour le traitement du cancer,
- Des antalgiques,
- Des médicaments pour le traitement d'infections,
- Des médicaments contre l'arthrose,
- Des médicaments pour lutter contre un taux insuffisant de sucre dans le sang,
- Des médicaments myorelaxants,
- Des somnifères,
- Des opioïdes tels que la morphine,
- Des « amines pressives » telles que l'adrénaline,
- Des médicaments antidiabétiques oraux ou du glucose.

Votre médecin peut être amené à modifier la dose. Si vous prenez un IEC ou l'lisinopril (voir également la rubrique 2 « Ne prenez jamais DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimé pelliculé ») et Avertissez votre médecin que vous prenez DIPREZAR® et recevez des produits de contraste iodés.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés

Il est conseillé de ne pas boire d'alcool en prenant DIPREZAR®. Il peut augmenter les effets de l'alcool d'eau. Des quantités excessives de sel dans l'alimentation ou cours ou en dehors des repas.

Grossesse et allaitement :

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être enceinte. Il vous recommandera normalement d'arrêter de prendre DIPREZAR® si vous êtes enceinte. Il vous recommandera de ne pas prendre DIPREZAR® si vous êtes enceinte de plus de 3 mois car cela pourrait nuire gravement à votre enfant. Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes désinvolte pour les femmes qui allaitent et votre souhait d'allaiter.

Sportifs :

Le diurétique contenu dans ce médicament peut entraîner une déshydratation et une déshydratation.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

Lors de l'initiation du traitement par ce médicament, attention particulière (telles que la conduite d'une voiture) : vous ne savez pas comment vous tolérez ce médicament.

DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés

Si votre médecin vous a informé d'une intolérance à ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. Comprimés pelliculés

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant les instructions de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien si la posologie appropriée de DIPREZAR® en fonction de votre état de santé. Il est important de continuer à prendre DIPREZAR® pour empêcher la réapparition de l'hypertension.

Hyperpression :
La posologie habituelle pour la plupart des patients est de prendre DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. une fois par jour. Si nécessaire, votre médecin peut augmenter la dose à 2 comprimés une fois par jour. La posologie peut être augmentée à 1 comprimé par jour de DIPREZAR®. Le dosage maximum par jour est de 1 comprimé pelliculé ou de 1 comprimé par jour de DIPREZAR®.

Mode d'administration

Les comprimés doivent être avalés entiers avec un verre d'eau.

Si vous avez pris plus de DIPREZAR® 50 mg/12,5 mg. ou si vous avez oublié une dose, ne prenez pas de supplément. En cas de surdosage, vous devez consulter immédiatement un service d'urgence. Un surdosage peut provoquer une chute de la pression artérielle, des changements de la composition du sang.