

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0014308

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7673 Société : Royal Air Maroc
 Actif Pensionné(e) Autre : Abu
 Nom & Prénom : BEN BIHI Tijani Abu
 Date de naissance : 13/03/1946
 Adresse : B.P 213 S.1000
 Tél. : 0661 31 62 61 Total des frais engagés : 2802,30 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Dr. DRAQUI KHALID
CARDIOLOGUE
 Place 2 Septembre, Rés. Ennakhil
 3^{eme} Etage, N° 10 - Meknès
 Tel : 05.35.51.00.50

INPE: 131258139

Date de consultation : 19/04/2023
 Nom et prénom du malade : BEN BIHI Tijani Age :
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : Hypertension arterielle et Tachycardie
 Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : El Hafed Le : 05/06/2023

Signature de l'adhérent(e) : El Hafed



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
19.04.23	C.S.+EcG		200,00DH	Dr. DRAOUI KHALID CARDIOLOGUE Place 2 Septembre, Rés. Ennakhil 3 ^{eme} Etage, N° 10 - Meknès Tél : 05.35.51.00.50
19.04.23	EcG + dopples couleurs		6.00,00DH	INPE: !

131258139

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien	Date	Montant de la Facture
Dr. DOUNYA MOHATTANE 42 Avenue Hassan II El Hajeb Tél. : 05 35 54 30 38	19/04/2023	729,90

INPE 132045798

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. DRAOUI KHALID Laboratoire d'Analyses Médicales Dr. NEJJAR Moustapha 6, Rue Pasteur, 10100 Meknès Tél. : 05 35 51 17 31 - Fax : 05 35 51 43 06	03.05.23	Analyses	1273

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux	
				MONTANTS DES SOINS	
				DEBUT D'EXECUTION	
				FIN D'EXECUTION	
				Coefficient des Travaux	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				
	H	25533412	21433552		
		00000000	00000000	MONTANTS DES SOINS	
	D	00000000	00000000	DATE DU DEVIS	
		35533411	11433553	DATE DE L'EXECUTION	
	G				
	B				
		[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



CARDIOLOGUE

Université de Liège - Belgique

Consultation | Echocardiographie | Electrocardiogramme

Test d'effort | Holter de rythme cardiaque | Holter de pression artérielle

Echographie de stress | Echographie par voie oesophagienne | Contrôle de Pacemaker

Meknès, le 19/4/22

M. BENBENI 75AN

18,20x3

suhiat 160/5

18,10x3

1h matin

Cardensiel 6

729,90

1h 25 (1h-9-25h)

Pharmacie Nouvelle
 Mme DOUNYA MOHATTANE
 42, Avenue Hassan II
 El Hajeb
 Tél. : 05 35 54 30 38





Laboratoire d'Analyses Médicales "Nejjar"



Dr NEJJAR M^{ed} Khalid

MEDECIN - BIOLOGISTE

Diplômé de la Faculté de Paris VI

C.E.S D'HEMATOLOGIE - C.E.S BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE CLINIQUE

C.E.S IMMUNOLOGIE GENERALE - C.E.S BACTERIOLOGIE VIROLOGIE SYSTEMATIQUE

HEMOSTASE - TOXICOLOGIE - HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Prescripteur:

Docteur DRAOUI KHALID

Prélèvement du: 03/05/2023

Identification

MR BENBIHI TIJANI

Référence 12K412 du 03/05/2023 à 09:38

Résultats édités le 03/05/2023

-- BILAN THYROIDIEN --

Page: 2/4

TSH ULTRASENSIBLE

Technique : (Chimiluminescence , ELECSYS 2010)

Résultat: 1,530 µUI/ml

0,25 à 5 µUI/ml

-- BIOCHIMIE SANG --

GLYCEMIE A JEUN

Valeurs de référence

Résultat: 1,88 g/l (*)
10,45 mmol/l (*)

0,70 à 1,10 g/l
3,90 à 6,10 mmol/l

Antécédent du 30/12/21 - 10:34 : 1,38 g/l

UREE

0,15 à 0,45 g/l
2,50 à 7,5 mmol/l

Résultat: 0,60 g/l (*)
10,00 mmol/l (*)

Antécédent du 30/12/21 - 10:34 : 0,40 g/l

CREATININE

7 à 13 mg/l
62 à 115 µmol/l

Résultat: 14,90 mg/l (*)
131,87 µmol/l (*)

Antécédent du 30/12/21 - 10:34 : 13,90 mg/l

SODIUM

130 à 140 mEq/l

Résultat: 139,10 mEq/l

الختام
Laboratoire d'Analyses Médicales
Dr NEJJAR Med. Khalid
6, Rue Pasteur - MEKNÈS
Tél. 05.35.51.25.31 - Fax 05.35.51.13.30





Laboratoire d'Analyses Médicales "Nejjar"



Dr NEJJAR M^{ed} Khalid

MÉDECIN - BIOLOGISTE

Diplômé de la Faculté de Paris VI

C.E.S D'HEMATOLOGIE - C.E.S BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE CLINIQUE

C.E.S IMMUNOLOGIE GENERALE - C.E.S BACTERIOLOGIE VIROLOGIE SYSTEMATIQUE

HEMOSTASE - TOXICOLOGIE - HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Prescripteur:

Docteur DRAOUI KHALID

Prélèvement du: 03/05/2023

Identification

MR BENBIHI TIJANI

Référence 12K412 du 03/05/2023 à 09:38

Résultats édités le 03/05/2023

POTASSIUM

Résultat: 4,49 mEq/l

3,5 à 5,0 mEq/l

Page: 3/4

CALCIUM

Résultat: 86,00 mg/l
2,15 mmol/l

80 à 110 mg/l
2 à 2,75 mmol/l

CHLORE

Résultat: 107,00 mEq/l

95 à 110 mEq/l

PHOSPHORE

Résultat: 30,30 mg/l
0,98 mmol/l

25 à 45 mg/l
0,80 à 1,45 mmol/l

RESERVE ALCALINE

Résultat: 24,06 mEq/l

24 à 30 mEq/l

PROTIDES

Résultat: 79,30 g/l

60 à 80 g/l

CHOLESTEROL TOTAL

Résultat: 1,83 g/l
4,71 mmol/l

1,5 à 2 g/l
3,86 à 5,15 mmol/l

Antécédent du 09/11/20 - 08:59 : 1,50 g/l

CHOLESTEROL HDL

Résultat: 0,59 g/l
1,52 mmol/l

Sup à 0,4 g/l
Sup à 1,03 mmol/l

Antécédent du 09/11/20 - 08:59 : 0,40 g/l

مختبر البحوث الطبية
Laboratoire d'Analyses Médicales
Dr NEJJAR Med. Khalid
6, Rue Pasteur - MEKNÈS
Tél. 05.35.51.25.31 - Fax: 05.35.51.13.30





Laboratoire d'Analyses Médicales " Nejjar "



Dr NEJJAR M^{ed} Khalid

MEDECIN - BIOLOGISTE

Diplômé de la Faculté de Paris VI

C.E.S D'HEMATOLOGIE - C.E.S BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE CLINIQUE

C.E.S IMMUNOLOGIE GENERALE - C.E.S BACTERIOLOGIE VIROLOGIE SYSTEMATIQUE

HEMOSTASE - TOXICOLOGIE - HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE

Prescripteur:

Docteur DRAOUI KHALID

Prélèvement du: 03/05/2023

Identification

MR BENBIHI TIJANI

Référence 12K412 du 03/05/2023 à 09:38

Résultats édités le 03/05/2023

CHOLESTEROL LDL

Page: 4/4

Résultat: 0,73 g/l (*) 1,08 à 1,88 g/l

Antécédent du 09/11/20 - 08:59 : 0,72 g/l

TRIGLYCERIDES

Résultat: 2,57 g/l (*) 0,60 à 1,50 g/l
2,93 mmol/l (*) 0,68 à 1,71 mmol/l

Antécédent du 09/11/20 - 08:59 : 1,91 g/l

ACIDE URIQUE

Résultat: 47,00 mg/l 25 à 70 mg/l
279,65 µmol/l 178,5 à 416,5 µmol/l

Antécédent du 09/11/20 - 08:59 : 35,24 mg/l

HEMOGLOBINE GLYQUEE HbA1C

Technique : (HPLC, BIO-RAD D-10)

Résultat: 7,72 % (*) 3,5 à 7 %

Antécédent du 30/12/21 - 10:34 : 6,83 %

Total de pages: 4

الطبية
Laboratoire
Dr. NEJJAR MED.
6, Rue Pasteur - MEKNÈS
Tél. 05.35.51.25.31 - Fax 05.35.51.13.80



MEKNES LE: 19/04/2023

FACTURE

Identité du patient : BENBIHI TIJANI

Date de naissance : 13/03/1946

-Consultation + ECG de repos: 200 DHS

-Echocardiographie Doppler couleur : 600 DHS

Arrêtée la présente facture à la somme de : 800 DIRHAMS

Dr. DRAOUI KHALID
CARDIOLOGUE
Place 2 Septembre, Rés. Ennakhil
3^{ème} Etage, N° 10 - Meknès
Tél : 05.35.51.00.50



CARDIOLOGUE

Université de Liège - Belgique

Consultation | Echocardiographie | Electrocardiogramme

Test d'effort | Holter de rythme cardiaque | Holter de pression artérielle

Echographie de stress | Echographie par voie oesophagiennne | Contrôle de Pacemaker

Meknès, le 13-4-23

13-4-23

Mr. BENBIGH TIGANE

F - SVC


- NFS
 - Songen completed
 - Ac mig
 - HS glycine
bulbful not J

u, 140

... 60

Triglycerides

TS4



سادة 2 شتبر، إقامة النخيل الطابق الثالث رقم 10 - مكناس (أمام القصر البلدي)

Place 2 septembre, Rés. Ennakhil, 3^{ème} Etage N°10 - Meknès (en face du palais municipal)

cardiologiemeknes@gmail.com - Tél.: 05 35 51 00 50 - INPE : 131 258 139



LABORATOIRE NEJJAR D'ANALYSES MEDICALES

6, Rue Pasteur. Appt 3. 1er Etage (V.N). MEKNES

Tél: 05.35.51.25.31 - Fax: 05.35.51.43.06

R.C: 30996 -- CNSS: 2223262 -- PATENTE: 17109226 -- IF: 309591 -- ICE: 001648398000055

FACTURE: 74086/2023

MEKNES le 03/05/2023
Nom et prénom MR BENBIHI TIJANI
Référence 12K412
Docteur DRAOUI KHALID

Acte de biologie demandé	Cotation (B)
NFS. HEMOGRAMME	80
GLYCEMIE A JEUN	30
UREE (AZOTEMIE, UREMIE)	30
CREATININE SERIQUE	30
SODIUM SERIQUE (NATREMIE, NA)	30
POTASSIUM SERIQUE (KALIEMIE, K)	30
CALCIUM SERIQUE (CALCEMIE, CA)	30
CHLORE SERIQUE (CHLOREMIE, CL)	30
RESERVE ALCALINE BICARBONATES (RA)	30
PROTIDES	30
PHOSPHORE SERIQUE	30
ACIDE URIQUE SERIQUE (URICEMIE)	30
Hb GLYCOSYLEE. HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE	100
CHOLESTEROL TOTAL	30
CHOLESTEROL HDL	50
LDL, CHOLESTEROL LDL	50
TRIGLYCERIDES	60
TSH ULTRASENSIBLE	250
Total du (B)	B 950
Prélèvement	0,00 DH
Montant en DH	1 273,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de: MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE DIRHAMS

جامعة الدراسات العليا
Laboratoire d'Analyses Médicales
Dr. NEJJAR Khalid
6, Rue Pasteur. Appt. 3 1er Etage
(V.N) MEKNES
Tél: 05 35 51 25 31 - Fax: 05 35 51 43 06

CARDENSIEL



mé pelliculé

Bisoprolol Fuma

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL :

CARDENSIEL



mé pelliculé

Bisoprolol Fuma

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL :

CARDENSIEL



mé pelliculé

Bisoprolol Fuma

Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la classe de médicaments appelés bêtabloquants.

Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines impulsions nerveuses, en particulier au niveau du cœur. Le bisoprolol ralentit ainsi le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans l'ensemble du corps.

L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable de pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque chronique stable. Ce produit est utilisé en association avec d'autres médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou IEC, les diurétiques et les glycosides cardiaques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARDENSIEL ?

Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique 6),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), pouvant entraîner des picotements dans les doigts et les orteils ou les faire pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines de médicaments amplifiant la force de contraction de votre cœur,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la pression artérielle et une insuffisance de la circulation sanguine.

Faites attention avec CARDENSIEL :

SULIAT®

80 mg/5 mg

160 mg/10 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14, 28 et 56

Valsartan / Amlodipine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la revoir.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'info.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Identifiez-vous aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous :

de leur maladie sont
au à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3- Comment prendre SULIAT® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle.



SULIAT® 160 mg/5 mg
28 comprimés pelliculés

Liste de

Contre-indications

Ne prenez jamais SULIAT®, car :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopiprane, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).
- Si vous présentez une bosse sévère de la pression artérielle (hypertension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'oléate de zinc.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive) ou une sténose aortique.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde.

185,20

(hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par

NAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?
Avant de prendre ce médicament :

Évitez dans les cas suivants :

à votre pharmacien.

SULIAT®

80 mg/5 mg

160 mg/10 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14, 28 et 56

Valsartan / Amlodipine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la revoir.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'info.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Identifiez-vous aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous :

de leur maladie sont
au à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3- Comment prendre SULIAT® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle.



SULIAT® 160 mg/5 mg
28 comprimés pelliculés

Liste de

Contre-indications

Ne prenez jamais SULIAT®, si :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopiprane, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).
- Si vous présentez une bosse sévère de la pression artérielle (hypertension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'oléate de zinc.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive) ou une sténose aortique.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde.

185,20

(hypertension), chez les patients adultes dont la tension artérielle n'est pas suffisamment contrôlée soit par

NAÎTRE AVANT DE PRENDRE SULIAT® ?
Avant de prendre ce médicament :

Évitez dans les cas suivants :

à votre pharmacien.

SULIAT®

80 mg/5 mg

160 mg/10 mg

Comprimés pelliculés, boîtes de 14, 28 et 56

Valsartan / Amlodipine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la revoir.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'info.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous :

de leur maladie sont
au à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1- Qu'est-ce que SULIAT® et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre SULIAT® ?
- 3- Comment prendre SULIAT® ?
- 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5- Comment conserver SULIAT® ?
- 6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE SULIAT® ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

SULIAT® contiennent deux substances actives : Valsartan et Amlodipine. Ces substances sont dotées de mécanismes complémentaires pour le contrôle de la tension artérielle.



SULIAT® 160 mg/5 mg
28 comprimés pelliculés

Liste de

Contre-indications

Ne prenez jamais SULIAT®, car :

- Si vous êtes allergique au valsartan, à l'amlopiprane, aux dihydropyridines ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament. Si vous pensez que vous pouvez être allergique, ne prenez pas SULIAT® et parlez-en à votre médecin.
- Si vous avez de graves problèmes hépatiques ou des problèmes biliaires tels que cirrhose biliaire ou cholestase.
- Si vous êtes enceinte de plus de 3 mois. (Il est également recommandé d'éviter de prendre SULIAT® en début de grossesse).
- Si vous présentez une bosse sévère de la pression artérielle (hypertension sévère).
- Si vous avez de graves problèmes rénaux ou si vous êtes sous dialyse.
- Si vous présentez un diabète ou une insuffisance rénale ($DFG < 60 \text{ ml}/\text{min}/1,73 \text{ m}^2$) et vous avez l'association de SULIAT® à des médicaments contenant de l'oléïne.
- Si vous présentez un choc, y compris choc cardiogénique (une affection dans laquelle votre cœur est incapable d'apporter suffisamment de sang à l'organisme).
- Si vous présentez une obstruction de la voie d'éjection du ventricule gauche (par exemple, cardiomyopathie hypertrophique obstructive) et sténose aortique.
- Si vous avez une insuffisance cardiaque après un infarctus aigu du myocarde.

à votre pharmacien.

185,20