

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : plc@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

## Déclaration de Maladie

N° W21-800689

169382



<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent (e)			
Matricule : <b>11365</b>	Société : <b>R.A.M</b>		
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : <b>ANASS BEN ZAIDOUNE</b>			
Date de naissance :			
Adresse :			
Tél. : <b>0667227844</b> Total des frais engagés : _____ Dhs			

Autorisation CNDP N° : A-A-215/2019

Cadre réservé au Médecin	
<b>Dr Radda MIKOU</b> <b>Chirurgien Ophthalmologiste</b> 18, Avenue Stendhal Casablanca .SC Tél. : (+212) 0528 47 15 94 E-mail : r.mikou@cliniquestendhal.com	
Cachet du médecin :	
Date de consultation :	<b>18/05/2023</b>
Nom et prénom du malade :	<b>EL Bedoui Ghizlane</b>
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	<b>Affection cutanée</b>
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :	
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ de l'adhérent(e) : \_\_\_\_\_

**MUPRAS** **ACCUEIL** **BOZACHANE**

**17 JUIN 2023**

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/05/2023	Actes	30,00 dh		INP : 091168336 Dr Reda MIKOU Chirurgien Ophtalmologiste 18, Avenue Stendhal Casablanca SC Tél : (+212) 0522 47 15 94 redamikou@gmail.com

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture

## **ANALYSES - RADIOPHARMACIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 18, Avenue Stendhal Casablanca Tel : 0522 47 15 00 Fax : 0522 99 34 34  18, Avenue Stendhal, SC Casablanca Fax : 0522 99 34 34	18/05/23	18/05/23 OCT	1.000,00 dh

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

#### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

### (Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

## Coefficient des travaux

## MONTANTS DES SOINS

DÉBUT  
D'EXÉCUTION

FIN  
D'EXECUTION

## COEFFICIENT DES TRAVAILX

## MONTANTS DES SOINS

DATE DU  
DEVIS

DATE DE  
L'EXECUTION

18/05/2023

## OCT RNFL

**Mme Ghizlane EL BEDOUI**

### Analyse de la couche des fibres optiques

- **ODG** : Épaisseur de la couche des fibres optiques dans les limites normales dans 4 quadrants **et ce, en comparaison avec les données de la base normative.**
- Épaisseur moyenne OD: 101 µm/ Épaisseur moyenne OG:103 µm
- C/d vertical: OD:0.63 et OG: 0.65
- Symétrie RNFL :85 %

### Analyse de la couche des cellules ganglionnaires

- **OD**: épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires **asymétrique** entre les deux hémi-rétines supérieur et inférieur dans la région maculaire
- **OG**: épaisseur de la couche des cellules ganglionnaires **symétrique** entre les deux hémi-rétines supérieur et inférieur dans la région maculaire
- **CCG OD**: 75 µm normale / **OG** 81 µm normale

Casablanca le 18/05/2023

## Compte'Rendu du champ visuel automatisé

Cher docteur,

L'examen du champ visuel de Mme EL BEDOUI Ghizlane , âgée de 51 ans et 0 Mois montre au seuil central 24-2 Sita-Standard

### Au Blanc-Blanc

#### L'œil droit :

**Les indices de fiabilités :** - Pertes de fixation : 0/0 - faux positifs : 12% - Faux négatifs : 4%

**Seuil fovéal :** 34 dB

**Indices globaux :** MD : -0.05 dB PSD : 1.72dB

- Test hémichamp glaucomateux dans les limites normales

#### L'œil gauche :

**Les indices de fiabilités :** - Pertes de fixation : 0/4 - faux positifs : 3% - Faux négatifs : 0%

**Seuil fovéal :** 36 dB

**Indices globaux :** MD : 0.56 dB PSD : 1.70dB

- Test hémichamp glaucomateux dans les limites normales

#### Conclusion :

Donc l'examen du champ visuel au blanc-blanc montre

- Au niveau de l'œil droit : dans les limites normales

- Au niveau de l'œil gauche: dans les limites normales

Bien à vous

CLINIQUE STENDHAL  
18, Avenue Stendhal, SC  
Casablanca  
Tél. : 0522 47 15.94 - Fax : 0522 99 34 51

CLINIQUE STENDHAL - SARL AU

18, Avenue Stendhal – Cité Plateau – Casablanca – Tél : 05 22.47.15.94 – Fax 05 22.99.34.51

Patente N° : 34701064 – Ident. Fisc. : 20697395 – C.N.S.S. : 5200738 – ICE : 01754572000095

R.C. : 362219 – E-mail : ophtalmologie@cliniquestendhal.com

090063488


**F A C T U R E**

 N° **255** / 2023 du **18/05/2023**

Nom patient	<b>EL BEDOUI GHIZLANE</b>	Entrée <b>18/05/2023</b>	Sortie <b>18/05/2023</b>
Prise en charge	<b>PAYANT</b>		

**CHAMPS VISUEL**

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
CHAMPS VISUEL	<b>1,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			Sous-Total	500,00
<b>Total</b>				<b>500,00</b>

**Total général 500,00**
*Arrêtée la présente facture à la somme de :  
CINQ CENTS DIRHAMS*

	Espèces				Total encaissé	Solde
Encaissements	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>


 CLINIQUE STENDHAL  
 18, Avenue Stendhal, SC  
 Casablanca  
 Tél. : 0522 47 15 94 - Fax : 0522 99 34 51

**CLINIQUE STENDHAL** - SARL AU

18, Avenue Stendhal – Cité Plateau – Casablanca – Tél : 05 22.47.15.94 – Fax 05 22.99.34.51

Patente N° : 34701064 – Ident. Fisc. : 20697395 – C.N.S.S. : 5200738 – ICE : 01754572000095

R.C. : 362219 – E-mail : ophtalmologie@cliniquestendhal.com


**F A C T U R E**

 N° **254** / 2023 du **18/05/2023**

Nom patient	<b>EL BEDOUI GHIZLANE</b>	Entrée	Sortie
Prise en charge	<b>PAYANT</b>	<b>18/05/2023</b>	<b>18/05/2023</b>

**OCT**

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
OCT	1,00		1 000,00	1 000,00
			Sous-Total	1 000,00
<b>Total</b>				<b>1 000,00</b>

**Total général 1 000,00**
*Arrêtée la présente facture à la somme de :*  
 MILLE DIRHAMS

	Espèces				Total encaissé	Solde
Encaissements	1 000,00				1 000,00	0,00


  
 18, Avenue Stendhal, SC  
 Casablanca  
 Tél: 0522 47 15 94 - Fax: 0522 99 34 51

Dr. Reda MIKOU

Ophtalmologiste

Chirurgie Vitreo-Rétinienne



CLINIQUE STENDHAL

Ancien interne des hôpitaux de france

Ancien assistant Spécialiste a l'Hôtel-Dieu de Paris

Titulaire de l'European Board of Ophthalmology

Diplômé de Chirurgie Vitreo-Rétinienne - Dijon

Diplôme d'imagerie et de pathologie Rétinienne - Lariboisière paris VII

الدكتور رضي ميكو

طب العيون

اختصاصي في جراحة الشبكية



PT210913152306

18 mai 2023

Mme EL BEDOUI Ghizlane

AGE, 10 x 3

DUOTRAV: collyre cl



1 goutte 1 fois par jour, le soir, dans les deux yeux, pendant 3 Mois

576,30

PHARMACIE AL NASSIRA  
51, Rue Rahal Ben Ahmed  
Dr. Mme BEN OUSSA Ouafae  
Tél : 05 22 24 80 54  
Fax : 05 22 24 85 44

Dr Reda MIKOU  
Chirurgien Ophtalmologiste  
18, Avenue Stendhal - Casablanca  
Tél. : (+212) 0522 47 15 94  
E-mail : r.mikou@cliniquestendhal.com

18, Avenue Stendhal - Cité Plateau - Casablanca

Tél : (+212) 05 22 47 15 94 - Fax : (+212) 05 22 99 34 51

E-mail : ophtalmologie@cliniquestendhal.com

Dr. Reda MIKOU

Ophtalmologiste

Chirurgie Vitréo-Rétinienne

CLINIQUE STENDHAL

الدكتور رضى ميكو

طب العيون

اختصاصي في جراحة الشبكية

Ancien interne des hôpitaux de france

Ancien assistant Spécialiste a l'Hôtel-Dieu de Paris

Titulaire de l'European Board of Ophthalmology

Diplôme de Chirurgie Vitréo-Rétinienne - Dijon

Diplôme d'imagerie et de pathologie Rétinienne - Lariboisière paris VII



PT210913152306

18 mai 2023

Mme EL BEDOUI Ghizlane

OCT

CHAMP VISUEL

Dr Reda MIKOU  
Chirurgien Ophtalmologiste  
18, Avenue Stendhal Casablanca SC  
Tél. : (+212) 0522 47 15 94  
E-mail : r.mikou@cliniquestendhal.com

CLINIQUE STENDHAL  
18, Avenue Stendhal, SC  
Casablanca  
Tél. : 0522 47 15 94 - Fax: 0522 99 34 51

18, Avenue Stendhal - Cité Plateau - Casablanca

Tél : (+212) 05 22 47 15 94 - Fax : (+212) 05 22 99 34 51

E-mail : ophtalmologie@cliniquestendhal.com



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

## DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

## Travoprost/Timolol

Flacon de 25 ml

**Veuillez lire attentivement car elle contient des informations importantes pourriez avoir besoin de l'utiliser.**  
Si vous avez d'autres questions, veuillez en parler à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit par un autre, cela pourrait lui être utile pour vos vôtres.  
Si l'un des effets indésirables n'a pas été mentionné dans cette notice, veuillez le faire savoir.

Lot 2

EXP

2NLC1C  
06 2024

**DUOTRAV**

40 microgrammes/mL + 5 mg/mL collyre en solution  
**travoprost/timolol**

## Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav ?  
 2- Quelles sont les informations ?  
 3- Comment utiliser DuoTrav ?  
 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?  
 5- Comment conserver DuoTrav ?  
 6- Informations supplémentaires.

## 1- QU'EST-CE QUE DuoTrav ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILE ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol). Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.

DuoTrav collyre est utilisé pour traiter une pression élevée à l'intérieur de l'œil chez les adultes, incluant les personnes âgées. Cette pression peut conduire à une maladie appelée glaucome.

## 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DuoTrav ?

N'utilisez jamais DuoTray :

- si vous êtes allergique au travoprost, aux prostaglandines, au timolol, aux bêta-bloquants ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
  - si vous souffrez ou avez souffert de troubles respiratoires graves tels que l'asthme, une bronchite chronique obstructive sévère (une maladie pulmonaire sévère qui peut entraîner une respiration sifflante, une gêne respiratoire et/ou une toux persistante) ou d'autres types de troubles respiratoires.
  - si vous avez un rhume des foins sévère.
  - si vous avez un rythme cardiaque lent, une insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme cardiaque (battements irréguliers du cœur).
  - si vous souffrez de troubles de la surface oculaire.

Demandez l'avis de votre médecin si vous êtes atteint par un de ces troubles.

## Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser DuoTrav si vous avez actuellement ou si vous avez eu dans le passé :

- une maladie coronarienne (dont les symptômes peuvent être une douleur ou une oppression thoracique, une difficulté à respirer, ou une suffocation), une insuffisance cardiaque, ou une pression artérielle basse.
  - des troubles du rythme cardiaque tels qu'un rythme cardiaque lent.
  - des problèmes respiratoires, de l'asthme ou une bronchite chronique obstructive.
  - des problèmes de circulation sanguine (tels que la maladie de Raynaud ou le syndrome de Raynaud).
  - du diabète (parce que le timolol peut masquer les signes et symptômes d'un faible taux de sucre dans le sang).
  - un excès d'hormones thyroïdiennes (parce que le timolol peut masquer les signes et symptômes d'une maladie de la thyroïde).
  - une myasthénie grave (faiblesse neuromusculaire chronique).
  - une chirurgie de la cataracte.
  - une inflammation de l'œil.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, prévenez votre médecin que vous utilisez Duotrace car le timolol peut modifier les effets de certains médicaments utilisés lors de l'intervention.

Si vous avez une réaction allergique sévère (éruption cutanée, rougeur et démangeaisons de l'œil) en utilisant DuoTrav, quelle qu'en soit la cause, le traitement paradrénaline peut ne pas s'avérer efficace. Si l'on vous prescrit un autre traitement, prévenez votre médecin que vous utilisez DuoTrav. DuoTrav peut modifier la couleur de votre iris (partie colorée de votre œil). Ce changement peut être permanent.

QlipTray peut augmenter la luminosité d'un écran de 10 à 20 %.

Il peut augmenter la longueur, l'épaisseur, la couleur et entraîner une nécrosé ciliaire normale sur vos paupières.

Ensuite, tester si une extrémité de la poudre de cristallin gonflement d'une portion du cristallin, gonflement d'une



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

## DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

## Travoprost/Timolol

Flacon de 25 ml

Veuillez lire attentivement car elle contient des informations que vous pourriez avoir besoin de lire. Si vous avez d'autres questions, veuillez en parler à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit par un autre, cela pourrait lui être utile pour vos vôtres. Si l'un des effets indésirables n'a pas été mentionné dans cette liste.

Lot 2

EXP

2NLC1C  
06 2024

**DUOTRAV**

40 microgrammes/mL + 5 mg/mL collyre en solution  
**travoprost/timolol**

## Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav ?  
2- Quelles sont les informations ?  
3- Comment utiliser DuoTrav ?  
4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?  
5- Comment conserver DuoTrav ?  
6- Informations supplémentaires.

## 1- QU'EST-CE QUE DuoTrav ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILE ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol). Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.

DuoTrav collyre est utilisé pour traiter une pression élevée à l'intérieur de l'œil chez les adultes, incluant les personnes âgées. Cette pression peut conduire à une maladie appelée glaucome.

## 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DuoTrav ?

N'utilisez jamais DuoTray :

- si vous êtes allergique au travoprost, aux prostaglandines, au timolol, aux bêta-bloquants ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
  - si vous souffrez ou avez souffert de troubles respiratoires graves tels que l'asthme, une bronchite chronique obstructive sévère (une maladie pulmonaire sévère qui peut entraîner une respiration sifflante, une gêne respiratoire et/ou une toux persistante) ou d'autres types de troubles respiratoires.
  - si vous avez un rhume des foins sévère.
  - si vous avez un rythme cardiaque lent, une insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme cardiaque (battements irréguliers du cœur).
  - si vous souffrez de troubles de la surface oculaire.

Demandez l'avis de votre médecin si vous êtes atteint par un de ces troubles.

#### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser DuoTrav si vous avez actuellement ou si vous avez eu dans le passé :

- une maladie coronarienne (dont les symptômes peuvent être une douleur ou une oppression thoracique, une difficulté à respirer, ou une suffocation), une insuffisance cardiaque, ou une pression artérielle basse.
  - des troubles du rythme cardiaque tels qu'un rythme cardiaque lent.
  - des problèmes respiratoires, de l'asthme ou une bronchite chronique obstructive.
  - des problèmes de circulation sanguine (tels que la maladie de Raynaud ou le syndrome de Raynaud).
  - du diabète (parce que le timolol peut masquer les signes et symptômes d'un faible taux de sucre dans le sang).
  - un excès d'hormones thyroïdiennes (parce que le timolol peut masquer les signes et symptômes d'une maladie de la thyroïde).
  - une myasthénie grave (faiblesse neuromusculaire chronique).
  - une chirurgie de la cataracte.
  - une inflammation de l'œil.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, prévenez votre médecin que vous utilisez Duotrace car le timolol peut modifier les effets de certains médicaments utilisés pendant l'anesthésie. Si vous avez une réaction allergique sévère (éruption cutanée, etc.) à l'un des ingrédients, arrêtez immédiatement l'utilisation de Duotrace et consultez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction allergique sévère (éruption cutanée, rougeur et démangeaisons de l'œil) en utilisant DuoTrav, quelle qu'en soit la cause, le traitement paradrénaline peut ne pas s'avérer efficace. Si l'on vous prescrit un autre traitement, prévenez votre médecin que vous utilisez DuoTrav. DuoTrav peut modifier la couleur de votre iris (partie colorée de votre œil). Ce changement peut être permanent.

DuoTrav peut augmenter la longueur, l'épaisseur, la couleur et/ou le nombre de vos cils et peut entraîner une croissance anormale sur vos paupières.



## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

## DuoTrav® 40 microgrammes/mL + 5 mg/mL Collyre en solution

## Travoprost/Timolol

Flacon de 25 ml

Veuillez lire attentivement car elle contient des informations importantes que vous pourriez avoir besoin de lire. Si vous avez d'autres questions, veuillez en parler à votre médecin, ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit par un autre, cela pourrait lui être utile pour vos vôtres. Si l'un des effets indésirables n'a pas été mentionné dans cette

Lot 2

EXP

2NLC1C  
06 2024

**DUOTRAV**

40 microgrammes/mL + 5 mg/mL collyre en solution  
**travoprost/timolol**

## Que contient cette notice ?

- 1- Qu'est-ce que DuoTrav ?  
 2- Quelles sont les informations ?  
 3- Comment utiliser DuoTrav ?  
 4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?  
 5- Comment conserver DuoTrav ?  
 6- Informations supplémentaires.

## 1- QU'EST-CE QUE DuoTrav ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILE ?

DuoTrav collyre en solution est une association de deux principes actifs (travoprost et timolol). Le travoprost est un analogue des prostaglandines qui agit en augmentant l'évacuation de liquide aqueux de l'œil, ce qui diminue la pression. Le timolol est un bêta-bloquant qui agit en réduisant la production de liquide à l'intérieur de l'œil. Les deux composants agissent ensemble pour réduire la pression à l'intérieur de l'œil.

DuoTrav collyre est utilisé pour traiter une pression élevée à l'intérieur de l'œil chez les adultes, incluant les personnes âgées. Cette pression peut conduire à une maladie appelée glaucome.

## 2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DuoTray ?

N'utilisez jamais DuoTray :

- si vous êtes allergique au travoprost, aux prostaglandines, au timolol, aux bêta-bloquants ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
  - si vous souffrez ou avez souffert de troubles respiratoires graves tels que l'asthme, une bronchite chronique obstructive sévère (une maladie pulmonaire sévère qui peut entraîner une respiration sifflante, une gêne respiratoire et/ou une toux persistante) ou d'autres types de troubles respiratoires.
  - si vous avez un rhume des foins sévère.
  - si vous avez un rythme cardiaque lent, une insuffisance cardiaque ou des troubles du rythme cardiaque (battements irréguliers du cœur).
  - si vous souffrez de troubles de la surface oculaire.

Demandez l'avis de votre médecin si vous êtes atteint par un de ces troubles.

#### Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser DuoTrav si vous avez actuellement ou si vous avez eu dans le passé :

- une maladie coronarienne (dont les symptômes peuvent être une douleur ou une oppression thoracique, une difficulté à respirer, ou une suffocation), une insuffisance cardiaque, ou une pression artérielle basse.
  - des troubles du rythme cardiaque tels qu'un rythme cardiaque lent.
  - des problèmes respiratoires, de l'asthme ou une bronchite chronique obstructive.
  - des problèmes de circulation sanguine (tels que la maladie de Raynaud ou le syndrome de Raynaud).
  - du diabète (parce que le timolol peut masquer les signes et symptômes d'un faible taux de sucre dans le sang).
  - un excès d'hormones thyroïdiennes (parce que le timolol peut masquer les signes et symptômes d'une maladie de la thyroïde).
  - une myasthénie grave (faiblesse neuromusculaire chronique).
  - une chirurgie de la cataracte.
  - une inflammation de l'œil

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, prévenez votre médecin que vous utilisez Duotrov car le timolol peut modifier les effets de certains médicaments utilisés pendant l'anesthésie. Si vous avez une réaction allergique sévère à l'acétaminophénol, ne prenez pas Duotrov.

Si vous avez une réaction allergique sévère (éruption cutanée, rougeur et démangeaisons de l'œil) en utilisant DuoTrav, quelle qu'en soit la cause, le traitement paradrénaline peut ne pas s'avérer efficace. Si l'on vous prescrit un autre traitement, prévenez votre médecin que vous utilisez DuoTrav. DuoTrav peut modifier la couleur de votre iris (partie colorée de votre œil). Ce changement peut être permanent.

DuoTrav peut augmenter la longueur, l'épaisseur, la couleur et/ou le nombre de vos cils et peut entraîner une nécrosé ciliaire normale sur une période.