

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0010456

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3273 Société : A64947

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : EL BAADI HAFID

Date de naissance : 1950

Adresse : N° 41 HASSAN II, BOULANGERIE CASA

Tél. : 0661826830 Total des frais engagés : 653 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr MIKOU A.
ENDOCRINOLOGIE DIABETE
39, BD. RAHAL EL MESKINI - CASA
TEL: 022 31 16 30 - FAX: 022 31 06 74

Date de consultation : 16/03/2023

Nom et prénom du malade : SABOUR Bachida Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous un caractère confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 16/03/2023

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/03/23	CS		300,- 0.0	MIKOU A LE DIABETE 00-145-022 31 06 24

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Numéro de la Facture
	10/03/23	35810

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Nom et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur MIKOU Abdelhaq

Diplômé de la faculté de
Médecine de Toulouse
Spécialiste en
Endocrinologie - Diabète
Maladies de la nutrition

Obésité - Maigreur - Maladies du Cholestérol
- Goître -

- Goitre -

Sur Rendez-vous

Membre de :

- **SFD** Société Francophone du Diabète
 - **EASD** Association Européenne pour l'Etude du Diabète.
 - **MGSD** Groupe Méditerranéen pour l'Etude du Diabète

Casablanca le

16 MAY 2003

Traitement Pour 3 Mois

DIAFORMINE® 1000 mg

METFORMINE

CO

Ch

Ex

FO

Co

CL

Ant

DA

As

du

Ch

Ch

AT

IN

DIA

* hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine.

* en cas de diabète de type 2.

* si

aucun symptôme de diabète.

* en cas de maladie rénale.

* si

si vous prenez des médicaments contenant de l'acide folique.

* si

en cas de maladie cardiaque.

* en cas de maladie pulmonaire.

* si

en cas de maladie hépatique.

* si

en cas de maladie thyroïdienne.

* si

en cas de maladie rénale.

* si

en cas de maladie cardiaque.

* si

en cas de maladie pulmonaire.

* si

en cas de maladie hépatique.

* si

en cas de maladie thyroïdienne.

* si

en cas de maladie rénale.

* si

en cas de maladie cardiaque.

* si

en cas de maladie pulmonaire.

* si

en cas de maladie hépatique.

* si

en cas de maladie thyroïdienne.

* si

en cas de maladie rénale.

* si

en cas de maladie cardiaque.

* si

en cas de maladie pulmonaire.

* si

en cas de maladie hépatique.

* si

en cas de maladie thyroïdienne.

Diaformine® 1000 mg
Metformine

30 comprimés pelliculés



F P V 2 1 D H 0 0
P E R 0 2 / 2 6
L G T M 6 9 0

C'est un antidiabétique oral destiné au traitement

du diabète de type 2. Il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

NE DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

AMAIS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- à l'un des constituants du produit,

rée. (défaillance des reins avec

broncho-pulmonaire, infection urinaire),
utilisant des produits radiographiques iodés,

1000 mg comprimé pelliculé :

maux abdominaux accompagnées de
la grande fatigue, peut être le signe d'un

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport glucidique au cours de la journée.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, bactérienne ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire. La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (Corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol, et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du salbutamol ou de la terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

DIAFORMINE® 1000 mg

METFORMINE

CO

Ch

Ex

FO

Co

CL

Ant

DA

As

du

Ch

Ch

AT

IN

DIA

* hypersensibilité connue au chlorhydrate de metformine.

* en cas de diabète de type 2.

* si

aucun symptôme de diabète.

* en cas de maladie rénale.

* si

si vous prenez des médicaments contenant de l'acide folique.

* si

en cas de maladie cardiaque.

* en cas de maladie pulmonaire.

* si

en cas de maladie hépatique.

* si

en cas de maladie thyroïdienne.

* si

en cas de maladie rénale.

* si

en cas de maladie cardiaque.

* si

en cas de maladie pulmonaire.

* si

en cas de maladie hépatique.

* si

en cas de maladie thyroïdienne.

* si

en cas de maladie rénale.

* si

en cas de maladie cardiaque.

* si

en cas de maladie pulmonaire.

* si

en cas de maladie hépatique.

* si

en cas de maladie thyroïdienne.

* si

en cas de maladie rénale.

* si

en cas de maladie cardiaque.

* si

en cas de maladie pulmonaire.

* si

en cas de maladie hépatique.

* si

en cas de maladie thyroïdienne.

Diaformine® 1000 mg
Metformine

30 comprimés pelliculés



F P V 2 1 D H 0 0
P E R 0 2 / 2 6
L G T M 6 9 0

C'est un antidiabétique oral destiné au traitement

du diabète de type 2. Il peut être prescrit seul ou en association avec l'insuline.

NE DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé.

AMAIS ETRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- à l'un des constituants du produit,

rée. (défaillance des reins avec

broncho-pulmonaire, infection urinaire),
utilisant des produits radiographiques iodés,

1000 mg comprimé pelliculé :

maux abdominaux accompagnées de
la grande fatigue, peut être le signe d'un

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :

Tous les patients doivent poursuivre le régime alimentaire, avec une répartition régulière de l'apport glucidique au cours de la journée.

Les patients en surcharge pondérale, doivent poursuivre le régime hypocalorique. Votre médecin pourra vérifier votre fonction rénale par un dosage de la créatinine dans le sang. Celle-ci doit être satisfaisante car l'élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Vous devez faire appel à votre médecin, pour tout traitement associé et toute maladie infectieuse, bactérienne ou virale : grippe, infection broncho-pulmonaire, infection urinaire. La survenue de certaines maladies ou la prise de certains médicaments (Corticoïdes et certains diurétiques, ritodrine, salbutamol, et terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) peuvent déséquilibrer plus ou moins gravement le diabète.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament.

Pour certains examens radiologiques avec produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et des boissons :

Evitez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, notamment des corticoïdes, des diurétiques, de la ritodrine, du salbutamol ou de la terbutaline, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des produits de contraste iodés, ou des médicaments contenant de l'alcool même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.



14011711

NATRIXAM® 1,5 mg/5 mg

NATRIXAM® 1,5 mg/10 mg

comprimé à libération modifiée

Indapamide / Amlodipine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NATRIXAM, comprimé à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
3. Comment prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NATRIXAM, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques et diurétiques -
Code ATC : C08GA02

- si vous avez fait récemment une crise cardiaque,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, tout trouble du rythme cardiaque,
- si vous avez une maladie coronarienne (n
- sanguin insuffisant dans les vaisseaux d
- si vous avez des problèmes rénaux,
- si vous ressentez une diminution de la
- Il peut s'agir de symptômes d'accum
- vasculaire de l'œil (épanchement chor
- pression dans l'œil, et peuvent surver
- suivant la prise de NATRIXAM. Cela p
- si elle n'est pas traitée. Si vous avez d
- sulfamides, vous pouvez être plus à ri
- si vous avez des troubles musculaires, n
- une faiblesse ou des crampes,
- si vous présentez une augmentation sévère de la pression artérielle

14011711



6 1118001 130184
NATRIXAM 1,5 mg / 5 mg
30 comprimés à Libération Modifiée
PPV : 79,90 DH



LEVOTHYROX® comprimé sécable

Lévothyroxine sodique, Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOTHYROX, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?

Informations à connaître avant de prendre LEVOTHYROX, comprimé sécable ; indésirables éventuels ; LEVOTHYROX, comprimé sécable ?
âge et autres informations

96091298L

Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH

6

118001 102013



VOPTHYROX, comprimé sécable et dans ilisé ?

hormone thyroïdienne.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines
 Sans objet.

JES

Il est préconisé dans les situations suivantes :



14011711

NATRIXAM® 1,5 mg/5 mg

NATRIXAM® 1,5 mg/10 mg

comprimé à libération modifiée

Indapamide / Amlodipine

NATRIXAM 1,5 mg / 5 mg
30 comprimés à libération modifiée
PPV : 79,90 DH

14011124

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NATRIXAM, comprimé à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
3. Comment prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NATRIXAM, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques et diurétiques -
Code ATC : C08GA02

- si vous avez fait récemment une crise cardiaque,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, tout trouble du rythme cardiaque, si vous avez une maladie coronarienne (maladie du cœur causée par un flux sanguin insuffisant dans les vaisseaux du cœur),
- si vous avez des problèmes rénaux,
- si vous ressentez une diminution de la vision ou des douleurs oculaires. Il peut s'agir de symptômes d'accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroïdien), ou d'une augmentation de la pression dans l'œil, et peuvent survenir dans les heures ou les semaines suivant la prise de NATRIXAM. Cela peut entraîner une perte de la vision, si elle n'est pas traitée. Si vous avez déjà une allergie à la pénicilline ou aux sulfamides, vous pouvez être plus à risque de développer cela,
- si vous avez des troubles musculaires, notamment des douleurs, une sensibilité, une faiblesse ou des crampes,



14011711

NATRIXAM® 1,5 mg/5 mg

NATRIXAM® 1,5 mg/10 mg

comprimé à libération modifiée

Indapamide / Amlodipine

NATRIXAM 1,5 mg / 5 mg
30 comprimés à libération modifiée
PPV : 79,90 DH

14011124

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que NATRIXAM, comprimé à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
3. Comment prendre NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NATRIXAM, comprimé à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE NATRIXAM, COMPRIMÉ À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : inhibiteurs calciques et diurétiques -
Code ATC : C08GA02

- si vous avez fait récemment une crise cardiaque,
- si vous avez une insuffisance cardiaque, tout trouble du rythme cardiaque, si vous avez une maladie coronarienne (maladie du cœur causée par un flux sanguin insuffisant dans les vaisseaux du cœur),
- si vous avez des problèmes rénaux,
- si vous ressentez une diminution de la vision ou des douleurs oculaires. Il peut s'agir de symptômes d'accumulation de fluide dans la couche vasculaire de l'œil (épanchement choroïdien), ou d'une augmentation de la pression dans l'œil, et peuvent survenir dans les heures ou les semaines suivant la prise de NATRIXAM. Cela peut entraîner une perte de la vision, si elle n'est pas traitée. Si vous avez déjà une allergie à la pénicilline ou aux sulfamides, vous pouvez être plus à risque de développer cela,
- si vous avez des troubles musculaires, notamment des douleurs, une sensibilité, une faiblesse ou des crampes,

Le diabète.
Informez le médecin que vous prenez ce médicament.
Pour certains examens radiologiques prenez des contrastes iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.
Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des alliements et des bolissons : Effectuez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament. Pour certains examens radiologiques brevés produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

car élimination des antidiabétiques oraux se fait en grande partie par les reins.

Les patients présentant une hypocalcémie doivent être traités par un régime hypocalorique. Votre médecin pourra vous conseiller une formule finale de régime adapté à votre état. Il est recommandé de faire appel à un diététiste pour une consultation régulière au cours de laquelle.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :
Prévenez l'assassinat votre médecin, sans reprendre votre médicament avant sa visite.

crampes musculaires ou de malaise général avec sensation de grande fatigue, peut être le signe d'un déséquilibre grave de votre diabète.

MISES EN GARDE SPECIALES
PRÉPARATION DES PREDICATEURS AVANT DÉBUT QUINZE 1000 MG COMPRIMÉ PERMUCINE

- pendant l'allaitement.
- en cas de consommation importante de boissons alcoolisées.

- si vous avez une insureillance habilitée (équivalence du rôle).
- en cas de défaillance persistante volumineux remplacements.

- en cas de malades invalides (par exemple, patients diabétiques, patients radiothérapiques, patients sous corticoïdes)
- pendant les deux jours qui suivent un examen radiologique utilisant des radiographies
- si une zone des tissus molles (par exemple, la peau) est irradiée

- Si vous avez une insuffisance renale même si elle est modérée. (depuis l'augmentation de la créatinine dans le sang).

• hyperesensibilité connue au chlorhydrate de méthormine ou à l'un des
• en cas de déséquilibre du diabète avec acido-cétose.

INFORMATIONS NECESARIAS AVANT DE PRENDRE DIAFORIN

chez les plus de dix ans et adolescents, il peut être prescrit seul ou en association avec un anti-inflammatoire.

Assoc
du déla
ment,
400

FOR MAE CO.

Chlorhydrate de Méformine Exclurent: q.s pour un mg 00 mg

COMPOSITION

DIAFORMINE 1000 mg

Le diabète.
Informez le médecin que vous prenez ce médicament.
Pour certains examens radiologiques prenez des contrastes iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.
Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des alliements et des bolissons : Effectuez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament. Pour certains examens radiologiques brevés produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, conservez pellucide avec des éléments et des brosses : EVitez toute consommation de boissons alcoolisées.

car permettant de déterminer les anomalies de la pression artérielle et la tension veineuse. Les résultats sont exprimés en millilitres par minute par mètre de longueur.

Les personnes qui ont été victimes de violence conjugale, avec une période d'isolement ou de séparation de leur conjoint, peuvent trouver refuge dans un centre d'accès à l'urgence. Ces centres sont destinés à accueillir les personnes qui ont été victimes de violence conjugale et à leur offrir un soutien psychologique et social. Ils peuvent également proposer des cours de survie et d'autodéfense.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'EMPLOI :
PRÉVOIR UNE ASSISTANCE SOUS MÉDECINAT, SURVEILLER LA TEMPÉRATURE ET LES SYMPTÔMES D'ALLERGIE.

des empêche de voter la loi.

Préndre des précautions particulières avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :

- en cas de diarrhée persistante, vomissements répétés.
- en cas de consommation importante de boissons alcoolisées.
- état de dépendance.

- pendant les deux jours qui suivent un examen radiologique utilisant des radiographies lodes et sous effet une insensibilité relative.

9 3 2 1

- Si sous avez une insuffisance rénale même si elle est modérée. (dès 6 mois)
- augmentation de la créatinine dans le sang).

DIAFORMINE 1000 MG COMPRIMÉS PELLICULÉS DÉROGATOIRES

A standard 1D barcode is positioned at the top left. To its right, the word "rimés" is printed vertically above the number "000". Below the barcode, the number "10" is printed in large, bold, black digits. At the bottom right, there is a block of printed text in French, which includes the word "ATTENTION!" followed by several lines of descriptive text about the medication's effects and usage.

CLIA
Coat
AntiC

CHlorhydrate de Méthomazine
EXCipients: g. s. Pour un comprimé

COMPOSITION

DIAFORMINE® 1000 mg

Le diabète.
Informez le médecin que vous prenez ce médicament.
Pour certains examens radiologiques prenez des contrastes iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.
Prise de DIAFORMINE 1000 mg, comprimé pelliculé avec des alliements et des bolissons : Effectuez toute consommation de boissons alcoolisées.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS.

En cas d'hospitalisation pour examens, pour une intervention chirurgicale ou pour toute autre raison, informez le médecin que vous prenez ce médicament. Pour certains examens radiologiques brevés produits de contraste iodés, votre médecin vous demandera d'interrompre ce médicament avant ou au moment de cet examen et de ne le reprendre que 48 heures après l'examen, après s'être assuré de la normalité de la fonction rénale.

Prise de DIAFORMINE 1000 mg, conservez pellucide avec des éléments et des brosses : EVitez toute consommation de boissons alcoolisées.

Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion peuvent désequilibrer plus ou moins gravement le diabète et la maladie pulmonaire, mais aussi entraîner des complications cardiaques ou rénales.

Ces patients doivent être surveillés avec une période d'interrogatoire de rapport quotidien au cours de 3 semaines, avec une période d'interrogatoire de 10 jours si la symptomatologie est importante.

PRECARIOUS WORKERS D'EMPLOI : Tous ceux qui sont dans une situation de précarité ou d'exploitation.

desequilibré grave de vote diabète.
Prévenir aussi les malades, sans épargner votre médicament avant sa visite.

MISES EN GRADE SPECIALES
Au cours de votre entraînement, la présence de voluméments, de douleurs abdominales accompagnées de

• Prendre des précautions particulières avec DIAFORMINE 1000 mg comprimé pelliculé :
- prendre l'ensemble de la dose dans un seul bolage.

- si vous avez une insuffisance hépatique (dérailance du foie).
- en cas de diarrhée persistante (dérailance du colon).

- Pour avoir une intensité critique ou explosive.
- Pendant les deux ou trois dernières années, un radiographe utiliseant des radiographies mobiles

D W

- si vous avez une instrumentation finale même si elle est modérée. (dès lors que l'augmentation de la fréquence dans le spectre est importante)
- ou cas des malades intercalaires (par exemple). [réaction broncho-pulmonaire à l'aspirine]

Si vous souhaitez recevoir nos publications, merci de nous écrire à l'adresse suivante : info@lafondation.org

ATTENTION !
NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE DIAFORN
DAEFORMINE 1000 mg COMPRIMÉS BILATÉRALE NE DOIT JAMAIS ÊTRE
SUJET À UN IMPRIMÉ MINIATURE

Chaque ligne d'assocation avec un autre membre de l'association sera considérée comme une ligne supplémentaire et sera facturée à 1000 francs supplémentaires.

DNA, ASACQ

CLIA
COURT
CITY
STATE
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD

FORME d'expéditions: q.s. pour un numéro de lot.

COMPOSITION Cholinhydrat de Meramine
00 ma

DIAFORMINE 1000 mg