

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0013843

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 747 Société : RAM  
 Actif  Pensionné[e]  Autre : RAM COR  
 Nom & Prénom : MIKOU Abdessamad 164978  
 Date de naissance : 8 MAI 1945  
 Adresse : Rue KAOUTAR AV. IBN ATHIR  
FES V. N  
 Tél. : 0663 045 835 Total des frais engagés : 6.345 Dhs

Cadre réservé au Médecin

**Dr Khaoula HBID**  
**CARDIOLOGUE**  
**Espace Rihab Fès Av. Allal Ibn Abdellah**  
**FES - Tél. 05 35 93 26 42**

Cachet du médecin :

Date de consultation : 05/06/2023  
 Nom et prénom du malade : MIKOU Abdessamad Age : 78 ans  
 Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant  
 Nature de la maladie : CHD Ischémique  
 Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : Pathologie  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 13 JUN 2023  
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : FES Le : 18/6/2023  
 Signature de l'adhérent[e] : Signature



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le paiement des Actes
05/09/2023	CSE	1	300,00	DR KHAOUIA HBLI Espace PRIMAIRE FRAIS HONORAIRES FES - TÉMOIGNAGE DE PAYER DR KHAOUIA HBLI - 05/09/2023

## EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<b>PHARMACIE AIN LAHNACH</b> <u>Dr KHALI REDA</u> <b>AIN LAHNACH ANNEX DE TIZGUIT</b> <b>PROVINCE IFRAN</b> <b>TEL : 06 67 74 98 01</b>	5/6/2023	6045,00

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

**Dr. Khaoula HBID**

**CARDIOLOGUE**

Ex. Chef de service de cardiologie

Hôpital El Ghassani, FES

Diplôme d'echocardiographie Bordeaux, France

Diplôme d'épreuve d'effort et de réadaptation Cardiaque  
Bordeau, France



**الدكتورة خولة حبيض**

**اختصاصية في أمراض القلب والشرايين**

رئيسة قسم أمراض القلب بمستشفى الغساني سابقا

دبلوم فحص القلب بالصدى من جامعة بوردو بفرنسا

دبلوم اختبار الجهد وإعادة تأهيل القلب من جامعة

بوردو بفرنسا



Fès, le 05/06/2023

**Mr MIKOU ABDESSAMAD 78 ans**

**ORDONNANCE**

**REGIME SANS SEL STRICT**

S.V

S.V

S.V

S.V

S.V

S.V

**Dr. Khaoula HBID**  
**CARDIOLOGUE**

Espace Rihab Fes Av. Alhalil Abdell

FES - Tel: 05.35.93.26.42

ر حاب فاس، سارع علال بن عبد الله، عمارة C الطابق الأول (جناح مقهى أسوان) - فاس

الهاتف: 05.35.93.26.42 / المحمول: 06.63.70.23.21 / البريد الإلكتروني: E-mail: hbid.kholla12@gmail.com

# **Lasilix® 40 mg** **Lasilix® 20 mg/2**

Furosémide



## **Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire à nouveau.

## **IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**

### **Composition**

#### **LASILIX 40 mg comprimés :**

Furosémide ..... 40 mg/comprimé.

Excipients : amidon de maïs, lactose, silice colloïdale, talc, stéarate de magnésium.

#### **LASILIX 20 mg/2ml :**

Furosémide ..... 20 mg/2 ml.

Excipients : chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables.

## **Formes pharmaceutiques et présentations**

LASILIX 40 mg : comprimés sécables dosés à 40 mg ; boîte de 20.

LASILIX 20 mg/2 ml : solution injectable,

ampoule de 2 ml ; boîte de 1.

## **DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT**

### **Voie orale :**

Ce médicament est indiqué dans le traitement :

- des œdèmes d'origine cardiaque ou rénale,
- des œdèmes d'origine hépatique, le plus souvent en association avec un diurétique épargneur de potassium,
- de l'hypertension artérielle.

### **Voie injectable :**

Cette forme est indiquée dans les cas suivants :

- urgences cardioliques : œdème aigu du poumon, arrêt cardiaque,
- poussées hypertensives sévères (*élévation importante de la tension artérielle*),
- rétentions sodées sévères d'origine cardiaque, rénale, cirrhotique (*rétenzione de sel*),
- radiologie du bas appareil urinaire et test de lavage « wash out » au LASILIX,
- peut être utilisé en réanimation pédiatrique.

## **ATTENTION !**

### **Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

Sacubit

28 Com

UPERIO® 100 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boite de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031726

NOVARTIS

Notice : Information du patient

**UPERIO® 50mg, 100mg, 200mg**

Comprimés pelliculés

Sacubitil / Valsartan

Veuillez lire attentivement cette notice avant que ce médicament ne vous soit administré car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO
2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'UPERIO ne vous soit administré
3. Quels sont les effets indésirables éventuels?
4. Comment conserver UPERIO ?
5. Contenu de l'emballage et autres informations
1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO

UPERIO est utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. UPERIO est prescrit pour réduire le risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque et le nombre d'hospitalisations nécessaires

à l'organisme en sang. Les symptômes de l'insuffisance cardiaque sont l'essoufflement, les pieds et des jambes du fait d'accumulation de liquide dans les tissus.

UPERIO ne doit être utilisé que sur prescription.

Quel est le mécanisme d'action d'UPERIO ?

UPERIO est ce qu'on appelle un inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine (ARNI) qui contient du sacubitil (un inhibiteur de l'angiotensine II) et du valsartan (un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine II). L'utilisation d'UPERIO, les vaisseaux sanguins et l'eau s'accumule dans le corps, ce qui peut entraîner des symptômes d'insuffisance cardiaque.

#### Comment prendre UPERIO ?

Votre médecin détermine ensuite la juste dose de UPERIO que vous avez pris au préalable. UPERIO adaptera la dose en fonction de votre réponse à la thérapie jusqu'à ce que la dose qui est optimale pour vous.

En général, vous commencez par prendre UPERIO une fois par jour (un comprimé le matin et un comprimé le soir). La dose cible recommandée s'élève généralement à deux comprimés par jour (un comprimé le matin et un comprimé le soir).

Si vous suivez préalablement un traitement par l'ECA, vous devez arrêter l'inhibiteur de l'ECA et prendre UPERIO que 36 heures après votre dernière prise d'ECA. Si le traitement par UPERIO est arrêté, vous devez arrêter l'ECA et prendre UPERIO que 36 heures après la dernière prise d'ECA.

Avalez les comprimés d'UPERIO entiers. Ne les divisez pas ou ne les brisez pas. UPERIO peut être pris avec les repas ou sans.

**Uperio**

**100 mg**

Sacubitril

28 Comp

UPERIO® 100 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boîte de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031726

**NOVARTIS**

Notice : Information du patient

**UPERIO® 50mg, 100mg,**

Comprimés pelliculés

**Sacubitril /Valsartan**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant que ce médicament ne vous soit administré car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO
2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'UPERIO ne vous soit administré.
3. Quels sont les effets indésirables éventuels?
4. Comment conserver UPERIO ?
5. Contenu de l'emballage et autres informations
1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO

UPERIO est utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. UPERIO est prescrit pour réduire le risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque et le nombre d'hospitalisations nécessaires

tout l'organisme en sang. Les s l'insuffisance cardiaque sont l' pieds et des jambes du fait d'a

UPERIO ne doit être utilisé que

**Quel est le mécanisme d'action**

UPERIO est ce qu'on appelle un récepteur de l'angiotensine (ARNI) qui contient du sacubitril et du valsartan. (un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine). L'utilisation d'UPERIO, les vaisseaux d'eau s'accumule dans le corps, cas d'insuffisance cardiaque

**Comment prendre UPERIO**

Votre médecin détermine ensuite les médicaments que vous avez pris et adaptera la dose en fonction de jusqu'à ce que la dose qui est

En général, vous commencez par prendre un comprimé le matin.

La dose cible recommandée s'est

par jour (un comprimé le matin).

Si vous suivez préalablement un

l'ECA, vous devez arrêter l'inhibiteur

UPERIO 36 heures après vo

l'ECA. Si le traitement par UPERIO

prescrire un inhibiteur de l'ECA,

plus tôt 36 heures après la derni

Avalez les comprimés d'UPERIO

doivent pas être brisés ni divisés.

UPERIO peut être pris avec les

**Uperio**

**100 mg**

Sacubitril

28 Comp

UPERIO® 100 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boîte de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031726

**NOVARTIS**

Notice : Information du patient

**UPERIO® 50mg, 100mg,**

Comprimés pelliculés

**Sacubitril /Valsartan**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant que ce médicament ne vous soit administré car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO
2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'UPERIO ne vous soit administré.
3. Quels sont les effets indésirables éventuels?
4. Comment conserver UPERIO ?
5. Contenu de l'emballage et autres informations
1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO

UPERIO est utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. UPERIO est prescrit pour réduire le risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque et le nombre d'hospitalisations nécessaires

tout l'organisme en sang. Les s l'insuffisance cardiaque sont l' pieds et des jambes du fait d'a

UPERIO ne doit être utilisé que

**Quel est le mécanisme d'action**

UPERIO est ce qu'on appelle un récepteur de l'angiotensine (ARNI) qui contient du sacubitril et du valsartan. (un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine). L'utilisation d'UPERIO, les vaisseaux d'eau s'accumule dans le corps, cas d'insuffisance cardiaque.

**Comment prendre UPERIO**

Votre médecin détermine ensuite les médicaments que vous avez pris et adaptera la dose en fonction de jusqu'à ce que la dose qui est

En général, vous commencez par prendre un comprimé le matin.

La dose cible recommandée s'est

par jour (un comprimé le matin).

Si vous suivez préalablement u

l'ECA, vous devez arrêter l'inhibi

UPERIO que 36 heures après vo

l'ECA. Si le traitement par UPERIO

prescrire un inhibiteur de l'ECA,

plus tôt 36 heures après la derni

Avalez les comprimés d'UPERIO

doivent pas être brisés ni divisés.

UPERIO peut être pris avec les r

**Uperio**

**100 mg**

Sacubitril

28 Comp

UPERIO® 100 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boîte de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031726

**NOVARTIS**

Notice : Information du patient

**UPERIO® 50mg, 100mg,**

Comprimés pelliculés

**Sacubitril /Valsartan**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant que ce médicament ne vous soit administré car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO
2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'UPERIO ne vous soit administré.
3. Quels sont les effets indésirables éventuels?
4. Comment conserver UPERIO ?
5. Contenu de l'emballage et autres informations
1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO

UPERIO est utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. UPERIO est prescrit pour réduire le risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque et le nombre d'hospitalisations nécessaires

tout l'organisme en sang. Les s l'insuffisance cardiaque sont l' pieds et des jambes du fait d'a

UPERIO ne doit être utilisé que

**Quel est le mécanisme d'action**

UPERIO est ce qu'on appelle un récepteur de l'angiotensine (ARNI) qui contient du sacubitril et du valsartan. (un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine). L'utilisation d'UPERIO, les vaisseaux d'eau s'accumule dans le corps, cas d'insuffisance cardiaque

**Comment prendre UPERIO**

Votre médecin détermine ensuite les médicaments que vous avez pris et adaptera la dose en fonction de

En général, vous commencez par prendre UPERIO par jour (un comprimé le matin). La dose cible recommandée s'élève à 1 comprimé par jour (un comprimé le matin).

Si vous suivez préalablement un traitement par l'ECA, vous devez arrêter l'inhibition de l'ECA 36 heures avant de prendre UPERIO. Si le traitement par UPERIO est nécessaire, il faut arrêter l'ECA 36 heures après la dernière prise de UPERIO.

Avalez les comprimés d'UPERIO entiers. Ils doivent pas être brisés ni divisés. UPERIO peut être pris avec les repas.

**Uperio**

**100 mg**

Sacubitril

28 Comp

UPERIO® 100 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boîte de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031726

**NOVARTIS**

Notice : Information du patient

**UPERIO® 50mg, 100mg,**

Comprimés pelliculés

**Sacubitril /Valsartan**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant que ce médicament ne vous soit administré car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO
2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'UPERIO ne vous soit administré.
3. Quels sont les effets indésirables éventuels?
4. Comment conserver UPERIO ?
5. Contenu de l'emballage et autres informations
1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO

UPERIO est utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. UPERIO est prescrit pour réduire le risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque et le nombre d'hospitalisations nécessaires

tout l'organisme en sang. Les s l'insuffisance cardiaque sont l' pieds et des jambes du fait d'a

UPERIO ne doit être utilisé que

**Quel est le mécanisme d'action**

UPERIO est ce qu'on appelle un récepteur de l'angiotensine (ARNI) qui contient du sacubitril et du valsartan. (un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine). L'utilisation d'UPERIO, les vaisseaux d'eau s'accumule dans le corps, cas d'insuffisance cardiaque

**Comment prendre UPERIO**

Votre médecin détermine ensuite les médicaments que vous avez pris et adaptera la dose en fonction de

jusqu'à ce que la dose qui est

En général, vous commencez par

par jour (un comprimé le matin).

La dose cible recommandée s'est

par jour (un comprimé le matin).

Si vous suivez préalablement u

l'ECA, vous devez arrêter l'inhibi

UPERIO que 36 heures après vo

l'ECA. Si le traitement par UPERIO

prescrire un inhibiteur de l'ECA,

plus tôt 36 heures après la derni

Avalez les comprimés d'UPERIO

doivent pas être brisés ni divisés.

UPERIO peut être pris avec les r

**Uperio**

**100 mg**

Sacubitril

28 Comp

UPERIO® 100 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boîte de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031726

**NOVARTIS**

Notice : Information du patient

**UPERIO® 50mg, 100mg,**

Comprimés pelliculés

**Sacubitril /Valsartan**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant que ce médicament ne vous soit administré car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO
2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'UPERIO ne vous soit administré.
3. Quels sont les effets indésirables éventuels?
4. Comment conserver UPERIO ?
5. Contenu de l'emballage et autres informations
1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO

UPERIO est utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. UPERIO est prescrit pour réduire le risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque et le nombre d'hospitalisations nécessaires

tout l'organisme en sang. Les s l'insuffisance cardiaque sont l' pieds et des jambes du fait d'a

UPERIO ne doit être utilisé que

**Quel est le mécanisme d'action**

UPERIO est ce qu'on appelle un récepteur de l'angiotensine (ARNI) qui contient du sacubitril et du valsartan. (un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine). L'utilisation d'UPERIO, les vaisseaux d'eau s'accumule dans le corps, cas d'insuffisance cardiaque

**Comment prendre UPERIO**

Votre médecin détermine ensuite les médicaments que vous avez pris et adaptera la dose en fonction de jusqu'à ce que la dose qui est

En général, vous commencez par prendre un comprimé le matin.

La dose cible recommandée s'est

par jour (un comprimé le matin).

Si vous suivez préalablement un

l'ECA, vous devez arrêter l'inhibiteur

UPERIO 36 heures après vo

l'ECA. Si le traitement par UPERIO

prescrire un inhibiteur de l'ECA,

plus tôt 36 heures après la derni

Avalez les comprimés d'UPERIO

doivent pas être brisés ni divisés.

UPERIO peut être pris avec les

**Uperio**

**100 mg**

Sacubitril

28 Comp

UPERIO® 100 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boîte de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031726

**NOVARTIS**

Notice : Information du patient

**UPERIO® 50mg, 100mg,**

Comprimés pelliculés

**Sacubitril /Valsartan**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant que ce médicament ne vous soit administré car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO
2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'UPERIO ne vous soit administré.
3. Quels sont les effets indésirables éventuels?
4. Comment conserver UPERIO ?
5. Contenu de l'emballage et autres informations
1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO

UPERIO est utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. UPERIO est prescrit pour réduire le risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque et le nombre d'hospitalisations nécessaires

tout l'organisme en sang. Les s l'insuffisance cardiaque sont l' pieds et des jambes du fait d'a

UPERIO ne doit être utilisé que

**Quel est le mécanisme d'action**

UPERIO est ce qu'on appelle un récepteur de l'angiotensine (ARNI) qui contient du sacubitril et du valsartan. (un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine). L'utilisation d'UPERIO, les vaisseaux d'eau s'accumule dans le corps, cas d'insuffisance cardiaque.

**Comment prendre UPERIO**

Votre médecin détermine ensuite les médicaments que vous avez pris et adaptera la dose en fonction de

jusqu'à ce que la dose qui est

En général, vous commencez par

par jour (un comprimé le matin).

La dose cible recommandée s'est

par jour (un comprimé le matin).

Si vous suivez préalablement u

l'ECA, vous devez arrêter l'inhibi

UPERIO que 36 heures après vo

l'ECA. Si le traitement par UPERIO

prescrire un inhibiteur de l'ECA,

plus tôt 36 heures après la derni

Avalez les comprimés d'UPERIO

doivent pas être brisés ni divisés.

UPERIO peut être pris avec les r

**Uperio**

**100 mg**

Sacubitril

28 Comp

UPERIO® 100 mg  
Comprimé pelliculé.  
Boîte de 28.  
PPV : 405 DH



6 118001 031726

**NOVARTIS**

Notice : Information du patient

**UPERIO® 50mg, 100mg,**

Comprimés pelliculés

**Sacubitril /Valsartan**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant que ce médicament ne vous soit administré car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO
2. Quelles sont les informations à connaître avant qu'UPERIO ne vous soit administré.
3. Quels sont les effets indésirables éventuels?
4. Comment conserver UPERIO ?
5. Contenu de l'emballage et autres informations
1. Qu'est-ce qu'UPERIO et dans quel cas est-il utilisé/Comment prendre UPERIO

UPERIO est utilisé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. UPERIO est prescrit pour réduire le risque de décès lié à l'insuffisance cardiaque et le nombre d'hospitalisations nécessaires

tout l'organisme en sang. Les s l'insuffisance cardiaque sont l' pieds et des jambes du fait d'a

UPERIO ne doit être utilisé que

**Quel est le mécanisme d'action**

UPERIO est ce qu'on appelle un récepteur de l'angiotensine (ARNI) qui contient du sacubitril et du valsartan. (un bloqueur des récepteurs de l'angiotensine). L'utilisation d'UPERIO, les vaisseaux d'eau s'accumule dans le corps, cas d'insuffisance cardiaque

**Comment prendre UPERIO**

Votre médecin détermine ensuite les médicaments que vous avez pris et adaptera la dose en fonction de jusqu'à ce que la dose qui est

En général, vous commencez par prendre un comprimé le matin.

La dose cible recommandée s'est

par jour (un comprimé le matin).

Si vous suivez préalablement un

l'ECA, vous devez arrêter l'inhibiteur

UPERIO 36 heures après vo

l'ECA. Si le traitement par UPERIO

prescrire un inhibiteur de l'ECA,

plus tôt 36 heures après la derni

Avalez les comprimés d'UPERIO

doivent pas être brisés ni divisés.

UPERIO peut être pris avec les

**REXBAN® 1  
Comprimé  
Boîte de 14,  
Boîte de 14,  
Riva**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire relative à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant comment déclarer les effets indésirables.

< Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'importe pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1 - Qu'est-ce que REXBAN® 15 mg et 20 mg, et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 3 - Comment prendre REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 6 - Informations supplémentaires

**1 - QU'EST-CE QUE REXBAN® 15 mg et 20 mg, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité**

Rexaban appartient à une classe de médicaments appelés antithrombotiques. Il agit en bloquant un facteur de la coagulation sanguine (le facteur Xa), réduisant ainsi la tendance du sang à former des caillots (code ATC : B01AF01).

**Indications thérapeutiques :**

Rexaban contient une substance active appelée Rivaroxaban et il est utilisé chez l'adulte pour :

- Prévenir la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau (Accident Vasculaire Cérébral, ou AVC) et dans les autres vaisseaux sanguins de votre corps si vous souffrez d'une irrégularité du rythme cardiaque appelée fibrillation atriale non valvulaire.

- Traiter les caillots sanguins qui se sont formés dans les veines de vos jambes (thrombose veineuse profonde) et dans les vaisseaux sanguins de vos poumons (embolie pulmonaire), et prévention la réapparition de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins de vos jambes et/ou de vos poumons.

**2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE REXBAN® 15 mg et 20 mg ?**

**Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

**Contres - Indications :**

**Ne prenez jamais REXBAN 15 mg et 20 mg :**

- Si vous êtes allergique au Rivaroxaban ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes sujet à des saignements excessifs.
- Si vous avez une maladie ou une prédisposition au niveau d'un organe qui augmente les risques de saignements importants (par exemple un ulcère de l'estomac, une blessure ou un saignement dans le cerveau, une intervention chirurgicale récente du cerveau ou des yeux).
- Si vous prenez déjà des médicaments pour empêcher la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), sauf lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte.
- Si vous présentez une maladie du foie augmentant les risques de saignement.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, ne prenez pas ce médicament et prévenez votre médecin.

**Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

**Faites attention avec REXBAN 15 mg et 20 mg :**

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Si vous présentez un risque accru de saignement, ce qui pourrait être le cas dans les situations suivantes : insuffisance rénale sévère, car l'état de votre fonction rénale peut avoir une influence sur la quantité de médicament pouvant agir dans votre corps ;
- si vous prenez d'autres médicaments destinés à prévenir la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte ;
- troubles hémorragiques ;
- pression artérielle très élevée, non contrôlée par un traitement médicamenteux ;
- maladie de l'estomac ou de l'intestin susceptible d'entrainer un saignement, par ex. inflammation des intestins ou de l'estomac, ou inflammation de l'œsophage par ex. due à un reflux gastro-œsophagien, (remontées acides de l'estomac vers l'œsophage) ;
- anomalies au niveau des vaisseaux sanguins du fond de l'œil (rétinopathie) ;
- maladie des poumons avec dilatation des bronches et présence de pus (bronchectasie), ou antécédents de saignement dans les poumons.
- Si vous avez une valve cardiaque artificielle.
- Si votre médecin considère que votre pression artérielle est instable ou si un autre traitement ou une intervention chirurgicale pour enlever le caillot sanguin de vos poumons est prévu.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous devez être traité(e) par ce médicament et s'il est nécessaire de vous surveiller étroitement.

**Si vous devez bénéficier d'une intervention chirurgicale :**

- Il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'opération.
- Si l'intervention chirurgicale implique l'utilisation d'un cathéter ou une injection dans votre colonne vertébrale (pour une anesthésie péridurale ou rachidienne ou pour l'injection d'un calmant, par ex.) :
- Il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'injection ou le retrait du cathéter ;

370,00

**Rexaban®**

Rivaroxaban

Voie Orale

**REXBAN® 1  
Comprimé  
Boîte de 14,  
Boîte de 14,  
Riva**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire relative à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant comment déclarer les effets indésirables.

< Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'importe pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1 - Qu'est-ce que REXBAN® 15 mg et 20 mg, et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 3 - Comment prendre REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 6 - Informations supplémentaires

**1 - QU'EST-CE QUE REXBAN® 15 mg et 20 mg, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité**

Rexaban appartient à une classe de médicaments appelés antithrombotiques. Il agit en bloquant un facteur de la coagulation sanguine (le facteur Xa), réduisant ainsi la tendance du sang à former des caillots (code ATC : B01AF01).

**Indications thérapeutiques :**

Rexaban contient une substance active appelée Rivaroxaban et il est utilisé chez l'adulte pour :

- Prévenir la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau (Accident Vasculaire Cérébral, ou AVC) et dans les autres vaisseaux sanguins de votre corps si vous souffrez d'une irrégularité du rythme cardiaque appelée fibrillation atriale non valvulaire.

- Traiter les caillots sanguins qui se sont formés dans les veines de vos jambes (thrombose veineuse profonde) et dans les vaisseaux sanguins de vos poumons (embolie pulmonaire), et prévention la réapparition de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins de vos jambes et/ou de vos poumons.

**2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE REXBAN® 15 mg et 20 mg ?**

**Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

**Contres - Indications :**

**Ne prenez jamais REXBAN 15 mg et 20 mg :**

- Si vous êtes allergique au Rivaroxaban ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes sujet à des saignements excessifs.
- Si vous avez une maladie ou une prédisposition au niveau d'un organe qui augmente les risques de saignements importants (par exemple un ulcère de l'estomac, une blessure ou un saignement dans le cerveau, une intervention chirurgicale récente du cerveau ou des yeux).
- Si vous prenez déjà des médicaments pour empêcher la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), sauf lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte.
- Si vous présentez une maladie du foie augmentant les risques de saignement.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, ne prenez pas ce médicament et prévenez votre médecin.

**Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

**Faites attention avec REXBAN 15 mg et 20 mg :**

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Si vous présentez un risque accru de saignement, ce qui pourrait être le cas dans les situations suivantes : insuffisance rénale sévère, car l'état de votre fonction rénale peut avoir une influence sur la quantité de médicament pouvant agir dans votre corps ;
- si vous prenez d'autres médicaments destinés à prévenir la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte ;
- troubles hémorragiques ;
- pression artérielle très élevée, non contrôlée par un traitement médicamenteux ;
- maladie de l'estomac ou de l'intestin susceptible d'entrainer un saignement, par ex. inflammation des intestins ou de l'estomac, ou inflammation de l'œsophage par ex. due à un reflux gastro-œsophagien, (remontées acides de l'estomac vers l'œsophage) ;
- anomalies au niveau des vaisseaux sanguins du fond de l'œil (rétinopathie) ;
- maladie des poumons avec dilatation des bronches et présence de pus (bronchectasie), ou antécédents de saignement dans les poumons.
- Si vous avez une valve cardiaque artificielle.
- Si votre médecin considère que votre pression artérielle est instable ou si un autre traitement ou une intervention chirurgicale pour enlever le caillot sanguin de vos poumons est prévu.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous devez être traité(e) par ce médicament et s'il est nécessaire de vous surveiller étroitement.

**Si vous devez bénéficier d'une intervention chirurgicale :**

- Il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'opération.
- Si l'intervention chirurgicale implique l'utilisation d'un cathéter ou une injection dans votre colonne vertébrale (pour une anesthésie péridurale ou rachidienne ou pour l'injection d'un calmant, par ex.) :
- Il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'injection ou le retrait du cathéter ;

370,00

**Rexaban®**

Rivaroxaban

Voie Orale

**REXBAN® 1  
Comprimé  
Boîte de 14,  
Boîte de 14,  
Riva**

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire relative à la sécurité. Vous pouvez y contribuer en signalant comment déclarer les effets indésirables.

< Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'importe pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

- 1 - Qu'est-ce que REXBAN® 15 mg et 20 mg, et dans quel cas est-il utilisé ?
- 2 - Quelles sont les informations à connaître avant de prendre REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 3 - Comment prendre REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 4 - Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5 - Comment conserver REXBAN® 15 mg et 20 mg ?
- 6 - Informations supplémentaires

**1 - QU'EST-CE QUE REXBAN® 15 mg et 20 mg, ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?**

**Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité**

Rexaban appartient à une classe de médicaments appelés antithrombotiques. Il agit en bloquant un facteur de la coagulation sanguine (le facteur Xa), réduisant ainsi la tendance du sang à former des caillots (code ATC : B01AF01).

**Indications thérapeutiques :**

Rexaban contient une substance active appelée Rivaroxaban et il est utilisé chez l'adulte pour :

- Prévenir la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau (Accident Vasculaire Cérébral, ou AVC) et dans les autres vaisseaux sanguins de votre corps si vous souffrez d'une irrégularité du rythme cardiaque appelée fibrillation atriale non valvulaire.

- Traiter les caillots sanguins qui se sont formés dans les veines de vos jambes (thrombose veineuse profonde) et dans les vaisseaux sanguins de vos poumons (embolie pulmonaire), et prévention la réapparition de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins de vos jambes et/ou de vos poumons.

**2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE REXBAN® 15 mg et 20 mg ?**

**Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament**

**Contres - Indications :**

**Ne prenez jamais REXBAN 15 mg et 20 mg :**

- Si vous êtes allergique au Rivaroxaban ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous êtes sujet à des saignements excessifs.
- Si vous avez une maladie ou une prédisposition au niveau d'un organe qui augmente les risques de saignements importants (par exemple un ulcère de l'estomac, une blessure ou un saignement dans le cerveau, une intervention chirurgicale récente du cerveau ou des yeux).
- Si vous prenez déjà des médicaments pour empêcher la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), sauf lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte.
- Si vous présentez une maladie du foie augmentant les risques de saignement.
- Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, ne prenez pas ce médicament et prévenez votre médecin.

**Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :**

**Faites attention avec REXBAN 15 mg et 20 mg :**

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

- Si vous présentez un risque accru de saignement, ce qui pourrait être le cas dans les situations suivantes : insuffisance rénale sévère, car l'état de votre fonction rénale peut avoir une influence sur la quantité de médicament pouvant agir dans votre corps ;
- si vous prenez d'autres médicaments destinés à prévenir la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte ;
- troubles hémorragiques ;
- pression artérielle très élevée, non contrôlée par un traitement médicamenteux ;
- maladie de l'estomac ou de l'intestin susceptible d'entrainer un saignement, par ex. inflammation des intestins ou de l'estomac, ou inflammation de l'œsophage par ex. due à un reflux gastro-œsophagien, (remontées acides de l'estomac vers l'œsophage) ;
- anomalies au niveau des vaisseaux sanguins du fond de l'œil (rétinopathie) ;
- maladie des poumons avec dilatation des bronches et présence de pus (bronchectasie), ou antécédents de saignement dans les poumons.
- Si vous avez une valve cardiaque artificielle.
- Si votre médecin considère que votre pression artérielle est instable ou si un autre traitement ou une intervention chirurgicale pour enlever le caillot sanguin de vos poumons est prévu.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament. Votre médecin décidera si vous devez être traité(e) par ce médicament et s'il est nécessaire de vous surveiller étroitement.

**Si vous devez bénéficier d'une intervention chirurgicale :**

- Il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'opération.
- Si l'intervention chirurgicale implique l'utilisation d'un cathéter ou une injection dans votre colonne vertébrale (pour une anesthésie péridurale ou rachidienne ou pour l'injection d'un calmant, par ex.) :
- Il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'injection ou le retrait du cathéter ;

370,00

**Rexaban®**

Rivaroxaban

Voie Orale

R

Rosu

Veuillez lire ce médicament  
 • Gardez cet  
 • Si vous avez plus d'informations  
 • Ce médicament n'est pas destiné à tout le monde  
 • Si l'un des effets indésirables est important, consultez votre médecin

# RO

## Rosuvas

28 Comprimés

Composition  
 Rosuvastatine

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline (Avicel PH 200), lactose granule, sodium carbonate anhydride, crospovidone, stéarate de magnésium, opadry AMB 80W34464 Pink, eau purifiée.

**Liste des excipients à effet notable :** Lactose, Sodium.

**Classe pharmaco-thérapeutique ou type d'activité :** ROZAT® appartient au groupe des médicaments appelés statines.

### Indications thérapeutiques :

ROZAT® comprimé pelliculé vous a été prescrit parce que :

• Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypcholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de ROZAT® comprimé pelliculé.

Ou

• Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

**Pourquoi il est important de continuer de prendre ROZAT® comprimé pelliculé :**

• ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé pour corriger le taux de substances graisseuses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

• Il y a différents types de cholestérol trouvés dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C). ROZAT® comprimé pelliculé peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

• Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre ROZAT® comprimé pelliculé, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

**Posologie Mode et voies d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :**

Doses usuelles chez les adultes.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour un taux de cholestérol élevé :

Dose initiale :

Votre traitement avec ROZAT® comprimé pelliculé doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'une autre statine avant.

Le choix de la dose initiale dépendra de :

• Votre taux de cholestérol,  
 • Vos risques d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral,  
 • Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.

Veuillez vérifier auprès de votre médecin ou pharmacien la dose

PPV: 147DH10  
 PER: 03/25  
 LOT: M333-2

10 mg

20 mg.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant, votre médecin pourra décider d'utiliser une dose plus faible si vous avez l'un des facteurs mentionnés ci-dessus.

Utilisation chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.

La dose initiale usuelle est de 5 mg. Votre docteur pourra augmenter votre dose afin de trouver la dose adaptée de ROZAT® comprimé pelliculé. La dose maximale de ROZAT® comprimé pelliculé est 10 mg par jour pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et de 20 mg par jour pour les enfants âgés de 10 à 17 ans. Prenez cette dose une fois par jour. La dose de 40 mg de ROZAT® comprimé pelliculé ne doit pas être utilisée chez les enfants.

### Mode et voies d'administration :

Avalez chaque comprimé en entier avec de l'eau.

**Durée du traitement et Fréquence d'administration :** ROZAT® doit être pris une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée avec ou sans nourriture. Il est recommandé de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d'oublier de le prendre. Le Contrôle régulier de votre cholestérol :

Il est important que vous retourniez votre médecin pour des contrôles réguliers de votre cholestérol afin d'être sûr que ce dernier est bien contrôlé.

Votre médecin peut décider d'augmenter la dose de ROZAT® comprimé pelliculé jusqu'à ce qu'elle soit appropriée pour vous.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais ROZAT® comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants du produit.

• Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par ROZAT® comprimé pelliculé.

• Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.

• Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).

• Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathies (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).

• Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

### Effets Indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont habituellement légers et de courte durée.

**Arrêtez de prendre ROZAT® comprimé pelliculé et consultez immédiatement un médecin :** si vous avez les réactions allergiques suivantes :

• Difficulté à respirer avec ou sans gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge.

• Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge qui peut causer des difficultés pour avaler.

• Démangeaison sévère de la peau (avec des doigts).

**Consultez votre médecin immédiatement si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles :** qui durent anormalement longtemps. Les symptômes musculaires sont plus fréquents chez les enfants et adolescents que chez les adultes. Comme avec les autres statines, un très petit nombre de personnes ont eu des problèmes musculaires qui ont rarement entraîné un danger pour la vie de ces personnes (rhabdomyalyses).

### Effets Indésirables fréquents :

- maux de tête,
- douleurs d'estomac,
- constipation,
- sensation de malaise,
- douleurs musculaires,
- sentiment général de faiblesse,
- sensations vertigineuses,
- augmentation des protéines dans les urines à la dose de 40 mg, ceci revient généralement à la normale sans avoir à arrêter le

R

Rosu

Veuillez lire ce médicament  
• Gardez cet  
• Si vous avez plus d'informations  
• Ce médicament n'est pas destiné à tout le monde  
• Si l'un des effets indésirables est important, consultez votre médecin

RO  
Rosuvas

28 Comprimés

PPV: 147DH10  
PER: 03/25  
LOT: M333-2

10 mg

Composition  
Rosuvas

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline (Avicel PH 200), lactose granule, sodium carbonate anhydride, crospovidone, stéarate de magnésium, opadry AMB 80W34464 Pink, eau purifiée.

**Liste des excipients à effet notable :** Lactose, Sodium.

**Classe pharmaco-thérapeutique ou type d'activité :**

ROZAT® appartient au groupe des médicaments appelés statines.

**Indications thérapeutiques :**

ROZAT® comprimé pelliculé vous a été prescrit parce que :

• Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypcholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de ROZAT® comprimé pelliculé.

Ou  
• Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

**Pourquoi il est important de continuer de prendre ROZAT® comprimé pelliculé :**

• ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé pour corriger le taux de substances graisseuses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

• Il y a différents types de cholestérol trouvés dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

• ROZAT® comprimé pelliculé peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

• Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre ROZAT® comprimé pelliculé, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

**Posologie Mode et voies d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :**

Doses usuelles chez les adultes.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour un taux de cholestérol élevé :

Dose initiale :

Votre traitement avec ROZAT® comprimé pelliculé doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'une autre statine avant.

Le choix de la dose initiale dépendra de :

• Votre taux de cholestérol,  
• Vos risques d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral,  
• Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.

Veuillez vérifier auprès de votre médecin ou pharmacien la dose

20 mg.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant, votre médecin pourra décider d'utiliser une dose plus faible si vous avez l'un des facteurs mentionnés ci-dessus.

Utilisation chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.

La dose initiale usuelle est de 5 mg. Votre docteur pourra augmenter votre dose afin de trouver la dose adaptée de ROZAT® comprimé pelliculé. La dose maximale de ROZAT® comprimé pelliculé est 10 mg par jour pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et de 20 mg par jour pour les enfants âgés de 10 à 17 ans. Prenez cette dose une fois par jour. La dose de 40 mg de ROZAT® comprimé pelliculé ne doit pas être utilisée chez les enfants.

**Mode et voies d'administration :**

Avalez chaque comprimé en entier avec de l'eau.

**Durée du traitement et Fréquence d'administration :** ROZAT® doit être pris une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée avec ou sans nourriture. Il est recommandé de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d'oublier de le prendre. Le Contrôle régulier de votre cholestérol :

Il est important que vous retourniez votre médecin pour des contrôles réguliers de votre cholestérol afin d'être sûr que ce dernier est bien contrôlé.

Votre médecin peut décider d'augmenter la dose de ROZAT® comprimé pelliculé jusqu'à ce qu'elle soit appropriée pour vous.

**Contre-indications :**

Ne prenez jamais ROZAT® comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants du produit.

• Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par ROZAT® comprimé pelliculé.

• Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.

• Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).

• Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathies (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).

• Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

**Effets Indésirables :**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont habituellement légers et de courte durée.

**Arrêtez de prendre ROZAT® comprimé pelliculé et consultez immédiatement un médecin :** si vous avez les réactions allergiques suivantes :

• Difficulté à respirer avec ou sans gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge.

• Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge qui peut causer des difficultés pour avaler.

• Démangeaison sévère de la peau (avec des doigts).

**Consultez votre médecin immédiatement si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles :** qui durent anormalement longtemps. Les symptômes musculaires sont plus fréquents chez les enfants et adolescents que chez les adultes. Comme avec les autres statines, un très petit nombre de personnes ont eu des problèmes musculaires qui ont rarement entraîné un danger pour la vie de ces personnes (rhabdomyalyses).

**Effets Indésirables fréquents :**

- maux de tête,
- douleurs d'estomac,
- constipation,
- sensation de malaise,
- douleurs musculaires,
- sentiment général de faiblesse,
- sensations vertigineuses,
- augmentation des protéines dans les urines à la dose de 40 mg, ceci revient généralement à la normale sans avoir à arrêter le

R

Rosu

Veuillez lire ce médicament  
• Gardez cet  
• Si vous avez plus d'informations  
• Ce médicament n'est pas destiné à tout le monde  
• Si l'un des effets indésirables est important, consultez votre médecin

# RO

## Rosuvas

28 Comprimés

Composition  
Rosuvastatine  
Rosuvastatine

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline (Avicel PH 200), lactose granule, sodium carbonate anhydride, crospovidone, stéarate de magnésium, opadry AMB 80W34464 Pink, eau purifiée.

**Liste des excipients à effet notable :** Lactose, Sodium.

**Classe pharmaco-thérapeutique ou type d'activité :**

ROZAT® appartient au groupe des médicaments appelés statines.

**Indications thérapeutiques :**

ROZAT® comprimé pelliculé vous a été prescrit parce que :

• Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypcholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de ROZAT® comprimé pelliculé.

Ou  
• Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

**Pourquoi il est important de continuer de prendre ROZAT® comprimé pelliculé :**

• ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé pour corriger le taux de substances graisseuses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

• Il y a différents types de cholestérol trouvés dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

• ROZAT® comprimé pelliculé peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

• Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre ROZAT® comprimé pelliculé, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

**Posologie Mode et voies d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :**

Doses usuelles chez les adultes.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour un taux de cholestérol élevé :

Dose initiale :

Votre traitement avec ROZAT® comprimé pelliculé doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'une autre statine avant.

Le choix de la dose initiale dépendra de :

• Votre taux de cholestérol,  
• Vos risques d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral,  
• Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.

Veuillez vérifier auprès de votre médecin ou pharmacien la dose

PPV:147DH10  
PER:03/25  
LOT:M333-2

10 mg

20 mg.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant, votre médecin pourra décider d'utiliser une dose plus faible si vous avez l'un des facteurs mentionnés ci-dessus.

Utilisation chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.  
La dose initiale usuelle est de 5 mg. Votre docteur pourra augmenter votre dose afin de trouver la dose adaptée de ROZAT® comprimé pelliculé. La dose maximale de ROZAT® comprimé pelliculé est 10 mg par jour pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et de 20 mg par jour pour les enfants âgés de 10 à 17 ans. Prenez cette dose une fois par jour. La dose de 40 mg de ROZAT® comprimé pelliculé ne doit pas être utilisée chez les enfants.

**Mode et voies d'administration :**

Avez chaque comprimé en entier avec de l'eau.

**Durée du traitement et Fréquence d'administration :**  
ROZAT® doit être pris une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée avec ou sans nourriture. Il est recommandé de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d'oublier de le prendre. Le Contrôle régulier de votre cholestérol :

Il est important que vous retourniez votre médecin pour des contrôles réguliers de votre cholestérol afin d'être sûr que ce dernier est bien contrôlé.

Votre médecin peut décider d'augmenter la dose de ROZAT® comprimé pelliculé jusqu'à ce qu'elle soit appropriée pour vous.

**Contre-indications :**

Ne prenez jamais ROZAT® comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants du produit.

• Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par ROZAT® comprimé pelliculé.

• Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.

• Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).

• Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathies (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).

• Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

**Effets Indésirables :**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont habituellement légers et de courte durée.

**Arrêtez de prendre ROZAT® comprimé pelliculé et consultez immédiatement un médecin :** si vous avez les réactions allergiques suivantes :

• Difficulté à respirer avec ou sans gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge.

• Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge qui peut causer des difficultés pour avaler.

• Démangeaison sévère de la peau (avec des doigts).

**Consultez votre médecin immédiatement si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles :** qui durent anormalement longtemps. Les symptômes musculaires sont plus fréquents chez les enfants et adolescents que chez les adultes.

Comme avec les autres statines, un très petit nombre de personnes ont eu des problèmes musculaires qui ont rarement entraîné un danger pour la vie de ces personnes (rhabdomyalyses).

**Effets Indésirables fréquents :**

- maux de tête,
- douleurs d'estomac,
- constipation,
- sensation de malaise,
- douleurs musculaires,
- sentiment général de faiblesse,
- sensations vertigineuses,
- augmentation des protéines dans les urines à la dose de 40 mg, ceci revient généralement à la normale sans avoir à arrêter le

R

Rosu

Veuillez lire ce médicament  
• Gardez cet  
• Si vous avez plus d'informations  
• Ce médicament n'est pas destiné à tout le monde  
• Si l'un des effets indésirables est important, consultez votre médecin

RO  
Rosuvas

28 Comprimés

PPV: 147DH10  
PER: 03/25  
LOT: M333-2

10 mg

Composition  
Rosuvas

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline (Avicel PH 200), lactose granule, sodium carbonate anhydride, crospovidone, stéarate de magnésium, opadry AMB 80W34464 Pink, eau purifiée.

**Liste des excipients à effet notable :** Lactose, Sodium.

**Classe pharmaco-thérapeutique ou type d'activité :**

ROZAT® appartient au groupe des médicaments appelés statines.

**Indications thérapeutiques :**

ROZAT® comprimé pelliculé vous a été prescrit parce que :

• Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypcholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de ROZAT® comprimé pelliculé.

Ou  
• Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

**Pourquoi il est important de continuer de prendre ROZAT® comprimé pelliculé :**

• ROZAT® comprimé pelliculé est utilisé pour corriger le taux de substances graisseuses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

• Il y a différents types de cholestérol trouvés dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

• ROZAT® comprimé pelliculé peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ».

• Il agit en aidant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à l'éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre ROZAT® comprimé pelliculé, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

**Posologie Mode et voies d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement :**

Doses usuelles chez les adultes.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour un taux de cholestérol élevé :

Dose initiale :

Votre traitement avec ROZAT® comprimé pelliculé doit débuter avec une dose de 5 ou 10 mg, même si vous prenez une dose plus élevée d'une autre statine avant.

Le choix de la dose initiale dépendra de :

• Votre taux de cholestérol,  
• Vos risques d'avoir une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral,  
• Facteurs pouvant vous rendre plus sensible à certains effets indésirables.

Veuillez vérifier auprès de votre médecin ou pharmacien la dose

20 mg.

Si vous prenez ROZAT® comprimé pelliculé pour réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés :

La dose recommandée est de 20 mg une fois par jour. Cependant, votre médecin pourra décider d'utiliser une dose plus faible si vous avez l'un des facteurs mentionnés ci-dessus.

Utilisation chez les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans. La dose initiale usuelle est de 5 mg. Votre docteur pourra augmenter votre dose afin de trouver la dose adaptée de ROZAT® comprimé pelliculé. La dose maximale de ROZAT® comprimé pelliculé est 10 mg par jour pour les enfants âgés de 6 à 9 ans et de 20 mg par jour pour les enfants âgés de 10 à 17 ans. Prenez cette dose une fois par jour. La dose de 40 mg de ROZAT® comprimé pelliculé ne doit pas être utilisée chez les enfants.

**Mode et voies d'administration :**

Avalez chaque comprimé en entier avec de l'eau.

**Durée du traitement et Fréquence d'administration :** ROZAT® doit être pris une fois par jour. Vous pouvez prendre le comprimé à tout moment de la journée avec ou sans nourriture. Il est recommandé de prendre votre comprimé chaque jour à la même heure, ceci vous évitera d'oublier de le prendre. Le Contrôle régulier de votre cholestérol :

Il est important que vous retourniez votre médecin pour des contrôles réguliers de votre cholestérol afin d'être sûr que ce dernier est bien contrôlé.

Votre médecin peut décider d'augmenter la dose de ROZAT® comprimé pelliculé jusqu'à ce qu'elle soit appropriée pour vous.

**Contre-indications :**

Ne prenez jamais ROZAT® comprimé pelliculé :

• Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants du produit.

• Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par ROZAT® comprimé pelliculé.

• Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.

• Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).

• Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathies (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).

• Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

**Effets Indésirables :**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Il est important que vous soyez informés des effets indésirables possibles. Ils sont habituellement légers et de courte durée.

**Arrêtez de prendre ROZAT® comprimé pelliculé et consultez immédiatement un médecin :** si vous avez les réactions allergiques suivantes :

• Difficulté à respirer avec ou sans gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge.

• Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge qui peut causer des difficultés pour avaler.

• Démangeaison sévère de la peau (avec des doigts).

**Consultez votre médecin immédiatement si vous ressentez des douleurs musculaires inhabituelles :** qui durent anormalement longtemps. Les symptômes musculaires sont plus fréquents chez les enfants et adolescents que chez les adultes. Comme avec les autres statines, un très petit nombre de personnes ont eu des problèmes musculaires qui ont rarement entraîné un danger pour la vie de ces personnes (rhabdomyalyses).

**Effets Indésirables fréquents :**

- maux de tête,
- douleurs d'estomac,
- constipation,
- sensation de malaise,
- douleurs musculaires,
- sentiment général de faiblesse,
- sensations vertigineuses,
- augmentation des protéines dans les urines à la dose de 40 mg, ceci revient généralement à la normale sans avoir à arrêter le

Maphar  
Bd Alkemia N° 6, Ql.  
Sifl Bernoussi, Casablanca  
Forxiga 10 mg cp pell b28  
P.P.V : 419,00 DH



6 118001 185023

بس

مع

فوركسيد  
داباغلوفلوزين

عن طريق الفم

فوركسيد<sup>(٥)</sup>

5 ملغ

فوركسيد<sup>(٥)</sup>

10 ملغ

P101325

Maphar  
Bd Alkemia N° 6, Ql.  
Sifl Bernoussi, Casablanca  
Forxiga 10 mg cp pell b28  
P.P.V : 419,00 DH



6 118001 185023

س  
بم  
بم

بس

مع

عن طريق الفم

فوركسيد  
داباغلوفلوزين

فوركسيد<sup>(٥)</sup>

5 ملغ

فوركسيد<sup>(٥)</sup>

10 ملغ



P101325

Maphar  
Bd Alkemia N° 6, Ql.  
Sifl Bernoussi, Casablanca  
Forxiga 10 mg cp pell b28  
P.P.V : 419,00 DH



6 118001 185023

س  
بم  
بم

بس

مع

عن طريق الفم

فوركسيد  
داباغلوفلوزين

فوركسيد<sup>(٥)</sup>

5 ملغ

فوركسيد<sup>(٥)</sup>

10 ملغ



P101325

## NOTICE : INFORMA

# CARDENSIE

كاردونسيال® ٥ مغ  
فرص مغلف قابل للكسر



Cardensiel® 5 mg  
Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 58,10 DH

7862160239

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce m

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'info
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelq
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirab

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la

#### Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines im le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

#### Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique "Ingrédients" à la page 10),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), le doigt pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de la tension artérielle.

#### Faites attention avec CARDENSIEL :

Si vous présentez l'une des affections suivantes, indiquez-le à votre médecin :

## NOTICE : INFORMA

# CARDENSIE

كاردونسيال® ٥ مغ  
فرص مغلف قابل للنكسر



Cardensiel® 5 mg  
Comprimés pelliculés sécables B/30

PPV: 58,10 DH

7862160239

## Bisoprolol Fumarate

### Voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce m

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'info
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelq
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirab

### Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CARDENSIEL et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CARDENSIEL ?
3. Comment prendre CARDENSIEL ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CARDENSIEL ?
6. Informations supplémentaires.

### 1. QU'EST-CE QUE CARDENSIEL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

La substance active de CARDENSIEL est le bisoprolol. Le bisoprolol appartient à la

#### Indications thérapeutiques

Les bêtabloquants agissent en modifiant la réponse de l'organisme à certaines im le rythme cardiaque et permet au cœur de pomper plus efficacement le sang dans L'insuffisance cardiaque se produit lorsque le muscle cardiaque est faible et incapable CARDENSIEL est utilisé pour traiter les patients présentant une insuffisance cardiaque médicaments adaptés à cette affection (tels que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

#### Ne prenez jamais CARDENSIEL en cas de :

- allergie (hypersensibilité) au bisoprolol ou à l'un des autres composants (voir rubrique "Ingrédients" à la page 10),
- asthme sévère,
- troubles sévères de la circulation sanguine périphérique (de type phénomène de Raynaud), le doigt pâlir ou virer au bleu,
- phéochromocytome non traité, tumeur rare de la glande surrénale,
- acidose métabolique, c'est-à-dire présence d'acide en excès dans le sang,

Ne prenez jamais CARDENSIEL si vous présentez l'un des problèmes cardiaques suivants :

- insuffisance cardiaque aiguë,
- aggravation de l'insuffisance cardiaque nécessitant l'injection dans vos veines,
- rythme cardiaque lent,
- pression artérielle basse,
- certaines affections cardiaques engendrant un rythme cardiaque lent ou irrégulier,
- choc cardiogénique, grave trouble cardiaque aigu aboutissant à une chute de

#### Faites attention avec CARDENSIEL :

Si vous présentez l'une des affections suivantes, indiquez-le à votre médecin :