

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1856 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre : RETRAITÉ

Nom & Prénom : SIAOUI KHTATAT


Date de naissance : 1956

Adresse : 5e lot KHARFADJI oued

Tél. : 061 820 500 Total des frais engagés : 843,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 09/06/2023

Nom et prénom du malade : SIAOUI KHTATAT Age : 67

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : RAM Le : 09/06/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Déclaration de Maladie

M22- 0056193

1856240

Optique Autres

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/06/23	3		CH	CH 01/06/23
				CH 01/06/23
				CH 01/06/23
				CH 01/06/23

EXECUTION DES ORDONNANCES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOPHARIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>Drs. f. M. M. 22/06/23</i>	13/06/23	UCSK20 UCN K20 ETG K45	hés 800d ⁴⁵

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. El Mostapha Aziz ALAOUI

Neurochirurgien

Chirurgie du cerveau, de la moelle épinière.

Chirurgie de la colonne vertébrale

Electroencéphalographie

12, Rue Zaki Eddine Attaoussi,
(à côté de la clinique Neurochirurgicale Anoual)

Casablanca - Tél.: 05 22 86 41 00

E.mail: doctoralaoui@hotmail.com



Sur Rendez-vous

Casablanca, le الدار البيضاء في

09/06/2023

بالموعد

12. زنفة زكي الدين الطاوي (قرب مصحة الدماغ أنوال الدار البيضاء).

الهاتف: 05 22 86 41 00

البريد الإلكتروني: doctoralaoui@hotmail.com

بالموعد

SLAOUI Khnata

**SUSPICION C CARPIEN
EMG**

Dr. El Mostapha Aziz ALAOUI
Neurochirurgien
Chirurgie du cerveau, de la moelle épinière.
Chirurgie de la colonne vertébrale
Electroencéphalographie
12, Rue Zaki Eddine Attaoussi
Casablanca - Tél.: 05 22 86 41 00



Dr. Abdelhafid MELIA
Médecine Physique et Rééducative
Médecine du Sport
28 Bis, Bd Mly Idriss 1^{er} - Casablanca
Tél. : 05 22 80 60 60 / 06 15 22

للحالات المستعجلة اتصلوا بمصحة أنوال - الهاتف: 05 22 86 02 07/08/09/10

Patente : 36300235 - I.F.:42023905 - N° CNSS: 2359330 - ICE: 002051462000048

Docteur Abdelhafid MELIANI
Médecine Physique et Rééducation
Electroneuromyographie- Urodynamique

RAPPORT D'ELECTRONEUROMYOGRAPHIE

CASABLANCA LE : mardi 13 juin 2023

Nom: SLAOUI Khnata

Age :67 ans

Diagnostic : Névralgie brachiale drte

Médecin traitant : DR AZIZ ALAOUI El mostapha

RAPPELS CLINIQUES:

Névralgie brachiale drte au niveau du bras et de l'avant-bras.

Avec une névralgie qui remonte sur le région cervico temporaire haute.

Dysesthésie nocturne.

Phalène positif du côté drt.

Force musculaire conservée.

Discret amyotrophie de l'éminence thénar drte.

Syndrome cervical.

CONCLUSION:

Diminution très importante de la conduction sensitive et motrice du nerf médian dans le canal carpien drt , importante du côté gche :

Compression très importante du canal carpien drt , et importante du côté gche .

Libérer à drte ensuite à gche.

Associé à une discrète atteinte neurogène radiculaire surtout C4 et C5 drte. Confronter aux éléments radiologiques et surtout rééducation antalgique au niveau du rachis cervical.



+Docteur Abdelhafid MELIANI
Médecine Physique et Rééducation

ELECTRONEUROMYOGRAPHIE (ENMG)

13/06/2023

FACTURE N°258/2023

Nom & Prénom : SLAOUI Khnata

Electromyographie + Enregistrement.....K45

Vitesses de conduction sensitives K20

Vitesses de conduction motrices..... K20
K 85

PRIX :..... 800, 00DH

Arrêter la présente facture à la somme de :

Huit Cents Dirhams

28, Bis Bd Moulay Driss 1er Casablanca Tél : 05 22 80 60 60/06 13 33 31 31

IF : 40444155 / ICE : 001823189000039/ INPE : 091112243

Em: dr.hafidmeliani@gmail.com / Web: www.reeducation-maroc.com

Dr. El Mostapha Aziz ALAOUI

Neurochirurgien

Chirurgie du cerveau, de la moelle épinière.

Chirurgie de la colonne vertébrale

Electroencéphalographie

12, Rue Zaki Eddine Attaoussi,
(à côté de la clinique Neurochirurgicale Anoual)
Casablanca - Tél.: 05 22 86 41 00
E.mail: doctoralaoui@hotmail.com



الدكتور عزيز علوى المصطفى

أخصائى فى أمراض وجراحة الدماغ

الأعصاب والعمود الفقري

التخطيط الكهربائى للدماغ

12. زنقة زكى الدين الطاوى (قرب مصحة الدماغ أنوال) الدار البيضاء.

الهاتف: 05 22 86 41 00

البريد الإلكتروني: doctoralaoui@hotmail.com

بالموعد

Sur Rendez-vous

09.06.2023
الدار البيضاء في Casablanca, le

ALAOUI KHAOUA



MB Any l
93 50

Si
1 ap de son
11226

- Aliparsa fit +
8020
1370

Boulevard Haïfa 125 - Casablanca
Tél: 05 22 86 41 00
PHARMACIE RZIKA SARL

Si
3 mors



DR. ALAOUI EL MOSTAPHA
NEUROCHIRURGIEN
12, Rue Zaki Eddine Attaoussi/
CASABLANCA. Tél: 05 22 86 41 00

للحالات المستعجلة اتصلوا بمصحة أنوال - الهاتف: 05 22 86 02 07/08/09/10

Patente : 36300235 - I.F.:42023905 - N° CNSS: 2359330 - ICE: 002051462000048

Urbanyl® 10mg

Clobazam

Comprimé sécable

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. • Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. • Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE URBANYL 10 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique – Anxiolytiques - code ATC : N05BA09
(N : système nerveux central)

Ce médicament appartient à la classe des benzodiazépines.

Ce médicament est utilisé :

Chez l'adulte

- pour traiter l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants.
- pour prévenir ou traiter les manifestations liées à un sevrage alcoolique.

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans

- pour traiter l'épilepsie, en association à un autre médicament.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE URBANYL 10 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais URBANYL 10 mg, comprimé sécable :

- Si vous alliez (voir rubrique 2, paragraphe « Grossesse et allaitement »). • Si vous êtes allergique au clobazam ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6. • Si vous avez une insuffisance respiratoire grave. • Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave). • Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil). • Si vous souffrez de myasthénie (maladie des muscles).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre URBANYL 10 mg, comprimé sécable : • Si vous avez une insuffisance respiratoire. • Si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique). • Si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale).

• Si vous avez eu des problèmes de dépendance à l'alcool.

• Si vous êtes enceinte.

Avec des produits non-médicamenteux contenant du cannabidiol, car cela peut augmenter les effets indésirables d'URBANYL 10 mg, comprimé sécable.

Avec des médicaments contenant du cannabidiol, comme cela peut augmenter les effets indésirables d'URBANYL 10 mg, comprimé sécable.

Avant de prendre URBANYL 10 mg, comprimé sécable, vous devez savoir que :

- Une analyse peut révéler un autre trouble physique ou psychique. Une évaluation médicale doit être effectuée avant la prescription de ce médicament. • Ce médicament ne traite pas la dépression. Si vous souffrez également de dépression, votre médecin vous prescrira un traitement approprié. Si la dépression n'est pas traitée, elle peut s'aggraver avec une persistance ou une augmentation possible du risque suicidaire. • Si votre anxiété persiste ou s'aggrave après une période courte de traitement, consultez votre médecin.

Dans les heures qui suivent la prise du médicament, il peut survenir :

- une perte de la mémoire concernant les événements survenus pendant le traitement (amnésie antégrade), • des troubles du comportement (tels que agressivité ou actes automatiques), agitation, nervosité, euphorie ou irritabilité, tension, • une insomnie, des cauchemars, • une altération de l'état de conscience, • une difficulté à coordonner certains mouvements (altération des fonctions psychomotrices).

Ces troubles peuvent être dangereux pour vous et pour autrui. Dans de tels cas, vous devez arrêter le traitement.

L'abus d'URBANYL 10 mg comprimé sécable, la prise associée d'alcool ou d'autres médicaments agissant sur l'état de vigilance, semblent augmenter le risque de tels comportements. Dans de tels cas, l'arrêt du traitement est recommandé.

- Si vous souffrez d'épilepsie, si la fréquence de vos crises augmente ou si des crises d'un type différent apparaissent : consultez immédiatement votre médecin.

Risque de dépendance

Ce médicament peut entraîner une dépendance physique et psychique. La dépendance peut se manifester par un phénomène de sevrage si vous arrêtez brutalement le

traitement.
musculaire
Divers
• si vous avez une de
médiacal
des bens
Lisez atti

LOT : 22E007V
PER : 10/2025

URBANYL 10MG
CP SEC B30

P.P.V : 23DH50

6 118000 061748

te, anxiété, douleur
gée, si vous prenez
endance à d'autres
icament de la famille
g. comprimé sécable
? Pour plus d'informations, parlez-en à votre pharmacien ou à votre pharmacien.

Risque de rebond

Une réapparition temporaire de l'anxiété peut survenir à l'arrêt du traitement. Afin de diminuer le risque de survenue d'un phénomène de sevrage ou de rebond de l'anxiété, la dose sera diminuée progressivement et les prises seront espacées. Les modalités d'arrêt du traitement doivent être précisées par votre médecin.

Idées suicidaires/tentative de suicide/suicide et dépression

Certaines études ont montré un risque accru d'idées suicidaires, de tentatives de suicide et de suicides chez les patients, prenant certains sédatifs et hypnotiques, y compris ce médicament. Cependant il n'a pas été établi si cela est dû au médicament ou s'il peut y avoir d'autres raisons. Si vous avez des idées suicidaires, contactez votre médecin le plus tôt possible pour obtenir un conseil médical (voir rubrique 4, « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).

Ce médicament ne traite pas la dépression. Chez le sujet présentant une dépression, il ne doit pas être utilisé seul car il laisserait persister la dépression évoluer pour son propre compte avec persistance ou majoration du risque suicidaire.

Utilisation chez les personnes âgées de plus de 65 ans

URBANYL 10 mg, comprimé sécable doit être utilisé avec prudence chez les personnes âgées en raison du risque de somnolence, sensations de vertiges et de relâchement musculinaire qui peuvent favoriser les chutes. Les chutes ont souvent des conséquences graves chez les personnes âgées.

Utilisation chez les personnes ayant un métabolisme du foie modifié (métaboliseurs lents) URBANYL 10 mg, comprimé sécable doit être utilisé avec prudence en cas d'association avec certains médicaments. Votre médecin adaptera la dose du traitement en conséquence.

Réactions sévères de la peau

Des réactions sévères de la peau comme le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Lyell peuvent survenir et mettre votre vie en danger. Vous devez immédiatement arrêter le traitement et consulter un médecin si des symptômes évocateurs de ces syndromes apparaissent : éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre de façon très grave à tout le corps, fièvre, érosions dans la bouche ou sur les organes génitaux.

Ces syndromes surviennent surtout si vous prenez deux médicaments en même temps dont les antiépileptiques qui sont associés à des réactions sévères de la peau.

Autres médicaments et URBANYL 10 mg, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament.

Et notamment les médicaments suivants : • médicaments ayant un effet sédatif, parmi lesquels des dérivés morphiniques (utilisés pour traiter la douleur, la toux et la dépendance) (par exemple dextrométhorphanine), des neuroleptiques (utilisés pour traiter certains troubles de l'humeur et du comportement) (par exemple promazine), des barbituriques, des benzodiazépines, des anxiolytiques autres que les benzodiazépines (par exemple, le mepromazine), des hypnotiques, des antidiépresseurs sédatifs (amitriptyline, doxépin, imépramine, miansépirine, mirtazapine, trimipramine), des antihistaminiques H1 sédatifs, des antihypertenseurs centraux, du baclofène et du thalidomide, • oxyde de sodium, utilisé dans le traitement de la narcolepsie, • stirenoptol, utilisé pour traiter l'épilepsie, • buprénorphine, utilisée pour traiter une dépendance aux opiacées, • clozapine, utilisée dans le traitement de troubles psychotiques, • produits contenant du cannabidiol (médicaments ou produits non-médicamenteux), • ticlopidine, un antiagréagant plaquettaire utilisé pour empêcher la formation des caillots sanguins, • fluconazole, utilisé pour traiter les infections dues à des champignons, • fluvoxamine, utilisée dans le traitement des états dépressifs, • oméprazole, utilisé dans le traitement de problèmes d'estomac, • paroxétine, utilisée dans le traitement de la dépression, • nébivolol, utilisé dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque.

URBANYL 10 mg, comprimé sécable avec de l'acé洛ol

La consommation d'alcool est formellement déconseillée pendant la durée du traitement. Grossesse et allaitement

Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse et chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception efficace. Si vous découvrez que vous êtes enceinte ou que vous souhaitez l'être, consultez votre médecin afin qu'il vous informe, juge de la nécessité de votre traitement et prenne les mesures adéquates.

Si vous prenez URBANYL 10 mg, comprimé sécable au cours du 1er trimestre de la grossesse : de nombreuses données n'ont pas montré d'effet malformatif des

OTIPAX

Phénazole, Chlorhydrate de lid

OTIPAX® 1% 4%

Solution pour instillation auriculaire

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament important pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les instructions de votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice.
- Vous devez-vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que OTIPAX®, solution pour instillation auriculaire et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser OTIPAX®, solution pour instillation auriculaire ?
3. Comment utiliser OTIPAX®, solution pour instillation auriculaire ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OTIPAX®, solution pour instillation auriculaire ?
6. Informations supplémentaires

Avertissements et précautions

Mises en garde spéciales

Si le tympan est ouvert, ce médicament peut être à l'origine d'effets indésirables au niveau de l'oreille moyenne.

PAR MESURE DE PRECAUTION, avant toute administration, il convient de faire vérifier l'intégrité de votre tympan par UN MEDECIN.

Précautions d'emploi

La durée de traitement ne doit pas dépasser 10 jours. Si les symptômes persistent, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

EN CAS DE DOUBTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Lot. 3717

Per.: 01 2026

BIOCODEX MAROC

PPV 20.20 DH