

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0055116

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4581 Société : RAM M2 Desinfest
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : NOUTI B. Mohamed
Date de naissance : 30-06-1952
Adresse : EN/45 Lot KHOZAMA ISSAFA Extension
Tél. : 0663621569 Total des frais engagés : 2,21,00, Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALP ☐ Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : OUSA Le : 06/23

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/05/23	C\$		Gratuit	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE L'EXTENSION 24 Rue 8 Lissasfa Extension - CASABLANCA Tel: 05 22 93 48 40	31.05.23	1941,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
LABORATOIRE D'ANALYSES RADIOLOGIQUES E-mail: labo@form-hiv.com 05 22 61 86 62	25/05/23	BONJOUR	180,00

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient																							
				CCEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DEBUT D'EXECUTION FIN D'EXECUTION																						
O.P.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE <table border="1"> <tr> <td>H</td> <td></td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			H		H	25533412	21433552		00000000	00000000		D		G	00000000	00000000		35533411	11433553		B				CCEFFICIENT DES TRAVAUX MONTANTS DES SOINS DATE DU DEVIS DATE DE L'EXECUTION
H		H																								
25533412	21433552																									
00000000	00000000																									
D		G																								
00000000	00000000																									
35533411	11433553																									
B																										
																										

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



وصفة طبية
Ordonnance

PHARMACIE L'EXTENSION
24 Rue 8 Mars 1956
Extension - CASABLANCA
Tél: 05-22 93 48 40

Casablanca, le :

31/05/23

Mouhib

Mohamed

119.80

* Betacyne 160 g/j
pdt 0.5J

239.00 x7

* Twarcon 2g/j pdt 0.7J

148.40

* Tublucan 50 g 1g/j
pdt 0.7J

G: 1941.20

وصفة طبية
Ordonnance

Casablanca, le :

25/05/2023

Dr MAOUIB Mohamed

1^{er} ECBU de
Contrôle

Laboratoire National de Biologie

Tél : 05.29.05.02.33

E-mail : labo@fckm-hck.ma

090061862
Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa
Médecin Interne BENIMAZHAR ACHRAF

HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

F A C T U R E

N° 73 249 / 2023 du 25/05/2023

Nom patient : **MOUHIB MOHAMED**

Entrée 25/05/2023

Prise en charge : **PAYANTS**

Sortie 25/05/2023

	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
PRESTATIONS INTERNES				
EXAMENS BIOLOGIE	1,00	B0150	180,00	180,00
			Sous-Total	180,00
Total Frais Clinique				180,00

<i>Arrêtée la présente facture à la somme de :</i>		
CENT QUATRE-VINGTS DIRHAMS	Total	180,00

Encaissements			Carte Bq		Total encaissé	Solde
			180,00		180,00	0,00

Signature
25/05/2023
Cheikh Mohamed



مركز النقد

SANS CONTACT



25/05/23

11:10:52

9900398026

93980201

HOP CHEIKH KHALIFA G10

Casablanca

A00000000031010

APP : VISA

xxxxxxxxxxxxxx4913

CARTE NATIONALE

0A4B02D94774AE1C

621-0-9999-1-44

MONTANT: 180,00 MAD

NUM TRANSACTION : 006

NUM AUTORISATION: 692431

STAN : 008159

DEBIT

Le CMI vous remercie

TICKET CONSERVER

COPIE CLIENT



NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Diflucan 50 mg gélules
Diflucan 150 mg gélules
fluconazole

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ? :

1. Qu'est-ce que Diflucan et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Diflucan
3. Comment prendre Diflucan
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Diflucan
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Diflucan et dans quel cas est-il utilisé ?
Diflucan fait partie d'un groupe de médicaments appelés "antifongiques". La substance active est le fluconazole. Diflucan est utilisé pour traiter les infections dues à des champignons et peut également être utilisé pour vous empêcher de contracter une infection à Candida. La cause la plus fréquente des infections fongiques est une levure appelée Candida.

Adultes

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :
- Ménéngite à cryptococcus - infection fongique du cerveau
- Coccidioidomycose - une maladie du système bronchopulmonaire
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, des organes (p.ex. cœur, poumons) ou les voies urinaires.
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge et de plaies dues à une prothèse dentaire
Mycose génitale - infection du vagin ou du pénis. Infections cutanées - p.ex. pied d'athlète, herpès circiné, eczéma marginé de Hebra, infection des ongles.
Vous pourriez aussi recevoir du Diflucan pour :
- Éviter la récurrence d'une ménéngite à cryptococcus
- éviter la récurrence d'une mycose de la muqueuse
- diminuer le risque de récurrence de mycose vaginale
éviter de contracter une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement)

Enfants et adolescents (0 à 17 ans)

Votre médecin pourra vous prescrire ce médicament pour traiter les types suivants d'infections fongiques :
- Mycose de la muqueuse - infection de la muqueuse buccale, de la gorge
- Infections à Candida, retrouvées dans le sang, des organes (p.ex. cœur, poumons) ou les voies urinaires.
- Ménéngite à cryptococcus - infection fongique du cerveau
Vous pourriez aussi recevoir du Diflucan pour :
- vous empêcher de contracter une infection à Candida (si votre système immunitaire est affaibli et ne fonctionne pas correctement).
- éviter la récurrence d'une ménéngite à cryptococcus

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Diflucan ?

Ne prenez jamais Diflucan :

- si vous êtes allergique au fluconazole, aux autres médicaments que vous avez pris pour traiter des infections fongiques ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. Les symptômes d'allergie peuvent être de type démangeaisons, rougeur de la peau ou difficultés à respirer.
- si vous prenez de l'astémizole, de la térfénadine (médicaments antihistaminiques utilisés pour traiter les allergies).
- si vous prenez du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac).
- si vous prenez du pimozide (utilisé pour traiter des troubles mentaux).
- si vous prenez de la quinidine (utilisée pour traiter les troubles du rythme cardiaque).
- si vous prenez de l'érythromycine (antibiotique pour traiter les infections).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Diflucan :
- si vous avez des problèmes de foie ou de rein,
- si vous souffrez d'une maladie du cœur, y compris des troubles du rythme cardiaque,
- si vous avez des taux anormaux de potassium, de calcium ou de magnésium dans le sang,
- si vous développez des réactions cutanées graves (démangeaisons, rougeurs de la peau ou des difficultés à respirer),
- si vous développez des signes d'insuffisance surrénale, un trouble dans lequel les glandes surrénales produisent des quantités insuffisantes de certaines hormones stéroïdiennes comme le cortisol (fatigue chronique ou prolongée, faiblesse musculaire, perte d'appétit, perte de poids, douleurs abdominales).

Autres médicaments et Diflucan

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Prévenez immédiatement votre médecin si vous prenez de l'astémizole, de la térfénadine (un antihistaminique pour traiter les allergies) ou du cisapride (utilisé pour les maux d'estomac) ou du pimozide (utilisé pour traiter les troubles mentaux) ou de la quinidine (utilisée pour traiter les arythmies cardiaques) ou de l'érythromycine (un antibiotique pour traiter les infections) car ces produits ne doivent pas être pris avec Diflucan (voir la rubrique « Ne prenez jamais Diflucan »).

Pour et de

Pfizer

DIFLUCAN®

50 mg FLUCONAZOLE

UT. AV. : 09 25

LOT N° : GP 47

P.P.V. :

14840

DIFLUCAN® 50 mg

7 GELULES

6 118000 250180

6 mg

Pour (si vot et ne l Utilisa Respo Utilisa La posé La posé Affectu

Mycose de la muqueuse et infections de la gorge dues à Candida - la dose et la durée dépendent de la sévérité de l'infection et de sa localisation.

Ménéngite à cryptococcus ou infections fongiques internes dues à Candida

Pour éviter la récurrence d'une ménéngite à cryptococcus

Pour empêcher les enfants de contracter une infection à Candida (si leur système immunitaire ne fonctionne pas correctement)

3 mg à 12 mg par kg de poids corporel une fois par jour

Utilisation chez les enfants âgés de 0 à 4 semaines

Enfants âgés de 3 à 4 semaines :
Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 2 jours seulement. La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 48 heures.
Enfants âgés de moins de 2 semaines :
Même posologie que ci-dessus mais à une fréquence de tous les 3 jours seulement. La posologie maximale est de 12 mg par kg de poids corporel toutes les 72 heures.

Patients âgés

La dose usuelle adulte devrait être administrée sauf si vous souffrez de problèmes rénaux.

Patients avec des problèmes rénaux

Votre médecin pourra modifier votre dose en fonction de l'état de votre fonction rénale.
Si vous avez pris plus de Diflucan que vous n'auriez dû
Si vous prenez trop de gélules en une seule fois, vous pourriez vous sentir mal. Contactez immédiatement votre médecin ou le service des urgences de l'hôpital le plus proche. Les symptômes d'un éventuel surdosage peuvent être d'entendre, de voir, de ressentir ou de penser des choses qui ne sont pas réelles (hallucinations) et comportement paranoïde. Une prise en charge (avec un traitement symptomatique et un lavage d'estomac, si nécessaire) peut être nécessaire.
Si vous avez pris trop de Diflucan, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoisons ou de Pharmacovigilance.

Si vous oubliez de prendre Diflucan

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rappelez. S'il est presque l'heure de votre dose suivante, ne prenez pas la dose que vous avez oubliée.
Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Quelques personnes développent des réactions allergiques mais les réactions allergiques graves sont rares. Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Si vous ressentez l'un des symptômes suivants, prévenez immédiatement votre médecin.

- suffocation respiratoire soudaine, difficultés à respirer ou oppression dans la poitrine
- gonflement des paupières, du visage ou des lèvres
- rougeur de la peau avec démangeaisons sur tout le corps ou démangeaisons au niveau de taches rouges
- éruption cutanée
- réactions cutanées sévères telles qu'une éruption entraînant la formation de bulles (pouvant toucher la bouche et la langue).

Diflucan peut affecter votre foie. Les signes de problèmes hépatiques comprennent :

- la fatigue
- une perte d'appétit
- des vomissements
- un jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse)

Si l'un de ces signes survient, arrêtez de prendre Diflucan et prévenez immédiatement votre médecin.

Autres effets indésirables :

Par ailleurs, si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables fréquents (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 10) sont :

- maux de tête
- maux d'estomac, diarrhée, nausées, vomissements
- augmentations des tests sanguins de fonctionnement du foie
- éruption

Les effets indésirables peu fréquents (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 100) sont :

Gentamycine®

LOT 448
EXP 08/24
PPV-112DH00

COMPOSITIONS

- Gentamicine (DCI) 2 ml
exprimé en 40 mg
ou 80 mg

• Excipients

FORMES ET PRESENTATIONS

Soluté injectable :

- Ampoule de 2 ml (40 mg) : Boîte unitaire.
- Ampoule de 2 ml (80 mg) : Boîte unitaire et boîte de 6.
- Ampoule de 3 ml (120 mg) : Boîte unitaire et boîte de 6.
- Ampoule de 4 ml (160 mg) : Boîte unitaire et boîte de 6.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

Antibiotique bactéricide de la famille des aminoglycosides.

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Zone industrielle, Ouest Ain Harrouda, Route Régionale N° 322
(ex R.S 111) Km 12.400 Ain Harrouda 28630 Mohammedia - Maroc

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Les indications sont limitées aux infections à bacilles Gram négatif sensibles, notamment dans leurs localisations rénales et urologiques. La gentamicine, associée à un autre antibiotique, pourra être prescrite dans certaines infections à germes sensibles, en se basant sur les données bactériologiques. En particulier :

- infections rénales, urologiques et génitales ;
- infections cutanées et, en particulier, staphylococcies malignes de la face ;
- infections articulaires ;
- infections respiratoires ;
- septicémies et endocardites.

CONTRE - INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des aminoglycosides,
- Myasthénie,
- Aminosides (administration simultanée).

Pour la gentamycine 160 mg :

- Insuffisance rénale sévère ;
- Hypoacousie préexistante ;
- Malade pesant moins de 50 Kg.

MISE EN GARDE

Ce produit contient des sulfites qui peuvent éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type anaphylactique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec précaution en cas de :

- Gentamycine devra être utilisée avec prudence chez les sujets porteurs d'une lésion vestibulaire ou cochléaire.
- La néphrotoxicité et l'ototoxicité de la gentamycine imposent les précautions suivantes :
- chez le sujet insuffisant rénal, n'utiliser Gentamycine qu'en cas de stricte nécessité et adapter la posologie de la créatinémie. Une surveillance médicale portant sur les fonctions rénale et auditive.
- Les taux sériques de l'antibiotique seront contrôlés dans toute la mesure du possible, afin d'éviter, de façon prolongée, le seuil toxique pour l'appareil cochléo-vestibulaire que l'on situe à 10-12 µg/ml.
- des taux sériques résiduels supérieurs à 2 µg/ml sont à éviter ;
- éviter d'associer la gentamycine aux diurétiques très actifs,
- éviter les traitements itératifs et/ou prolongés, surtout chez les sujets âgés.
- En cas d'intervention chirurgicale, informer l'anesthésiste réanimateur de la prise de ce médicament.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut déclarer à votre médecin ou à votre pharmacien tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse : l'innocuité du produit au cours de la grossesse n'a pas été évaluée (absence de données sur la cochléo-vestibulaire du fœtus).

Allaitement : le passage dans le lait maternel est négligeable.

POSOLOGIES

Les posologies seront adaptées à la sévérité de l'infection, à l'état et à l'âge du patient.

LOT: S-13-3
PER: 11-2024
PPV: 239.00DH

في حالة
الغرقية
بالة الدودة

تبلغ 1,5 ملغ/كغم من فليكسيدين في تطعيم وريدي (60 قطرة/كغم) /
 لتتبع (البروب) في حالة علاجات الطوارئ أو وجود عوامل خطر التكرار الدوائية
 للحساسية المتعددة المتزامن.

يبلغ مخلفات الجرعات هذا بعد 36-48 ساعة حسب التذكير، اللبنة الأصغر للزيادة
 للتعامل مع التكرار الدوائية.

الأطفال
 الميعة الأمية هي 50 ملغ/كغم البروب في حقنة أحقة

الأمم المتحدة استئنافية خطيرة وأحياناً ترمية إلى اليونانيين قبل الآن و
اليونانيين البدء بالحسين على الكالاسيون وبعيد السلك
الرومي بالتمسك بالحسين كانت الممارات الرومية وقران الكالاسيون معتدلة
لدى اليونانيين قبل الآن اليونانيين وحدث تزيينات الإصلاح الكالاسية
استيقظت قبل على مستوي أعلى الروي والكالسيو وتعتبر على الأرجح لدى
اليونانيين قبل الآن اليونانيين كبريا سمى شعب شعاع منهم (80 ميل/كلم)
الزواجر جلد قلعته من ظهور حصان. حكمه كد على لاقل من أجيال أخرى من

هناك
الماء ليس متساوية المتاحات
تتعلق الأمر بالوضع
الماء منتج طبيعي
مقدار بحث طبي من اكتشافات في العالم

[illegible][illegible]

تعتبر جامعة القاهرة من الجامعات التي تلتزم بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في التعليم والبحث العلمي، حيث تمتلك الجامعة أحدث المرافق والمعدات العلمية، وتحرص على تطوير برامجها الدراسية لتتواءم مع المتغيرات العالمية في سوق العمل.

مما علاجه
وقد ثبتت لك من أجل الخلق على حقيقة هذا الدواء
1 استعملوا هذا دواءا يوما أو يومين لكم طيبكم
2 استعملوا دواء الطيب استمراما لما
3 استعملوا الدواء الجوى حينما تم وصفه طبه حتى لم اعتدوا مكافحه
مصر على أن لا تفرط
4 تعطلوا هذا الدواء إلى ما شئتم أن لا تكون مناسباً لمرضى
5 من الأنهار من علاجهم للمرضى كالأطباء الذين لا

في الماضي،
كانت تعان الحياة الناجمة عن جرائم محاسبة لسيبريا، لكن خاصة في
الوقت بعد الحرب العالمية الثانية، والتفاهد السياسي، باستثناء تلك المستوحاة
من النازية.

محرر "الشمس"
التي تتصدر مع سببها لغة حذرة (الفرقة) خلال
الفترة الأخيرة مع الجولان السياسي (الرائد القانوني)
في نهاية المطاف، حيث تم إنشاء مجلة "الشمس" (1998-2000)

في الماضي،
كانت تعان الحياة الناجمة عن جرائم محاسبة لسيبريا، لكن خاصة في
الوقت بعد الحرب العالمية الثانية، والتفاهد السياسي، باستثناء تلك المستوحاة
من النازية.

محرر "الشمس"
التي تتصدر مع سببها لغة حذرة (الفرقة) خلال
الفترة الأخيرة مع الجولان السياسي (الرائد القانوني)
في نهاية المطاف، حيث تم إنشاء مجلة "الشمس" (1998-2000)

البرص
1 في الدم في حلة واحدة وكان هذا في 2 في حلة واحدة حسب
عطرية الأربعة والبرص
البرص
طريقة استعمال الزكامس في 2
في الدم في حلة واحدة وكان هذا في 2 في حلة واحدة حسب
عطرية الأربعة والبرص

من الحاديات غسيل الأنف بعد كل استعمال
من يقطن في أقاليم البحر أو الأوسر السبخ
شروط الخطر القليلة المصير

في نفس الوقت، فإننا نلاحظ أن بعض الدول قد اتخذت تدابير إضافية لتتجنب حدوث مثل هذه المواقف. فمثلاً، فإن بعض الدول قد اتخذت تدابير إضافية لتتجنب حدوث مثل هذه المواقف.

[illegible]

في حالة التعلق بالبريد في مستشفى
التغذية الأولية والتعليمية
يا كنت تلتزم بالبريد
الطبيب في المستشفى
الحمل والولادة
لا يستعمل الدواء خلال الحمل
علاج التشنج استئصال العصب الـ ٩
استئصال العصب الـ ٩
استئصال العصب الـ ٩

[illegible]

تحت إشراف اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في مصر. الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحسين الوصول إلى الغذاء. الاستراتيجية هي وثيقة توجيهية تهدف إلى توفير إطار عام للتخطيط والسياسة في مجال الأمن الغذائي. الاستراتيجية هي وثيقة توجيهية تهدف إلى توفير إطار عام للتخطيط والسياسة في مجال الأمن الغذائي.

من كتاب حبيب الخوري، إنا كان بك شك أغلب الزعم من العلومات
التي هي حال ومواد أمراض يشكك شخصي وأثم باعتضاله شخص آخر
أما أصبحت أول الأضرار غير الشريفة لهدم عظمته (إنا حصلت وجه
عائلي غير شريفة غير متذكر في هذه الأثرية، قلت من ذلك مع
الطبيب الشيخ الصديقي

تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم إعداد هذا الدليل في إطار مشروع "تعزيز التعليم العالي والبحث العلمي" الذي يهدف إلى تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. تم إعداد هذا الدليل بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والتعليمية في العراق، بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. تم إعداد هذا الدليل باللغة العربية، وهو متاح للجميع، ويمكن استخدامه كمرجع أساسي للمهتمين بالتعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

[illegible][illegible]

بإحدى الألاع، ينتابه على هذه النشرة أكاديمية قبل تناول هذا الدواء.
احتفظ بهذه النشرة في مكان آمن لفراستها من وقت
استخدام هذه أكاديمية صودي

تلك التي يقتر فيها الكاسبوم، وذلك رغم اختلال التوازن الجبرجية بين أنماها. يمكن التخلص من خطر التكاثر الجنسي مع أدوية أخرى غير الاستعمال، يجب استعمال سينترالين وحده ولا يجب خلطه مع محاليل أو مواد مكملة بشكل مسبق في طريقة الاستعمال (راجع ورقة كاسبيدية الاستعمال). التغيرات غير النشوية فيها (بواسطة الاستعمال) ينصح بإدراجها في علاج طويل الأمد (بواسطة الاستعمال).

طريقة وكيفية الاستعمال
تستغرق مدة التصنيع حوالي 30 دقيقة
يطلب 2 غ من سفينترالسيوم في 40 ملل من ماء استحضرات الفخار (ppm) أو
في محاليل التطهير التالية:
كلوريد الصوديوم 0.9% كلوريد الصوديوم 0.45% 2.5% كلوكور 5%
كلوكور 10% بكتاكسين 6% في كلوكور 5% هيدروكسي إيثيل النشا 10.6%.

أعضاء الجهاز العصبي المركزي. حالات جد تارة من الصعاق الدول في يولي
استعمال جرعات كبيرة في حالات الاعتلال المائي (اضطراب الأيونات
حركات غير تاليد (تجاهات) خاصة عند العائدين من تصور المرض في الإبحار
حالات خطيرة استتابة أي بعضها إلى اليلة في المليونين قبل الأوان
المليونين بعد حلول في نفس الوقت من سيدونيكسون في الوريد
ولاح (الكالسيوم) (راجع طريقة وأهمية استعماله)
تفاعلات ملحوظة: من بين البوديكين وأقرب ف

41 زينة محمد نبوي - الدار البيضاء 20110

COOPER
FARMMA

بل يتعلق الأمر بتناول الأدوية التي لا في حاجة إليها.

HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

CASABLANCA

Reçu de caisse

N° : 2305251212390790 / 1 / 0

Numéro admission	Nom du patient	Date encaissement
2300690610	MOUHIB MOHAMED	25/05/2023

Mode paiement	Références du paiement	Montant Dhs
CarteB	8159	180,00
PAYANT	Total payé	180,00
CENT QUATRE-VINGTS DIRH		

Reçu établi par : SALJAR

Laboratoire
Tél : 05 29 45 02 33
E-mail : labo@cm-hck.ma