

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **7472**

Société : **165754**

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom :

AKIL ABDELLAH

Date de naissance :

04.10.1958

Adresse :

31 Rue IBNOU HABBOUS MAARIF

Tél. : **06 78 27 59 32**

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. BENLHABIB Aicha
OMNIPRATICIENNE
106 Av. El Joulane Sidi Othmane
Tél: 0522 22 94 09

Cachet du médecin :

Date de consultation : **15/06/2023**

Nom et prénom du malade : **D° AICIL Abderrahim** Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : **H.I.A Cyst. h.**

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **CASA**

Le : **16/06/2023**

Signature de l'adhérent(e) :

ACIL



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 M'hamed GERMANE Pharmacie TANOU KATIR Docteur en Pharmacie	15/10/23	1042.80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	C
00000000	00000000
25533411	11433553

[Création, remont, adjonction] onctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الشروع في استعمال هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أستئلة أخرى أو شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات إضافية.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه لشخص آخر حتى إذا ظهرت عليه نفس الأعراض، يمكن لذلك أن يضر به.
- إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو شعرت بأي أثر جانبي غير مذكور في هذه النشرة، استشر الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
3. كيف تتناول أتابكاند (④) قرص قابل للقسمة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
6. معلومات أخرى.

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟

اسم هذا الدواء هو أتابكاند (④)، ويحتوي على المادة النشطة كانديسارتان سيلكزتيل. يتبع هذا الدواء إلى مجموعة أدوية تسمى مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2. وهو يعمل عن طريق ارتخاء وتتوسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد على خفض ضغط الدم الشرياني. كما أنه يساعد القلب على هُبَّةِ الدُّم بسهولة أكبر إلى كافة أجزاء الجسم. يستخدم هذا الدواء:



يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الشروع في استعمال هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أستئلة أخرى أو شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات إضافية.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه لشخص آخر حتى إذا ظهرت عليه نفس الأعراض، يمكن لذلك أن يضر به.
- إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو شعرت بأي أثر جانبي غير مذكور في هذه النشرة، استشر الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
3. كيف تتناول أتابكاند (④) قرص قابل للقسمة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
6. معلومات أخرى.

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟

اسم هذا الدواء هو أتابكاند (④)، ويحتوي على المادة النشطة كانديسارتان سيلكزتيل. يتبع هذا الدواء إلى مجموعة أدوية تسمى مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2. وهو يعمل عن طريق ارتخاء وتتوسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد على خفض ضغط الدم الشرياني. كما أنه يساعد القلب على هُبَّةِ الدُّم بسهولة أكبر إلى كافة أجزاء الجسم. يستخدم هذا الدواء:



يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الشروع في استعمال هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أستئلة أخرى أو شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات إضافية.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه لشخص آخر حتى إذا ظهرت عليه نفس الأعراض، يمكن لذلك أن يضر به.
- إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو شعرت بأي أثر جانبي غير مذكور في هذه النشرة، استشر الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
3. كيف تتناول أتابكاند (④) قرص قابل للقسمة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
6. معلومات أخرى.

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟

اسم هذا الدواء هو أتابكاند (④)، ويحتوي على المادة النشطة كانديسارتان سيلكزتيل. يتبع هذا الدواء إلى مجموعة أدوية تسمى مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2. وهو يعمل عن طريق ارتخاء وتتوسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد على خفض ضغط الدم الشرياني. كما أنه يساعد القلب على هُبَّةِ الدُّم بسهولة أكبر إلى كافة أجزاء الجسم. يستخدم هذا الدواء:



يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الشروع في استعمال هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أستئلة أخرى أو شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات إضافية.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه لشخص آخر حتى إذا ظهرت عليه نفس الأعراض، يمكن لذلك أن يضر به.
- إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو شعرت بأي أثر جانبي غير مذكور في هذه النشرة، استشر الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
3. كيف تتناول أتابكاند (④) قرص قابل للقسمة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
6. معلومات أخرى.

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟

اسم هذا الدواء هو أتابكاند (④)، ويحتوي على المادة النشطة كانديسارتان سيلكزتيل. يتبع هذا الدواء إلى مجموعة أدوية تسمى مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2. وهو يعمل عن طريق ارتخاء وتتوسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد على خفض ضغط الدم الشرياني. كما أنه يساعد القلب على هُبَّةِ الدُّم بسهولة أكبر إلى كافة أجزاء الجسم. يستخدم هذا الدواء:



يرجى قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الشروع في استعمال هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قراءتها مجدداً.
- إذا كانت لديك أستئلة أخرى أو شكوك، استشر الطبيب أو الصيدلي للحصول على معلومات إضافية.
- وصف هذا الدواء لك شخصياً، لا تعطه لشخص آخر حتى إذا ظهرت عليه نفس الأعراض، يمكن لذلك أن يضر به.
- إذا أصبح أي من الآثار الجانبية خطيراً، أو شعرت بأي أثر جانبي غير مذكور في هذه النشرة، استشر الطبيب أو الصيدلي.

في هذه النشرة

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟
2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل تناول أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
3. كيف تتناول أتابكاند (④) قرص قابل للقسمة؟
4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
5. كيف يحفظ أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة؟
6. معلومات أخرى.

1. ما هو أتابكاند (④)، قرص قابل للقسمة، وما هي دواعي استعماله؟

اسم هذا الدواء هو أتابكاند (④)، ويحتوي على المادة النشطة كانديسارتان سيلكزتيل. يتبع هذا الدواء إلى مجموعة أدوية تسمى مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2. وهو يعمل عن طريق ارتخاء وتتوسيع الأوعية الدموية، الأمر الذي يساعد على خفض ضغط الدم الشرياني. كما أنه يساعد القلب على هُبَّةِ الدُّم بسهولة أكبر إلى كافة أجزاء الجسم. يستخدم هذا الدواء:

~~Dr. ALLALI BENLHABIB Aïcha~~

Médecine Générale

Experte près les Tribunaux

CES de Microbiologie et Virologie

de la Faculté de Médecine de Nancy

Diplômée d'Université de Diabétologie

D.U. de Nutrition et Diététique Médicale

D.U. d'Echographie Générale

de la Faculté de Médecine de Montpellier



الدكتورة علالى ابن الحبيب عائشة

الطب العام

خبيرة لدى المحاكم

اختصاصية في علم الميكروبات و الفيروسات

من كلية الطب ببنانسي

دبلوم داء السكري

دبلوم التغذية و علاج السمنة

دبلوم الفحص بالصدى

من كلية الطب بمونبولي

Casablanca, le 15/06/2023 الدار البيضاء، في

M^E AKIL

Abderrahim

127.70 × 5 = 638.50

ATACAND 8 mg.

n° (5)

1c le matin pendant
5 mois

222.00

Augmenter 1g.

Isachub 3x15
pendant 87

74.80

Sepcon 500 mg

1c 2x15 × 55



05 22 37 04 08

106، شارع الجولان سيدى عثمان - الدار البيضاء

106, Av. El Joulane Sidi Othmane - Casablanca

59.70

O10 propolis
application 1 g

47.80

Dagen:

re 2x15

1042.70

Pharmacie IBNOU KHLIK
M'hamed DR RMANE
Docteur en Pharmacie

Dr. BENHARIB Aicha
011/914211645
106 Av. El Jazira 1000 Othmane
Tél: 0122 3744 08

Nourrissons - Enfants - Adultes

BAUME BUCCO-GINGIVAL

OROPROPOLIS



E VOTRE MEDECIN

10

ss durant la période

toux est donc

OROPROPOLIS

OROPROPOLIS

et des poumons.

définiment.

/S DE VOTRE

nue à l'un des

atisme ou une

cas d'affection

LOT : 350 / PER : 11 / 2025
PPC : 59.70 DHS

OROPROPOLIS

BAUME BUCCO-GINGIVAL

Nourrissons - Enfants - Adultes

Laboratoires LA
Distribué par PHAI
60, Zone Industrielle
Av. Chirac 30100
Tél : 0536563333 Fax : 0
BP : 5751 Fès - MA

site web : www.pharm

40 Comprimés enrobés
gastro-résistants

Serrapeptase

10 000 UI

DASEN® 10 000 UI

Indications :

- * Irritation de la muqueuse bucco-gingival.
- * Agressions dues aux prothèses dentaires.
- * Eruption dentaire du nourrisson et du petit enfant.
- * Hygiène de la cavité buccale.

Mode d'emploi :

Appliquer une noisette de baume sur un doigt propre et masser les gencives, jusqu'à pénétration complète. Renouveler l'opération aussi souvent que nécessaire.

Ingédients :

GLYCERIN - ALOE - MEL - SORBITOL.

47/80

Lot N° :

EXP :

PPV :

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR
SEPCEN® 250 mg, SEPCEN® 500 mg et
Boîte de 10 comprimés pelliculés
D.C.J. : Ciprofloxacin

LDT: 05322033
PER: 10/2025
PPV: 74.80 DH

74,80

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cet

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin.
 - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un ou votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement pres en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui é.
 - Si l'un des effets indésirables devient grave ou si v dans cette notice parlez-en à votre médecin ou votre n

• Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que **SEPCEN®** et dans quels cas est-il recommandé ?
 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre **SEPCEN®** ?
 3. Comment prendre **SEPCEN®** ?
 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
 5. Comment conserver **SEPCEN®** ?
 6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE SEPCEN® ET DANS QUELS

Classe pharmacothérapeutique : Fluoroquinolone. SEPCEN® contient une substance active, la ciprofloxacine. La ciprofloxacine est un antibiotique appartenant à la classe des fluoroquinolones. Ces substances sont utilisées pour combattre les bactéries responsables des infections. Elle est contre-indiquée dans les cas de sensibilité connue.

Chez l'adulte :

SEPCENO® est utilisé chez l'adulte pour traiter les infections bactériennes suivantes

- infections des voies respiratoires.
 - infections persistantes ou récurrentes de l'oreille ou des sinus.
 - Infections urinaires.
 - infections de l'appareil génital chez l'homme et chez la femme.
 - infections gastro-intestinales et infections intra-abdominales.
 - infections de la peau et des tissus mous.
 - infections des os et des articulations.
 - Prévention des infections dues à la bactérie *Neisseria meningitidis*.
 - Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut être utilisé dans le traitement de patients présentant un faible taux de globules blancs (neutropénie), et ayant de la fièvre, dont on suppose qu'une bactérie en est la cause.

Si vous présentez une infection sévère ou une infection due à différents types de bactéries, un traitement antibiotique additionnel pourra vous être prescrit en complément de SEPCEN®.

Chez l'enfant et l'adolescent :

SEPCEN® est utilisé chez l'enfant et l'adolescent, sous le contrôle d'un spécialiste, pour traiter les infections bactériennes suivantes :

- Infections des poumons et des bronches chez l'enfant et l'adolescent atteint de mucoviscidose.
 - Infections urinaires compliquées, y compris les infections ayant atteint les reins (pyélonéphrite).
 - Exposition à la maladie du charbon.

SEPCEN® peut également être utilisé pour traiter d'autres infections sévères spécifiques de l'enfant et de l'adolescent si votre médecin le juge nécessaire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE SEPCEN® ?

• Ne prenez jamais SEPCENO :

- Si vous êtes allergique à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des autres composants contenus dans **SEPCEN®** (voir rubrique 6).
 - Si vous prenez de la tizanidine (voir rubrique 2 : Prise d'autres médicaments).

• Mise en garde et précaution d'emploi :

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SEPCENO® :
Vous ne devez pas prendre d'antibiotiques de la famille des fluoroquinolones.

vous ne devez pas prendre d'antécoupoles de la famille des fluoroquinolones/quinolones, incluant SEPCEN®, si vous avez déjà présenté un effet indésirable grave dans le passé lors de la prise d'une quinolone ou d'une fluoroquinolone. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin au plus vite.

Adresssez-vous à Votre Médecin avant de prendre SEPGEN® ;

- Si vous avez déjà présenté des problèmes rénaux car il pourra être nécessaire d'adapter votre traitement ;
 - Si vous souffrez d'épilepsie ou d'une autre affection neurologique ;
 - Si vous avez déjà eu des problèmes aux tendons avec des antibiotiques de la même famille que SEPCEN® ;
 - Si vous êtes diabétique parce que la ciprofloxacine risque de vous occasionner une hypoglycémie ;
 - Si vous souffrez de myasthénie (maladie rare qui entraîne une faiblesse musculaire) en raison du risque d'aggravation des symptômes ;
 - Si vous savez que vous présentez, ou un membre de votre famille présente un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), car la ciprofloxacine peut vous occasionner une anémie ;
 - Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertrophie ou de " renflement " d'un gros vaisseau sanguin (anévrisme aortique ou anévrisme périphérique d'un gros vaisseau) ;
 - Si vous avez déjà eu un épisode antérieur de dissection aortique (une déchirure de la paroi aortique) ;
 - Si vous présentez des antécédents familiaux d'anévrisme aortique ou de dissection aortique ou de valvulopathie cardiaque congénitale, ou présentez d'autres facteurs de risque ou affections prédisposantes (par exemple, des troubles du tissu conjonctif comme syndrome de Marfan ou le syndrome d'Ehlers-Danlos, le syndrome de Turner, le syndrome de Sjögren (une maladie auto-immune inflammatoire), ou des troubles vasculaires comme l'artérite de Takayasu, l'artérite à cellules géantes, la

AUGMENTIN 1 g/125 mg, ADULTES, poudre pour suspension

buvable en sachet-dose

AUGMENTIN 500 mg/62.5 mg ADULTES, comprimé pelliculé

Amoxicilline/acide clavulanique

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'information au médecin ou au pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit (ou a été prescrit à votre enfant). Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en au médecin ou au pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AUGMENTIN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AUGMENTIN ?
3. Comment prendre AUGMENTIN ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AUGMENTIN ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE AUGMENTIN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaceutique : Association de pénicillines, y compris inhibiteurs de la bêta-lactamase

- code ATC : J01CR02.

AUGMENTIN est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois être d'efficaces (être inactives). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

AUGMENTIN est utilisé chez l'adulte et chez l'enfant pour traiter les infections suivantes :

- Infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AUGMENTIN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre AUGMENTIN 1 g/125mg. Adultes, poudre pour suspension buvable en sachet-dose.

Ne prenez jamais AUGMENTIN :

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 8.
- si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou,
- si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

→ Ne prenez pas AUGMENTIN si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AUGMENTIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Selon ses résultats, il pourra vous prescrire un dosage différent d'AUGMENTIN ou un autre médicament.

Réactions nécessitant une attention particulière

AUGMENTIN peut agraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves, notamment des réactions allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque vous prenez AUGMENTIN, vous devez surveiller certains symptômes afin de réduire les risques. Voir → Réactions nécessitant une attention particulière, à la rubrique 4.

Test sanguins et urinaires

Si vous effectuez des analyses de sang (nombre de globules blancs, tests ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des analyses d'urine (taux de glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmière(r) que vous prenez AUGMENTIN. En effet, AUGMENTIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Autres médicaments et AUGMENTIN :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

Si vous prenez du chlorpropamide (en traitement de la goutte) avec AUGMENTIN, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

Si vous prenez du probénécide (en traitement de la goutte) il est nécessaire d'ajuster votre dose d'AUGMENTIN.
Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation sont pris avec AUGMENTIN, des analyses sanguines doivent être réalisées pour déterminer si AUGMENTIN peut influer sur l'action du méthotréxate (pour le cancer ou les maladies rhumatismales). AUGMENTIN peut influer sur l'action du mycophénolate moftétil (traitement pour prévenir le rejet de greffe d'organes).

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

AUGMENTIN peut provoquer des effets indésirables susceptibles de réduire la capacité à conduire.

Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines si vous ne vous sentez pas bien.

AUGMENTIN 1 g/125 mg, ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) contenu de l'aspartant (E951), de l'alcool benzylique de la malothroxine (glucose) et du sodium :

- Ce médicament contient 30 mg d'aspartam par sachet. L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (FCU). Une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.
- Ce médicament contient 0,00011176 mg d'alcool benzylique par sachet. L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques. AUGMENTIN contient de la malothroxine (glucose). Si votre médecin vous a dit que vous avez une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.
- Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par sachet, c.-à-d. qu'il est essentiellement + sans sodium.

3. COMMENT PRENDRE AUGMENTIN ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Veillez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

Adultes et enfants de 40 kg et plus

- Dose habituelle : 1 sachet de 1g/125mg ou 2 comprimés de 500mg/62.5mg trois fois par jour.
- Dose inférieure : 1 sachet de 1g/125mg ou 2 comprimés de 500mg/62.5mg deux fois par jour.

Enfants pesant moins de 40 kg

Les sachets AUGMENTIN 1 g/125 mg ne sont pas recommandés.

Les enfants âgés de 6 ans ou moins doivent de préférence être traités avec AUGMENTIN en suspension buvable ou en sucre de 500mg/62.5mg.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous devez donner des comprimés de AUGMENTIN à des enfants pesant moins de 40 kg.

Patients souffrant de problèmes rénaux et hépatiques

- En cas de problèmes rénaux, une adaptation de la posologie peut être nécessaire. Le médecin pourra prescrire un dosage différent ou un autre médicament.
- En cas de problèmes au foie, des analyses de sang plus fréquentes pourront être nécessaires afin de vérifier le fonctionnement de votre foie.

Mode d'administration

- Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures. Ne prenez pas 2 doses en 1 heure.
- Ne prenez pas AUGMENTIN pendant plus de 2 semaines. Si vos symptômes persistent, consultez de nouveau un médecin.

AUGMENTIN 1 g/125 mg sachets :

- Juste avant la prise d'AUGMENTIN, ouvrez le sachet et mélangez son contenu dans un demi-verre d'eau.
- Arivez le mélange dans un verre d'un repas ou un peu avant.

AUGMENTIN 500mg/62.5mg comprimés :

- Avez les comprimés entiers avec un verre d'eau au début d'un repas ou un peu avant.

Si vous avez pris plus d'AUGMENTIN que vous n'auriez dû :

La prise d'une quantité excessive d'AUGMENTIN peut entraîner des maux de ventre (nausées, vomissements ou diarrhée) ou des convulsions. Parlez-en à votre médecin le plus tôt possible. Montrez la boîte de médicament au médecin.

Si vous oubliez de prendre AUGMENTIN :

Si vous avez oublié une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Attendez ensuite environ 4 heures avant de prendre la dose suivante.

Si vous arrêtez de prendre AUGMENTIN :

Vous devez continuer de prendre AUGMENTIN jusqu'à la fin du traitement, même si vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.