

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
13/6/23	6		300	Dr Said RAMY RHUMATOLOGUE 39, Rue Omar Soudi, Casablanca Tel: 0522 26 68 78 INPE: 091118794

EXECUTION DES ORDONNANCES

Détail du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Dr. Adarisse SAGA 05 22 3	13/06/2023	1782,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	214333552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	114333553

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DOCTEUR SAÏD RAMY
Spécialiste

Diplômé de la faculté de Médecine de Clermont

Ferrand (France)

Ancien interne et assistant des Hôpitaux
de France

Enseignant à la haute Ecole
de Kinésithérapie (H.E.K)

Rhumatalogue

Maladie des Os, Articulations, Muscles et

Colonnes vertébrales

Radiologie Osseuse



الدكتور سعيد الرامي

(اختصاصي)

طبيب كلية الطب بالجامعة نوران فرنسا

طبيب ماهر سابق مستشفى نوران فرنسا

أستاذ بالجامعة العليا

للتربيتين الطبي

أمراض الرumatizm

للظام العائمة، المضلاط

للماء الفقري و الرجل

للمعصم بالأشعة

Casablanca, le 13/6/23

7^{me} HAGI D

RACHIDA

- Flen-tomé

96,80 X 0
78,50 X 0,2

5. ✓ Separat
2 min

- Alorina 15 mg : up le son au

87,40 milles du repas 20 i/min
X 0,2

2 min

- E.M.C 20:
144,50 X 0,2

gel 1/2

2 min

- parentel 500: up rot et in 10 i

10,10 X 0,1

5. ✓

- Dirovenor 600: up rot et in

04 X 13,60

1782,70

Dr Said RAMY
RHUMATOLOGUE

39, Rue Omar Slaoui, Casablanca

0522 26 68 78

0522 26 68 78

0522 26 68 78

0522 26 68 78

0522 26 68 78

0522 26 68 78

0522 26 68 78

39 نفقه عمر السلاوي الطابق الثاني رقم 0 المركب التجاري طريق العصر البيضاء - الهاتف : 0522 26 68 78

39, Rue Omar Slaoui 2 ème étage N°6 Centre Commercial Taofik Casablanca - Tél/Fax : 05 22 26 68 78

E-mail : saidram@hotmail.fr

Flex-Tonic

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE



Flex-Tonic est une synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.

COLLAGÈNE DE TYPE II

Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif.

Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

Par cette action sur le collagène de type II :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA VITAMINE C

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans la formation du cartilage, mais aussi

La silice joue un rôle important dans le tissu le plus dur de l'organisme. Dans le cartilage non minéralisé, elle favorise la croissance des chondroblastes et les chondrocytes.



CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, ou éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE
9, rue Rahal Meskini - FES

Flex-Tonic

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE



Flex-Tonic est une synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.

COLLAGÈNE DE TYPE II

Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif.

Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

Par cette action sur le collagène de type II :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA VITAMINE C

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans la formation du cartilage, mais aussi

La silice joue un rôle important dans le tissu le plus dur de l'organisme. Dans le cartilage non minéralisé, elle favorise la croissance des chondroblastes et les chondrocytes.



CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, ou éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE
9, rue Rahal Meskini - FES

Flex-Tonic

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE



Flex-Tonic est une synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.

COLLAGÈNE DE TYPE II

Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif.

Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

Par cette action sur le collagène de type II :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA VITAMINE C

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans la formation du cartilage, mais aussi

La silice joue un rôle important dans le tissu le plus dur de l'organisme. Dans le cartilage non minéralisé, elle favorise la croissance des chondroblastes et les chondrocytes.



CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, ou éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE
9, rue Rahal Meskini - FES

Flex-Tonic

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE



Flex-Tonic est une synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.

COLLAGÈNE DE TYPE II

Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif.

Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

Par cette action sur le collagène de type II :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA VITAMINE C

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans la formation du cartilage, mais aussi

La silice joue un rôle important dans le tissu le plus dur de l'organisme. Dans le cartilage non minéralisé, elle favorise la croissance des chondroblastes et les chondrocytes.



CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, ou éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE
9, rue Rahal Meskini - FES

Flex-Tonic

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE



Flex-Tonic est une synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.

COLLAGÈNE DE TYPE II

Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif.

Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

Par cette action sur le collagène de type II :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA VITAMINE C

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans la formation du cartilage, mais aussi

La silice joue un rôle important dans le tissu le plus dur de l'organisme. Dans le cartilage non minéralisé, elle favorise la croissance des chondroblastes et les chondrocytes.



CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, ou éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants


Laboratoire SYNERGIA
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE
9, rue Rahal Meskini - FES

Flex-Tonic

synergia
Laboratoire de médecine nutritionnelle

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE



Flex-Tonic est une synergie exclusive d'un collagène de type II breveté et de silice. La vitamine C associée contribue à la formation de collagène pour assurer une fonction normale des cartilages.

COLLAGÈNE DE TYPE II

Ce collagène est un actif nutritionnel breveté, issu de cartilage de poulet, biologiquement actif.

Cette molécule de collagène de type II se présente sous la forme d'une triple hélice, intégrant à sa surface des antigènes alimentaires. Cette petite dose antigénique prise quotidiennement, initie une tolérance orale empêchant toute agression articulaire.

Par cette action sur le collagène de type II :

- stopper l'érosion
- initier la réparation
- améliorer la mobilité

LA VITAMINE C

La vitamine C renforce le collagène, entrant dans la formation du cartilage, mais aussi

La silice joue un rôle important dans le tissu le plus dur de l'organisme. Dans le cartilage non minéralisé, elle favorise la croissance des chondroblastes et les chondrocytes.



CONSEILS D'UTILISATION :

1 seul comprimé par jour avec un verre d'eau.

A prendre de préférence en dehors des repas, ou éventuellement au petit-déjeuner.

L'action de Flextonic est également améliorée, quand la flore intestinale est de bonne qualité. Aussi nous vous recommandons de faire des cures régulières de Maxi-Flore, probiotiques de la gamme Synergia

DUREE RECOMMANDÉE :

Si amélioration dans les 30 à 40 jours (70% des cas), poursuivre la prise de Flex-Tonic de manière continue.

Si aucun effet au bout de 90 jours (30% des cas), arrêter Flex-Tonic.

CAS PARTICULIERS :

Flextonic est déconseillé aux personnes allergiques à l'un des constituants

Laboratoire SYNERGIA
43500 BEAUNE sur ARZON

Distribué au Maroc par PHARM-HYGIÈNE
9, rue Rahal Meskini - FES

ALOXIA® 7,5 mg, comprimé et 15 mg, comprimé sécable Méloxicam

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALOXIA, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?
3. COMMENT PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALOXIA, COMPRIMÉ ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALOXIA, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALOXIA, comprimé contient une substance active dénommée méloxicam. Le méloxicam appartient à un groupe de médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui sont utilisés pour réduire l'inflammation et la douleur dans les articulations et les muscles.

ALOXIA, comprimé est utilisé dans :

- le traitement de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose,
- le traitement de longue durée :
- de la polyarthrite rhumatoïde,
- de la spondylarthrite ankylosante (également appelée maladie de Bechterew)

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais ALOXIA, comprimé dans les cas suivants :

- pendant le 3^{ème} trimestre de grossesse,
- enfants et adolescents de moins de 16 ans,
- allergie (hypersensibilité) au méloxicam,
- allergie (hypersensibilité) à l'aspirine ou à d'autres médicaments anti-inflammatoires (AINS),
- allergie (hypersensibilité) à l'un des composants de Aloxia (voir rubrique 6 « Informations supplémentaires » pour la liste des autres composants),
- si vous avez présenté l'un des signes suivants après avoir pris l'aspirine ou d'autres AINS :

 - respiration sifflante, oppression respiratoire, difficulté à respirer (asthme),
 - obstruction nasale due à des petits renflements de la muqueuse nasale (polypes nasaux),
 - éruptions cutanées / urticaire,
 - gonflement soudain des tissus sous la peau et les muqueuses, tel qu'un gonflement autour des yeux, du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile (œdème de Quincke),
 - si vous avez déjà présenté, après un traitement avec des AINS :

 - un saignement de l'estomac ou des intestins,

- des perforations de l'estomac ou des intestins,
- ulcères ou saignement de l'estomac ou des intestins
- antécédents d'ulcères ou de saignements récidivants de l'estomac ou des intestins (ulcérant produit au moins deux fois)
- insuffisance hépatique sévère
- insuffisance rénale sévère non
- saignements récents dans le cervebrovasculaire)
- troubles hémorragiques de qu
- insuffisance cardiaque sévère
- intolérance à certains sucre
- contient du lactose (voir égale
- Informations importantes sur
- Si vous n'êtes pas certain à p
- parlez-en à votre médecin.

Faites attention avec ALOXIA Mises en garde spéciales

Les médicaments tels que « une légère augmentation d'infarctus du myocarde » ou risque est d'autant plus imp

élèvées et la durée de trait

Ne pas dépasser les doses

traitement (voir rubrique 3 « Comment prendre ALOXIA, comprimé ? »).

- si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risque pour ce type de pathologie, vous devez discuter de votre traitement avec votre médecin ou avec votre pharmacien. Par exemple :
- si vous avez une pression artérielle élevée (hypertension),
- si vous avez des taux élevés de sucre dans le sang (diabète),
- si vous avez un taux élevé de cholestérol dans le sang (hypercholestérolémie),
- si vous fumez.

Vous devez arrêter le traitement par Aloxia dès la première apparition d'une éruption cutanée, de lésions des tissus mous (lésions des muqueuses), signes de réactions allergiques sévères ou de tout autre signe d'allergie, et prendre contact avec votre médecin.

Arrêtez immédiatement votre traitement avec Aloxia dès que vous remarquez un saignement (donnant une coloration des selles en noir) ou une ulcération de votre appareil digestif (provocant des douleurs abdominales).

ALOXIA ne convient pas au traitement des douleurs aiguës. ALOXIA peut masquer les symptômes d'une infection (par exemple la fièvre). Si vous pensez que vous avez une infection, vous devez consulter votre médecin.

ALOXIA peut entraîner des difficultés pour être enceinte. Vous devez informer votre médecin si vous prévoyez une grossesse, ou si vous rencontrez des difficultés à être enceinte.

Précautions d'emploi

Comme il pourrait ne pas être nécessaire d'adapter votre traitement, il est important de demander conseil à votre médecin avant de prendre ALOXIA en cas de :

- antécédent d'inflammation de l'œsophage (œsophagite), d'inflammation de l'estomac (gastrite) ou de toute autre affection du tractus digestif, par exemple rectocolite hémorragique, maladie de Crohn,
- pression artérielle élevée (hypertension),
- si vous êtes âgé,
- maladie cardiaque, hépatique ou rénale,
- taux élevé de sucre dans le sang (diabète),
- volume sanguin diminué (hypovolémie), ce qui peut se produire si vous avez perdu beaucoup de sang, si vous avez été brûlé, ou si vous avez subi une opération ou en cas d'apport insuffisant de liquides,

- intolérance à certains sucre diagnostiquée par votre médecin, car ce produit contient du lactose,
 - taux élevés de potassium dans le sang précédemment diagnostiqués par votre médecin.
- Votre médecin devra s'assurer de suivre toute modification de votre état pendant le traitement.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Etant donné que l'action de ALOXIA peut affecter, ou peut être affectée par d'autres médicaments, veuillez prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance.

En particulier, prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou si vous avez pris un des médicaments suivants :

- autres AINS,
- médicaments utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins (anticogulants),
- médicaments qui désagrégent les caillots sanguins (thrombolytiques),
- médicaments pour traiter les maladies cardiaques et rénales, ou corticostéroïdes (médicaments utilisés pour réduire l'inflammation et les réactions allergiques),
- ciclosporine – utilisée après les transplantations d'organes, dans des affections cutanées sévères, des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde ou le syndrome néphrotique,
- médicaments diurétiques.

Votre médecin peut être amené à contrôler votre fonction rénale si vous prenez des diurétiques.

- médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (par exemple les bêta-bloquants),
- lithium – utilisé pour traiter les troubles de l'humeur,
- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) – utilisés dans le traitement de la dépression,
- méthotrexate – utilisé pour traiter certaines tumeurs ou des affections cutanées sévères incontrôlées et la polyarthrite rhumatoïde active,
- cholestyramine – utilisée pour faire baisser le cholestérol,
- si vous êtes une femme qui utilise comme contraceptif un dispositif intra-utérin (DIU), plus connu sous le nom de stérilet, EN CAS DE DOUCE, DEMANDEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

En cas de découverte d'une grossesse au cours d'un traitement par ALOXIA, vous devez en informer votre médecin.

En cas de nécessité, votre médecin peut être amené à vous prescrire, de façon limitée, ce médicament au cours des 6 premiers mois de votre grossesse.

Au cours des 3 derniers mois de votre grossesse, vous ne devez en aucun cas prendre ALOXIA, car ceci peut entraîner des conséquences graves pour votre enfant, en particulier des effets cardiopulmonaires et rénaux, même avec une seule prise.

Allaitement

La prise de ce produit n'est pas recommandée en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des troubles visuels, une somnolence, des vertiges (étourdissements) ou d'autres perturbations du système nerveux central peuvent survenir avec ce produit. Dans ce cas ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machine.

Informations importantes concernant certains composants de ALOXIA, Comprimé

Ce produit contient du lactose. Si votre médecin vous a signalé que vous présentez une intolérance à certains sucre,

contactez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?

Posologie/Mode d'administration/

Fréquence d'administration/Durée de traitement

Voie orale.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle est :

Poussées aiguës d'arthrose:

7,5 mg (un comprimé de ALOXIA 7,5 mg ou un demi-comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour. Elle peut être augmentée jusqu'à 15 mg (deux comprimés de ALOXIA 7,5 mg ou un demi-comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour.

Polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante:

15 mg (deux comprimés de ALOXIA 7,5 mg ou un comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour. Elle peut être réduite à 7,5 mg (un comprimé de ALOXIA 7,5 mg ou un demi-comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour.

Les comprimés doivent être avalés avec de l'eau, ou un autre liquide, au cours d'un repas.

NE PAS DEPASSER LA DOSE MAXIMALE DE 15 mg PAR JOUR.

Si l'une des informations énumérées sous le titre « Faîtes attention avec ALOXIA » s'applique à vous, votre médecin peut limiter la dose à 7,5 mg (un comprimé de ALOXIA 7,5 mg ou un demi-comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour.

ALOXIA ne doit pas être administré chez les enfants de moins de 16 ans.

Si vous trouvez que l'effet de ALOXIA est trop fort ou trop faible, ou si après plusieurs jours vous ne ressentez aucune amélioration de votre état, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de ALOXIA, comprimé que vous n'auriez dû:

Si vous avez pris trop de comprimés ou si vous suspectez un surdosage, prenez contact avec votre médecin ou allez immédiatement à l'hôpital le plus proche.

Les symptômes survenant après un surdosage aigu d'AINS sont habituellement limités à :

- une perte d'énergie (léthargie),
- une somnolence,
- une sensation de malaise (nausées) et des vomissements,
- des douleurs dans la région de l'estomac (douleur épigastrique).

Ces symptômes s'améliorent généralement lorsque vous arrêtez de prendre ALOXIA. Vous pouvez souffrir d'hémorragies de l'estomac ou des intestins (saignements gastro-intestinaux).

Une intoxication sévère peut entraîner des effets indésirables graves (voir rubrique 4 « QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ») :

- une augmentation de la pression artérielle (hypertension),
- une insuffisance rénale aigüe,
- des troubles de la fonction hépatique (foie),
- une réduction ou un arrêt de la respiration (dépression respiratoire),
- une perte de conscience (coma),
- des convulsions,
- une chute de la pression sanguine (collapsus cardiovasculaire),
- un arrêt cardiaque,
- des réactions allergiques soudaines (hypersensibilité), incluant :

 - évanouissement,
 - difficultés à respirer,
 - réactions cutanées.

ALOXIA® 7,5 mg, comprimé et 15 mg, comprimé sécable Méloxicam

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE ALOXIA, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?
3. COMMENT PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER ALOXIA, COMPRIMÉ ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE ALOXIA, COMPRIMÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

ALOXIA, comprimé contient une substance active dénommée méloxicam. Le méloxicam appartient à un groupe de médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui sont utilisés pour réduire l'inflammation et la douleur dans les articulations et les muscles.

ALOXIA, comprimé est utilisé dans :

- le traitement de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose,
- le traitement de longue durée :
- de la polyarthrite rhumatoïde,
- de la spondylarthrite ankylosante (également appelée maladie de Bechterew)

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?

Ne prenez jamais ALOXIA, comprimé dans les cas suivants :

- pendant le 3^{ème} trimestre de grossesse,
- enfants et adolescents de moins de 16 ans,
- allergie (hypersensibilité) au méloxicam,
- allergie (hypersensibilité) à l'aspirine ou à d'autres médicaments anti-inflammatoires (AINS),
- allergie (hypersensibilité) à l'un des composants de Aloxia (voir rubrique 6 « Informations supplémentaires » pour la liste des autres composants),
- si vous avez présenté l'un des signes suivants après avoir pris l'aspirine ou d'autres AINS :

 - respiration sifflante, oppression respiratoire, difficulté à respirer (asthme),
 - obstruction nasale due à des petits renflements de la muqueuse nasale (polypes nasaux),
 - éruptions cutanées / urticaire,
 - gonflement soudain des tissus sous la peau et les muqueuses, tel qu'un gonflement autour des yeux, du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile (œdème de Quincke),
 - si vous avez déjà présenté, après un traitement avec des AINS :
 - un saignement de l'estomac ou des intestins,

- des perforations de l'estomac ou des intestins,
- ulcères ou saignement de l'estomac ou des intestins
- antécédents d'ulcères ou de saignements récidivants de l'estomac ou des intestins (ulcérant produit au moins deux fois)
- insuffisance hépatique sévère
- insuffisance rénale sévère non
- saignements récents dans le cervebrovasculaire)
- troubles hémorragiques de qu
- insuffisance cardiaque sévère
- intolérance à certains sucre
- contient du lactose (voir égale
- Informations importantes sur
- Si vous n'êtes pas certain à p
- parlez-en à votre médecin.

Faites attention avec ALOXIA

Mises en garde spéciales

- Les médicaments tels que « une légère augmentation d'infarctus du myocarde » ou risque est d'autant plus importante élevées et la durée de traiter. Ne pas dépasser les doses de traitement (voir rubrique 3 « Comment prendre ALOXIA, comprimé ? »).
- si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risque pour ce type de pathologie, vous devez discuter de votre traitement avec votre médecin ou avec votre pharmacien. Par exemple :
 - si vous avez une pression artérielle élevée (hypertension),
 - si vous avez des taux élevés de sucre dans le sang (diabète),
 - si vous avez un taux élevé de cholestérol dans le sang (hypercholestérolémie),
 - si vous fumez.

Vous devez arrêter le traitement par Aloxia dès la première apparition d'une éruption cutanée, de lésions des tissus mous (lésions des muqueuses), signes de réactions allergiques sévères ou de tout autre signe d'allergie, et prendre contact avec votre médecin.

Arrêtez immédiatement votre traitement avec Aloxia dès que vous remarquez un saignement (donnant une coloration des selles en noir) ou une ulcération de votre appareil digestif (provocant des douleurs abdominales).

ALOXIA ne convient pas au traitement des douleurs aiguës. ALOXIA peut masquer les symptômes d'une infection (par exemple la fièvre). Si vous pensez que vous avez une infection, vous devez consulter votre médecin.

ALOXIA peut entraîner des difficultés pour être enceinte. Vous devez informer votre médecin si vous prévoyez une grossesse, ou si vous rencontrez des difficultés à être enceinte.

Précautions d'emploi

Comme il pourrait ne pas être nécessaire d'adapter votre traitement, il est important de demander conseil à votre médecin avant de prendre ALOXIA en cas de :

- antécédent d'inflammation de l'œsophage (œsophagite), d'inflammation de l'estomac (gastrite) ou de toute autre affection du tractus digestif, par exemple rectocolite hémorragique, maladie de Crohn,
- pression artérielle élevée (hypertension),
- si vous êtes âgé,
- maladie cardiaque, hépatique ou rénale,
- taux élevé de sucre dans le sang (diabète),
- volume sanguin diminué (hypovolémie), ce qui peut se produire si vous avez perdu beaucoup de sang, si vous avez été brûlé, ou si vous avez subi une opération ou en cas d'apport insuffisant de liquides,

- intolérance à certains sucre diagnostiquée par votre médecin, car ce produit contient du lactose,
 - taux élevés de potassium dans le sang précédemment diagnostiqués par votre médecin.
- Votre médecin devra s'assurer de suivre toute modification de votre état pendant le traitement.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Etant donné que l'action de ALOXIA peut affecter, ou peut être affectée par d'autres médicaments, veuillez prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment d'autres médicaments, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance.

En particulier, prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou si vous avez pris un des médicaments suivants :

- autres AINS,
- médicaments utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins (anticogulants),
- médicaments qui désagrégent les caillots sanguins (thrombolytiques),
- médicaments pour traiter les maladies cardiaques et rénales, ou corticostéroïdes (médicaments utilisés pour réduire l'inflammation et les réactions allergiques),
- ciclosporine – utilisée après les transplantations d'organes, dans des affections cutanées sévères, des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde ou le syndrome néphrotique,
- médicaments diurétiques.

Votre médecin peut être amené à contrôler votre fonction rénale si vous prenez des diurétiques.

- médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (par exemple les bêta-bloquants),
- lithium – utilisé pour traiter les troubles de l'humeur,
- inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) – utilisés dans le traitement de la dépression,
- méthotrexate – utilisé pour traiter certaines tumeurs ou des affections cutanées sévères incontrôlées et la polyarthrite rhumatoïde active,
- cholestyramine – utilisée pour faire baisser le cholestérol,
- si vous êtes une femme qui utilise comme contraceptif un dispositif intra-utérin (DIU), plus connu sous le nom de stérilet, EN CAS DE DOUCE, DEMANDEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse

En cas de découverte d'une grossesse au cours d'un traitement par ALOXIA, vous devez en informer votre médecin.

En cas de nécessité, votre médecin peut être amené à vous prescrire, de façon limitée, ce médicament au cours des 6 premiers mois de votre grossesse.

Au cours des 3 derniers mois de votre grossesse, vous ne devez en aucun cas prendre ALOXIA, car ceci peut entraîner des conséquences graves pour votre enfant, en particulier des effets cardiopulmonaires et rénaux, même avec une seule prise.

Allaitement

La prise de ce produit n'est pas recommandée en cas d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Des troubles visuels, une somnolence, des vertiges (étourdissements) ou d'autres perturbations du système nerveux central peuvent survenir avec ce produit. Dans ce cas ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machine.

Informations importantes concernant certains composants de ALOXIA, Comprimé

Ce produit contient du lactose. Si votre médecin vous a signalé que vous présentez une intolérance à certains sucre,

contactez votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE ALOXIA, COMPRIMÉ ?

Posologie/Mode d'administration/

Fréquence d'administration/Durée de traitement

Voie orale.

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle est :

Poussées aiguës d'arthrose:

7,5 mg (un comprimé de ALOXIA 7,5 mg ou un demi-comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour. Elle peut être augmentée jusqu'à 15 mg (deux comprimés de ALOXIA 7,5 mg ou un demi-comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour.

Polyarthrite rhumatoïde et spondylarthrite ankylosante:

15 mg (deux comprimés de ALOXIA 7,5 mg ou un comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour. Elle peut être réduite à 7,5 mg (un comprimé de ALOXIA 7,5 mg ou un demi-comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour.

Les comprimés doivent être avalés avec de l'eau, ou un autre liquide, au cours d'un repas.

NE PAS DEPASSER LA DOSE MAXIMALE DE 15 mg PAR JOUR.

Si l'une des informations énumérées sous le titre « Faîtes attention avec ALOXIA » s'applique à vous, votre médecin peut limiter la dose à 7,5 mg (un comprimé de ALOXIA 7,5 mg ou un demi-comprimé de ALOXIA 15 mg) une fois par jour.

ALOXIA ne doit pas être administré chez les enfants de moins de 16 ans.

Si vous trouvez que l'effet de ALOXIA est trop fort ou trop faible, ou si après plusieurs jours vous ne ressentez aucune amélioration de votre état, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous avez pris plus de ALOXIA, comprimé que vous n'auriez dû:

Si vous avez pris trop de comprimés ou si vous suspectez un surdosage, prenez contact avec votre médecin ou allez immédiatement à l'hôpital le plus proche.

Les symptômes survenant après un surdosage aigu d'AINS sont habituellement limités à :

- une perte d'énergie (léthargie),
- une somnolence,
- une sensation de malaise (nausées) et des vomissements,
- des douleurs dans la région de l'estomac (douleur épigastrique).

Ces symptômes s'améliorent généralement lorsque vous arrêtez de prendre ALOXIA. Vous pouvez souffrir d'hémorragies de l'estomac ou des intestins (saignements gastro-intestinaux).

Une intoxication sévère peut entraîner des effets indésirables graves (voir rubrique 4 « QUELLES SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? ») :

- une augmentation de la pression artérielle (hypertension),
- une insuffisance rénale aigüe,
- des troubles de la fonction hépatique (foie),
- une réduction ou un arrêt de la respiration (dépression respiratoire),
- une perte de conscience (coma),
- des convulsions,
- une chute de la pression sanguine (collapsus cardiovasculaire),
- un arrêt cardiaque,
- des réactions allergiques soudaines (hypersensibilité), incluant :

 - évanouissement,
 - difficultés à respirer,
 - réactions cutanées.

DIOVENOR® 600 mg

DIOSMINE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

COMPOSITION

Principe actif :

Diosmine (quantité exprimée en diosmine anhydre et pure) 600 mg

Excipients : talc, silice colloïdale anhydre, acide stéarique micronisé, hypromellose, cellulose microcristalline, stéarate de macrogol 400, propyléneglycol, dioxyde de titane, laque aluminique de rouge cochenille A, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, cire de carnauba, cire d'abeille, gomme laque, alcool éthylique à 95°. Pour un comprimé pelliculé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé (boîte de 30)

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

VASCULOPROTECTEUR / MÉDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES
(système cardiovasculaire).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un veinotonique (*il augmente la tonicité des parois veineuses*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins*).

Il est préconisé dans :

- les troubles de la circulation veineuse (*jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher*)
- la crise hémorroïdaire.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est généralement déconseillé :

Allergie connue à l'un des composants.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux rameaux veineux persistent, consulter votre médecin.

Si les troubles hémorroïdaires persistent, consulter votre médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est pris régulièrement. Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la transpiration. La marche à pied et, éventuellement, l'assise prolongée peuvent favoriser l'apparition d'un saignement.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT

133-160

DIOVENOR® 600 mg

DIOSMINE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

COMPOSITION

Principe actif :

Diosmine (quantité exprimée en diosmine anhydre et pure) 600 mg
Excipients : talc, silice colloïdale anhydre, acide stéarique micronisé, hypromellose, cellulose microcristalline, stéarate de macrogol 400, propyléneglycol, dioxyde de titane, laque aluminique de rouge cochenille A, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, cire de carnauba, cire d'abeille, gomme laque, alcool éthylique à 95°. Pour un comprimé pelliculé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé (boîte de 30)

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

VASCULOPROTECTEUR / MÉDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES
(système cardiovasculaire).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un veinotonique (*il augmente la tonicité des parois veineuses*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins*).

Il est préconisé dans :

- les troubles de la circulation veineuse (*jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher*)
- la crise hémorroïdaire.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est généralement déconseillé.

Allergie connue à l'un des composants.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux sont marquées, il est recommandé de consulter votre médecin.

Si les troubles hémorroïdaires persistent, il est recommandé d'indispensable de consulter votre médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est pris régulièrement. Il faut donc l'utiliser régulièrement. Il faut éviter l'exposition au soleil, la chaleur, la transpiration et les exercices physiques intensifs. La marche à pied et, éventuellement, l'escalade sont recommandées. Il faut éviter les exercices physiques intensifs.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT

133-160

DIOVENOR® 600 mg

DIOSMINE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

COMPOSITION

Principe actif :

Diosmine (quantité exprimée en diosmine anhydre et pure) 600 mg
Excipients : talc, silice colloïdale anhydre, acide stéarique micronisé, hypromellose, cellulose microcristalline, stéarate de macrogol 400, propyléneglycol, dioxyde de titane, laque aluminique de rouge cochenille A, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, cire de carnauba, cire d'abeille, gomme laque, alcool éthylique à 95°. Pour un comprimé pelliculé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé (boîte de 30)

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

VASCULOPROTECTEUR / MÉDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES
(système cardiovasculaire).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un veinotonique (*il augmente la tonicité des parois veineuses*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins*).

Il est préconisé dans :

- les troubles de la circulation veineuse (*jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher*)
- la crise hémorroïdaire.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est généralement déconseillé.

Allergie connue à l'un des composants.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux sont marquées, il est recommandé de consulter votre médecin.

Si les troubles hémorroïdaires persistent, il est recommandé d'indispensable de consulter votre médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est pris régulièrement. Il faut donc l'utiliser régulièrement. Il faut éviter l'exposition au soleil, la chaleur, la transpiration et les exercices physiques intensifs. La marche à pied et, éventuellement, l'escalade sont recommandées. Il faut éviter les exercices physiques intensifs.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT

133-160

DIOVENOR® 600 mg

DIOSMINE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

COMPOSITION

Principe actif :

Diosmine (quantité exprimée en diosmine anhydre et pure) 600 mg
Excipients : talc, silice colloïdale anhydre, acide stéarique micronisé, hypromellose, cellulose microcristalline, stéarate de macrogol 400, propyléneglycol, dioxyde de titane, laque aluminique de rouge cochenille A, oxyde de fer noir, oxyde de fer rouge, cire de carnauba, cire d'abeille, gomme laque, alcool éthylique à 95°. Pour un comprimé pelliculé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé (boîte de 30)

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

VASCULOPROTECTEUR / MÉDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES
(système cardiovasculaire).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est un veinotonique (*il augmente la tonicité des parois veineuses*) et un vasculoprotecteur (*il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins*).

Il est préconisé dans :

- les troubles de la circulation veineuse (*jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher*)
- la crise hémorroïdaire.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est généralement déconseillé.

Allergie connue à l'un des composants.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Si la gêne et la fragilité des vaisseaux sont marquées, il est recommandé de consulter votre médecin.

Si les troubles hémorroïdaires persistent, il est recommandé d'indispensable de consulter votre médecin.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est pris régulièrement. Il faut donc l'utiliser régulièrement. Il faut éviter l'exposition au soleil, la chaleur, la transpiration et les exercices physiques intensifs. La marche à pied et, éventuellement, l'escalade sont recommandées. Il faut éviter les exercices physiques intensifs.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

AFIN D'ÉVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT

133-160