

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation | : contact@mupras.com |
| 0 Prise en charge | : pec@mupras.com |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

16389

Déclaration de Maladie : N° P19- 0021440

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 9616 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KANIA SAID Date de naissance :

Adresse : PANOURAMATE BLOCH N° 21 INT BARRAUSSE

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 17/06/2023

Nom et prénom du malade : KANIA SAID Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Infection respiratoire

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

| Dates des Actes | Natures des Actes | Nombre et Coefficient | Montant détaillé des Honoraires | Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 11/06/23 | 1 | | 180,00 |  DR. EL MEFTAH AL AZHAR Diabetologie - Nutrition - Endocrinologie Bichagry, 3ème étage, CH 09, BP 1000, 1000 Tunis, Tunisia Tel: +216 98 23 15 28 |

EXECUTION DES ORDONNANCES

| Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur | Date | Montant de la Facture |
|---|-------------|-----------------------|
| <p>Pharmacie DASSIN Im. M, Franche 29 Mag. 1 Bloc 3 - 20500114 Tél: 05 22 15 52</p> | 1er. 06. 23 | 810,60 |

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

| Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue | Date | Désignation des Cœfficients | Montant des Honoraires |
|---|------|-----------------------------|------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AUXILIAIRES MEDICAUX



| Cachet et signature du Praticien | Date des Soins | Nombre | | | | Montant détaillé des Honoraires |
|-------------------------------------|-------------------|--------|-----|-----|-----|------------------------------------|
| | | A M | P C | I M | I V | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

| SOINS DENTAIRES | Dents Traitées | Nature des Soins | Coefficient | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | | | | Coefficient des travaux |
| | | | | Montants des soins |
| | | | | Début d'exécution |
| | | | | Fin d'exécution |
| O.D.F PROTHESES DENTAIRES | DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE | | | |
|  | H 25533412 00000000 | G 21433552 00000000 | B 35533411 11433553 | Coefficient des travaux |
| | | | | Montants des soins |
| | | | | Date du devis |
| | | | | Date de l'exécution |

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Eyame Reda

Diabétologie

Nutrition diabétique

Omnipraticien

D.U diabétologie Faculté de Médecine Fès

D.U nutrition Faculté de médecine

Casablanca

Echographie - ECG



دكتور رضا أيام

أمراض السكري

الحمية والتغذية

الطب العام

دبلوم جامعي في السكري كلية الطب فاس

دبلوم جامعي في الحمية والتغذية كلية الطب

دار البيضاء

الفحص بالصدى - تخطيط القلب

17/06/23

دار البيضاء، في:

KANA SADO-

222.00

1) Levamox 1g
1 sachet x 3 fl

pdfl Pjum

69.00

~ 2) Docinex sirup

82.00 100c x 4 fl

3) Isona 200mg pdfl 10jum

99.00 100 comprimés

4) Lizi for gr
mg le mafin

Pharmacie HASSI
Imm. M, Tranche 2 Rés. Panorama
Mag. 1 Bloc 3 - 20640 Ahl Logia
Tél: 05 22 76 60 21

Tél. : 06 73 23 18 28 Fixe : 0522 74 63 16

عمراء 1 GH 09 شقة رقم 3 الطابق السفلي
حي الأزهر مدینتی سیدی البرنوصي البيضاء

21.30 & 4) 5) Taxor 20g. poft 1mg
jegle moph

24. 05

6) Zetulax.

25. 05 1pm rectal i la dandu.

7) Ceneline

1sp & 3h

26. 05

8) Fluomizin

1pm rect.

210. 05

Pharmacie HASSINI
Imm. M, Tranche 2 Rés. Panorama
Mag. 1 Bloc 3 - 20640 Ahl Loghiam
Tél : 05 22 76 60 31

DR. EYAMIS Keda
Généraliste - Nutrition - Diététicien
Thérapeute
Educatrice de l'EA
GH 09, Avenue 25 May Al Azhar
Giza - 12216 - Egypt
Tél : +20 2 26 16 7 04 73 22 18 28

Untergesetzliche Rechtsvorschriften können Rechtshilferei im Type des Deutschen Strafrechts

LevAmox® 1g/125 mg 24 COMPRIMES EFFERVESCENTS

PPV 224DH00

LOT 240331
EXP 06/2024

EVAMOX® or
Le-ch-Pentetetraenoic acid
benzylic ester
potassium salt

1 - QU'EST-CE QUE LEVAMOX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou à type d'activité

- LEVAMOX® est un antibiotique qui tire ses caractéristiques de deux molécules différentes, appellées amoxicilline et acide clavulanique. Il contient deux molécules différentes, appartenant à un groupe de médicaments appelés « penicillines ». L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « penicillines », qui possèvent certains avantages sur les autres antibiotics. Le LEVAMOX® empêche certaines bactéries de se multiplier.

- Levamox® est utilisé chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nouveau-né pour traiter les infections suivantes :

- infections respiratoires.
- infections des voies urinaires.
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires.
- infections des os et des articulations.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LEVAMOX® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :
- Levamox® contient de l'acide clavulanique.

Veuillez lire attentivement l'information importante avant de prendre ce médicament car elle contient des informations très importantes pour vous.

- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ces médicaments vous aident à faire des exercices physiques et à réduire les symptômes. Ils pourraient leur être nocifs, même si les signes de leur maladie sont temporaires. Ne le donnez pas à d'autres personnes.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quel contentement cette notice

1. Qu'est-ce que LEVAMOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quels sont les informations à connaître avant de prendre LEVAMOX® ?
3. Comment prendre LEVAMOX® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVAMOX® ?
6. Informations supplémentaires

(rapport amical/mission/accide civili/indique : 6/1)

- LEVAMOX® 1 mg/62,5 µg Compresse effervescente entable, boîte de 12 et 24.
- LEVAMOX® 1 mg/62,5 µg Comprimé effervescent, boîte de 12 et 16.
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 µg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose, boîte de 12 et 16.
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 µg Poudre pour suspension buvable adulte en sachet-dose, flacon de 30 ml.
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 µg Poudre pour suspension buvable noumission en flacon de 60 ml.

(Amoxicilline + acide clavulique)

LEVAMOX®

JOUADI Pharmacien Responsable

Pharmacie du Quai
146-147, Zone Industrielle
Trit-Melli, Casablanca

Autorisation ministère de la santé n° U.A.201/1612028U/M/P/20UCAVI

COMPOSITION

Le pas dépend de la dose journalière recommandée.

Deconseiller aux personnes allergiques aux produits de la ruche ou à l'un des constitutants. Teneur hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1 comprimé à sucer 3 fois par jour.

Doccivox procure une sensation de fraîcheur agréable et durable (gout original menthe, miel et citron).

ILLUSTRATIONS:

la grippe ou le raffroidissement (syndrome grippal). Les symptômes peuvent inclure des rhinopharyngites, des conjonctivites et des malaises communs.

Eucalyptus : remarquable décongestionnant respiratoire des muqueuses et des sinus, il facilite le confort respiratoire.

Propos : la sphère d'action privilégiée de la propulsions concerne l'ORL où elle permet d'ajuster à guérir facilement et très rapidement de nombreux problèmes couramment rencontrés, plus particulièrement en automne et en hiver.

Pour la gorge et les voies respiratoires : • Apaise et dégage les voies respiratoires • Adoucit la gorge irritée en cas de toux • Renforce les défenses naturelles.

DocVox est une

-Boîte de 10 - Boîte de 20

FORMES ET PRÉSENTATIONS

DociVox

LOT: 220962
BLUO: 12/2025
69.00 PH

ANSWER

ADDITIONAL INFORMATION AND SOURCE:

peut étre utilisée comme substitut à
l'acrylique. La peinture est appliquée
à la spatule ou à la brosse. L'application
peut étre faite à l'aide d'un pinceau.
Le vernis acrylique peut étre appliquée
à la spatule ou à la brosse. L'application
peut étre faite à l'aide d'un pinceau.

Docivox Spray gorge au goût miel - citron est apprécié par l'adulte et l'enfant.

LIXIFOR

COMPOSITION : Dose par gélule

| | |
|---------------------|--------|
| - Séné | 140 mg |
| - Radis Noir | 75 mg |
| - Anis Etoilé | 75 mg |
| - Cascara | 30 mg |

PROPRIETES :

LIXIFOR Actif dès le premier jour spécialement formulé pour :

- Régulation du volume et de la fréquence des selles
- Réduction des gaz
- Ballonnements et pesanteur abdominale
- Active le péristaltisme
- Améliore le confort intestinal
- Stimule le transit intestinal
- Combat les fermentations intestinales
- Favorise un transit régulier

CONSEILS D'UTILISATION :

- 1 gélule par jour le soir au coucher avec un verre d'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans.
- Ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou qui allaitent sans avis médical.

PI
Bo
Lot/à consommer
de X1026 0526
LOT _____ PER _____
Prix 99.00

REF. Lixifor



élatine.

3 700221 339503

IXOR®

(Oméprazole)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28
- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IXOR® ?
3. Comment prendre IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

- Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids

• Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraîne douleur, inflammation et brûlures.

• Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation) et une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

• Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des médicaments qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A PRENDRE IXOR® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

- Ne prenez jamais IXOR® (Contre-indications)

Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres ingrédients contenus dans ce médicament.

• Si vous êtes allergique à un autre (par exemple pantoprazole, esoméprazole).

• Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection par le VIH.

• Si vous êtes dans une des situations suivantes, ne prenez pas IXOR® comprimé effervescent. Si vous avez des questions, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien.

• En raison de la présence d'aspartate aminotransférase (ASAT) élevée indiquée en cas de phénylcétoneurie.

- Faites attention avec IXOR® (précautions particulières d'emploi)

Prendre en compte la teneur en sodium de ce médicament dans votre régime hyposodé strict.

- IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent.

- IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg de sodium par comprimé effervescent.

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

IXOR® comprimé effervescent est recommandé pour les patients souffrant d'autres maladies. Par conséquent, si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres maladies, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez d'autres malades, il est recommandé de prendre IXOR® comprimé effervescent.



PPV 41DH30
EXP 25/2024
LOT 5004 1

Traitement des ulcères duodénal

- La dose recommandée est de 20 mg par jour, soit 1 comprimé effervescent par jour.
- Si vous avez des symptômes d'ulcère, consultez votre médecin.

IXOR®

(Oméprazole)

DENOMINATION DU MÉDICAMENT

- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28
- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IXOR® ?
3. Comment prendre IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

1- QU'EST-CE QUE IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

- Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez les adultes :

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus de 12 ans :

- Le reflux gastro-œsophagien (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

Enfants âgés de 6 à 12 ans :

- Les symptômes d'ulcère de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les symptômes d'ulcère de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

2 - QUELLES SOUVENTS PRENDRE IXOR®

- Liste des informations utiles
- Ne prenez jamais plus de 1 comprimé par jour.
- Si vous êtes allergique à IXOR®, ne prenez pas ce médicament.

• Si vous êtes allergique à un autre (par exemple pantoprazole, esoméprazole).

• Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection par le VIH.

• Si vous êtes dans une des situations où IXOR® comprimé effervescent n'est pas recommandé : demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.

• En raison de la présence d'aspargine dans le médicament, il est recommandé d'éviter l'aspartame (par exemple dans les boissons gazeuses) si vous avez une maladie de l'œsophage.

• Faites attention avec IXOR® (comme tous les médicaments) à certaines précautions particulières d'utilisation.

Prendre en compte la teneur en sodium dans le médicament.

• IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent.

• IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg de sodium par comprimé effervescent.

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien pour obtenir des informations sur l'effet du sodium dans IXOR®.

IXOR® comprimé effervescent peut également entraîner d'autres maladies. Par conséquent, si vous prenez IXOR® comprimé effervescent pour traiter une affection, vous devez informer immédiatement votre médecin de l'apparition de l'un des éléments suivants se produisant pendant le traitement :

• Vous perdez du poids sans raison apparente.

• Vous avez des douleurs à l'estomac.

• Vous vomissez de la nourriture ou de l'eau.

• Vous avez des selles noires (teintées de noir par l'acide dans l'estomac) et/ou diarrhée sévère.

• Si ces symptômes sont associés à une faible augmentation de la température corporelle.

• Si vous avez des problèmes hépatiques (jaunissement de la peau et des yeux).

• Si vous êtes déjà arrivé de déshydratation après un traitement avec un médicament qui réduit l'acidité de l'estomac.

• Vous devez faire un examen sanguin pour vérifier la fonction rénale et hépatique (si vous avez plus de 65 ans ou si vous prenez IXOR® comprimé effervescent pendant plus d'un an).

Si vous prenez IXOR® comprimé effervescent pendant plus d'un an, votre médecin doit le faire régulièrement.

Vous devez informer immédiatement votre médecin si vous avez des symptômes et événements nouveaux ou si vous avez des symptômes de maladie.

• Vous devez faire un examen sanguin pour vérifier la fonction rénale et hépatique (si vous avez plus de 65 ans ou si vous prenez IXOR® comprimé effervescent pendant plus d'un an).

Si vous avez une éruption sur la peau ou des symptômes de maladie, informez immédiatement votre médecin.

Si vous avez une éruption sur la peau ou des symptômes de maladie, informez immédiatement votre médecin.

Rappelez-vous de mentionner toutes les maladies ou symptômes que vous avez.

• Enfants

Certains enfants atteints d'une maladie peuvent nécessiter un traitement à long terme.

• Prises d'autres médicaments

Autres médicaments et IXOR®

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez récemment pris ou pourriez prendre IXOR® comprimé effervescent.

Vous ne devez pas prendre IXOR® comprimé effervescent si vous prenez un médicament contenant de l'aspirine ou de l'acetylsalicylate de calcium (par exemple IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables).

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables avec certains médicaments et certains aliments.

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables avec certains médicaments et certains aliments.

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables avec certains médicaments et certains aliments.

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables avec certains médicaments et certains aliments.

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables avec certains médicaments et certains aliments.

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables avec certains médicaments et certains aliments.

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables avec certains médicaments et certains aliments.

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables avec certains médicaments et certains aliments.

اكسور
7 أقراص فاندة 20 ملغ

IXOR® 20 mg

7 comprimés effervescents



6 118000 032786

u niveau douleur,

s dans la ts et une

Dans ce alotiques

ANT DE

ent

omposants

030314F56360E010720

IXOR®

(Oméprazole)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28

- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IXOR® ?
3. Comment prendre IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

- Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez ces AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse ou au pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants

Enfants âgés

• Le reflux gastro-œsophagien, inflammation

• Les symptômes de la bouche du cœur, prise de poids

Enfants âgés de 6 mois et plus

• Les ulcères indiqués par le médecin qui permettent

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IXOR® ?

- Liste des informations à connaître

Sans objet.

- Ne prenez jamais

• Si vous êtes allergique aux composants

- Si vous êtes allergique à un autre médicament (par exemple pantoprazole, esoméprazole).
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection par le VIH.
- Si vous êtes dans une des situations où IXOR® comprimé effervescent n'est pas recommandé ou votre pharmacien recommande un autre médicament.

• En raison de la présence d'aspéritine indiquée en cas de phénylcétoneurie.

- **Faites attention avec IXOR® aux précautions particulières d'emploi.** Prendre en compte la teneur en sucre dans le régime hyposodé strict.

- IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg d'aspéritine.

- IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg d'aspéritine.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien IXOR® comprimé effervescent. IXOR® comprimé effervescent convient aux personnes souffrant d'autres maladies. Par conséquent, si vous prenez IXOR® comprimé effervescent pour traiter une autre affection, vous devez informer votre pharmacien ou votre médecin de l'ensemble des éléments suivants.

• Vous perdez du poids sans raisonnablement justifiée.

• Vous avez des douleurs à l'estomac.

• Vous vomissez de la nourriture.

• Vous avez des selles noires (tels que le charbon).

• Vous souffrez de diarrhée sévère et/ou récurrente. Cela peut être associé à une faible augmentation de la température corporelle.

• Si vous avez des problèmes hépatiques.

• Si vous êtes déjà arrivé de diarrhée ou de nausées après un traitement avec un autre médicament.

• Vous devez faire un examen san-

ctologique. Si vous prenez IXOR® comprimé effervescent pendant plus d'un an, votre médecin doit effectuer un examen régulier.

• Vous devez informer votre pharmacien ou votre médecin de tout symptôme et événement nouveau.

• Votre pharmacien ou votre médecin doivent être informés de toute réaction indésirable.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à proton (IPIP) IXOR® comprimé effervescent, en particulier pendant plus d'un an, peut légèrement augmenter la pression artérielle et/ou des vertiges. Si vous souffrez de hypertension artérielle, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

Si vous avez une réaction indésirable, il est recommandé de faire une visite chez votre pharmacien ou votre médecin.

IXOR® 20 mg 7 comprimés effervescents

PPV 41DH30
EXP 05/2024
LOT 23043 2

0 kg
inté au niveau
mant douleur,

itées dans la
tents et une

ri. Dans ce
tibiotiques

ANT DE

ent
omposants

IXOR®

(Oméprazole)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 20 mg en boîte de 7, 14 et 28
- IXOR® Comprimés effervescents dosés à 10 mg en boîte de 7, 14 et 28

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre IXOR® ?
3. Comment prendre IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

1 - QU'EST-CE QUE IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

- Indications thérapeutiques

IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes : Chez les adultes :

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.
- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.
- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.
- Un excès d'acide dans l'estomac dû à une grossesse au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez les enfants :

Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids

- Le reflux gastro-œsophagien (RGO). L'acide de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraîne douleur, inflammation et brûlures.
- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre une bouche ouverte (régurgitation) ou une prise de poids limitée.

Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée H. pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des médicaments qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A PRENDRE IXOR® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament.
- Ne prenez jamais IXOR® (Contre-indications)
- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres ingrédients.

- Si vous êtes allergique à un autre médicament (par exemple pantoprazole, esoméprazole).

- Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection par le VIH.

- Si vous êtes dans une des situations suivantes : pas IXOR® comprimé effervescent, pas à votre médecin ou votre pharmacien.

- En raison de la présence d'aspéritine dans ce médicament.

- Faites attention avec IXOR® : précautions particulières d'emploi.

Prendre en compte la teneur en soufre dans ce médicament.

- IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg d'aspéritine.

- IXOR® 10 mg : environ 382,9 mg d'aspéritine.

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

IXOR® comprimé effervescent peut entraîner des effets indésirables.

Par conséquent, si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

Si vous avez des symptômes de maladie ou de l'effet indésirable, il faut prendre IXOR® comprimé effervescent.

IXOR® 20 mg

7 comprimés effervescents

PPV 41DH30
EXP 03/2024
LOT 23043 2

ment même si vous ne remarquez plus aucun symptôme, tel que prurit, écoulement, odeurs.

La prise de plus d'un comprimé vaginal par jour n'augmente pas l'efficacité de Fluomizin. Par contre, les effets secondaires peuvent être plus importants.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Fluomizin peut-il provoquer?

La prise ou l'utilisation de Fluomizin peut provoquer les effets secondaires suivants:

Les infections vaginales provoquent généralement des troubles tels que le prurit, les sensations de brûlures et l'écoulement. Ces troubles désagréables disparaissent la plupart du temps pendant le traitement. Dans de rares cas, les troubles d'irritation locale comme le prurit, la sensation de brûlure ou les rougeurs peuvent s'amplifier au début du traitement. Il n'est pas nécessaire d'interrompre le traitement. Si vous ressentez des troubles ou douleurs plus importantes, consultez votre médecin.

Des cas très rares de saignements d'ulcérations vaginales ont été rapportés lorsque la surface vaginale est déjà lésée, par ex. à la suite d'un manque d'oestrogènes ou d'une inflammation assez prononcée. On a observé des cas très rares d'apparition de fièvre. Dans ces cas, il faut interrompre le traitement par Fluomizin.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

On ne dispose d'aucune étude sur la tolérance de la préparation avec les préservatifs, les diaphragmes ou autres moyens de contraception. Pendant le traitement par le Fluomizin, il est préférable de renoncer aux rapports sexuels. Fluomizin n'est pas compatible avec les savons ou autres substances actives d'agents de surface anioniques. Fluomizin ne peut pas être employé pour d'autres parties du corps.

Date-lin

Distribué par: ZENITHPHARMA

96, Zone Industrielle Tassila Inezgane

Le méd

Agadir-Maroc

Conser

Dr. M. EL BOUHMADI, Pharmacien Responsable

AMM N°: 24/18DMP/21/NRQ

Conser

P.P.V.: 96.40 DHS

311531

des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui dispose d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Int après la mention "EXP" sur le récipi

température inférieure à 30 °C et hors de p

Propriétés traditionnellement reconnues des principaux composants:

Charbon actif (210mg), Bactcharose, Dextransucrose Stabilisant; Cellulose microcrystalline, Extrait de fenouil (34,98mg), Arome anis. Anti-agglomérants : Dioxyde de silicium et silicate de magnésium.

Composition par comprime:

Boîte de 30 comprimés sous blister.

Présentation générale :

CARBOLINE®

Zetalax[®]_{DM}

microlavement

QUAND UTILISER ZETALAX[®] DM[®] MICROLAVEMENT :

Zetalax[®] DM[®] Microlavement s'utilise en cas de constipation. La constipation consiste en l'altération du rythme normal d'évacuation; elle peut être liée à des facteurs comme un changement du style de vie, des habitudes alimentaires, etc.

En cas de constipation chronique, il est conseillé de consulter un médecin.

COMMENT FONCTIONNE ZETALAX[®] DM[®] MICROLAVEMENT :

Zetalax[®] DM[®] Microlavement agit mécaniquement au niveau du rectum et stimule le processus d'expulsion des matières fécales. L'action locale garantit la sécurité du produit, qui n'a pas d'interaction avec les processus physiologiques du tube digestif et n'a donc aucun effet collatéral sur le système.

Les ingrédients contenus dans le microlavement garantissent le ramollissement et la lubrification de la masse fécale, ce qui permet ensuite une expulsion rapide et aisée des matières fécales.

Zetalax[®] DM[®] Microlavement ne contient pas de substances actives au niveau pharmacologique et son action est exclusivement mécanique.

La présence d'extraits végétaux à action émolliente atténue l'effet irritant de la glycérine au niveau du rectum, ce qui rend son introduction plus aisée.

CAS DANS LESQUELS IL NE FAUT PAS UTILISER LE PRODUIT :

Ze

ab

sa

re

Ne

pr

Lot : 038

À utiliser de

préférence avant le : 06/2027

PPC : 84,50 DH

G

A

ZET

COMMENT UTILISER CE PRODUIT :

- Ouvrir l'emballage.
- Enlever le bouchon du microlavement et lubrifier la canule avec une goutte du produit.
- Introduire délicatement la canule dans le rectum, sans presser le tube.
- Appuyer à fond sur le microlavement.
- Extraire la canule sans relâcher la pression sur le tube, pour ne pas aspirer à nouveau le liquide.

Il est conseillé d'appliquer un ou deux microlavements par jour.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.

Suivre attentivement le mode d'emploi.

Conserver hors de portée des enfants.

INGÉDIENTS :

Glycérol, amidon, camomille extrait fluide, mauve extrait fluide, eau.

DATE D'ÉMISSION :

08/05/2011

Dispositif médical classe 1.

Autorisation ministère de la santé n°:860/16116/2016/DMP/20/DM



LOT



Validité 5 ans
La date de péremption se réfère
au produit intégré,
conservé correctement.

Importé au Maroc par :

Laboratoires IRCOS
N°109 Q.I sidi ghanem
40000 MARRAKECH

Distribué au Maroc par :

MEDIPRO PHARMA
Borj El yacout, Bd Rahal El Meskini.
20120. Casablanca.



A900021