

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M22- 0038002

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5396 Société : R.A.M.
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre : 166259
Nom & Prénom : ZAKARIA IMANE
Date de naissance : 02/04/1961
Adresse : 159 MANJA RONA, SIDI-MAAROUF - CASA
Tél. : 0661 62 70 57 Total des frais engagés : 5466,50 DHS

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
OPHTALMOLOGUE
181, Boulevard Abdelmoumen
4ème Etage N° 15 - CASA
Tél/Fax : 0522 27 60 61
Date de consultation : 12 JUN 2023
Nom et prénom du malade : ZAKARIA IMANE Age : 62
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : 6/2000
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA Le : 12/06/2023
Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2 JUIN 2023	9		300	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	12/06/2023	5166,50

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				Coefficient DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE																
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B</td> </tr> </table>		H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B		Coefficient DES TRAVAUX
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS														
			DATE DU DEVIS														
		DATE DE L'EXECUTION															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Azhar AZHARI

*Spécialiste des Maladies
et de la Chirurgie des Yeux
Ancien Interne des hôpitaux
de Toulouse (France)*



الدكتور مصطفى أزهرى

*اختصاصي في أمراض
وجراحة العيون
طبيب سابقا بمستشفيات
تولوز - فرنسا*

*جراحة بالليزر - علاج الحول
العدسات اللاصقة*

12 juin 2023

Casablanca, le

Mme ZAKARIA IMANE

RANCIPHEX 20 mg comprimés

1 comprimé le matin , pendant 6 Mois

TANAKAN cp

1 CP X 2/J, pendant 6 Mois

XOLA collyre

1 goutte 2 x / j, dans les deux yeux, pendant 6 Mois

ALPHAGAN 02 ./.: collyre

1 goutte 2 fois/jour; 8h30 et 20 heures30, dans les deux yeux,
pendant 6 Mois

GANFORT collyre (ou DUOTRAV colyre)

1 GOUTTE LE SOIR , dans les deux yeux, pendant 6 Mois

FRAKIDEX POMMADE

1 APPLICATION LE SOIR AU COUCHER PENDANT 08 JOURS LES
DEUX YEUX

131 شارع عبد المومن (زاوية زقاق جالين) إقامة جوهرة عبد المومن الطابق 4 - الرقم 15 - الدار البيضاء

131, Bd. Abdelmoumen (Angle Rue Galien) Résidence Jawhara Abdelmoumen - 4^e Etage - N° 15 - Casablanca

Tél. / Fax: 05 22 27 60 61 - Tél. : 05 22 47 30 38 / E-mail : azamus2000@yahoo.fr

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات الموصى بها

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles, adolescentes, femmes en âge de procréer ou enceintes, sauf en cas d'échec des autres traitements ou en l'absence d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنينة من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عنقود بنزلكونيوم
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنينة

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات الموصى بها

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنبنة من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنبنة

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات الموصى بها

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 مل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنية

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات للمعدة

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنية من فئة 3 مل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنية

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات للمعدة

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنينة من فئة 3 مل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنينة

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات للمعدة

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنبنة من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنبنة

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات للمعدة

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنبنة من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنبنة

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات للمعدة

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنينة من فئة 3 مل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنينة

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات للمعدة

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنينة من فئة 3 مل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنينة

11

Allergan

GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Voie oculaire

Flacon de 3 ml

Lot: *Sans Prix*
FAB:
EXP:

Médicament autorisé
219/2020 DMP/NRQd

Respecter les doses prescrites
احترم الجرعات للمعدة

Tableau A (Liste I)
I (اللائحة جدول)



Ne pas utiliser chez les filles,
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes, sauf
en cas d'échec des autres
traitements ou en l'absence
d'alternative thérapeutique.



Fabriqué par les Laboratoires

Allergan

Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irlande

Importé par les Laboratoires



134, Allée des Mimosas Ain Sebaâ
20590 - Casablanca - Maroc

64156MA10

92588MA

غانفور®

0,3 ملغ/مل + 5 ملغ/مل

بيماتوبروست + تيمولول

قطرات للعين

عن طريق العين

قنبنة من فئة 3 ملل

GANFORT® 0,3mg/ml+5mg/ml,
collyre en solution , flacon de 3 ml



GANFORT®

0,3 mg/ml + 5 mg/ml,
collyre en solution
bimatoprost/timolol

Composition pour 1 ml :

Bimatoprost.....0,3 mg
Timolol.....5,0 mg
sous forme de maléate de
timolol.....6,8 mg

Excipients :

Chlorure de benzalkonium, acide
citrique monohydraté, phosphate
disodique heptahydraté, chlorure de
sodium, hydroxyde de sodium ou
acide chlorhydrique (pour ajuster le
pH), eau purifiée.

Excipients à effet notoire :

Chlorure de benzalkonium
عن أن تأثير معروف : كلوريد
البنزلكونيوم

Lire la notice avant utilisation.

الرجو قراءة النشرة قبل الإستعمال

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants.

Conservez le flacon dans
l'emballage extérieur à l'abri de la
lumière.

A utiliser dans les 4 semaines après
ouverture du flacon.

يستعمل خلال 4 أسابيع بعد فتح القنبنة

11

تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
تحتوي السولات ذات تأثير معروف لآكتوز أحادي الصيغة الجينية. استعمال عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
يرجى الإطلاع بآمنة على الدواء قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgoïdes-bilobacelle 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
Consumer HealthCare
maphar
Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss, Casablanca.

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.
بوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين) باستثناء أي نوع من النعت الثانوي، الاضطرابات ناتجة عن مضاعفات طبية.

71,30

LOT 22220
PER 11/20



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
تحتوي السولات ذات تأثير معروف لآكتوز أحادي الصيغة الجينية. استعمال عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
يرجى الإطلاع بآمنة على الدواء قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgoïdes-bilobacelle 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
Consumer HealthCare
maphar
Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss, Casablanca.

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.
بوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين) باستثناء أي نوع من النعت الثانوي، الاضطرابات ناتجة عن مضاعفات طبية.

71,30

LOT 22220
PER 11/20



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
 نسبة السوائل ذات تأثير معروف لاكتوز أحادي الصاندة وكيفية استعمال: عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
 يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
 يرجى الإطلاع بابتداءً على النشرة قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
 Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
 Consumer HealthCare
 maphar
 Casablanca,
 Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss.

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض
 الاضطرابات الارتفاعية لدى الأشخاص المسنين
 (خاصة الاضطرابات الارتفاعية، باستثناء أي نوع
 من الحكة النوبة، الاضطرابات ثانوية ناتجة عن
 اضطرابات الأيضية.
 Ce médicament est indiqué dans le
 traitement symptomatique de certains
 troubles cognitifs du sujet âgé
 (en particulier troubles de la mémoire)
 à l'exception de tout type de démence
 confirmée, de troubles secondaires à des
 médicaments, à une dépression ou à des
 troubles métaboliques.

71,30

LOT 22220
 PER 11/20



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
 نسبة السوائل ذات تأثير معروف لاكتوز أحادي الصاندة وكيفية استعمال: عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
 يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
 يرجى الإطلاع بابتداءً على النشرة قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
 Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
 Consumer HealthCare
 maphar
 Casablanca,
 Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss.

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض
 الاضطرابات الارتفاعية لدى الأشخاص المسنين
 (خاصة الاضطرابات الارتفاعية، باستثناء أي نوع
 من الحكة النوبة، الاضطرابات ثانوية ناتجة عن
 اضطرابات الأيضية.
 Ce médicament est indiqué dans le
 traitement symptomatique de certains
 troubles cognitifs du sujet âgé
 (en particulier troubles de la mémoire)
 à l'exception de tout type de démence
 confirmée, de troubles secondaires à des
 médicaments, à une dépression ou à des
 troubles métaboliques.

71,30

LOT 22220
 PER 11/20



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
 نسبة السوائل ذات تأثير معروف لاكتوز أحادي الصاندة وكيفية استعمال: عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
 يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
 يرجى الإطلاع بابتداءً على النشرة قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
 Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
 Consumer HealthCare
 maphar
 Casablanca,
 Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss.

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض
 الاضطرابات الارتفاعية لدى الأشخاص المسنين
 (خاصة الاضطرابات الارتفاعية، باستثناء أي نوع
 من الحكة النوبة، الاضطرابات ثانوية ناتجة عن
 اضطرابات الأيضية.
 Ce médicament est indiqué dans le
 traitement symptomatique de certains
 troubles cognitifs du sujet âgé
 (en particulier troubles de la mémoire)
 à l'exception de tout type de démence
 confirmée, de troubles secondaires à des
 médicaments, à une dépression ou à des
 troubles métaboliques.

71,30

LOT 22220
 PER 11/20



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
 نسبة السوائل ذات تأثير معروف لاكتوز أحادي الصاندة وكيفية استعمال: عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
 يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
 يرجى الإطلاع بابتداءً على النشرة قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
 Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
 Consumer HealthCare
 maphar
 Casablanca,
 Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss.

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض
 الاضطرابات الارتفاعية لدى الأشخاص المسنين
 (خاصة الاضطرابات الارتفاعية، باستثناء أي نوع
 من الحكة النوبة، الاضطرابات ثانوية ناتجة عن
 اضطرابات الأيضية.
 Ce médicament est indiqué dans le
 traitement symptomatique de certains
 troubles cognitifs du sujet âgé
 (en particulier troubles de la mémoire)
 à l'exception de tout type de démence
 confirmée, de troubles secondaires à des
 médicaments, à une dépression ou à des
 troubles métaboliques.

71,30

LOT 22220
 PER 11/20



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
 نسبة السوائل ذات تأثير معروف لاكتوز أحادي الصاندة وكيفية استعمال: عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
 يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
 يرجى الإطلاع بابتداءً على النشرة قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
 Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
 Consumer HealthCare
 maphar
 Casablanca,
 Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss.

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض
 الاضطرابات الارتفاعية لدى الأشخاص المسنين
 (خاصة الاضطرابات الارتفاعية، باستثناء أي نوع
 من الحكة النوبة، الاضطرابات ثانوية ناتجة عن
 اضطرابات الأيضية.
 Ce médicament est indiqué dans le
 traitement symptomatique de certains
 troubles cognitifs du sujet âgé
 (en particulier troubles de la mémoire)
 à l'exception de tout type de démence
 confirmée, de troubles secondaires à des
 médicaments, à une dépression ou à des
 troubles métaboliques.

71,30

LOT 22220
 PER 11/20



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
 نسبة السوائل ذات تأثير معروف لاكتوز أحادي الصاندة وكيفية استعمال: عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
 يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
 يرجى الإطلاع بابتداءً على النشرة قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgolides-bilobalide 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
 Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
 Consumer HealthCare
 maphar
 Casablanca,
 Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss.

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض
 الاضطرابات الارتفاعية لدى الأشخاص المسنين
 (خاصة الاضطرابات الارتفاعية، باستثناء أي نوع
 من الحكة النوبة، الاضطرابات ثانوية ناتجة عن
 اضطرابات الأيضية.
 Ce médicament est indiqué dans le
 traitement symptomatique de certains
 troubles cognitifs du sujet âgé
 (en particulier troubles de la mémoire)
 à l'exception de tout type de démence
 confirmée, de troubles secondaires à des
 médicaments, à une dépression ou à des
 troubles métaboliques.

71,30

LOT 22220
 PER 11/20



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
 نسبة السوائل ذات تأثير معروف لاكتوز أحادي الصاندة وكيفية استعمال: عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
 يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
 يرجى الإطلاع بابتداءً على النشرة قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgoïdes-bilobacelle 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
 Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
 Consumer HealthCare
 maphar
 Casablanca,
 Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss.

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض
 الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين
 (خاصة الاضطرابات الإدراكية، باستثناء أي نوع
 من الخلل الحركي، الاضطرابات ناتجة ناتجة عن
 الاضطرابات الإدراكية).
 Ce médicament est indiqué dans le
 traitement symptomatique de certains
 troubles cognitifs du sujet âgé
 (en particulier troubles de la mémoire)
 à l'exception de tout type de démence
 confirmée, de troubles secondaires à des
 médicaments, à une dépression ou à des
 troubles métaboliques.

71,30

LOT 22220
 PER 11/20



40th Anniversary

42x25x88

Composition : Gingko (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié 4g) titré à 24 % d'hydrostides de ginkgo et 6 % de ginkgolides-bilobaïde (40,00 mg Pour un comprimé enrobé).

Liste des excipients à effet notoire :
lactose monohydraté.

Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA
30 COMPRIMÉS ENROBÉS



نسبة التسويعات ذات تأثير معزول لاكثر احدى الدائنية وكيفية الاستعمال عن طريق الفم

يقف في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

IMPRIMEPEL



9 781118 000115

30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg 

IPSEN
Consumer HealthCare
maphar
Boulevard ALKIMIA N°6 Qi-Sidi Bernoussi,
Casablanca.

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires ou de médicaments, à une dose supérieure à des troubles métaboliques.

7A.30



تاناكان 40مجم

42x25x88



tanakan® 40mg

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

المكونات: جينكو بيلوبا (استخلص مقاس) نسبة 2400 من الهيدروسيديات جينكو 69% من جينكويد بيلوباليد 40,00 ملغ لكل قرص مغلف.
تحتوي السولات ذات تأثير معروف لآكتوز أحادي الصيغة الجينية. استعمال عن طريق اللع.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.
يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.
يرجى الإطلاع بآمنة على الدواء قبل تناول هذا الدواء.

IMPRIMEPEL

Composition : Ginkgo (Ginkgo biloba L.) (extraits quantifiés de titre à 24 % d'hydrocides de ginkgo et 6 % de Ginkgoïdes-bilobacelle 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.
Liste des excipients à effet notoire : lactose monohydraté.
Mode et voie d'administration : Voie orale.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.



30 COMPRIMÉS ENROBÉS

tanakan 40 mg

IPSEN
Consumer HealthCare
maphar
Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bemouss, Casablanca.

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.
بوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين) باستثناء أي نوع من النعت الثانوي، الاضطرابات ناتجة عن مضاعفات طبية.

71,30

LOT 22220
PER 11/20



40th Anniversary

42x25x88

Composition : Gingko (Ginkgo biloba L.) (extrait quantifié 4g) titré à 24 % d'hydrostides de ginkgo et 6 % de ginkgolides-bilobaïde 40,00 mg Pour un comprimé enrobé.

Liste des excipients à effet notoire :
lactose monohydraté.

Mode et voie d'administration : Voie orale

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament.

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA
30 COMPRIMÉS ENROBÉS



يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية.

يرجى الإطلاع بانتباه على النشرة
تتاول هذا الدواء قبل

يحفظ بعيداً عن مرآة ومقتناول الأطفال.

4000 ملع لكل لتر ماء

المكونات: جينكو بلوبا (مستخلص مقاس) نسبته 24% من الهيدروكسيدات جينكو و 6% من جينكوبلايد (مستخلص مقاس)

الفعالة: السواوات ناه تأثير معروف، لاكتون أحادي السائية وكيفية الاستعمال: عن طريق الفم.

IMPRIMEPEL

tanakan 40 mg 

30 COMPRIMÉS ENROBÉS

6 118000 011545

IPSEN
Consumer HealthCare
maphar
Boulevard ALKIMIA N°6 Qi-Sidi Bernoussi,
Casablanca.

Le médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démente confirmée, de troubles secondaires ou de médicaments, à un degré sévère ou à des troubles métaboliques.

7A.30



**À chaque fois
que l'œil est irrité**

16 unidoses stériles de 10 ml



PhyLarm

Solution stérile pour usage oculaire

Solution stérile pour usage oculaire

PhyLarm

HER MEDIC
PPC
104.00 DHS

16 unidoses stériles de 10 ml

**À chaque fois
que l'œil est irrité**

0459
STERILE A



PHYLARM permet une élimination des corps étrangers, des poussières, des allergènes et polluants atmosphériques, des sécrétions conjonctivales présents à la surface de l'œil, par irrigation de toute la surface oculaire.

PhyLarm



جامجوم فارما
Jamjoom Pharma

(Dorzolamide)
SOLUTION
OPHTHALMIQUE
STÉRILE

Xola[®] 2%

21

9



Tableau A (liste 1) (125)

No pas avaliar-respectar las doses prescritas

[illegible]

2% [®] 96

مجموعه فارما
famjoom Pharma

[illegible]

(continued)

® 92

Ophthalmics

زولا
Xola®

Lot: 2 1 1 1 8
Fab: 1 1 2 2
Exp: 1 1 2 4

P.P.V : 95 DH 20



64

82. Allee des Gastwirts - Au Seels - Casablanca - Maroc
S. Bachouchi - Pharmacia Responsable

Un produit fabriqué par
Jamjoom Pharmaceuticals Co.,
Jeddah, Arabie Saoudite
AMM N°313R1/19DMP/21/NRQ

Ne pas laisser à la portée des enfants.
À conserver 30 jours après ouverture.
Lire attentivement la notice.

Ne pas stocker au-dessus de 30 °C.

Voie oculaire

Chlorure de Benzalkonium
Excipient à effet notoire :
Dorzolamide 20 mg).
22,25 mg (Equivalent à
Chlorhydrate de Dorzolamide
Chaque ml contient :

Xola[®] 2%

12502660-02S

118001 " 040421



21

9. $\frac{1}{28}$ of the population of a country is 1.5 million. Find the population of the country.



Tableau A (liste 1) (1257) : جزئي

No pas avyar-respectar los doses prescritas

١٠٥٣
١٠٥٤
١٠٥٥
١٠٥٦
١٠٥٧
١٠٥٨
١٠٥٩
١٠٦٠
١٠٦١
١٠٦٢
١٠٦٣
١٠٦٤
١٠٦٥
١٠٦٦
١٠٦٧
١٠٦٨
١٠٦٩
١٠٧٠
١٠٧١
١٠٧٢
١٠٧٣
١٠٧٤
١٠٧٥
١٠٧٦
١٠٧٧
١٠٧٨
١٠٧٩
١٠٨٠
١٠٨١
١٠٨٢
١٠٨٣
١٠٨٤
١٠٨٥
١٠٨٦
١٠٨٧
١٠٨٨
١٠٨٩
١٠٩٠
١٠٩١
١٠٩٢
١٠٩٣
١٠٩٤
١٠٩٥
١٠٩٦
١٠٩٧
١٠٩٨
١٠٩٩
١١٠٠

٦٨

Xola[®] 2%

(Dorzolamide)
SOLUTION
OPHTHALMIQUE
STÉRILE


Jamfoom Pharma

(continued)

22

Ophthalmics

زولا®
Xola®

Lot: 700 18
Fab: 11 22
Exp: 11 24

P.P.V : 95 DH 20



64

82. Allele des Casusmarius - Ayn Seida - Casablanca - Marrakech
S. Bachouch - Pharmacia Responsable

Un produit fabriqué par
Jamjoom Pharmaceuticals Co.,
Jeddah, Arabie Saoudite
AMM N°313R1/19DMP/21/NRQ

Ne pas stocker au-dessus de 30 °C.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
À conserver 30 jours après ouverture.
Lire attentivement la notice.

Voie oculaire
Chlorure de Benzalkonium
Excipient à effet notoire :
Dorzolamide 20 mg,
22,25 mg (Equivalent à
Chlorhydrate de Dorzolamide
Chaque ml contient :

Xola[®] 2%

12502660-02S

118001 " 040421



21

9. $\frac{1}{28} \times 100 = 3.57\%$



Tableau A (liste 1) (في الجدول 1)

No pas avyar-respectar los doses prescritas

[illegible]

٢٦٨

Xola[®] 2%

(Dorzolamide)
SOLUTION
OPHTHALMIQUE
STÉRILE

Amjoom Pharma



(continued)

29

Ophthalmics

زولا®
Xola®

Lot: 700 18
Fab: 11 22
Exp: 11 24

P.P.V : 95 DH 20



64

82. Aile des Casuarinae - Ail. Social - Casuarina - Marac
S. Bachoult - Pharmacia Responsable

Un produit fabriqué par
Jamjoom Pharmaceuticals Co.,
Jeddah, Arabie Saoudite
AMM N°313R1/19DMP/21/NRQ

Ne pas stocker au-dessus de 30 °C.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
À conserver 30 jours après ouverture.
Lire attentivement la notice.

Voie oculaire

Chlorure de Benzalkonium
Excipient à effet notoire :
Dorzolamide 20 (mg).
22,25 mg (équivalent à
Chlorhydrate de Dorzolamide
Chaque ml contient :

Xola[®] 2%

12502660-02S

6" 118001 " 040421



21

9. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$



Tableau A (liste 1) (125)

No pas avaliar/respectar las dosis prescritas

[illegible]

2% [®] 96

Xola[®] 2%

(Dorzolamide)
SOLUTION
OPHTHALMIQUE
STÉRILE



Jamjoom Pharma

[illegible]

(ကမ္ဘာ့စံ)

® 92

Ophthalmics

زولا[®]
Xola[®]

Lot: 2 1 1 1 0
Fab: 1 1 2 2
Exp: 1 1 2 4

P.P.V : 95 DH 20



64

82, Av. des Casernes - Ain Seidi - Casablanca - Maroc
S. Bachouch - Pharmacien Responsable

Un produit fabriqué par
Jamjoom Pharmaceuticals Co.,
Jeddah, Arabie Saoudite
AMM N°313R1/19DMP/21/NRQ

Ne pas stocker au-dessus de 30 °C.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
À conserver 30 jours après ouverture.
Lire attentivement la notice.

Voie oculaire

Chlorure de Benzalkonium
Excipient à effet notoire :
Dorzolamide 20 (mg).
22,25 mg (équivalent à
Chlorhydrate de Dorzolamide
Chaque ml contient :

Xola[®] 2%



جامجوم فارما
Jamjoom Pharma

(Dorzolamide)
SOLUTION
OPHTHALMIQUE
STÉRILE

Xola[®] 2%

21

9



Tableau A (liste 1) (125)

No pas avaliar-respectar las dosis prescritas

[illegible]

2% [®] 96

مجموعه فارما
famjoom Pharma

॥

॥

(ကမ္ဘာ့စံ)

® 92

Ophthalmics

زولا
Xola®

Lot: 2 1 1 1 8
Fab: 1 1 2 2
Exp: 1 1 2 4

P.P.V : 95 DH 20

64

82. Allee des Gastwirts - Au Seckel - Casablanca - Maroc
S. Bachouchi - Pharmacia Responsable

Un produit fabriqué par
Jamjoom Pharmaceuticals Co.,
Jeddah, Arabie Saoudite
AMM N°313R1/19DMP/21/NRQ

Ne pas stocker au-dessus de 30 °C.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
À conserver 30 jours après ouverture.
Lire attentivement la notice.

Voie oculaire

Chlorure de Benzaikonium
Excipient à effet notoire :
Dorzolamide 20 mg).
22,25 mg (équivalent à
Chlorhydrate de Dorzolamide
Chaque ml contient :

Xola[®] 2%



جامجوم فارما
Jamjoom Pharma

(Dorzolamide)
SOLUTION
OPHTHALMIQUE
STÉRILE

Xola[®] 2%

21

9



Tableau A (liste 1) (125)

No pas avaliar-respectar las doses prescritas

[illegible]

2% [®] 96

مجموعه فارما
famjoom Pharma

॥

॥

(ကမ္ဘာ့စံ)

® 92

Ophthalmics

زولا
Xola®

Lot: 2 1 1 1 8
Fab: 1 1 2 2
Exp: 1 1 2 4

P.P.V : 95 DH 20

64

82. Allee des Gastwirts - Au Seckel - Casablanca - Maroc
S. Bachouchi - Pharmacia Responsable

Un produit fabriqué par
Jamjoom Pharmaceuticals Co.,
Jeddah, Arabie Saoudite
AMM N°313R1/19DMP/21/NRQ

Ne pas stocker au-dessus de 30 °C.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
À conserver 30 jours après ouverture.
Lire attentivement la notice.

Chlorhydrate de Dorzolamide
22,25 mg (équivalent à
Dorzolamide 20 mg).
Excipient à effet notoire :
Chlorure de Benzaikonium

Xola[®] 2%



جامجوم فارما
Jamjoom Pharma

(Dorzolamide)
SOLUTION
OPHTHALMIQUE
STÉRILE

Xola[®] 2%

21

9



Tableau A (liste 1) (125)

No pas avaliar-respectar las doses prescritas

[illegible]

2% [®] 96

مجموعه فارما
famjoom Pharma

॥ ॥

(continued)

® 92



زولا
Xola®

Lot: 2 1 1 1 8
Fab: 1 1 2 2
Exp: 1 1 2 4

P.P.V : 95 DH 20



64

82. Allee des Gaiswirts - An Seela - Casablanca - Maroc
S. Bachouchi - Pharmacie Responsable

Un produit fabriqué par
Jamjoom Pharmaceuticals Co.,
Jeddah, Arabie Saoudite
AMM N°313R1/19DMP/21/NRQ


Ne pas laisser à la portée des enfants.
À conserver 30 jours après ouverture.
Lire attentivement la notice.


Ne pas stocker au-dessus de 30 °C.


Voie oculaire


Chlorure de Benzalkonium
Excipient à effet notoire :
Dorzolamide 20 mg).
22,25 mg (Equivalent à
Chlorhydrate de Dorzolamide
Chaque ml contient :

Xola[®] 2%














فراكيدكس® FRAKIDEX

Phosphate sodique de dexaméthasone / Sulfate de framycétine
فوسفات ديكساميثازون صودي / سولفات فراميسيتين

Pommade ophtalmique / مرهم للعين

BAUSCH + LOMB

COMPOSITION :

Phosphate sodique de dexaméthasone 0,1 g,
Sulfate de framycétine 315 000 UI.
Excipients : vaseline, paraffine liquide q.s.p. 100 g

التركيب :
سلفات فراميسيتين 315 000 وحدة دولية
سواغات : هازلين ، بارافين سائل ك ل ك 100 غ

AMM France n° /
رخصة فرنسا رقم 326 452 13
CIV Algérie n°/
مقرر تسجيل الجزائر رقم
096/17D125/01
AMM Tunisie n°/
رخصة تونس رقم 5283073



Soyez prudent
Ne pas conduire
sans avoir lu la notice
كن حذرا
تجنب القيادة قبل
قراءة النشرة

أنبوب 5 غ / 5 g Tube de

DÉTENTEUR DE LA D.E / DE L'AMM:
صاحب مقرر التسجيل، حامل الرخصة:

LABORATOIRE CHAUVIN
416, rue Samuel Morse - CS 99535
34961 Montpellier Cedex 2, France
Nom et adresse du fabricant / conditionneur:
اسم و عنوان المصنع / المعبي
Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165/173
13581 Berlin, Allemagne

Distribué par : ZENTIPHARMAMA,
96 zone industrielle Tassila Inezgane,
Agadir - Maroc.
AMM N°30/19/DMP/21/NRQDMM
PPV : 20,80 dh

INDICATIONS ET POSOLOGIE :

Lire attentivement la notice. Appliquer sur l'œil.
NE LAISSER NI À LA PORTÉE NI À LA VUE DES
ENFANTS. A conserver à une température
inférieure à 25°C.
Frakidex est une marque déposée de
Bausch & Lomb Incorporated ou de ses
filiales. © 2020 Bausch & Lomb
Incorporated ou de ses filiales.

احترم الجرعات الموصوفة
RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

Liste I

القائمة I

NE PAS AVALER
لا يتبع

Date de
fab 11.2022
Date Exp 10.2024
Lot 912

4831455727-MA6
3.18.08.20
27/20/92

05/2018-C

Composition:

Rabéprazole sodique (DGI) 20 mg

Excipients q.s.p. un comprimé

Indications, Contre-indications, Posologie

& Précautions d'emploi: lire la notice à l'intérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

PPV: 113 DH 70

التوكية:

رابيرازول الصودي 20 ملغ

الأسوغة كنية كافية لكل الرس.

الارشادات العلاجية، موانع الاستعمال، الجرعة

و احتياطات الاستعمال: اقرأ النشرة بالداخل.

يحفظ بعيدا عن متناول و سرائ الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية،

بعيدا عن الرطوبة.

5186189

رانسييفيكس
رابيرازول الصودي

RANCIPHEX® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 1118001 300808

20 ملغ

28 قرصا مقاوما

لحموضة المعدة

عن طريق الفم

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca.

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Paonta Sahib, Dist. Simour,

Himachal Pradesh, Inde.

CODE No.:

HP/DRUGS/MNB/95/2

Médicament Autorisé N°526/17 DMP/21/NRS



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترم الجرعات المحددة

Tableau C (Liste II)

Ranciphex®
Rabéprazole sodique



20 mg

28 Comprimés

gastro-résistants

Voie orale

GTIN: 16118001300805

Lot No: PTC6296A

EXP.: 11/2023

S.N.: P9JADV84DB82QD



05/2018-C

Composition:

Rabéprazole sodique (DGI) 20 mg

Excipients q.s.p. un comprimé

Indications, Contre-indications, Posologie

& Précautions d'emploi: lire la notice à l'intérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

PPV: 113 DH 70

التوكية:

رابيرازول الصودي 20 ملغ

الأسوغة كنية كافية لكل الرس.

الارشادات العلاجية، موانع الاستعمال، الجرعة

و احتياطات الاستعمال: اقرأ النشرة بالداخل.

يحفظ بعيدا عن متناول و سرائ الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية،

بعيدا عن الرطوبة.

5186189

رانسييفيكس
رابيرازول الصودي

RANCIPHEX® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 1118001 300808

20 ملغ

28 قرصا مقاوما

لحموضة المعدة

عن طريق الفم

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca.

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Paonta Sahib, Dist. Simour,

Himachal Pradesh, Inde.

CODE No.:

HP/DRUGS/MNB/95/2

Médicament Autorisé N°526/17 DMP/21/NRS



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترم الجرعات المحددة

Tableau C (Liste II)

Ranciphex®
Rabéprazole sodique



20 mg

28 Comprimés

gastro-résistants

Voie orale

GTIN: 16118001300805

Lot No: PTC6296A

EXP.: 11/2023

S.N.: P9JADV84DB82QD



05/2018-C

Composition:

Rabéprazole sodique (DGI) 20 mg

Excipients q.s.p. un comprimé

Indications, Contre-indications, Posologie

& Précautions d'emploi: lire la notice à l'intérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

PPV: 113 DH 70

التوكية:

رابيرازول الصودي 20 ملغ

الأسوغة كنية كافية لكل الرس.

الارشادات العلاجية، موانع الاستعمال، الجرعة

و احتياطات الاستعمال: اقرأ النشرة بالداخل.

يحفظ بعيدا عن متناول و سرائ الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية،

بعيدا عن الرطوبة.

5186189

رانسييفيكس
رابيرازول الصودي

RANCIPHEX® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 1118001 300808

20 ملغ

28 قرصا مقاوما

لحموضة المعدة

عن طريق الفم

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca.

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Paonta Sahib, Dist. Simour,

Himachal Pradesh, Inde.

CODE No.:

HP/DRUGS/MNB/95/2

Médicament Autorisé N°526/17 DMP/21/NRS



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترم الجرعات المحددة

Tableau C (Liste II)

Ranciphex®
Rabéprazole sodique



20 mg

28 Comprimés

gastro-résistants

Voie orale

GTIN: 16118001300805

Lot No: PTC6296A

EXP.: 11/2023

S.N.: P9JADV84DB82QD



05/2018-C

Composition:

Rabéprazole sodique (DGI) 20 mg

Excipients q.s.p. un comprimé

Indications, Contre-indications, Posologie

& Précautions d'emploi: lire la notice à l'intérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

PPV: 113 DH 70

التوكية:

رابيرازول الصودي 20 ملغ

الأسوغة كنية كافية لكل الرس.

الارشادات العلاجية، موانع الاستعمال، الجرعة

و احتياطات الاستعمال: اقرأ النشرة بالداخل.

يحفظ بعيدا عن متناول و سرائ الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية،

بعيدا عن الرطوبة.

5186189

رانسييفيكس
رابيرازول الصودي

RANCIPHEX® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 1118001 300808

20 ملغ

28 قرصا مقاوما

لحموضة المعدة

عن طريق الفم

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca.

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Paonta Sahib, Dist. Simour,

Himachal Pradesh, Inde.

CODE No.:

HP/DRUGS/MNB/95/2

Médicament Autorisé N°526/17 DMP/21/NRS



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترم الجرعات المحددة

Tableau C (Liste II)

Ranciphex®
Rabéprazole sodique



20 mg

28 Comprimés

gastro-résistants

Voie orale

GTIN: 16118001300805

Lot No: PTC6296A

EXP.: 11/2023

S.N.: P9JADV84DB82QD



05/2018-C

Composition:

Rabéprazole sodique (DGI) 20 mg

Excipients q.s.p. un comprimé

Indications, Contre-indications, Posologie

& Précautions d'emploi: lire la notice à l'intérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

PPV: 113 DH 70

التوكية:

رابيرازول الصودي 20 ملغ

الأسوغة كنية كافية لكل الرس.

الارشادات العلاجية، موانع الاستعمال، الجرعة

و احتياطات الاستعمال: اقرأ النشرة بالداخل.

يحفظ بعيدا عن متناول و سرائ الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية،

بعيدا عن الرطوبة.

5186189

رانسييفيكس
رابيرازول الصودي

RANCIPHEX® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 1118001 300808

20 ملغ

28 قرصا مقاوما

لحموضة المعدة

عن طريق الفم

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca.

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Paonta Sahib, Dist. Simour,

Himachal Pradesh, Inde.

CODE No.:

HP/DRUGS/MNB/95/2

Médicament Autorisé N°526/17 DMP/21/NRS



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترم الجرعات المحددة

Tableau C (Liste II)

Ranciphex®
Rabéprazole sodique



20 mg

28 Comprimés

gastro-résistants

Voie orale

GTIN: 16118001300805

Lot No: PTC6296A

EXP.: 11/2023

S.N.: P9JADV84DB82QD



05/2018-C

Composition:

Rabéprazole sodique (DGI) 20 mg

Excipients q.s.p. un comprimé

Indications, Contre-indications, Posologie

& Précautions d'emploi: lire la notice à l'intérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

PPV: 113 DH 70

التوكية:

رابيرازول الصودي 20 ملغ

الأسوغة كنية كافية لكل الرس.

الارشادات العلاجية، موانع الاستعمال، الجرعة

و احتياطات الاستعمال: اقرأ النشرة بالداخل.

يحفظ بعيدا عن متناول و سرائ الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية،

بعيدا عن الرطوبة.

5186189

رانسيفيكس
رابيرازول الصودي

RANCIPHEX® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 1118001 300808

20 ملغ

28 قرصا مقاوما

لحموضة المعدة

عن طريق الفم

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca.

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Paonta Sahib, Dist. Simour,

Himachal Pradesh, Inde.

CODE No.:

HP/DRUGS/MNB/95/2

Médicament Autorisé N°526/17 DMP/21/NRS



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترم الجرعات المحددة

Tableau C (Liste II)

Ranciphex®
Rabéprazole sodique



20 mg

28 Comprimés

gastro-résistants

Voie orale

GTIN: 16118001300805

Lot No: PTC6296A

EXP.: 11/2023

S.N.: P9JADV84DB82QD



05/2018-C

Composition:

Rabéprazole sodique (DGI) 20 mg

Excipients q.s.p. un comprimé

Indications, Contre-indications, Posologie

& Précautions d'emploi: lire la notice à l'intérieur.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

PPV: 113 DH 70

التوكية:

رابيرازول الصودي 20 ملغ

الأسوغة كنية كافية لكل الرس.

الارشادات العلاجية، موانع الاستعمال، الجرعة

و احتياطات الاستعمال: اقرأ النشرة بالداخل.

يحفظ بعيدا عن متناول و سرائ الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 25 درجة مئوية،

بعيدا عن الرطوبة.

5186189

رانسيفيكس
رابيرازول الصودي

RANCIPHEX® 20 mg

28 comprimés gastro-résistant

Voie orale



6 1118001 300808

20 ملغ

28 قرصا مقاوما

لحموضة المعدة

عن طريق الفم

Importé par :

SUN PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC

169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca.

Fabriqué par :

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Paonta Sahib, Dist. Simour,

Himachal Pradesh, Inde.

CODE No.:

HP/DRUGS/MNB/95/2

Médicament Autorisé N°526/17 DMP/21/NRS



RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

احترم الجرعات المحددة

Tableau C (Liste II)

Ranciphex®
Rabéprazole sodique



20 mg

28 Comprimés

gastro-résistants

Voie orale

GTIN: 16118001300805

Lot No: PTC6296A

EXP.: 11/2023

S.N.: P9JADV84DB82QD

