

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET ÉVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - [www.mupras.com](http://www.mupras.com)

166123

**Déclaration de Maladie : N° P19- 0014590**

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2818

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MOUTAKI NAJMA


Date de naissance : 01/01/1952

Adresse :

Tél. : 0661580701

Total des frais engagés : 39,49 Dhs

Cadre réservé au Médecin

  
SIDI ALLAL BEN ABDELLAH  
Résidence Hotel & Casino P2 N° 2  
Hassan II Avenue  
Allal Ben Abdellah Street, Al Quds  
Casablanca  
Tél. : 05 22 21 25 55 - GSM : 06 61 98 66 06

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/5/25	OS		300DH	
DL				 <i>Dr. Abdellah Ben Ali, Médecin généraliste, Résidence El Moudawia, Casablanca, Tél.: 05 22 21 25 15 - 05 22 21 25 15</i>

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE CARNOT Dr. BERNARDI Lalla 15, Rue Isafy EL Barmaki Casablanca - Tel. 05 22 63 86 57	17.15.23	649.10

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

#### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
<i>MAJIA HAJAR</i> <del>07 GPE 1000 Ennakhil</del> Majia Hajar Ennakhil	<i>BAFTA 1000 13</i> <del>31/07/2017 GPE 1000 Ennakhil</del> Bouazza Ablaica 06 38 77	1	1			<i>3000.00</i>

#### **RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important :**


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553



### **(Création, remont, adjonction)**

#### Fonctionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION**

**Dr. NACHAT Bouchaib**

**OPHTHALMOLOGISTE**

Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux

Ex - Ophtalmologiste au CHU Ibn Rochd

20 Août Casablanca

- Membre de la société française d'ophtalmologie

- Chirurgie de l'oeil : Adultes et enfants
- Explorations Oculaires
- Lasers - Lasik
- Urgences Ophtalmologiques



**الدكتور بوشعيب نشاط**

اخصائي في أمراض و جراحة العيون

طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن رشد

20 غشت بالبيضاء

عضو الجمعية الفرنسية لأمراض و جراحة العيون

- جراحة العين : الكبار و الصغار

- التصوير الرقمي لشبكة العين

- المعالة بالليزر - تصحيح النظر

- المستعجلات

## ORDONNANCE

Casa **MOUTTAKI Najma**

110,70  
x3

99,00  
+  
109,00  
x2

- XALAMOL COLLYRE

1 goutte, le soir, dans les deux yeux, pendant 3 mois

- Hye COLLYRE

1 goutte, 3 fois par jour, dans les deux yeux, pendant 3 mois

S.V

S.V

PHARMACIE CARNOT  
Dr. BENJELLOUN Laila  
15, Rue Jaâfar El Barmaki  
Casablanca - Tél. 05 22 63 86 57

T: 649, 10

Dr. Bouchaib NACHAT  
Ophtalmologiste  
Résidence Fath 1, Imm 12 N° 2  
Hay Mly Abdellah Bd. Al Quds  
Aïn Chock - Casablanca  
Tél.: 05 22 21 25 15 - GSM: 06 61 98 66 06

شارع القدس إقامة الفتح 1 عمارة 12 رقم 2 ( أمام مقاطعة 30 ) عين الشق الدار البيضاء  
B.d ALQODS RESIDENCE AL FATH 1 Imm 12 N° 2 (en face Commune Urbain 30) Aïn Chock Casa

Tél : 05 22 21 25 15 - Urgences : 06 61 98 66 06

E-mail : nachat.Bouchaib@gmail.com

912253/00



FARMIGEA<sup>V</sup>

Lubricant ophthalmic solution  
with sodium hyaluronate 0.4%  
10ml bottle



#### Composition

Sodium hyaluronate 0.4%, dibasic sodium phosphate; monobasic sodium phosphate; sodium chloride; benzalkonium chloride; sodium edetate; water for injection.

#### How is presented?

HYE is an ophthalmic solution in a bottle of 10ml.

#### What is it?

HYE is a 0.4% ophthalmic solution of high molecular weight sodium hyaluronate, obtained by biotechnology. It has muco-mimetic, muco-adhesive properties, stabilizes the tear film and keeps the

#### When should it be used?

The lubricant, moisturizing and protective elements such as relieve irritation, dry, burning and to environmental elements such as excessive light, air conditioning, ocular surgery, conjunctivitis, cont

#### How much to use?

1 drop in the eye 2-3 times daily.

#### Precautions and warnings

- do not use if the container is damaged
- do not use if you are sensitive to any of the components
- do not use after the expiry date shown on the container
- do not touch the eye with the tip of the container
- after administration, in rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the solution. It is therefore advisable to wait for a few seconds before any activity that requires clear vision.
- leave at least 10-15 minutes between administration of any other ophthalmic drugs
- once opened the bottle the product can be used within 30 days
- keep out of the reach and sight of children
- the product is for external ophthalmic use only
- store below 25 °C

**Manufacturer:** Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva 8, 56121 Pisa, Italy  
**Importateur:** B2S Health Services. Villa 44, lotissement AL Hanaa, Hay Nahda 2 - Rabat

Date of last revision text: September 2012

CE 0546

STERILE A



912253/00



FARMIGEA<sup>V</sup>

Lubricant ophthalmic solution  
with sodium hyaluronate 0.4%  
10ml bottle



#### Composition

Sodium hyaluronate 0.4%, dibasic sodium phosphate; monobasic sodium phosphate; sodium chloride; benzalkonium chloride; sodium edetate; water for injection.

#### How is presented?

HYE is an ophthalmic solution in a bottle of 10ml.

#### What is it?

HYE is a 0.4% ophthalmic solution of high molecular weight sodium hyaluronate, obtained by biotechnology. It has muco-mimetic, muco-adhesive properties, stabilizes the tear film and keeps the

#### When should it be used?

The lubricant, moisturizing and protective elements such as relieve irritation, dry, burning and to environmental elements such as excessive light, air conditioning, ocular surgery, conjunctivitis, cont

#### How much to use?

1 drop in the eye 2-3 times daily.

#### Precautions and warnings

- do not use if the container is damaged
- do not use if you are sensitive to any of the components
- do not use after the expiry date shown on the container
- do not touch the eye with the tip of the container
- after administration, in rare cases, a slight temporary blurring of vision may be observed due to the viscosity of the solution. It is therefore advisable to wait for a few seconds before any activity that requires clear vision.
- leave at least 10-15 minutes between administration of any other ophthalmic drugs
- once opened the bottle the product can be used within 30 days
- keep out of the reach and sight of children
- the product is for external ophthalmic use only
- store below 25 °C

**Manufacturer:** Farmigea S.p.A. - Via G.B. Oliva 8, 56121 Pisa, Italy  
**Importateur:** B2S Health Services. Villa 44, lotissement AL Hanaa, Hay Nahda 2 - Rabat

Date of last revision text: September 2012

CE 0546

STERILE A



Notice: information de l'utilisateur

# Xolamol® ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## dorzolamide + Timolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est Xolamol® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé

Xolamol® collyre est une combinaison de deux médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés «inhibiteurs de l'anhydrase carbonique».
- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés «bêta-bloquants».

Xolamol® collyre est prescrit pour abaisser la tension élevée dans l'œil dans le traitement du glaucome quand le collyre bêta-bloquant utilisé seule n'est pas suffisant.

### 2. Avant d'utiliser Xolamol® collyre

**N'utilisez pas Xolamol® collyre si vous êtes allergique au dorzolamide ou au timolol, les bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).**

- vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).

• vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.

- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.

• vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament,

consultez d'abord votre m

Si vous avez d'autres ques  
de ce médicament, interro  
pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires, certains surviennent pas systématiquement dans le monde.

Vous pouvez habituellement les reconnaître par des gouttes, sauf si les effets sont très importants ou si vous êtes inquiet, parlez à un médecin ou à une infirmière. N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® collyre sans consulter votre médecin.

**Si vous ressentez un des suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament immédiatement et rendez-vous au service de soins de santé le plus proche.**

• Réactions allergiques: gonflement sous la peau ou dans les zones tels que le visage, entravant les voies respiratoires, une difficulté à avaler, urticaire ou éruption cutanée, éruption localisée et/ou réaction allergique.

• Maladie grave avec gonflement de la tête, de la bouche, les yeux, la gorge, la fièvre. Une éruption rose-rouge en partie ou dans toute la partie des pieds et des mains.

• Comme d'autres médicaments, Xolamol® collyre peut entraîner des effets secondaires, comme ce qui va avec des agents de nettoyage et/ou voie intraveineuse et/ou inhalation. Ils sont



6 118001 040278

12502657-02S

**Xolamol®**

Lot:

Fab:

Exp:

P.P.V: 110 DH 70



Notice: information de l'utilisateur

# Xolamol® ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## dorzolamide + Timolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.
- Le nom complet de ce médicament est Xolamol® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé

Xolamol® collyre est une combinaison de deux médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés «inhibiteurs de l'anhydrase carbonique».
- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés «bêta-bloquants».

Xolamol® collyre est prescrit pour abaisser la tension élevée dans l'œil dans le traitement du glaucome quand le collyre bêta-bloquant utilisé seule n'est pas suffisant.

### 2. Avant d'utiliser Xolamol® collyre

**N'utilisez pas Xolamol® collyre si vous êtes allergique au dorzolamide ou au timolol, les bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).**

- vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).

• vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.

- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.

• vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament,

consultez d'abord votre m

Si vous avez d'autres ques  
de ce médicament, interro  
pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires, certains surviennent pas systématiquement dans le monde.

Vous pouvez habituellement les reconnaître par des gouttes, sauf si les effets sont très importants ou si vous êtes inquiet, parlez à un médecin ou à une infirmière. N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® collyre sans consulter votre médecin.

**Si vous ressentez un des suivants, arrêtez d'utiliser ce médicament immédiatement et rendez-vous au service de soins de santé le plus proche.**

• Réactions allergiques: gonflement sous la peau ou dans les zones tels que le visage, entravant les voies respiratoires, une difficulté à avaler, urticaire ou éruption cutanée, éruption localisée et/ou réaction allergique.

• Maladie grave avec gonflement de la tête, de la bouche, les yeux, la gorge, la fièvre. Une éruption rose-rouge en partie ou dans toute la partie des pieds et des mains.

• Comme d'autres médicaments, Xolamol® collyre peut entraîner des effets secondaires, comme ce qui va avec des agents de nettoyage et/ou voie intraveineuse et/ou inhalation. L'usage de ce



6 118001 040278

12502657-02S

**Xolamol®**

Lot:

Fab:

Exp:

P.P.V: 110 DH 70



Notice: information de l'utilisateur

# Xolamol® ml + 5 mg/ml, Collyre en solution

## dorzolamide + Timolol

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament.

Gardez cette notice. Vous pourriez en avoir besoin de la relire.

- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien.

- Le nom complet de ce médicament est Xolamol® Collyre en solution mais dans la notice, il sera appelé Xolamol® collyre.

### 1. Qu'est-ce que Xolamol® collyre et dans quels cas est-il utilisé

Xolamol® collyre est une combinaison de deux médicaments: dorzolamide et timolol.

- Le dorzolamide appartient à une classe de médicaments appelés «inhibiteurs de l'anhydrase carbonique».

- Le timolol appartient à une classe de médicaments appelés «bêta-bloquants».

Xolamol® collyre est prescrit pour abaisser la tension élevée dans l'œil dans le traitement du glaucome quand le collyre bêta-bloquant utilisé seule n'est pas suffisant.

### 2. Avant d'utiliser Xolamol® collyre

**N'utilisez pas Xolamol® collyre si vous êtes allergique au dorzolamide ou au timolol, les bêta-bloquants ou l'un des autres composants de ce médicament (cités dans la section 6).**

- vous avez maintenant ou avez eu dans le passé des problèmes respiratoires tels que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (maladie pulmonaire sévère qui peut provoquer une respiration sifflante, une difficulté à respirer et/ou une toux de longue date).

- vous avez des problèmes rénaux sévères, ou des antécédents de calculs rénaux.

- vous avez une perturbation dans le pH (équilibre acide/alcali) de votre sang.

- vous avez certains problèmes cardiaques, y compris certains troubles du rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne,

### Si vous oubliez d'utiliser Xolamol® collyre

Il est important d'utiliser Xolamol® collyre tel que votre médecin vous l'a prescrit.

Si vous manquez une dose, appliquez-la dès que possible. Cependant, s'il est presque temps pour votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et reprenez votre programme de dosage régulier.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

### Si vous arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre

Si vous voulez arrêter d'utiliser ce médicament,

consultez d'abord votre m-

Si vous avez d'autres que-

ce de ce médicament, interro-

pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires, certains surviennent pas systématiquement dans le monde.

Vous pouvez habituellement gouttes, sauf si les effets sont importants ou inquiétants, parlez à un médecin. N'arrêtez pas d'utiliser Xolamol® collyre sans consulter votre médecin.

**Si vous ressentez un des suivants, arrêtez d'utiliser Xolamol® collyre et prévenez immédiatement votre pharmacien ou rendez-vous au service de plus proche.**

- Réactions allergique

gonglement sous la peau ou dans les zones tels que le visage, entraînant les voies respiratoires et une difficulté à avaler.

urticaire ou éruption cutanée, éruption localisée et réaction allergique.

- Maladie grave avec gonflement de la tête, la bouche, les yeux, la gorge et la fièvre. Une éruption rose-rouge en partie ou dans toute la partie du corps.

Comme d'autres médicaments, Xolamol® collyre peut entraîner des effets secondaires.

comme sur le voit avec des agents de

voie intraveineuse et/ou inhalation. L'insuffisance



6 118001 040278

12502657-02S

Lot: 118001  
Fab: 040278  
Exp: 04/2015

P.P.V: 110 DH 70





Lubricant ophthalmic Solution

**Sodium Hyaluronate 0.4%**

10 ml

**Composition:** Sodium hyaluronate (0.4% w/v), dibasic sodium phosphate, sodium chloride, benzalkonium water for injections.

#### **What is it?**

Hye is a 0.4% ophthalmic solution of sodium hyaluronate by chemical synthesis. Sodium hyaluronate has muco-mimetic properties that improve the tear film stability and keep the eye lubricated, moisturized and protected.

#### **How is it presented?**

Hye is an ophthalmic solution in a bottle of 10 ml.

#### **When should it be used?**

The lubricant, moisturising and protective qualities of sodium hyaluronate relieve irritation, dryness, burning and foreign body sensation due to environmental elements (wind, sun, smoke, dry air), visual stress (excessive use of computers) or mechanical factors (contact lenses use, eye strain) providing a long lasting relief.

#### **How much to use?**

1 drop in the eye 2-3 times daily.

8 032668 870147

LOT

0600123  
2025 01

PPC 109,00 DH



**Dr. NACHAT Bouchaib**

**OPHTALMOLOGISTE**

Spécialiste des Maladies et Chirurgie des yeux

Ex - Ophtalmologiste au CHU Ibn Rochd

20 Août Casablanca



**الدكتور بوشعيب نشاط**

أخصائي في أمراض و جراحة العيون

طبيب سابق بالمستشفى الجامعي ابن رشد

20 غشت بالبيضاء

• عضو الجمعية الفرنسية لأمراض و جراحة العيون

- جراحة العين : الكبار و الصغار

- التصوير الرقمي لشبكة العين

- المعالة بالليزر- تصحيح النظر

- المستعجلات

• Membre de la société française  
d'ophtalmologie

- Chirurgie de l'oeil : Adultes et enfants

- Explorations Oculaires

- Lasers - Lasik

- Urgences Ophtalmologiques

17/05/2023  
**ORDONNANCE**  
MOUTTAKI Najma

Casablanca le :

DEUX PAIRES DE LUNETTES + MONTURES :  
DE LOIN Organiques

Oeil Droit : +1,75 (-1,00) à 100°

Oeil Gauche : +1,00 (-0,50) à 79°

DE PRES Organiques

Oeil Droit : +4,25 (-1,00) à 100°

Oeil Gauche : +3,50 (-0,50) à 79°

*BENKIA HAJAR*  
 3 Imm 7 GPE 4 ét. Ennakhil  
 Errahma 02 Bouazza  
 Casablanca  
 Fix : 05 05 30 38 71

*Dr. Bouchaib N. A. N. A.*  
 Ophtalmologiste  
 Residenc AL FATH 1 Imm 12 N° 2  
 Hay Alia Abou El Kacem Rd, Al Qasr  
 Ain Chock Casablanca  
 Tél: 05 22 21 25 15 - Urgences : 06 61 98 66 06

شارع القدس إقامة الفتاح 1 عمارة 12 رقم 2 ( أمام مقاطعة 30 ) عين الشق الدار البيضاء

B.d ALQODS RESIDENCE AL FATH 1 Imm 12 N° 2 (en face Commune Urbain 30) Ain Chock Casa

Tél : 05 22 21 25 15 - Urgences : 06 61 98 66 06

E-mail : nachat.Bouchaib@gmail.com

**BENKIA OPTIQUE**  
Opticien Spécialiste



7 Op. Annakhil Rahma - Etage MG Apt. 3  
Imm. MG 3GH 4 - Casablanca  
Tél. : 08 08 56 38 77 / 06 66 76 23 00

0004263

Ordonnance du Docteur :

N° de Nomenclature :

Correspondant à la prescription

LOIN	O.D. : $(100 - 100) + 1.75$ O.G. : $(75 - 50) + 1.00$	PRES	O.D. : $(100 - 100) + 4.25$ O.G. : $(75 - 50) + 3.50$
<b>FOURNITURE</b>			
Monture : optique		② 100.00	
Verres : VL Optique que PR VP, optique IBC		② 100.00	
Total : .....		② 600.00	
		<hr/> 3000.00	

**BENKIA HAJAR**  
Imm / GPE 4/11 Elmalihi  
Errahma Dar Bouazza  
Casablanca  
Fix : 08 08 56 38 77

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Casablanca, le : 05/03/2023

M. ou Mme : .....

FWA SMA