

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-004121

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 02015 Société : (166375)

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : EL OIRDI EL MASTABA

Date de naissance : 01.01.1952

Adresse : Derb Nejma Bloc 129 n°25 Hay Habbani

CASABLANCA

Tél. : 06 61 26 42 76 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Maladie de la peau

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/05/2023		1	7152.027	<i>SEMU</i> Service Médecin M. BERRADA MEDICIN SEMU

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE Le Maroc Le Maroc C. BERRADA M. MOHAMED	24/05/2023	25721.70.

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
<img alt="Diagram of the dental arch with numbered teeth from 1 to 8 on both upper and lower arches. Arrows indicate the direction				



El Sidi fofia

أطباء المستعجلات

MEDECINS D'URGENCE

SEMU

Le 24/05/2023



43700x3

1) jomet 50/ug n° 3
14/ij.



208,00x3

2) covera 515 ug n° 3



111,80x3

3) bestor 5 ug n° 3
14/ij.

2151,00

4) 14/ij.



87,30

5) Rocigal 40g
14/ij.



Demofix cu
10g/kt x 2/j.

2572,90.



مستعجلة بالمنزل و النقل الطبي 24/24 ساعة

Consultation à domicile & transports médicalisés - 24H/24

Angle Route Azemmour et Boulevard Sidi Abderahmane - Hay Hassani - Casablanca

Tél. : 05.22.90.50.50 (L.G.) / 05.22.91.33.33 - GSM : 06.61.14.04.01

كوفيرام® 5 ملغ/5 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجنتين / أملوديبين

حبات

كوفيرام® 5 ملغ/10 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجنتين / أملوديبين

حبات

كوفيرام® 10 ملغ/10 ملغ حبات

بيراندوبريل أرجنتين / أملوديبين

208/00

لدواء. لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

جديد.

دلالي.

فأعطيها لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.

صيدلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

فأعطيها لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض متشابهة، فقد تلحق به الضرر.

صيادلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

صيادلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

صيادلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

صيادلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

صيادلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

صيادلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

صيادلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

صيادلاني. هذا ينطوي أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المرغوب بها في هذه النشرة (أنظر إلى الجهة الثالثة).
صيادلاني.

في هذه النشرة.

1. ما هو كوفيرام، سبب وفي أي حالة يستعمل؟

2. ما هي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبلأخذ كوفيرام، حبة؟

3. كيف يأخذ كوفيرام، حبة؟

4. ما هي الآثار الجانبية للمحضلة؟

5. كيف يحفظ كوفيرام، حبة؟

6. ما هو كوفيرام، سبب وفي أي حالة يستعمل؟

الفلة العلاجية الصيدلانية: ملتحف للمجموعة المحوسبة للأرجنتين (IEC) (وحاشر للكالسيوم).

كود 09BB04: ATC

يعرف كوفيرام، حبة لعلاج إنفراط الشريان التاجي المستتر في حال

نافذ أو إنحصار الدبر الوارد للقلب.

أعلمن طبيبك إن كنت ترضعين أو على وشك الإرضاع.

لا يوصي بإعطائه كوفيرام حبة للحوامل المرضات، ولكن طبيبك أن يختار لك طبلة آخر إذا كنت فضولياً

الإرضاع خاصة إذا كان طبلوك حديث الولادة أو سائق لواهه (خدين).

قد ينذر كوفيرام حبة على قيادة السيارة أو العمل على الآليات. إذا تسببت لك العلاج بالشعور

BESTOR 5; 10 ET 20 mg

Comprimés pelliculés

Rosuvastatine Calcique

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez pas à l'autrui, il pourra leur être nocif, même si les signes de votre maladie sont identiques.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que BESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BESTOR, comme par exemple :
- Comment prendre BESTOR, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver BESTOR, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

BESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

BESTOR vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.
- Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Pourquoi il est important de continuer de prendre BESTOR :

BESTOR est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

Il y a différents types de cholestérol trouvé dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

- BESTOR peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol »
- Il agit en adiant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre BESTOR, même si vous trouvez que le taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse, Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BESTOR, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BESTOR :

- Si vous êtes allergique à la Rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par BESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques ;
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin) ;
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées) ;
- Si vous prenez la ciclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de BESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;

• Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BESTOR.

- Si vous avez des problèmes hépatiques ;

- Si vous avez des problèmes rénaux ;

- Si vous avez des douleurs musculaires.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hé

BESTOR 5; 10 ET 20 mg

Comprimés pelliculés

Rosuvastatine Calcique

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez pas à l'autrui, il pourra leur être nocif, même si les signes de votre maladie sont identiques.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que BESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BESTOR, comme par exemple :
- Comment prendre BESTOR, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver BESTOR, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

BESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

BESTOR vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.
- Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Pourquoi il est important de continuer de prendre BESTOR :

BESTOR est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

Il y a différents types de cholestérol trouvé dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

- BESTOR peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol »
- Il agit en adiant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre BESTOR, même si vous trouvez que le taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse, Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BESTOR, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BESTOR :

- Si vous êtes allergique à la Rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par BESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques ;
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin) ;
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées) ;
- Si vous prenez la ciclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de BESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;

• Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BESTOR.

- Si vous avez des problèmes hépatiques ;

- Si vous avez des problèmes rénaux ;

- Si vous avez des douleurs musculaires.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.</

BESTOR 5; 10 ET 20 mg

Comprimés pelliculés

Rosuvastatine Calcique

Boîte de 30

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la lire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit personnellement. Ne le donnez pas à l'autrui, il pourra leur être nocif, même si les signes de votre maladie sont identiques.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas dans cette notice.

Que contient cette notice ?

- Qu'est-ce que BESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BESTOR, comme par exemple :
- Comment prendre BESTOR, comprimé pelliculé ?
- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Comment conserver BESTOR, comprimé pelliculé ?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE BESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase.

BESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

BESTOR vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.
- Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Pourquoi il est important de continuer de prendre BESTOR :

BESTOR est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelé lipides, le plus fréquent étant le cholestérol.

Il y a différents types de cholestérol trouvé dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C).

- BESTOR peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol »
- Il agit en adiant à bloquer la production de « mauvais cholestérol » par votre organisme. Il améliore également l'aptitude de votre corps à éliminer de votre sang.

Pour la plupart des personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de conséquence sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne aucun symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre BESTOR, même si vous trouvez que le taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse, Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BESTOR, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucre, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais BESTOR :

- Si vous êtes allergique à la Rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par BESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques ;
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin) ;
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées) ;
- Si vous prenez la ciclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de BESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;

• Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre BESTOR.

- Si vous avez des problèmes hépatiques ;

- Si vous avez des problèmes rénaux ;

- Si vous avez des douleurs musculaires.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hépatique (bilan fonctionnel) avant de prendre BESTOR.

Il est recommandé de faire faire un bilan hé

DERMOFIX® Crème

Sertaconazole

nitrate
cont E218 & Acide sorbique)

Sertaconazole est un anti-mycosique à usage topique. Son spectre d'activité comprend les mycoses cutanées et onychiques causées par les champignons pathogènes (*Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. spp.*, *Pithysporom* orbiculatum), les champignons opportunistes filamenteux (*Aspergillus*), les champignons résistants à d'autres anti-mycosiques (les actinomycètes gram+ (*Staphylococcus* et *Streptococcus*))

indications thérapeutiques :

traitement topique des mycoses superficielles de la peau telles que dermatophytose d'athlète), *Tinea cruris* (Eczéma marginé de Hebra), *Tinea corporis* (Herpès circiné), *Tinea pedis* et *Tinea manus*, Candidoses (Minillose) et Pityriasis versicolor (Pityrosporum

Effets indésirables :

Le Sertaconazole présente une innocuité totale et une excellente tolérance : aucun cas de réaction de photosensibilité n'a été relevé. Seul un érythème léger peut survenir lors des premières applications n'entraînant jamais la suspension du traitement.

Conditions particulières d'emploi :

Dermofix ne convient pas à l'usage ophtalmique.

Après l'application dermique de grandes quantités, on ne détecte pas de niveaux plasmatiques. Malgré cela, son innocuité n'a pas été démontrée chez le nouveau-né et chez la femme enceinte ou allaitante.

Posologie usuelle, voie et mode d'administration :

Voie topique.

Appliquer la crème une fois par jour (de préférence le soir) ou deux fois (matin et soir), doucement et uniformément, en essayant de couvrir 1 cm de peau saine (environ) autour de la zone à traiter.

La durée du traitement varie d'un patient à l'autre en fonction de l'agent étiologique et de la localisation de l'infection.

En général, on recommande quatre semaines de traitement afin d'assurer une guérison clinique et microbiologique complète et d'éviter ainsi toute récidive, cette guérison clinico-microbiologique peut apparaître entre deux et quatre semaines de traitement.

Pityriasis versicolor : 2 semaines

Dermatophytose : 2 à 4 semaines

Candidose : 2 à 4 semaines

Formes et autres présentations :

Dermofix® crème 2% tube de 30 g

Dermofix® poudre flacon de 30 g

Dermofix® Solution 2% flacon de 30 ml

Dermofix® Gel 2% flacon de 50 g

Dermofix® Gel 2% flacon de 100 g

Gyno-dermofix® 300 mg boîte de 1 ovule.

Liste I (Tableau A)

PROMOPHARM S.A.
Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L FERRER INTERNATIONAL

87,30



Distribué par MSD MAROC.
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ.
P.P.V: 437,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ.
P.P.V: 437,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ.
P.P.V: 437,00 DH.