RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Déclaration de Maladie

M22- N° 004681

Maladie Dentaire Optique Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10530 Société : 170072
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : DAOU EC ASLI Mohamed
 Date de naissance :
 Adresse :
 Tél. : Total des frais engagés :Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
 Date de consultation :
 Nom et prénom du malade : Oazendi Zahra Age :
 Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant
 Nature de la maladie : AFFECTION DIGESTIVE
 Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22.05 2023	3		3000H	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	22/05/2023	544.90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	22.05 2023		4000H

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des Travaux <input type="text"/>
				Montants des Soins <input type="text"/>
				Debut d'Execution <input type="text"/>
				Fin d'Execution <input type="text"/>

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
G	
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient des Travaux

Montants des Soins

Date du Devis

Date de l'Execution

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Professeur Salwa Nadir

Spécialiste en Hépatogastroentérologie
D.U. "Hépatites Virales-Cytokines"
Echographie et Endoscopie Digestives
D.U "Explorations Fonctionnelles Digestives"
D.U "Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin"
Proctologie Médicale et Chirurgicale

الدكتورة سلوى ندير

أستاذة جامعية سابقا بكلية الطب
ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء
أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي
التشخيص بالمنظار والصدى
أمراض وجراحة الشرج

Casablanca, le 07.05.2023 في الدار البيضاء

Note d'honoraires

Professeur Salwa NADIR
Hépatogastroentérologie
Proctologie Médicale et Chirurgicale
Clinique Dar Salam / 85 14 14

Le docteur

a l'honneur de présenter ses compliments

à Mr (Mme) Daroudi Zahra

et lui adresse selon l'usage sa note d'honoraires ;

soit la somme de 400,00 dhs.

pour ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

Professeur Salwa NADIR
Hépatogastroentérologie
Proctologie Médicale et Chirurgicale
Clinique Dar Salam / 85 14 14

En cas d'urgence : 06 61 46 84 96

Casablanca ,le 22/05/2023

Nom et Prénom : Mme DAOUDI ZOHRA

Age : Née en 1973

Indication :Ballonnement abdominal/Gastralgies atypiques

COMPTE RENDU

- Foie de taille normale, de contours réguliers , d'échostructure discrètement hyperéchogène.
- Absence de lésion focale hépatique .
- Absence de dilatation des voies biliaires intrahépatiques et de la voie biliaire principale.
- Tronc porte de calibre normal.
- Absence d'épanchement dans la cavité abdominale .
- Vésicule biliaire libre .Sa paroi est fine.
- Absence d'épanchement péritonéal .
- Rate ,reins, pancréas sans anomalie.
- Aérocolie++

Conclusion : Discrète stéatose hépatique

Pr S. NADIR

Professeur S. NADIR
Hépatologue
Praticien
120, bd. ...
2014

Professeur Salwa Nadir

Spécialiste en Hépatogastroentérologie

D.U. "Hépatites Virales-Cytokines"

Echographie et Endoscopie Digestives

D.U "Explorations Fonctionnelles Digestives"

D.U "Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin"

Proctologie Médicale et Chirurgicale

الدكتورة سلوى ندير

أستاذة جامعية سابقا بكلية الطب

ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي

التشخيص بالمنظار والصدى

أمراض وجراحة الشرج

Casablanca, le.....22.05.2023 في. الدار البيضاء.

Mme DAOUDI Zohra

Prendre :

1 - ANXIOL

1 quart de comprimé le soir vers 19heures pendant 15 jours

Puis un jour sur deux pendant 15jours

2 - RELAXIUM B6 375MG

1 gélule le soir, après le repas, pendant 1 mois

3 - INEXIUM 40 mg cp gastrorésis : Plq/14

1 comprimé le matin, avant le repas, pendant 28 jours.

4 - ARGO SIROP

1 cuillère à soupe le matin, à midi et le soir, après le repas, pendant 1 mois

5 - BALLONYL

1 gélule le matin et le soir, après le repas, pendant 10 jours.

6 - PERIDYS

1 Comprimé le matin et le soir, avant le repas, pendant 10 jours.

7 - REFLUXAID

En cas d'urgence : 06 61 46 84 96

PHARMACIE AZUR
KHAOUK Fatima Elzohra
Docteur en Pharmacie
km 16, Route de l'Université, Dar el Salam
Casablanca - Tél : 05 22 96 54 54

Professeur Salwa Nadir
Hépatogastroentérologie
Proctologie Médicale et Chirurgicale
Casablanca - Tél : 05 22 86 27 86

SYNTHEMEDIC
22 rue zoubair bnou al aouam roches
noires casablanca
INEXIUM
40 mg Cpr GR
Boîte 14
64175DMP/21ARQ P.P.W. 123,60 DH
6 118001 020607

SYNTHEMEDIC
22 rue zoubair bnou al aouam roches
noires casablanca
INEXIUM
40 mg Cpr GR
Boîte 14
64175DMP/21ARQ P.P.W. 123,60 DH
6 118001 020607

Professeur Salwa Nadir

Spécialiste en Hépatogastroentérologie

D.U. "Hépatites Virales-Cytokines"

Echographie et Endoscopie Digestives

D.U "Explorations Fonctionnelles Digestives"

D.U "Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin"

Proctologie Médicale et Chirurgicale

الدكتورة سلوى ندير

أستاذة جامعية سابقا بكلية الطب

ومستشفى ابن رشد بالدار البيضاء

أخصائية أمراض الكبد والجهاز الهضمي

التشخيص بالمنظار والصدى

أمراض وجراحة الشرج

22.05.2023

Casablanca, le..... في الدار البيضاء،

Mme DAOUDI Zohra

Prendre :

1 sachet en cas de besoin

Professeur Salwa NADIR

En cas d'urgence : 06 61 46 84 96

120, Bd. Moulay Idriss 1er, 4^{ème} étage N°10 - Tél. : 05 22 86 27 86 - Fax : 05 22 86 34 39 - رقم 10، شارع مولاي إدريس الأول، الطابق 4،
مصحة دار السلام، 728، شارع مودي بوكيتا، الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 85 14 14 - Clinique Dar Salam, 728, Bd. Modibokeita - Casablanca 20100 - Tél. : 05 22 85 14 14

E-mail : salwanadir@yahoo.fr : البريد الإلكتروني - Site web : www.prnadirsalwa.com/www.prnadirsalwa.ma : الموقع الإلكتروني

Péridys 10 mg

Ce médicament
qui permet de
relatives à
tout effet
rubrique 4

081280
32180

supplémentaire
elles informations
uer en signalant
Voir en fin de
bles.

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre votre médicament.

• Gardez ce médicament à l'abri de la chaleur et de la lumière.

• Si vous avez des questions, demandez conseil à votre pharmacien.

• Ne prenez pas ce médicament si votre médecin ne vous l'a prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes.

• En cas de symptômes identiques, consultez votre médecin. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

lisez attentivement cette notice

de la relire.

Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Ne donnez pas ce médicament à d'autres personnes, même si elles ont les mêmes symptômes.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient de la dompéridone, substance appartenant à la famille des antagonistes de la dopamine. Il agit sur la motricité intestinale.

Ce médicament est utilisé chez l'adulte et chez l'adolescent à partir de 12 ans et de 35 kg pour traiter les nausées et les vomissements.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous avez une allergie connue à la dompéridone ou à l'un des autres composants de ce médicament ;
- si vous souffrez d'une prolactinome (maladie de la glande hypophysaire) ;
- si vous avez des saignements de l'estomac ou de l'intestin, obstruction mécanique ou perforation digestive ;
- si vous souffrez d'occlusion intestinale, en raison de la présence d'huile de ricin ;
- si vous souffrez d'une maladie modérée ou sévère du foie ;
- si votre ECG (électrocardiogramme) montre un problème cardiaque appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé" ;
- si vous avez ou avez eu un problème qui fait que votre cœur ne peut pas pomper le sang dans l'ensemble de votre corps aussi bien qu'il le devrait (affection appelée insuffisance cardiaque) ;
- si vous avez un problème qui entraîne une diminution du taux de potassium ou de magnésium ou une augmentation du taux de potassium dans votre sang ;
- si vous prenez certains médicaments (voir "Autres médicaments et PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé").

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi : mises en garde spéciales

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Ce médicament contient de l'huile de ricin et peut provoquer des troubles digestifs (effet laxatif léger, diarrhée).

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé :

- si vous souffrez de problèmes au foie (défaillance des fonctions du foie ou insuffisance hépatique) (voir "Ne prenez jamais PERIDYS 10 mg, comprimé

Allaitement : De petites quantités de la dompéridone ont été détectées dans le lait maternel. La dompéridone peut entraîner des effets indésirables sur le cœur des enfants allaités. La dompéridone doit être utilisée au cours de l'allaitement uniquement si votre médecin le juge absolument nécessaire. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Ce médicament n'altère pas (ou de façon négligeable) la capacité à conduire ou à utiliser des machines.

Contre-indications : lactose, huile de ricin

COMMENT PRENDRE PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé : respectez strictement ces instructions sauf en cas d'urgence, contactez votre médecin.

Les symptômes disparaissent habituellement en 3 ou 4 jours après l'arrêt du médicament. Ne prenez pas de PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé au-delà de 7 jours sans consulter votre médecin.

Dans tous les cas, respectez strictement la prescription de votre médecin.

Dosologie

Adultes et adolescents (à partir de 12 ans et de 35 kg) : la dose habituelle est d'un comprimé à prendre jusqu'à trois fois par jour, si possible avant les repas.

Ne prenez pas plus de trois comprimés par jour.

Enfants et adolescents de la naissance jusqu'à un poids inférieur à 35 kg

Les comprimés ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 35 kg. La dompéridone doit être administrée à un enfant, demandez à votre médecin la formulation pour les enfants.

Mode d'administration : Voie orale.

Il est recommandé de prendre ce médicament avant les repas. Si votre médicament est pris après les repas, son absorption est quelque peu retardée.

Ne vous avez pris plus de PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû : Si vous avez utilisé ou pris trop de PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou un centre antipoison, en particulier si un enfant a pris trop de médicament.

En cas de surdosage, un traitement symptomatique peut être administré. Une surveillance électrocardiographique peut être instaurée en raison de la possibilité de survenue d'un problème cardiaque appelé allongement de l'intervalle QT.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé : Prenez votre médicament dès que vous vous en rendez compte. S'il est presque l'heure de votre prochaine dose, ajoutez cette prochaine dose, puis continuez comme d'habitude. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets (survient chez moins d'un patient sur 1000) : • Troubles hormonaux : augmentation des taux de prolactine (hormone qui provoque la lactation), galactorrhée (écoulement de lait en dehors des périodes d'allaitement), gynécomastie (développement normal des seins chez l'homme), aménorrhée (absence de règles). • Troubles du système digestif, de courtes crampes intestinales peuvent se produire mais celles-ci sont exceptionnelles. Ces effets disparaissent spontanément à l'arrêt du traitement.

Effets très rares (survient chez moins d'un patient sur 10000) : •

• des réactions allergiques (par exemple : essoufflement, respiration sifflante, gonflement de la gorge) ;
• des troubles rapportés. Si cela se produit, arrêtez immédiatement et contactez votre médecin ;
• agitation et nervosité ont été rapportés ;
• des mouvements involontaires, des tremblements, convulsions, peuvent survenir. Le risque de chute est particulièrement important chez le jeune enfant. • Diarrhées, • troubles de la fonction hépatique, prévenez votre médecin si vous prenez PERIDYS.

(ne peut être estimée sur la base des effets secondaires) : des troubles du rythme cardiaque (troubles cardiaques rapides ou irréguliers) ont été rapportés ; si cela est le cas, vous devez arrêter immédiatement le traitement. La dompéridone peut être associée à un risque accru de troubles du rythme cardiaque et d'arrêt cardiaque. Ce risque peut être plus élevé chez les patients de plus de 60 ans ou chez ceux prenant des doses supérieures à 30 mg par jour. La dompéridone doit être utilisée à la dose efficace la plus faible chez l'adulte et chez l'enfant.

Déclaration des effets secondaires : Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé ? Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. Ne pas utiliser PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation : Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration : Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé ?

Dompéridone 10,00 mg
Pour un comprimé pelliculé.

Noyau : povidone, amidon de riz, lactose monohydraté, cellulose excipient, stéarate de magnésium, laurilsulfate de sodium, huile de ricin hydrogénée.

Pelliculage : hypromellose.

Qu'est-ce que PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé. Boîte de 20.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 16 Février 2015

PIERRE FABRE MEDICAMENT
Fabriqué sous licence par :
maphar
Km 10, route côtière 111, Quartier industriel,
Zenata Ain Sebaâ, Maroc.

IMPRIMERIE 40000321-01 08/20 240x145

Gélule
Voie orale

Ballonyl

Charbon activé

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Charbon activé 162 mg.
Excipients : qsp 1 gélule.

FORME ET PRESENTATIONS

Gélules
Boite de 60

PROPRIETES

Ballonyl contient du charbon végétal activé. Grâce à son fort pouvoir adsorbant au niveau intestinal, il permet la capture des gaz, des toxines et des bactéries responsables de la fermentation.

Il possède un effet bénéfique sur le processus de digestion, en luttant contre les phénomènes de ballonnements et de flatulences.

VOIE D'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Prendre 2 gélules avec un grand verre d'eau, 3 fois par jour à distance des repas, en complément d'une alimentation variée et équilibrée. Renouveler les prises en fonction des sensibilités individuelles.

La posologie usuelle est de 4 gélules par jour. Sur les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien, la posologie peut être portée à 6 gélules par jour.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et pendant l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs médicaments, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.
Garder hors de portée des enfants.
A conserver dans un endroit sec et frais.

Autorisation ministère de santé n° : DA20181805313DMP/20UCAV1

Code : AC - 00060