

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M23-014582

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

170 143

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 528

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BENOUHOUD

Mohamed

Date de naissance :

29/01/42

Adresse :

3, Rue Sama BP 20000 Zouhairine, 3^e étage Appt 5
Q. Palmier CASABLANCA

Tél. : 0522250700
0666880612

Total des frais engagés : 1486.9 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr.BENOUHOUD Nawa
Pneumologue - Allergologue
Rond-point Georges Rés. Aya Lot N°65
3^e Etg N°8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1
+212 522 658 861

Date de consultation :

24/07/2023

Nom et prénom du malade :

BENOUHOUD Mohamed Age: 79

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Enragion allergique / point

Affection longue durée ou chronique :

ALD ALC Pathologie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 27/07/2023

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet du Praticien attestant le Paiement des honoraires
24/01/2023	CS		250,00	Dr.BENOUHOUD Nabil Rond-point Georges Bizet Avenue N°65 3 ^e Etg N°8 Oulala Al Wifaq Ferraria 0212 522 658 861
24/01/2023	Télé	500,00		Dr.BENOUHOUD Nabil Pneumologue - Allergologue Rond-point Georges Bizet Avenue N°65 3 ^e Etg N°8 Oulala Al Wifaq Ferraria 0212 522 658 861
24/01/2023	Contrôle			INPE : 091035188
EXECUTION DES ORDONNANCES				
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur		INPE : 091035188	Date	Montant de la Facture
		24/01/2023		250,00
		24/01/2023		37,00

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
<i>BIO-MED</i> INPE : 091035188	26/01/2023	P 250 + PC	400,00

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>
</				

Dr Nawal BENOUEHOUD

Pneumologue - Allergologue

Adultes & Enfants

Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Pléthysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani

et Hôp 20 Août - Casablanca



الدكتورة نوال بنوحود

اخصائية في أمراض الجهاز التنفسي
الكبار والأطفال

الضيق الحساسية داء السل
فحص وظائف الرئة - اختبار الحساسية

التشخيص بالمنظار
طبية سابقاً بالمستشفى الحسني

والمستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Casablanca, le27/07/2023

MR BENOUEHOUD MOHAMED

• Diprosalic - pommade

1 APPLICATION X2/J PDT 1SEM PUIS 1APPLIC/J PDT 1SEM PUIS
1 APLLIC 1J/2 PDT 10J

Chap
⑤
RC
318383
ICE 0021791300087
PHARMACIE LMV
Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65, 3^{eme} étage
Rond point Georges R. Aya Lungs
3^{eme} Etg N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara
Tel +212 522 658 861

Dr.BENOUEHOUD Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond point Georges R. Aya Lungs
3^{eme} Etg N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara
+212 522 658 861

Rond Point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65, 3^{eme} étage
N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1 / e-mail : benouhoudnawal@gmail.com
Tél : +212 522 658 861 - Gsm : +212 661 711 424 - INPE : 091035188

• Si vous souffrez d'une maladie de la peau appelée rosacée (couperose).

• Si vous souffrez d'une infection de la peau due à un virus (herpès, zona, varicelle...), à une bactérie (impétigo...), à des champignons microscopiques (mycoses) ou à un parasite.

Avertissements et précautions

Adresssez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser DIPROSALIC, pommade.

Faites attention avec DIPROSALIC

• Un traitement chez l'enfant de moins de 12 ans ou un traitement sur le visage doivent être soumis à une stricte surveillance médicale.

• Chez le nourrisson et le jeune enfant, il est préférable d'éviter DIPROSALIC.

Pendant le traitement

• Respectez les conseils de votre médecin, notamment la localisation des applications (voir la rubrique "Précautions d'utilisation").

• Signalez à votre médecin toute irritation ou infection.

• Arrêtez le traitement et prévenez votre médecin si une réaction d'intolérance apparaît. Vous pourrez la reconnaître par exemple par des boutons, des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures ou un gonflement non douloureux (œdème).

Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et DIPROSALIC, pommade

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

DIPROSALIC, pommade avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER DIPROSALIC, POMMADE ?

Posologie

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin (quantité de pommade à appliquer et nombre d'applications). Vérifiez auprès de votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

La posologie habituelle est en moyenne de 1 à 2 applications par jour.

N'augmentez jamais le nombre d'applications par jour sans demander l'avis de votre médecin.

Mode et voie d'administration

• Ce médicament doit être appliqué sur la peau, sur la zone à traiter. Puis effectuez un léger massage pour étailler la pommade avec un gant en plastique jusqu'à ce que celle-ci soit entièrement absorbée.

• Si vous n'avez pas utilisé de gant pour appliquer la pommade : lavez-vous les mains après l'application.

Précautions d'utilisation

Avant d'appliquer DIPROSALIC, les recommandations suivantes doivent être suivies :

• N'appliquez pas ce médicament dans les yeux ou sur les muqueuses (par exemple l'intérieur du nez, de la bouche ou des parties génitales).

• N'appliquez pas ce médicament sur le visage sauf en cas de prescription formelle de votre

(telangiectasies) à réduire particulièrement sur le visage, des vésicules (bulles) chez les adolescents, des petites tâches rouges sur la peau évoluant en bleus (purpura ecchymotique).

Les effets indésirables suivants peuvent également survenir :

des rougeurs et des irritations autour de la bouche (dermatose péri-orale), l'apparition ou l'aggravation d'une rosacée (couperose), une poussée d'acné, des petits boutons contenant du pus (pustules), un développement exagéré des poils (hypertrophie), une décoloration de la peau (dépigmentation), un retard de cicatrisation des plaies, l'apparition de croutes noirâtres, plus ou moins épaisses (escarres), des lésions cicatrisant difficilement avec un écoulement plus ou moins abondant au niveau des jambes (ulcères de jambes), une vision floue.

Déclaration des effets secondaires

- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER DIPROSALIC, POMMADE?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le tube. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Ce que contient DIPROSALIC, pommade

Les substances actives sont :

Bétaméthasone (sous forme de dipropionate de bétaméthasone)..... 0,05 g

Acide salicylique 3,00 g

Pour 100 g de pommade.

Les autres composants sont : l'huile de vaseline épaisse et la vaseline blanche.

Qu'est-ce que DIPROSALIC, pommade et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de pommade.

Chaque tube contient 30 g de pommade.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : Septembre 2019



Titulaire de l'AMM dans le pays d'origine:

MSD France

10-12 Cours Michelet

92800 Puteaux



Fabriqué et distribué par:

Pharmaceutical Institute

BP 4491 - 12100, Ain El Aouda - Maroc

h.i Pharmacien Responsable : Maria SEDRATI

DIPROSALIC® pommade

Dipropionate de bétaméthasone et Acide salicylique

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques à

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la rubrique 4.

Dans cette notice :

- Qu'est-ce que DIPROSALIC, pommade et dans quels cas est-il utilisé?
- Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DIPROSALIC, pommade?
- Comment utiliser DIPROSALIC, pommade?
- Quels sont les effets indésirables éventuels?
- Comment conserver DIPROSALIC, pommade?
- Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIPROSALIC, POMMADE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Dermocorticoïde associé (D. dermatologie) - code ATC : D07XC01

Qu'est-ce que DIPROSALIC ?

DIPROSALIC appartient à une classe de médicaments appelés dermocorticoïdes d'activité forte associés à l'acide salicylique, destinés à être appliqués sur la peau. La substance active (la bétaméthasone) agit sur les mécanismes de l'inflammation et l'acide salicylique dissout la kératine (protéine responsable de l'épaississement de la peau).

Dans quels cas est-il utilisé ?

DIPROSALIC est utilisé pour traiter certaines maladies de la peau telles que :

- Le psoriasis (maladie au long cours de la peau caractérisée par des plaques rouges et épaisses),
- Le lichen (maladie qui provoque un épaississement de la peau et caractérisée par des boutons ou des plaques striées rouges ou violacées),
- La dermatite séborrhéique (maladie qui provoque une inflammation de la peau et une peau grasse) à l'exception du visage.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DIPROSALIC, POMMADE ?

N'utilisez jamais DIPROSALIC, pommade :

- Si vous êtes allergique aux substances actives (la bétaméthasone et/ou l'acide salicylique) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6,
- Si votre peau présente des lésions cicatrisant difficilement avec un écoulement plus ou moins abondant (lésions ulcérées).
- Si votre peau présente une lésion avec du liquide qui s'écoule (lésion suintante).
- Si vous avez de l'acné.

médecin,

- En raison de la possibilité de passage d'une partie des substances actives dans les applications :
- sur une grande surface,
- sous un pansement ou une couche imperméable, en particulier chez les enfants, cela peut entraîner un ralentissement de la croissance et un syndrome de Cushing, à savoir une prise de poids, un gonflement et une rougeur du visage, prolongées, sur le visage et dans les plis.

Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser ce médicament. Utilisez DIPROSALIC uniquement pendant la durée prescrite par votre médecin et ne prolongez jamais votre traitement sans son accord.

En général, le traitement sera court. L'arrêt du traitement se fera de façon progressive, en espaçant les applications et/ou en utilisant un médicament de la même famille (dermocorticoïde) moins fort ou moins dosé.

L'utilisation prolongée doit être soumise à une stricte surveillance médicale.

Si vous avez utilisé plus de DIPROSALIC, pommade que vous n'auriez dû

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous utilisez DIPROSALIC (ou un médicament de la même famille : les corticoïdes locaux) en quantité ou en durée supérieure à celle prescrite, un ensemble de troubles liés à une augmentation de corticoïde dans le sang (hypercorticisme) peuvent apparaître. Ils peuvent inclure notamment la maladie de Cushing, reconnaissable par une prise de poids, un gonflement et une rougeur du visage.

Si vous oubliez d'utiliser DIPROSALIC, pommade

N'appliquez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'appliquer.

Si vous arrêtez d'utiliser DIPROSALIC, pommade

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

En cas d'utilisation prolongée, les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- un amincissement et une fragilité de la peau, une dilatation de petits vaisseaux sanguins

LOT : 799

PER DEC 2025

PPV : 37 DH 60

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR
LABIXTEN® 20 mg comprimés
DCI: bilastine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à autre personne, elle pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LABIXTEN® 20 mg comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
3. Comment prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LABIXTEN® 20 mg comprimés contient de la bilastine qui est un antihistaminique. LABIXTEN® 20 mg comprimé est indiqué pour soulager les symptômes de la rhino-conjonctivite allergique (étoumement, démangeaison nasale, écoulement nasal, congestion nasale ainsi que rougeur et larmoiement oculaire) et autres symptômes d'origine allergique.

LABIXTEN® 20 mg comprimés peut également être utilisé pour traiter les éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons (urticaire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS :

• Contre-indication de LABIXTEN® 20 mg comprimés :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la bilastine ou à l'un des autres composants du LABIXTEN® 20 mg comprimés.

• Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LABIXTEN® 20 mg si vous avez une insuffisance rénale modérée à sévère ou si vous prenez d'autres médicaments (voir « Interaction avec d'autres médicaments »).

Ne pas dépasser la dose prescrite. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Enfants et adolescents :

Ce médicament ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

En particulier, veuillez informer votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants pouvant interagir avec LABIXTEN® 20 mg comprimés :

- Kétoconazole (antifongique utilisé pour le traitement des mycoses).
- Erythromycine (antibiotique).
- Diliazem (utilisé pour le traitement de l'angine de poitrine).
- Ciclosporine (immunosuppresseur utilisé chez les sujets ayant subi une greffe pour diminuer le risque de rejet de greffe ou dans le traitement des maladies auto-immunes tels que le psoriasis, la dermatite atopique ou la polyarthrite rhumatoïde).
- Ritonavir (médicament utilisé pour traiter le VIH).
- Rifampicine (antibiotique).

• Interaction avec les aliments et les boissons

Les comprimés ne doivent pas être pris avec des aliments ni avec le jus de pamplemousse ou d'autres jus de fruits car cela peut diminuer l'efficacité de la bilastine.

Pour éviter cela vous pouvez :

- Prendre un comprimé une heure avant ou deux heures après l'ingestion de jus de fruits ou de nourriture.

- A la dose recommandée de 20 mg par 24 heures (soit un comprimé), la bilastine n'augmente pas la somnolence induite par l'alcool.

• Grossesse, allaitement et fertilité :

Il n'y a pas des données suffisantes relatives à l'utilisation de la bilastine chez la femme enceinte, allaitante ni sur les effets sur la fertilité.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

• Conduite de véhicules et utilisation des machines :

Il a été démontré que LABIXTEN® 20 mg n'affecte pas les performances pendant la conduite chez l'adulte. Cependant, la réponse de chaque patient au médicament peut être différente. Par conséquent, vérifiez comment ce médicament vous affecte avant de conduire ou d'utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- La dose recommandée chez les adultes, y compris les personnes âgées et les adolescents âgés de plus de 12 ans, est de 1 comprimé (20 mg) par jour.

- Le comprimé s'administre par voie orale.

- Le comprimé doit être pris une heure avant ou deux heures après la prise de la nourriture ou jus. (Voir rubrique « Interaction avec les aliments et les boissons »).

- Avalez le comprimé avec un verre d'eau.

La barre de cassure n'est là que pour faciliter la prise du comprimé si vous éprouvez des difficultés à l'avaler en entier.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera, selon vos symptômes, la durée pendant laquelle vous devez prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés.

• Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous, ou quelqu'un d'autre, avez pris plus de LABIXTEN® 20 mg comprimés que vous n'auriez dû, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

• Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que de prendre.

Si vous oubliez de prendre votre dose à l'heure prévue, prenez dès que possible, puis continuer selon le rythme habituel.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, parlez-en à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EVENTUELS EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, LABIXTEN® 20 mg peuvent provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas chez tout le monde.

Les effets indésirables sont :

Fréquents : peuvent concerner plus de 1 personne

- Maux de tête.
- Somnolence

Peu fréquents : peuvent concerner plus de 1 personne sur 100 personnes

- Anomalie de l'électrocardiogramme (ECG : enregistrement graphique des battements du cœur).
- Modification du bilan sanguin hépatique.
- Sensations vertigineuses.
- Douleur au niveau de l'estomac.
- Sensation de fatigue.
- Augmentation de l'appétit.
- Battements cardiaques irréguliers.
- Prise de poids.

- Nausées.
- Anxiété.

- Sécheresse ou inconfort nasal.
- Douleur abdominale (au niveau du ventre).
- Diarrhées.

- Gastroïtis (inflammation de la paroi de l'estomac).
- Vertiges.

- Sensation de faiblesse générale.
- Soif.

- Dyspnée (difficulté à respirer).
- Sécheresse buccale.

- Indigestion.
- Démangeaisons.

- Herpès labial.
- Fièvre.

- Acouphènes (bourdonnements dans les oreilles).
- Trouble du sommeil.

- Modification du bilan sanguin rénal.
- Augmentation des taux de lipides (graisses) mesurés dans le sang.

Fréquence inconnue : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

- Palpitations (perception des battements du cœur).
- Tachycardie (accélération des battements du cœur).

- Des réactions allergiques dont les signes peuvent comporter une difficulté à respirer, un vertige, un événissement ou perte de connaissance, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et/ou un gonflement et une rougeur de la peau. Si vous remarquez un de ces effets secondaires graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez immédiatement un médecin.

- Vomissements

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et de la Pharmacovigilance. Site internet : www.capp.ma.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Ne pas utiliser LABIXTEN® 20 mg après la date de péremption figurant sur la boîte et sur les blisters.

- Pas de précautions particulières de conservation.

- Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les égouts ni dans les poubelles. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Ce que contient LABIXTEN® 20 mg comprimés :

La substance active est :

Bilastine 20 mg. Par comprimé.

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique type A, silice colloïdale, stéarate de magnésium d'origine végétale.

Aspect de LABIXTEN® 20 mg et contenu de l'emballage extérieur :

LABIXTEN® 20 mg comprimés sont blancs, ovales, biconvexes et rainurés.

Les comprimés sont conditionnés sous forme de blisters, et mis dans des boîtes de 10, 20 et 30 comprimés.

Désignation et tableau éventuel

Tableau C. (Liste II)

Nom et adresse de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché au Maroc :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI - Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC.

Fabriqué par :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI - Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC.

Sous licence du Laboratoire pharmaceutique FAES FARMA,

Maximo Aguirre 14, 48940 Lejona (VIZCAYA) ESPAGNE.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée :

Aout 2019

Conditions de prescription et de délivrance :

Tableau C (liste II).

LOT : 14425205
PER : 820211
PRI : 99.00

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR
LABIXTEN® 20 mg comprimés
DCI: bilastine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à autre personne, elle pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LABIXTEN® 20 mg comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
3. Comment prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LABIXTEN® 20 mg comprimés contient de la bilastine qui est un antihistaminique. LABIXTEN® 20 mg comprimé est indiqué pour soulager les symptômes de la rhino-conjonctivite allergique (étouffement, démangeaison nasale, écoulement nasal, congestion nasale ainsi que rougeur et larmoiement oculaire) et autres symptômes d'origine allergique.

LABIXTEN® 20 mg comprimés peut également être utilisé pour traiter les éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons (urticaire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS :

• Contre-indication de LABIXTEN® 20 mg comprimés :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la bilastine ou à l'un des autres composants du LABIXTEN® 20 mg comprimés.

• Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LABIXTEN® 20 mg si vous avez une insuffisance rénale modérée à sévère ou si vous prenez d'autres médicaments (voir « Interaction avec d'autres médicaments »).

Ne pas dépasser la dose prescrite. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Enfants et adolescents :

Ce médicament ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

En particulier, veuillez informer votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants pouvant interagir avec LABIXTEN® 20 mg comprimés :

- Kétoconazole (antifongique utilisé pour le traitement des mycoses).
 - Erythromycine (antibiotique).
 - Diliazem (utilisé pour le traitement de l'angine de poitrine).
 - Ciclosporine (immunosuppresseur utilisé chez les sujets ayant subi une greffe pour diminuer le risque de rejet de greffe ou dans le traitement des maladies auto-immunes tels que le psoriasis, la dermatite atopique ou la polyarthrite rhumatoïde).
 - Ritonavir (médicament utilisé pour traiter le VIH).
 - Rifampicine (antibiotique).
- Interaction avec les aliments et les boissons**
- Les comprimés ne doivent pas être pris avec des aliments ni avec le jus de pamplemousse ou d'autres jus de fruits car cela peut diminuer l'efficacité de la bilastine.

Pour éviter cela vous pouvez :

- Prendre un comprimé une heure avant ou deux heures après l'ingestion de jus de fruits ou de nourriture.

- A la dose recommandée de 20 mg par 24 heures (soit un comprimé), la bilastine n'augmente pas la somnolence induite par l'alcool.

• Grossesse, allaitement et fertilité :

Il n'y a pas des données suffisantes relatives à l'utilisation de la bilastine chez la femme enceinte, allaitante ni sur les effets sur la fertilité.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

• Conduite de véhicules et utilisation des machines :

Il a été démontré que LABIXTEN® 20 mg n'affecte pas les performances pendant la conduite chez l'adulte. Cependant, la réponse de chaque patient au médicament peut être différente. Par conséquent, vérifiez comment ce médicament vous affecte avant de conduire ou d'utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- La dose recommandée chez les adultes, y compris les personnes âgées et les adolescents âgés de plus de 12 ans, est de 1 comprimé (20 mg) par jour.

- Le comprimé s'administre par voie orale.

- Le comprimé doit être pris une heure avant ou deux heures après la prise de la nourriture ou jus. (Voir rubrique « Interaction avec les aliments et les boissons »).

- Avalez le comprimé avec un verre d'eau.

La barre de cassure n'est là que pour faciliter la prise du comprimé si vous éprouvez des difficultés à l'avaler en entier.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera, selon vos symptômes, la durée pendant laquelle vous devez prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés.

• Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous, ou quelqu'un d'autre, avez pris plus de LABIXTEN® 20 mg comprimés que vous n'auriez dû, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

• Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous oubliez de prendre votre dose à l'heure prévue, prenez-la dès que possible, puis continuer selon le rythme habituel.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, parlez-en à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EVENTUELS EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, LABIXTEN® 20 mg peuvent provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas chez tout le monde.

Les effets indésirables sont :

Fréquents : peuvent concerner plus de 1 personne

- Maux de tête.
- Somnolence

Peu fréquents : peuvent concerner plus de 1 personne sur 100 personnes

- Anomalie de l'électrocardiogramme (ECG : enregistrement graphique des battements du cœur).
- Modification du bilan sanguin hépatique.
- Sensations vertigineuses.
- Douleur au niveau de l'estomac.
- Sensation de fatigue.
- Augmentation de l'appétit.
- Battements cardiaques irréguliers.
- Prise de poids.

- Nausées.
- Anxiété.

- Sécheresse ou inconfort nasal.
- Douleur abdominale (au niveau du ventre).
- Diarrhées.

- Gastroïtis (inflammation de la paroi de l'estomac).
- Vertiges.

- Sensation de faiblesse générale.
- Soif.

- Dyspnée (difficulté à respirer).
- Sécheresse buccale.

- Indigestion.
- Démangeaisons.

- Herpès labial.
- Fièvre.

- Acouphènes (bourdonnements dans les oreilles).
- Trouble du sommeil.

- Modification du bilan sanguin rénal.
- Augmentation des taux de lipides (graisses) mesurés dans le sang.

Fréquence inconnue : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

- Palpitations (perception des battements du cœur).
- Tachycardie (accélération des battements du cœur).

- Des réactions allergiques dont les signes peuvent comporter une difficulté à respirer, un vertige, un événissement ou perte de connaissance, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et/ou un gonflement et une rougeur de la peau. Si vous remarquez un de ces effets secondaires graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez immédiatement un médecin.

- Vomissements

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et de la Pharmacovigilance. Site internet : www.capp.ma.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Ne pas utiliser LABIXTEN® 20 mg après la date de péremption figurant sur la boîte et sur les blisters.

- Pas de précautions particulières de conservation.

- Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les égouts ni dans les poubelles. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Ce que contient LABIXTEN® 20 mg comprimés :

La substance active est :

Bilastine 20 mg. Par comprimé.

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique type A, silice colloïdale, stéarate de magnésium d'origine végétale.

Aspect de LABIXTEN® 20 mg et contenu de l'emballage extérieur :

LABIXTEN® 20 mg comprimés sont blancs, ovales, biconvexes et rainurés.

Les comprimés sont conditionnés sous forme de blisters, et mis dans des boîtes de 10, 20 et 30 comprimés.

Désignation et tableau éventuel

Tableau C. (Liste II)

Nom et adresse de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché au Maroc :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI - Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC.

Fabriqué par :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI - Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC.

Sous licence du Laboratoire pharmaceutique FAES FARMA,

Maximo Aguirre 14, 48940 Lejona (VIZCAYA) ESPAGNE.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée :

Aout 2019

Conditions de prescription et de délivrance :

Tableau C (liste II).

LOT : 14425205
PER : 820211
PRI : 99.00

NOTICE: INFORMATION POUR L'UTILISATEUR
LABIXTEN® 20 mg comprimés
DCI: bilastine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à autre personne, elle pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LABIXTEN® 20 mg comprimés et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
3. Comment prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LABIXTEN® 20 mg comprimés ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST CE QUE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

LABIXTEN® 20 mg comprimés contient de la bilastine qui est un antihistaminique. LABIXTEN® 20 mg comprimé est indiqué pour soulager les symptômes de la rhino-conjonctivite allergique (étoumement, démangeaison nasale, écoulement nasal, congestion nasale ainsi que rougeur et larmoiement oculaire) et autres symptômes d'origine allergique.

LABIXTEN® 20 mg comprimés peut également être utilisé pour traiter les éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons (urticaire).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS :

• Contre-indication de LABIXTEN® 20 mg comprimés :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la bilastine ou à l'un des autres composants du LABIXTEN® 20 mg comprimés.

• Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LABIXTEN® 20 mg si vous avez une insuffisance rénale modérée à sévère ou si vous prenez d'autres médicaments (voir « Interaction avec d'autres médicaments »).

Ne pas dépasser la dose prescrite. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Enfants et adolescents :

Ce médicament ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans.

• Interactions avec d'autres médicaments :

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

En particulier, veuillez informer votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants pouvant interagir avec LABIXTEN® 20 mg comprimés :

- Kétoconazole (antifongique utilisé pour le traitement des mycoses).
- Erythromycine (antibiotique).
- Diliazem (utilisé pour le traitement de l'angine de poitrine).
- Ciclosporine (immunosuppresseur utilisé chez les sujets ayant subi une greffe pour diminuer le risque de rejet de greffe ou dans le traitement des maladies auto-immunes tels que le psoriasis, la dermatite atopique ou la polyarthrite rhumatoïde).
- Ritonavir (médicament utilisé pour traiter le VIH).
- Rifampicine (antibiotique).

• Interaction avec les aliments et les boissons

Les comprimés ne doivent pas être pris avec des aliments ni avec le jus de pamplemousse ou d'autres jus de fruits car cela peut diminuer l'efficacité de la bilastine.

Pour éviter cela vous pouvez :

- Prendre un comprimé une heure avant ou deux heures après l'ingestion de jus de fruits ou de nourriture.

- A la dose recommandée de 20 mg par 24 heures (soit un comprimé), la bilastine n'augmente pas la somnolence induite par l'alcool.

• Grossesse, allaitement et fertilité :

Il n'y a pas des données suffisantes relatives à l'utilisation de la bilastine chez la femme enceinte, allaitante ni sur les effets sur la fertilité.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

• Conduite de véhicules et utilisation des machines :

Il a été démontré que LABIXTEN® 20 mg n'affecte pas les performances pendant la conduite chez l'adulte. Cependant, la réponse de chaque patient au médicament peut être différente. Par conséquent, vérifiez comment ce médicament vous affecte avant de conduire ou d'utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS ?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- La dose recommandée chez les adultes, y compris les personnes âgées et les adolescents âgés de plus de 12 ans, est de 1 comprimé (20 mg) par jour.

- Le comprimé s'administre par voie orale.

- Le comprimé doit être pris une heure avant ou deux heures après la prise de la nourriture ou jus. (Voir rubrique « Interaction avec les aliments et les boissons »).

- Avalez le comprimé avec un verre d'eau.

La barre de cassure n'est là que pour faciliter la prise du comprimé si vous éprouvez des difficultés à l'avaler en entier.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera, selon vos symptômes, la durée pendant laquelle vous devez prendre LABIXTEN® 20 mg comprimés.

• Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous, ou quelqu'un d'autre, avez pris plus de LABIXTEN® 20 mg comprimés que vous n'auriez dû, contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

• Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose déjà prise.

Si vous oubliez de prendre votre dose à l'heure prévue, prenez-la dès que possible, puis continuez selon le rythme habituel.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EVENTUELS EFFETS INDÉSIRABLES

Comme tous les médicaments, LABIXTEN® 20 mg peuvent provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas chez tout le monde.

Les effets indésirables sont :

Fréquents : peuvent concerner plus de 1 personne

- Maux de tête.
- Somnolence

Peu fréquents : peuvent concerner plus de 1 personne sur 100 personnes

- Anomalie de l'électrocardiogramme (ECG : enregistrement graphique des battements du cœur).
- Modification du bilan sanguin hépatique.
- Sensations vertigineuses.
- Douleur au niveau de l'estomac.
- Sensation de fatigue.
- Augmentation de l'appétit.
- Battements cardiaques irréguliers.
- Prise de poids.

- Nausées.
- Anxiété.

- Sécheresse ou inconfort nasal.

- Douleur abdominale (au niveau du ventre).

- Diarrhées.

- Gastroite (inflammation de la paroi de l'estomac).

- Vertiges.

- Sensation de faiblesse générale.

- Soif.

- Dyspnée (difficulté à respirer).

- Sécheresse buccale.

- Indigestion.

- Démangeaisons.

- Herpès labial.

- Fièvre.

- Acouphènes (bourdonnements dans les oreilles).

- Trouble du sommeil.

- Modification du bilan sanguin rénal.

- Augmentation des taux de lipides (graisses) mesurés dans le sang.

Fréquence inconnue : la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

- Palpitations (perception des battements du cœur).

- Tachycardie (accélération des battements du cœur).

- Des réactions allergiques dont les signes peuvent comporter une difficulté à respirer, un vertige, un événissement ou perte de connaissance, un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, et/ou un gonflement et une rougeur de la peau. Si vous remarquez un de ces effets secondaires graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez immédiatement un médecin.

- Vomissements

Déclaration des effets secondaires :

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre Antipoison et de la Pharmacovigilance. Site internet : www.capp.ma.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER LABIXTEN® 20 mg COMPRIMÉS

- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

- Ne pas utiliser LABIXTEN® 20 mg après la date de péremption figurant sur la boîte et sur les blisters.

- Pas de précautions particulières de conservation.

- Les médicaments ne doivent pas être jetés dans les égouts ni dans les poubelles. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Ce que contient LABIXTEN® 20 mg comprimés :

La substance active est :

Bilastine 20 mg. Par comprimé.

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, carboxyméthylamidon sodique type A, silice colloïdale, stéarate de magnésium d'origine végétale.

Aspect de LABIXTEN® 20 mg et contenu de l'emballage extérieur :

LABIXTEN® 20 mg comprimés sont blancs, ovales, biconvexes et rainurés.

Les comprimés sont conditionnés sous forme de blisters, et mis dans des boîtes de 10, 20 et 30 comprimés.

Désignation et tableau éventuel

Tableau C. (Liste II)

Nom et adresse de titulaire de l'autorisation de mise sur le marché au Maroc :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI - Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC.

Fabriqué par :

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE IBERMA

ZI - Lot 149 -HAD SOUALEM-MAROC.

Sous licence du Laboratoire pharmaceutique FAES FARMA, Maximo Aguirre 14, 48940 Lejona (VIZCAYA) ESPAGNE.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée :

Aout 2019

Conditions de prescription et de délivrance :

Tableau C (liste II).

LOT : 14425205
PER : 820211
PRI : 99.000

Dr Nawal BENOUEHOUD

Pneumologue - Allergologue

Adultes & Enfants


Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Plethysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani

et Hôpital 20 Août - Casablanca



دكتورة نوال بنوحود

صائبة في أمراض الجهاز التنفسى

وار والأطفال

بيقة الحساسية داء السل

من وطا نف الرئة - اختبار الحساسية

نخیص بالمنظار

بـة سابقاً بالمستشفى الحسني

ستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Le. 24/07/2023

TESTS CUTANÉS ALLERGOLOGIQUES

NOM :

BENOUHOUD

PRÉNOM :

Mohamed

Allergène	Papule (en mm)
Témoin négatif	NEGATIF
Témoin positif	10mm
DP	6mm
DF	5mm
5 Graminées	4mm
Olivier	4mm
Phanères chat	4mm

CONCLUSION :

TC positif aux DP f. DF

Dr.BENOUEHOUD Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond point Georges Rés Aya Lot N°65
3^e Etg N°8 Oulfa Al Wifaq Ferrara
+212 522 658 86

Rond Point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N°65 , 3ème étage N°8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1 / INPE : 091035188 / ICE : 003308157000077



+212 522 658 861



+212 661 711 424



benouhoudnawal@gmail.com

Dr Nawal BENOUEHOUD

Pneumologue - Allergologue

Adultes & Enfants

Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Pléthysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani

et Hôp 20 Août - Casablanca



الدكتورة نوال بنوحود

اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي

الكبار والأطفال

الضيق الحساسية داء السل

فحص وظائف الرئة - اختبار الحساسية

التخدير بالمنظار

طبية سابقاً بالمستشفى الحسني

والمستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Casablanca, le24/07/2023

BENOUEHOUD MOHAMED

• Labixten 20 mg - comprimé

1cpX2/j PDT 7J PUIS 1CP le soir pdt 3 mois

• Predni cooper 20 mg - comprimé effervescent sécable

3 cp /j le matin après petit déj pdt 3J



PHARMACIE LM
 28, Bis Rue Salomon Angle
 Rue de Rome Casablanca
 Tel: 05 22 85 43 95
 Tel: 06 00 06 07 08
 ICE: 00217913000087
 RC: 318383

Dr. BENOUEHOUD Nawal
 Pneumologue - Allergologue
 Rond-point Georges Régis Aya Lot N° 65
 3^e Etg N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara
 +212 522 658 86

Rond Point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65, 3^{eme} étage
 N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1 / e-mail : benouehoudnawal@gmail.com
 Tél : +212 522 658 861 - Gsm : +212 661 711 424 - INPE : 091035188

Dr Nawal BENOUEHOUD

Pneumologue - Allergologue

Adultes & Enfants

Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Pléthysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani
et Hôp 20 Août - Casablanca



الدكتورة نوال بنوحود

اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي
الكبار و الأطفال

الضيق الحساسية داء السل
فحص وظائف الرئة - اختبار الحساسية
التشخيص بالمنظار

طبيبة سابقاً بالمستشفى الحسني
والمستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Casablanca, le

Facture N°: 7

Date : 24/07/2023

Bénéficiaire : Mr Benouhoud Mohamed
Mr BENOUEHOUD MOHAMED

Tél: 0666880612

Email:

Adresse:

Code	Description	Quantité	Prix	Sous-total
Visite du 24/07/2023				
CNS	Consultation	1	250,00	250,00
Pharmacie-Actes				
TC	TESTS CUTANES	1	500,00	500,00
Total				750,00

Arrêté le présent document à la somme de :
sept cent cinquante dirham(s)

Dr.BENOUEHOUD Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond point Georges Rés. Aya Lot N° 65
3^{eme} Etg N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1
+212 522 658 861
Nawal

Rond Point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65, 3^{eme} étage
N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1 / e-mail : benouhoudnawal@gmail.com
Tél : +212 522 658 861 - Gsm : +212 661 711 424 - INPE : 091035188

Dr Nawal BENOUHOUD

Pneumologue - Allergologue

Adultes & Enfants

Asthme - Allergies - Tuberculose

Spirométrie - Pléthysmographie

Tests Cutanés - Bronchoscopie

Ex. Pneumologue à l'Hôpital Al Hassani
et Hôp 20 Août - Casablanca



الدكتورة نوال بنوحود

اختصاصية في أمراض الجهاز التنفسي
الكبار والأطفال

الضيق الحساسية داء السل
فحص وظائف الرئة - اختبار الحساسية

التشخيص بالمنظار

طبية سابقاً بالمستشفى الحسني
والمستشفى 20 غشت - الدار البيضاء

Casablanca, le .24/07/2023

BENOUHOUD MOHAMED

NFS PLQ

IGE TOTALES



Dr.BENOUHOUD Nawal
Pneumologue - Allergologue
Rond point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N°65
3^{ème} Etg N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1 / N° 61
+212 522 658 861

NGD 23

Rond Point Georges Bd Oum Rabii Rés Aya Lot N° 65, 3^{ème} étage
N° 8 Oulfa Al Wifaq Ferrara 1 / e-mail : benouhoudnawal@gmail.com
Tél : +212 522 658 861 - Gsm : +212 661 711 424 - INPE : 091035188



مختبر بيمديكا
Laboratoire BIOMEDICA

Dr. Fathallah Harim

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Facture

Référence : HGQ23

Nom : Mr.BENOUHOUD

Date : 25/07/2023

Prenom : MOHAMED

Docteur : BENOUHOUD NAWAL

ANALYSES DEMANDEES	Total en B	Total TTC
IGE TOTALES	200	268.00 DH
NFS	80	107.20 DH
Prélèvement + Deplacement + Divers ...	0	25.00 DH

EN VOTRE AIMABLE REGLEMENT

280 B

400.20 DH TTC

Casablanca 25/07/2023

BIOMEDICA
IF : 41703944
INPB : 093000115
I.C.E : 001688679000032

مختبر بيومديكا
Laboratoire BIOMEDICA

Sathallah Harim

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble
A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Docteur : BENOUHOUD NAWAL

Nom : Mr BENOUHOUD MOHAMED

Prél. le : 25/07/2023

Réf : HGQ23

Édité le : 26/07/2023

Resultats Unités Valeurs Normales

SEROLOGIE

IGE TOTALES

RESULTAT.....

216.4 UI/ml.

Valeurs usuelles :

1 à 12 mois : < 20 UI/ml.

1 à 4 ans : < 45 UI/ml.

4 à 8 ans : < 100 UI/ml.

Adultes : < 150 UI/ml.

T. Immunofluorescence, i-CHROMA II

Dr.HARIM

LABORATOIRE
BIOMEDICA
160 Rue M. Maâni - Casablanca



مختبر بيومديكا
Laboratoire BIOMEDICA

Dr. Fathallah Harim

Pharmacien Biologiste

A. Interne du C.H.U. de Grenoble

A. Chef du Laboratoire d'Hygiène

Docteur : BENOUEHOUD NAWAL

Nom : Mr BENOUEHOUD MOHAMED

Prél. le : 25/07/2023

Réf : HGQ23

Édité le : 26/07/2023

Resultats Unités Valeurs Normales

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE- Sysmex XN-350

HEMATIES.....	4 641 000	/mm3	[4 500 000 -- 6 100 000]
HEMOGLOBINE.....	13.1	g/dl	[13 -- 17]
HEMATOCRITE.....	40.5	%	[40 -- 55]
- VGM.....	87.27	μ 3	[80 -- 100]
- CGMH.....	32.35	%	[32 -- 36]
- TGMH.....	28.23	pg	[27 -- 32]
LEUCOCYTES.....	7 940	/mm3	[4 000 -- 10 000]
POLY. NEUTROPHILES.....	64.1	%	
Soit	5 089.54	/mm3	[1 700 -- 7 000]
POLY. EOSINOPHILES.....	2.5	%	
Soit	198.5	/mm3	[50 -- 500]
POLY. BASOPHILES.....	0.6	%	
Soit	47.64	/mm3	[10 -- 100]
LYMPHOCYTES.....	26.1	%	
Soit	2 072.34	/mm3	[1 400 -- 4 000]
MONOCYTES.....	6.7	%	
Soit	531.98	/mm3	[100 -- 1 000]
PLAQUETTES.....	369 000	/mm3	[150 000 -- 400 000]

LABORATOIRE
BIOMEDICA
160, Rue M. Maâni - Casablanca