

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1207 Société : R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : FATIHI Abdellatif

Date de naissance : 1/1/1952

Adresse : HAT El gouds HES EL PAIR In BOU CASABLANCA

Bermusi

Tél. : 06 94 06 66 278

06 32 88 82 37

Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 25.7.13

Nom et prénom du malade : N.D.I YAHYI

Age:

Lien de parenté :  Lui-même

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : ..... Le : ..... / ..... / .....

Signature de l'adhérent(e) :

SA

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES					
Dates des Actes	Lectures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes	
22-05-2014 Actes en Diabète et Hypertension	22-05-2014 Actes en Diabète et Hypertension	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes	
22-05-2014 Bd Souhail - Casablanca	22-05-2014 Bd Souhail - Casablanca		200.00 D	Omnipratique et DTT en Diabète et Hypertension	
22-05-2014 Sidi Bernoussi	22-05-2014 Sidi Bernoussi			373 - Bd Souhail - Casablanca	
				Sidi Bernoussi - Casablanca	
				Tél : 05 22 73 72 72	

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
ARMERIA MENDOUR MENNOUR Houda enue M 13 El Hamidia Sidi Bernoussi El Qods abnour - Tel 05 22 72 40 4	25.07.23	49.3, 20

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

## AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553



### **[Création, remont, adjonction]**

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

**Dr. OUZIT Souad**

**Medecine Générale**

Diplômée de la Faculté  
de médecine de montpellier  
en Diététique et Diabétologie

**الدكتورة سعاد أوزيت**

**الطب العام**

حاصلة من كلية الطب بمونبولي  
على دبلوم جامعي في التغذية و داء السكري

Casablanca le:

25 Juillet 2023 الدار البيضاء في

**Mme DIYANI FATHA**

THYROZOL 10 mg

2x6,80 1.0.0

LEVOOTHYROX 25

2x89,50 1 cp / j  
D3 NORM GOUTTE BUVABLE 200 UI

10GOUTTES / J

5 gouttes / j pd 3 mois

Traitemment pendant : 6 Mois

Rendez vous le :

373 شارع مصطفى الرومي الطابق الأول - منصور 3 البرنوصي / البيضاء - الهاتف : 05 22 73 72 72

373, Bd. Souhaib Erroumi 1er Etage Mansour III-Bernoussi - Casa - Tél.: 05 22 73 72 72

- Fragilité osseuse.

## **CONSEILS D'UTILISATION :**

Suivre les recommandations d'un professionnel de la santé. Bien agiter avant emploi. Les gouttes sont à diluer dans un liquide froid de préférence (lait, jus de fruits...). Le flacon est muni d'un compte goutte.  
1 goutte = 200 UI

## **PRECAUTIONS D'UTILISATION :**

- À utiliser en complément d'une alimentation variée.
- Ne pas dépasser la dose recommandée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Complément alimentaire, ce n'est pas un médicament .

Fabriqué par Pharmalife Research - Italie.

Importé et distribué au Maroc par Thérapharm.

Autorisation ministère de la santé n° : 20211711315/MAv3DMP/CA/18

D3 NORM®

200 UI

GOUTTES BUVABLES



8 051178 634501

230494

05/2026

ATION :

Con compte-gouttes de 30 ml.

D3 NORM®  
200 UI

Lot:  
A consommer  
avant le:

PPC : 89,50 DH

#### PROPRIETES :

D3 NORM® 200 UI gouttes buvables renferme de la vitamine D3 (cholécalciférol), la forme la plus active de vitamine D.

D3 NORM® 200 UI gouttes buvables favorise l'absorption du calcium et du phosphore et contribue au maintien d'une ossature normale et au bon fonctionnement du système immunitaire.

#### UTILISATIONS :

- Carence en vitamine D.

من المعومات من صبيت او الصيدلي .



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH



7862160335

#### 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة

وصف الآثار غير المرغوبة مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكارباجانبية، ولكنها لا تحصل تفاقم مرض قلبي (الذبحة الـ نظم القلب)

علامات فرط التدرق (احتلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحو سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك، عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات والأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنفاس في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الاغتناء عن الآثار الجانبية:

من المعومات من صبيت او الصيدلي .



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH



7862160335

#### 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة

وصف الآثار غير المرغوبة مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكارباجانبية، ولكنها لا تحصل تفاقم مرض قلبي (الذبحة الـ نظم القلب)

علامات فرط التدرق (احتلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحو سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك، عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،

ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات والأعراض الأكثر شيوعا هي : طفح جلدي، حكة، إنفاس في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

الاغر عن الآثار الجانبية:

dilocyto.

### Rares (peut toucher moins de 1 personne sur 1000) :

- Troubles du goût ou perte du goût (dysgueusie, agueusie).
- Fièvre.

### Très rares (peut toucher

### 1 personne sur 10 000) :

sanguines (thrombocytopénie),  
les cellules sanguines  
anglions (lymphadénopathie

**Thyrozol 10 mg Comprimé**  
pelliculé sécable, Boîte de 30  
PPV : 50,10 Dhs

Pharmacien Responsable :

Amina DAOUDI



6 118001 103065

glycémie avec abaissement  
insulinique auto-immun).  
(névrite, polyneuropathie).

- I
  - G
  - D
- cholostatique, hépatite toxique). Généralement, les symptômes disparaissent après l'arrêt du traitement.

Réactions allergiques cutanées graves pouvant toucher tout le corps, y compris réactions bulleuses touchant la peau (syndrome de Stevens-Johnson), perte de cheveux, maladie auto-immune inflammatoire de la peau et du tissu conjonctif (lupus érythémateux).

- **Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)  
Inflammation du pancréas (pancréatique aiguë).

### Enfants et adolescents

Les effets indésirables chez les enfants et chez les adolescents sont comparables à ceux observés chez les adultes.

Si ces effets deviennent graves, contactez immédiatement votre médecin.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER THYROZOL ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le carton après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

dilocyto.

### Rares (peut toucher moins de 1 personne sur 1000) :

- Troubles du goût ou perte du goût (dysgueusie, agueusie).
- Fièvre.

### Très rares (peut toucher

### 1 personne sur 10 000) :

sanguines (thrombocytopénie),  
les cellules sanguines  
anglions (lymphadénopathie

**Thyrozol 10 mg Comprimé**  
pelliculé sécable, Boîte de 30  
PPV : 50,10 Dhs

Pharmacien Responsable :

Amina DAOUDI



6 118001 103065

glycémie avec abaissement  
insulinique auto-immun).  
(névrite, polyneuropathie).

- I
  - G
  - D
- cholostatique, hépatite toxique). Généralement, les symptômes disparaissent après l'arrêt du traitement.

Réactions allergiques cutanées graves pouvant toucher tout le corps, y compris réactions bulleuses touchant la peau (syndrome de Stevens-Johnson), perte de cheveux, maladie auto-immune inflammatoire de la peau et du tissu conjonctif (lupus érythémateux).

- **Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)  
Inflammation du pancréas (pancréatique aiguë).

### Enfants et adolescents

Les effets indésirables chez les enfants et chez les adolescents sont comparables à ceux observés chez les adultes.

Si ces effets deviennent graves, contactez immédiatement votre médecin.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER THYROZOL ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le carton après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

dilocyto.

### Rares (peut toucher moins de 1 personne sur 1000) :

- Troubles du goût ou perte du goût (dysgueusie, agueusie).
- Fièvre.

### Très rares (peut toucher

### 1 personne sur 10 000) :

sanguines (thrombocytopénie),  
les cellules sanguines  
anglions (lymphadénopathie

**Thyrozol 10 mg Comprimé**  
pelliculé sécable, Boîte de 30  
PPV : 50,10 Dhs

Pharmacien Responsable :

Amina DAOUDI



6 118001 103065

glycémie avec abaissement  
insulinique auto-immun).  
(névrite, polyneuropathie).

- I
  - G
  - D
- cholostatique, hépatite toxique). Généralement, les symptômes disparaissent après l'arrêt du traitement.

Réactions allergiques cutanées graves pouvant toucher tout le corps, y compris réactions bulleuses touchant la peau (syndrome de Stevens-Johnson), perte de cheveux, maladie auto-immune inflammatoire de la peau et du tissu conjonctif (lupus érythémateux).

- **Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)  
Inflammation du pancréas (pancréatique aiguë).

### Enfants et adolescents

Les effets indésirables chez les enfants et chez les adolescents sont comparables à ceux observés chez les adultes.

Si ces effets deviennent graves, contactez immédiatement votre médecin.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER THYROZOL ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le carton après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

dilocyto.

### Rares (peut toucher moins de 1 personne sur 1000) :

- Troubles du goût ou perte du goût (dysgueusie, agueusie).
- Fièvre.

### Très rares (peut toucher

### 1 personne sur 10 000) :

sanguines (thrombocytopénie),  
les cellules sanguines  
anglions (lymphadénopathie

**Thyrozol 10 mg Comprimé**  
pelliculé sécable, Boîte de 30  
PPV : 50,10 Dhs

Pharmacien Responsable :

Amina DAOUDI



6 118001 103065

glycémie avec abaissement  
insulinique auto-immun).  
(névrite, polyneuropathie).

- I
  - G
  - D
- cholostatique, hépatite toxique). Généralement, les symptômes disparaissent après l'arrêt du traitement.

Réactions allergiques cutanées graves pouvant toucher tout le corps, y compris réactions bulleuses touchant la peau (syndrome de Stevens-Johnson), perte de cheveux, maladie auto-immune inflammatoire de la peau et du tissu conjonctif (lupus érythémateux).

- **Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)  
Inflammation du pancréas (pancréatique aiguë).

### Enfants et adolescents

Les effets indésirables chez les enfants et chez les adolescents sont comparables à ceux observés chez les adultes.

Si ces effets deviennent graves, contactez immédiatement votre médecin.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER THYROZOL ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le carton après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

dilocyto.

### Rares (peut toucher moins de 1 personne sur 1000) :

- Troubles du goût ou perte du goût (dysgueusie, agueusie).
- Fièvre.

### Très rares (peut toucher

### 1 personne sur 10 000) :

sanguines (thrombocytopénie),  
les cellules sanguines  
anglions (lymphadénopathie

**Thyrozol 10 mg Comprimé**  
pelliculé sécable, Boîte de 30  
PPV : 50,10 Dhs

Pharmacien Responsable :

Amina DAOUDI



6 118001 103065

glycémie avec abaissement  
insulinique auto-immun).  
(névrite, polyneuropathie).

- I
  - G
  - D
- cholostatique, hépatite toxique). Généralement, les symptômes disparaissent après l'arrêt du traitement.

Réactions allergiques cutanées graves pouvant toucher tout le corps, y compris réactions bulleuses touchant la peau (syndrome de Stevens-Johnson), perte de cheveux, maladie auto-immune inflammatoire de la peau et du tissu conjonctif (lupus érythémateux).

- **Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)  
Inflammation du pancréas (pancréatique aiguë).

### Enfants et adolescents

Les effets indésirables chez les enfants et chez les adolescents sont comparables à ceux observés chez les adultes.

Si ces effets deviennent graves, contactez immédiatement votre médecin.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER THYROZOL ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le carton après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

dilocyto.

### Rares (peut toucher moins de 1 personne sur 1000) :

- Troubles du goût ou perte du goût (dysgueusie, agueusie).
- Fièvre.

### Très rares (peut toucher

### 1 personne sur 10 000) :

sanguines (thrombocytopénie),  
les cellules sanguines  
anglions (lymphadénopathie

**Thyrozol 10 mg Comprimé**  
pelliculé sécable, Boîte de 30  
PPV : 50,10 Dhs

Pharmacien Responsable :

Amina DAOUDI



6 118001 103065

glycémie avec abaissement  
insulinique auto-immun).  
(névrite, polyneuropathie).

- I
  - G
  - D
- cholostatique, hépatite toxique). Généralement, les symptômes disparaissent après l'arrêt du traitement.

Réactions allergiques cutanées graves pouvant toucher tout le corps, y compris réactions bulleuses touchant la peau (syndrome de Stevens-Johnson), perte de cheveux, maladie auto-immune inflammatoire de la peau et du tissu conjonctif (lupus érythémateux).

- **Fréquence indéterminée** (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)  
Inflammation du pancréas (pancréatique aiguë).

### Enfants et adolescents

Les effets indésirables chez les enfants et chez les adolescents sont comparables à ceux observés chez les adultes.

Si ces effets deviennent graves, contactez immédiatement votre médecin.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER THYROZOL ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le carton après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.