

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### Adresses Mails utiles

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 0 Réclamation                      | : contact@mupras.com  |
| 0 Prise en charge                  | : pec@mupras.com      |
| 0 Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

N° W21-802057

A71828

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

Cadre réservé à l'adhérent (e)

04909

Matricule :

Société :

R.A.M

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Hitti Hassay

Date de naissance :

20.03.1957

Adresse :

Residente BEL-AIR Villa n°10 Hay jamez  
Bouvier

Tél. :

06 61 31 47 82

Total des frais engagés :

1089,80

Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Jihane EL JAOUIHARI  
CARDIOLOGUE  
Boulevard Abou Bakr El Kadiri Rés Naim  
n°3, 5ème Etage Appt.9 Sidi Maârouf  
Casablanca - GSM : 05 22 20 45 45

Date de consultation :

15.06.2013  
Hitti Hassay

Age:

Nom et prénom du malade :

Lui-même

Conjoint  
 Enfant

Lien de parenté :

Conjoint

Nature de la maladie :

Coronarien

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Le : 01/06/2013

Signature de l'adhérent(e) :

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2023	CHIRURGIE STOMATOLOGIQUE	3000K-	INP : 109176537	DR. SIDI MAAROUF NAIM

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Formateur Date Montant de la Facture

PHARMACIE EN ROCHD  
Villa N° 2 Hay El Jamaâ 106123  
Bouskoura - Tel : 05 22 33 12 61

10.89,80

### ANALYSES - RADIGRAPHIES


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### VOLET ADHERENT

\* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



### O.D.F PROTHESES DENTAIRES



### DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
B	35533411	11433553
G		

[Création, remont, adjonction]  
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

# Dr. Lalla Jihane EL JAOUHARI

- ❖ Spécialiste en Cardiologie
- ❖ Diplômée de la Faculté de Médecine de Rabat
- ❖ Diplômée en Echocardiographie de la Faculté Victor Segalen, Bordeaux II - France
- ❖ Ex. Médecin au CHU Ibn Sina - Rabat
- ❖ Ex. Médecin à l'Hôpital militaire d'instruction Med V - Rabat



الدكتورة للا جهان الجوهرى

- ❖ اختصاصية في أمراض القلب
- ❖ خريجة كلية الطب فيكتور سينكلار بوردو فرنسا
- ❖ في تشخيص أمراض القلب بالصدى
- ❖ طبيبة سابقاً بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط
- ❖ طبيبة سابقاً بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط

Le 11/06/2023

MR Hilti Hassan.

27.70

Cardioaspirine S.V 50mg : 1cp midi

(3 x 316,00)

Plavix 75mg S.V 1cp midi (3 Boites)

Cardensrel 5mg : 1/2 cp matin

1 14,10

Greshor 5mg : S.V 1cp lessor

1089,80

~~PHARMACIE IBN ROCHD  
Villa N° 2 Hay El Jamaâ  
Bouskoura. Tel : 05 22 33 42 67~~

~~Dr. Jihane EL JAOUHARI  
CARDIOLOGUE  
Boulevard Abou Bakr El Kadiri Rés. Naim  
Imm 5, 3ème Etage Appt. 9 Sidi Maârouf  
Casablanca. GSM : +212 662 38 61 68  
& mail: dr.eljaouhari.jihane@gmail.com~~

**Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



# CARDIOASPIRINE®

## 100 mg, comprimés gastro-résistants

### Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et
2. Quelles sont les informations nécessaires
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg
6. Informations supplémentaires

Cardioaspirine 100 mg/30cpr  
Acide acetylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.



6 118001 090280

BT17XZ1 04 2022

04 2027

EXP

### 1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS

CardioAspirine contient comme principe actif l'**acide acetylsalicylique**. Ce dernier inhibe l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se dissout que dans l'intestin grêle. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la rétention gastrique.

#### **NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

#### **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix
  3. Comment prendre Plavix
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels
  5. Comment conserver Plavix
  6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### **1. QU'EST-CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ**

**Plavix contient du clopidogrel et appartient à une classe de médicaments appelé**

Il faut cependant être préoccupé et apprécier les antiagrégants plaquettaires. Les plaquette et qui s'agrégent lors de la coagulation du antiagrégants plaquettaires réduisent le risque thrombose.

Plavix est utilisé chez l'adulte pour éviter  
vaisseaux sanguins (artères) devenus rigid  
athérothrombose peut conduire à la survi  
l'accident vasculaire cérébral, la crise carc  
On vous a prescrit Plavix pour empêcher l'é

- de survenue de tels événements graves.
  - Vous avez des artères qui se sont rigo-  
dérrose), et
  - Vous avez déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une artériopathie des membres inférieurs, ou
  - Vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou "d'infarctus du myocarde" (cnse cardiaque). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace. Votre médecin doit également vous prescrire de l'acide acétylsalicylique.

peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse) [voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels"].

- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien constater d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").
  - Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens sanguins.

## **Enfants et adolescents**

**Enfants et adolescents** Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants en raison de l'absence d'efficacité.

#### **Autres médicaments et Playix**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de Plavix ou vice-versa.

**Vous devez informer avec précision votre médecin si vous prenez :**

- des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de saignement tels que :
  - des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour diminuer la coagulation du sang), un anti-inflammatoire non stéroïdien, médicament utilisé habituellement pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations, de l'héparine ou tout autre médicament injectable utilisé pour diminuer la coagulation du sang,
  - de la ticlopidine, un autre antiagrégant plaquettaire,
  - un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (incluant notamment la fluoxétine ou la fluvoxamine), médicament utilisé habituellement dans le traitement de la dépression,
  - de l'omeprazole ou de l'ésoméprazole pour des maux d'estomac,
  - du fluconazole ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement d'infections fongiques,
  - de l'efavirenz, ou d'autres traitements antirétroviraux (utilisés pour traiter les infections au VIH),
  - de la carbamazépine
  - du moclémide, p
  - du repaglinide, mé
  - du pacitaxel, médi
  - des opioïdes, si vous opioïde ne vous soi

Si vous avez eu une douleur, vous êtes prescrit en association avec l'acide acétalicylique (par exemple, aspirine), nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Une utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg sur une période de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin.

#### **Plavix avec des aliments et boissons**

#### **NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
  - Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
  - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
  - Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

## **Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé
  2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix
  3. Comment prendre Plavix
  4. Quels sont les effets indésirables éventuels
  5. Comment conserver Plavix
  6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Plavix contient du clopidogrel et appartient à une classe de médicaments appelés

Il faut contrôler la coagulation et apprécier les antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes et qui s'agrègent lors de la coagulation du sang sont réduites par les antiagrégants plaquettaires et appelé thrombose.

Plavix est utilisé chez l'adulte pour éviter l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque et la mort subite. On vous a prescrit Plavix pour empêcher l'embolie pulmonaire.

- Vous avez des artères qui se sont rigo-  
clérose), et
  - Vous avez déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une artériopathie des membres inférieurs, ou
  - Vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou "d'infarctus du myocarde" (crise cardiaque). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace. Votre médecin doit également vous prescrire de l'acide arachidysalicylique.

peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse) [voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels"].

- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien constater d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").
  - Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens sanguins.

## **Enfants et adolescents**

**Contraindications** Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants en raison de l'absence d'efficacité.

#### **Autres médicaments et Playix**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de Plavix ou vice-versa.

**Vous devez informer avec précision votre médecin si vous prenez :**

- des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de saignement tels que :
  - des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour diminuer la coagulation du sang), un anti-inflammatoire non stéroïdien, médicament utilisé habituellement pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations, de l'héparine ou tout autre médicament injectable utilisé pour diminuer la coagulation du sang,
  - de la ticlopidine, un autre antiagrégant plaquettaire,
  - un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (incluant notamment la fluoxétine ou la fluvoxamine), médicament utilisé habituellement dans le traitement de la dépression,
  - de l'omeprazole ou de l'ésoméprazole pour des maux d'estomac,
  - du fluconazole ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement d'infections fongiques,
  - de l'efavirenz, ou d'autres traitements antirétroviraux (utilisés pour traiter les infections au VIH),
  - de la carbamazépine
  - du moclobémide, p
  - du repaglinide, mé
  - du pacitaxel, médi
  - des opioïdes, si vous opioïde ne vous soi

Si vous avez eu une douleur, vous êtes prescrit en association avec l'acide acétalicylique (par exemple, aspirine), nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Une utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg sur une période de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin.

#### **Plavix avec des aliments et boissons**

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**

# Plavix® 75 mg

**comprimés pelliculés**  
clopidogrel

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

**Que contient cette notice :**

1. Qu'est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix
3. Comment prendre Plavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Plavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. QU'EST-CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Plavix contient du clopidogrel et appartient à une classe de médicaments appelés

antiagrégants plaquettaires. Les plaquette et qui s'agrégent lors de la coagulation du antiagrégants plaquettaires réduisent le risque appelé thrombose).

Plavix est utilisé chez l'adulte pour éviter les vaisseaux sanguins (artères) devenus rigides l'athérosclérose peut conduire à la survenue d'un accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque. On vous a prescrit Plavix pour empêcher l'

de survenue de tels événements graves.

- Vous avez des artères qui se sont rigo...
- Vous avez déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une artérite des membres inférieurs, ou
- Vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou "d'infarctus du myocarde" (crise cardiaque). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace. Votre médecin a donc également vous prescrire de l'acide acétylsalicylique

peau, pouvant apparaître comme des petites têtes d'épingles rouges, accompagné ou non de fatigue extrême inexplicable, confusion, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse) (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").

- Si vous vous coupez ou si vous vous blessez, l'arrêt du saignement peut demander plus de temps que d'habitude. Ceci est lié au mode d'action de votre médicament qui empêche la formation de caillots sanguins. Dans le cas de coupures ou blessures superficielles (par exemple au cours du rasage), vous ne devriez généralement rien constater d'anormal. Cependant, si ce saignement vous préoccupe, vous devez en avertir immédiatement votre médecin (voir rubrique 4 "Effets indésirables éventuels").
- Votre médecin pourra vous demander de pratiquer des examens sanguins.

**Enfants et adolescents**

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants en raison de l'absence d'efficacité.

**Autres médicaments et Plavix**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Certains médicaments peuvent exercer une influence sur l'utilisation de Plavix ou vice-versa.

**Vous devez informer avec précision votre médecin si vous prenez :**

- des médicaments qui peuvent augmenter votre risque de saignement tels que :
- des anticoagulants oraux (médicaments utilisés pour diminuer la coagulation du sang), un anti-inflammatoire non stéroïden, médicament utilisé habituellement pour traiter la douleur et/ou les maladies inflammatoires des muscles ou des articulations, de l'héparine ou tout autre médicament injectable utilisé pour diminuer la coagulation du sang,
- de la ticlopidine, un autre antiagrégant plaquetttaire,
- un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (incluant notamment la fluoxétine ou la fluvoxamine), médicament utilisé habituellement dans le traitement de la dépression,
- de l'oméprazole ou de l'ésoméprazole pour des maux d'estomac,
- du fluconazole ou du voriconazole, qui sont des médicaments utilisés dans le traitement d'infections fongiques,
- de l'efavirenz, ou d'autres traitements intéractifs (utilisés pour traiter les infections au VIH),
- de la carbamazépine
- du moclobémide, p
- du répaglinide, mé
- du paclitaxel, médi
- des opioïdes, si vous opioïde ne vous soi

**LOT/BATCH**

FAB/MFG

EA1644

EXP

03/23

SN

02/2026  
100F44C02K1CAV



Si vous avez eu une douleur dans le dos ou dans les membres inférieurs, ou si vous êtes prescrit en association avec de l'acide acétylsalicylique, nombreux médicaments utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Une utilisation occasionnelle d'acide acétylsalicylique (pas plus de 1000 mg sur une période de 24 heures) ne devrait généralement pas poser de problèmes, mais une utilisation prolongée dans d'autres circonstances doit être discutée avec votre médecin.

**Plavix avec des aliments et boissons**

Notice : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

**CRESTOR 5 mg, comprimé pelliculé**  
**CRESTOR 10 mg, comprimé pelliculé**  
**CRESTOR 20 mg, comprimé pelliculé**

Rosuvastatine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CRESTOR, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase -  
code ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

CRESTOR vous a été prescrit parce que :

- Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé.

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires)
- Si vous prenez d'organes) greffes d'organes)

Si vous êtes concerné (doute), parlez-en à vot

De plus, vot  
plus élevé

• Vous a  
demandé

• Vous a  
des ant

ou si vo  
médicam

• Vous a  
d'alco

• Vous a  
vietnam

• Vous ét  
de chole

Si vous êtes con  
doute), parlez-en à vot

Avertissements et précautions

Maphar  
Bd Alkmia N° 6, Qi,  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Crestor 5mg cp peli b30  
P.P.V : 114.10 DH

6 118001 183104

Lot 24453

Exp 01 2025

Fab : 02 2022

—



emple lors de

il vous avez un

le

s,

es

autre

bo

med

taux

de

au

vez

un