

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 4249 Société : RAM 173276

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

FAKIR - ABID

Date de naissance :

1.1.1950

Adresse :

13 Mohamed Abdelli Bougogne

Tél. : 0662.17.98.27

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 18/08/2023

Nom et prénom du malade : QARRAS Fouzia

Lui-même

Conjoint

Enfant

Lien de parenté :

Age:

Nature de la maladie : Dermatosc

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18.02.23	Cg		30000	Dr. Ouafae BENHIBA Dermatologue - Vénérologue Anglais, Tantanet Avenue Dr Sijilmassi Rés. Saint Len Etage 1000 Casablanca +212 62 41 47 09 15

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Mekhla El Aoud Directeur en Pharmacie Pharmacie 1200 10, bd Bourguiba - Casablanca 05 22 48 21 47 / 05 22 29 19 18 092010982	18/08/23	28,00
	28/08/23	168,00

ANALYSES - RADIographies

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
	D 00000000 35533411	B 00000000 11433553		MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



Médecine esthétique - Cosmétologie - Lasers

Maladies et chirurgies de la peau, cheveux et ongles

Maladies sexuellement transmissibles - Allergies - Brûlures

Diplôme de dermatologie esthétique, cosmétologie et lasers - Besançon

Diplôme de dermatologie pédiatrique - Montpellier

Diplôme de dermatologie et maladies du système - Paris

الدكتورة وفاء بنهيبة

اختصاصية في الأمراض الجلدية والتناسلية

طب التجميل والعلاج بالليزر

أمراض و جراحة الجلد و الشعر والأظافر

الامراض المتنقلة جنسيا - الحساسية - البروائق

دبلوم طب التجميل والعلاج بالليزر - بيرنستون

دبلوم الامراض الجلدية عند الاطفال - مونتوليبي

دبلوم الامراض الجلدية والباطنية - باريس

Casablanca le :

الدارالبيضاء في :

28/08/2023

Mme DARRAS Fouzia

28,00

AGIDERM CREME

1 application, matin et soir



160,00

MEBO CREME

1 application, matin et soir



PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE, 04/09/2023

Total = 168,00.



Angle Bd TanTan et avenue Dr Sijilmassi (ex. Bd du phare), résidence Sami,
1er étage, Appt 3, Bourgogne - Casablanca

Tél: 05 22 36 55 77 / 06 41 47 09 15 - E-mail : drbenhiba@gmail.com

زاوية شارع طانطان و شارع الدكتور سليماني (شارع المنار سابقا)، اقامة سامي، الطابق الاول، شقة 3، بوركون - الدار البيضاء

الهاتف : drbenhiba@gmail.com - 06 41 47 09 15 / 05 22 36 55 77

Médecine esthétique - Cosmétologie - Lasers
Maladies et chirurgies de la peau, cheveux et ongles
Maladies sexuellement transmissibles - Allergies - Brûlures
Diplôme de dermatologie esthétique, cosmétologie et lasers - Besançon
Diplôme de dermatologie pédiatrique - Montpellier
Diplôme de dermatologie et maladies du système - Paris



الدكتورة وفاء بنهيبة
اختصاصية في الأمراض الجلدية والتناسلية

طب التجميل والعلاج بالليزر
أمراض وجرأة الجلد و الشعر والاظافر
الامراض المتنقلة جنسيا - الحساسية - الدروق
دبلوم طب التجميل والعلاج عند الاطفال - بيزنوسون
دبلوم الامراض الجلدية عند الاطفال - مونتولى
دبلوم الامراض الجلدية والباطنية - باريس

Casablanca le :
الدارالبيضاء في :

18/08/2023

Mme DARRAS Fouzia

CICAPLAST BAUME B5+

1 APPLICATION 3 FOIS PAR JOUR SUR LES LESIONS



AGIDERM CREME

1 application, matin et soir



PROCHAIN RENDEZ-VOUS LE, 28/08/2023

- Total = 28,00.



Angle Bd TanTan et avenue Dr Sijilmassi (ex. Bd du phare), résidence Sami,
1er étage, Appt 3 , Bourgogne – Casablanca
Tél: 05 22 36 55 77 / 06 41 47 09 15 - E-mail : drbenhiba@gmail.com

زاوية شارع طانطان و شارع الدكتور سجلماسي (شارع المغاربة سابقا)، اقامة سامي، الطابق الاول، شقة 3، بورگون - الدار البيضاء
الهاتف : 05 22 36 55 77 / 05 22 36 55 77 - البريد الالكتروني : drbenhiba@gmail.com

ميبيو

Extrait de l'huile de sésame
Excipient
Excipient à effet notable
Conserver à une température
Ne pas laisser à portée des enfants
Pour les indications:

PPV: 140,00 Dhs

لم يرقم
بياناته على ملصق الدواء
عمره مدة 30 عاماً
تم إدخال هذه النشرة جيداً قبل استعمال هذا الدواء، حيث أنها تحتوي على معلومات هامة:
يجب عليك استعمال هذا الدواء بدقة وفقاً لتعليمات المذكورة في هذه النشرة أو وفاً لبياناته.
- احتفظ بهذه النشرة، فربما تحتاج أن تقرأها مرة أخرى.
- في حال كان لديك أي استفسار تتعلق بهذا المستحضر، فقم بالاتصال بـ طبلك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه.
- إن هذا المستحضر قد تم صيانته خصيصاً لك بناءً على وصفة طبية، وبهذا يجب عليك عدم إعطائه لأي شخص قد يلحقضرر به، حتى وإن كان هذا الشخص يعاني من نفس الأعراض التي تعاني منها.
- قم بالاتصال بـ طبلك المعالج أو الصيدلي الذي تتعامل معه في حال زيادة حدة التأثيرات الجانبية أو ملاحظة حدوث آية تأثيرات جانبية ولم يتم تذكرها في هذه النشرة.

- تحتوي هذه النشرة على:
1. ما هو ميبيو، وما هي استعمالاته؟
2. ما عليك معرفته قبل استعمال ميبيو؟
3. كيفية استعمال ميبيو.
4. التأثيرات الجانبية المحتملة حدوثها.
5. طرق تخزين ميبيو.
6. معلومات إضافية.

1. ما هو ميبيو، وما هي استعمالاته؟

تم إدخال هذا الدواء على السوق المغربية للطوارئ في الممارسة الطبية لمدة عددين من الزمن من الصنف.
كان ميبيو هذا الدواء هو تعزيز الحرج الراحي المضيبي بهدف زيادة صلابة اللسان الطبيعية، بحيث يتم تسهيل هجرة الخلايا الفرعية، ومبادرات اللقح وكذلك التفاعل مع عوامل النمو.
ولذلك تم إدخاله (برقم إدخال السوق المغربية للطوارئ) في المردم المطهور صحيحاً لتنمية هذه المعايير.
طريقة العمل:

الرمز التشريحي العلاجي: D03A. مستحضرات لعلاج الحرج والقرح والتسلّل.

يعد ميبيو على:
• تقوية الأنسجة المترتبة على سطوح الجلد، تحسين تجدد وتنفس الأنسجة.
• تحفيز النكير المصعد للخلايا، مما يتيح بذلك للتخلص من الامحرار والتورم الناتجين عن الحرج والقرح.
• تحفيز أجزاء من الجسم لتنمية نعم المستعمرات الميكانية والطيفية.
• عزل وحماية الهياكل الحيوانية المصابة والمكتوحة، مما يتيح بذلك تأثيراً مسكنأً.
• توفير إمداداً موهماً يساعد في إيقاف اللثاميات في منطقة الحرج.
• جعل الأنسجة المصعدة متغيرة على هيئة سائل.

يعد ميبيو ذات مفعول طفيف على الأنسجة المصعدة في نفس الوقت بالمقارنة على تصرف العصارات الناتجة عن الحرج والقرح على إبط العارضات مع المحيط الداري.
• يقلل إفراز السوائل من منطقة اللثاميات (الحروق).
• انتصاف العصارة الكافية في منطقة الحرج.
• تعييل وتسهيل بناء السويع العطالي للجلد مع المحافظة على مظهر جسماني مقبول.

- بيان الأستعمال:

• العروق السanguine ذات المسماكة الجزيئية والتفريحات الجلدية.
• الحرج الصحري الحاد، الدروع والخدوش.
• مع ضبابات الحرج المزمنة والأنسجة المصعدة من الجلد.
• تخفيف كعب القدم المدقع، تخفيف حملة الكي، تفريغ الأعنة المخاطية.
2. ما الذي يجب معرفته قبل استعمال ميبيو؟

- مواعيده ومتى يمكن استخدامه.

يجب عدم استعمال ميبيو من قبل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه أي من مكوناته.
التطهيرات والاحتياطات الخاصة قبل الاستعمال:
• يبعد ميبيو عن الأسطح التي يتعذر إزالتها.
• قد يتغير مظهر الدارجي لـ ميبيو خلال تخزينه وعلى الأخص خلال المراسم الحرارية، ولكن دون أن يؤثر ذلك على فعاليته.
• يحتوي هذا المستحضر على زيت السمسم، وقد يسبب في حالات نادرة حدوث تفاعلات تحسسية شديدة.
التفاعلات الدوائية وأشكال التفاعلات الأخرى:
• لم يتم الإبلاغ عن آية تفاعلات دوائية معروفة.
التفاعل مع الطعام والشراب:
لا ينصح.

- القصور والحمل والرضاعة الطبيعية

تم استخدام هذا المستحضر لمدة عددين من الزمن من قبل النساء الحوامل والمرضعات دون الإبلاغ عن حدوث آية تأثيرات جانبية.
الأطفال:
يعد ميبيو آمن للاستخدام من قبل الأطفال.

التأثيرات على القدرة على القراءة واستخدام الآلات:
من غير معتمد أن يؤثر ميبيو على القدرة على القراءة واستخدام الآلات.

- الإيابوصون:

- مواقيع ذات تأثير معروفة: زيت السمسم.

3. كيفية استعمال ميبيو؟

- مواعيده ومتى يمكن استخدامه:

- يستخدم من طريق الماء.

AGIDERM 2%, Crème

Acide Fusidique

Voie cutanée

Tube de 15 g

La

Veuillez lire
importante
Vous deve
votre phar
LOT : 336
• 12/25
• 28,00 DH
L'etite notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice ou par
besoin de la relire.

- Gardez cette notice, vous pourrez y faire référence.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- 1) Qu'est-ce que AGIDERM 2%, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2) Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AGIDERM 2%, crème ?
- 3) Comment prendre AGIDERM 2%, crème ?
- 4) Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5) Comment conserver AGIDERM 2%, crème ?
- 6) Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que AGIDERM 2%, crème et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Antibiothérapie locale, code ATC : D06AX01.

L'acide fusidique est un antibiotique de structure stéroïdienne, de la famille des fusidanines.

Indications thérapeutique : Ce médicament est préconisé dans le traitement des infections de la peau provoquées par une bactérie appartenant à la famille des staphylococques ou des streptocoques.

➤ impétigos et dermatoses impétigoïnées :

- en traitement local uniquement dans les formes localisées à petit nombre de lésions ;
- en traitement local d'appoint en association à une antibiothérapie générale adaptée dans les formes les plus étendues ;
- Désinfection des gîtes microbien cutanéo-muqueux, chez les porteurs sains de staphylococques, et après staphylococcie, notamment furonculose.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AGIDERM 2%, crème ?

Contre-indications :

N'utilisez jamais AGIDERM 2% crème : Si vous êtes allergique à l'acide fusidique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

En cas de doute, il est nécessaire de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi : Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser AGIDERM 2%, crème. Ce médicament contient de la Glycérine, l'Alcool céstostéarylique, Hydroxybenzoate de méthyle et hydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales. En cas d'utilisation de AGIDERM sur le visage, la zone proche de l'œil doit être évitée, car les excipients présents dans la forme pommade peuvent provoquer des irritations de la conjonctive.

Interactions médicamenteuses : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Aliments, boissons et de l'alcool : Sans objet.

Grossesse et allaitement : Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous allaitez, n'appliquez pas AGIDERM sur le sein. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : AGIDERM n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Excipients à effet notable : Ce médicament contient de la Glycérine, l'Alcool céstostéarylique, Hydroxybenzoate de méthyle et hydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales

3. Comment prendre AGIDERM 2%, crème ?

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie : Applications locales avec ou sans pansement, une ou deux fois par jour, après nettoyage de la zone infectée.

Evitez l'application en couche épaisse.

Durée du traitement : A titre indicatif, le traitement est limité à une semaine.

Si vous avez utilisé plus de AGIDERM 2%, crème que vous n'auriez dû : La survenue d'un surdosage est peu probable.

Veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser AGIDERM 2%, crème : N'appliquez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'appliquer.

Si vous arrêtez d'utiliser AGIDERM 2%, crème : Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables peu fréquents pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :

- Réactions cutanées locales (y compris dermatite de contact, eczéma) • Éruption cutanée (rash) • Démangeaison (prurit), rougeur de la peau (érythème) • Douleur au site d'application (y compris sensation de brûlure cutanée), irritation au site d'application

Effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

- Réaction allergique • Conjunctivite • Gonflement du cou et du visage • Urticaire • Cloque (phlyctène)

Si l'un des effets indésirables est grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires : Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc :

Site internet : <http://www.cappm.ma/>

5. COMMENT CONSERVER AGIDERM 2%, crème ?

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Composition qualitative et quantitative en substance(s) actives(s) et en excipients :

AGIDERM 2%, crème : 0,315 g

ACIDE FUSIDIQUE

Excipient q.s.p pour un tube de 15 g

Les autres composants sont : Alcool céstostéarylique, Paraffine Blanche molle, Polyoxy 40 stéarate, Paraffine liquide, Isopropyl myristate. Glycérine, Hydroxybenzoate de méthyle, Hydroxybenzoate de propyle, Eau déminéralisée

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : 24/03/2020

Tableau A (Liste I)



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA

Z.I.I₂ Tit Mellil - Casablanca -

PRLAGI01V01IMP EHS

AGIDERM 2%, Crème

Acide Fusidique

Voie cutanée

Tube de 15 g

La

Veuillez lire
importante
Vous deve
votre phar
LOT : 336
• 12/25
• 28,00 DH
L'etite notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations
en suivant scrupuleusement les instructions fournies dans cette notice ou par
besoin de la relire.

- Gardez cette notice, vous pourrez y faire référence.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes, il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?

- 1) Qu'est-ce que AGIDERM 2%, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
- 2) Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AGIDERM 2%, crème ?
- 3) Comment prendre AGIDERM 2%, crème ?
- 4) Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- 5) Comment conserver AGIDERM 2%, crème ?
- 6) Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que AGIDERM 2%, crème et dans quels cas est-il utilisé ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

Antibiothérapie locale, code ATC : D06AX01.

L'acide fusidique est un antibiotique de structure stéroïdienne, de la famille des fusidanines.

Indications thérapeutique : Ce médicament est préconisé dans le traitement des infections de la peau provoquées par une bactérie appartenant à la famille des staphylococques ou des streptocoques.

➤ impétigos et dermatoses impétigoïnées :

- en traitement local uniquement dans les formes localisées à petit nombre de lésions ;
- en traitement local d'appoint en association à une antibiothérapie générale adaptée dans les formes les plus étendues ;
- Désinfection des gîtes microbien cutanéo-muqueux, chez les porteurs sains de staphylococques, et après staphylococcie, notamment furonculose.

Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AGIDERM 2%, crème ?

Contre-indications :

N'utilisez jamais AGIDERM 2% crème : Si vous êtes allergique à l'acide fusidique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

En cas de doute, il est nécessaire de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Mises en garde spéciales et précautions d'emploi : Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser AGIDERM 2%, crème. Ce médicament contient de la Glycérine, l'Alcool céstostéarylique, Hydroxybenzoate de méthyle et hydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales. En cas d'utilisation de AGIDERM sur le visage, la zone proche de l'œil doit être évitée, car les excipients présents dans la forme pommade peuvent provoquer des irritations de la conjonctive.

Interactions médicamenteuses : Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Aliments, boissons et de l'alcool : Sans objet.

Grossesse et allaitement : Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous allaitez, n'appliquez pas AGIDERM sur le sein. Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : AGIDERM n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Excipients à effet notable : Ce médicament contient de la Glycérine, l'Alcool céstostéarylique, Hydroxybenzoate de méthyle et hydroxybenzoate de propyle qui peuvent provoquer des réactions cutanées locales

3. Comment prendre AGIDERM 2%, crème ?

Veuillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie : Applications locales avec ou sans pansement, une ou deux fois par jour, après nettoyage de la zone infectée.

Evitez l'application en couche épaisse.

Durée du traitement : A titre indicatif, le traitement est limité à une semaine.

Si vous avez utilisé plus de AGIDERM 2%, crème que vous n'auriez dû : La survenue d'un surdosage est peu probable.

Veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser AGIDERM 2%, crème : N'appliquez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'appliquer.

Si vous arrêtez d'utiliser AGIDERM 2%, crème : Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables peu fréquents pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100 :

- Réactions cutanées locales (y compris dermatite de contact, eczéma) • Éruption cutanée (rash) • Démangeaison (prurit), rougeur de la peau (érythème) • Douleur au site d'application (y compris sensation de brûlure cutanée), irritation au site d'application

Effets indésirables rares, pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000 :

- Réaction allergique • Conjunctivite • Gonflement du cou et du visage • Urticaire • Cloque (phlyctène)

Si l'un des effets indésirables est grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires : Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration :

Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc :

Site internet : <http://www.cappm.ma/>

5. COMMENT CONSERVER AGIDERM 2%, crème ?

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption figurant sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Composition qualitative et quantitative en substance(s) actives(s) et en excipients :

AGIDERM 2%, crème : 0,315 g

ACIDE FUSIDIQUE

Excipient q.s.p pour un tube de 15 g

Les autres composants sont : Alcool céstostéarylique, Paraffine Blanche molle, Polyoxy 40 stéarate, Paraffine liquide, Isopropyl myristate. Glycérine, Hydroxybenzoate de méthyle, Hydroxybenzoate de propyle, Eau déminéralisée

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée : 24/03/2020

Tableau A (Liste I)



Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique NOVOPHARMA

Z.I.I₂ Tit Mellil - Casablanca -

PRLAGI01V01IMP EHS