

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule :	2451	Société :	RAM
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	Retraité
Nom & Prénom :		AHRID Mustapha 133461	
Date de naissance :		1949	
Adresse :		Res. el fajr Imm. Rihane N°4 Hay el qods Sidi Bernoussi	
Tél. :		06 60 87 09 31	Total des frais engagés : 882 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :			
Date de consultation :	28/08/2023	Age:	
Nom et prénom du malade :		Ahrid Mustapha	
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même	<input type="checkbox"/> Conjoint	<input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :			
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :			
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.			

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.
 Fait à : Casablanca Le : 28/08/2023
 Signature de l'adhérent(e) :

31 AOUT 2023 IBRAHIM

R ACCUEIL

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
2010-03-2023	Chirurgie	02	140	DOCTEUR MATA SOUZA Tél : 0522-263-08-08
2010-03-2023	Consultation	01		MARINA SOUTO SOUZA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur "C"	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BLOC "C" Rue 2 N° 710 Bloc (C) Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca	30.08.23	102,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
ALYSES MEDICO-CHIRURGICALE 1er étage 101, rue de la Kasbah Bab El Oued Alhamdia Casablanca Maroc	23/08/23	R : 580	180,00



AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important:

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou Je traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				COEFFICIENT DES TRAVAUX												
				MONTANTS DES SOINS												
				DEBUT D'EXECUTION												
				FIN D'EXECUTION												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	<p>DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>H</td> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>00000000</td> <td>35533411</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>00000000</td> <td>11433553</td> </tr> </table> <p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	35533411	G	00000000	11433553	Coefficient des travaux
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	00000000	35533411														
G	00000000	11433553														
				MONTANTS DES SOINS												
				DATE DU DEVIS												
				DATE DE L'EXECUTION												

BILAN BIOLOGIQUE

Nom : Almidustapha

28/08/2023

INFLAMMATION

- CRP
- VS 1^{ère} heure et 2^{ème} heure

IONOGRAMME

- Potassium, Sodium, Chlore
- Réserve alcaline
- Protides totaux

BILAN LIPIDIQUE

- Triglycérides
- Cholestérol total
- Cholestérol HDL
- Cholestérol LDL

BILAN HEPATIQUE

- SGOT (ASAT), SGPT (ALAT)
- Gamma GT
- Phosphatases alcalines

BILAN URINAIRE

- Protéinurie des 24 heures
- ECBU
- Ionogramme urinaire

BILAN GLYCEMIQUE

- Glycémie à jeun
- Glycémie post prandiale
- HbA_{1c}

DIVERS

- Myoglobine
- Troponine
- Electrophorèse des protéines

HEMOGRAMME =

(NUMERATION- FORMULE -SANGUINE)

- Globules rouges - Hémoglobine
Hématocrite - Globules blancs...
- Plaquettes

BILAN DE LA FONCTION THYROÏDIENNE

- T3, T4, TSH

BILAN DE LA COAGULATION

- Taux de prothrombine
- INR
- TCA malade/TCA témoin
- Fibrinogène

BILAN DE LA FONCTION RENALE

- Créatinine
 - Urée plasmatique
- LABORATOIRES MEDICALES
3d. Imam
Lotis. Almadraba
Bettar ST - PSA Sablanca

EXPLORATION DE LA PROSTATE

ENZYMES MUSCULAIRES

- LDH
- CPK
- CPK-mb

Cachet

LABORATOIRE CBA D'ANALYSES MEDICALES



Dr Abdelaziz AMACHKI
Médecin Biologiste

لaboratoire
التدليل الطبية

HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BACTERIOLOGIE - BIOCHIMIE
VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - SPERMOLOGIE

INPE :
093064640

FACTURE N° 6877/23

CASABLANCA le
Nom et prénom
Référence
Médecin prescripteur

29/08/2023
MR AHRID MUSTAPHA
23H475
Docteur HACHIMI SOUMIA

Acte de biologie demandé	Cotation (B)
TRIGLYCERIDES	60
CHOLESTEROL TOTAL	30
GLYCEMIE A JEUN	30
Hb GLYCOSYLEE. HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE HBA1C	100
CREATININE SERIQUE	30
UREE (AZOTEMIE, UREMIE)	30
PSA. ANTIGENE SPECIFIQUE PROSTATIQUE	300
Total du (B)	B 580
Prise de sang (PC)	0,00 DH
Montant en DH	580,00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de: **CINQ CENT QUATRE-VINGT DIRHAMS**

LABORATOIRE C.B.A.
D'ANALYSES MEDICALES
Bd. Imam Chafii, N°7, Lot. 2C
otis. Al Hamadia Hay El Qods
Casablanca



Dr Abdelaziz **AMACHKI**
Médecin Biologiste

مختبر سبا
للتحاليل الطبية

HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BACTERIOLOGIE - BIOCHIMIE
VIROLOGIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - SPERMOLOGIE

Prélèvement du : 29/08/2023 à 08:05

Résultats édités le: 30/08/2023



Prescripteur: Docteur **HACHIMI SOUMIA**

MR AHRID MUSTAPHA

Dossier N° 23H475

Page: 2/2

HEMOGLOBINE GLYQUEE- HBA1C -
(Technique HPLC sur Automate TOSOH-GX)

HBA1C : 9,1 %

Profil du patient

Sujet non diabétique
Diabète de type 2 traité par antidiabétiques oraux
Diabète de type 2 traité par l'insuline
Patients avec insuffisance rénale chronique
Patients avec antécédents cardio-vasculaires
Diabète de type 1
Femme diabétique enceinte ou envisageant de l'être

HBA1C cible

4 à 6 %
Inf à 6,5 %
Inf à 7 %
Inf à 7,5 %
Inf à 8 %
Inf à 7 %
Inf à 6,5 %

MARQUEURS TUMORAUX
(Sur Automates VIDAS , Cobas E411 - Roche®)

ANTIGENE SPECIFIQUE PROSTATIQUE - PSA

(Technique : Electro-chimi-luminescence Cobas E411)

Résultat : 5,85 ng/ml

Interprétations:

< 40 ans	:	< 1,72 ng/ml
40 à 49 ans	:	< 2,19 ng/ml
50 à 59 ans	:	< 3.42 ng/ml
60 à 69 ans	:	< 6.16 ng/ml
> 69 ans	:	< 6.77 ng/ml

Demande validée biologiquement par: Dr AbdelAziz AMACHKI

LABORATOIRE C.B.A
D'ANALYSES MEDICALES
Dr. Abdelaziz Amachki

Total de pages: 2

Prélèvement du : 29/08/2023 à 08:05

Résultats édités le: 30/08/2023



Prescripteur: Docteur HACHIMI SOUMIA

MR AHRID MUSTAPHA

Dossier N° 23H475

Page: 1/2

BIOCHIMIE SANGUINE
(Sur Automate WIENER LAB® CM 250)

GLYCEMIE A JEUN.....: 1,43 g/l
(Technique : Colorimétrie enzymatique) 7,95 mmol/l

- 0,70 à 1,10 g/L : Taux normal
- Entre 1,10 et 1,26 g/L : Diminution de la tolérance au glucose
- > 1,26 g/L : Sujet diabétique

UREE.....: 0,49 g/l 0,15 à 0,50 g/l
(Technique: Enzymatique à l'Uréase) 8,13 mmol/l 2,49 à 8,30 mmol/l

CREATININE.....: 13,70 mg/l (*) 7,00 à 13,00
(Technique : Enzymatique à la Créatininase) 121,25 µmol/l 61,95 à 115,05

CHOLESTEROL TOTAL.....: 1,94 g/l
(Technique : Colorimétrie enzymatique)

Interprétation:

- < à 20 ans : 1,20 - 1,85 g/l
- 20 à 40 ans : < à 2,00 g/l
- > à 40 ans : < à 2,20 g/l

TRIGLYCERIDES.....: 1,22 g/l 0,40 à 1,50
(Technique enzymatique LPL-GK) 1,39 mmol/l 0,46 à 1,71

NB: Risque de pancréatite aiguë si TG = ou > 5 g/L (ou 5,6 mmol/L)

LABORATOIRE C.B.A.
D'ANALYSES MEDICALES
Dr. ABDELAZIZ AMACHKI

Docteur Soumia HACHIMI SLAOUI
Ex-Médecin à l'hôpital BOUAFI

Médecine Générale-Diabétologie

Hypertension - Nutrition

Gynécologie obstétrique

Médecine de sport

Echographie - ECG



الدكتورة سومية هاشمي السلاوي

طبيبة سابقاً بمستشفى محمد بوافي

الطب العام - داء السكري - أمراض الضغط

التغذية - أمراض النساء ومتابعة الحمل

الطب الرياضي - الفحص بالصدري

التخطيط الكهربائي للقلب

ORDONNANCE

Casablanca le:

الدار البيضاء، في :

Dr

Ahmed Mostafa

34,00 ₣³

Adm 850



T: 102,00

1 - 0 - 1

PHARMACIE BLOC "C"
BLOC (C)
GHOFFANE
N° 11, Sidi Bernoussi
Rue 2
Q Al Qods Casablanca

Opies

Hay
Bhay
Doc Dr HACHIMI SOUMIA
149, Angle Bd.Ali Yaataet Rue Ibn Baytar-Hay Mohammadi-Casablanca-Tel: 05.22.63.08.08
Tél : 05.22.63.08.08

05.22.63.08.08، زاوية شارع علي يعنة وزنقة بيطار الحي المحمدى - الدار البيضاء - الهاتف :

149, Angle Bd.Ali Yaataet Rue Ibn Baytar-Hay Mohammadi-Casablanca-Tel: 05.22.63.08.08

ADO®

Metformine

Formes et Présentations :

- Comprimés pelliculés à 1000 mg : boîte de 60

LOT : 4941
PER : 11-25
P.P.V : 34 DH 00

ADO 850 mg
Boîte de 60 comprimés pelliculés



6118000090038

met
(so
Exc
AD
Met
(soit
Exc
Prop
la m
bigua

Indic.

- Traitement du diabète de type 2, lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique ne sont pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique.
- ADO® peut être utilisé seul ou en association avec des antidiabétiques oraux ou avec l'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité au chlorhydrate de metformine,
- Diabète acidocétosique, précoma diabétique.
- Insuffisance rénale ou altération de la fonction rénale,
- Affections aiguës susceptibles d'altérer la fonction rénale telles que déshydratation, infection grave, choc, administration intramusculaire des produits de contraste iodés,
- Maladie aiguë ou chronique pouvant entraîner une hypoxie tissulaire telle que : insuffisance cardiaque ou respiratoire, infarctus du myocarde récent, choc...
- Insuffisance hépatocellulaire, intoxication alcoolique aiguë,
- Allaitement,
- Exploration des produits de contraste (UV-angiographie) en règle générale, à éviter chez les diabétiques, en cas de nécessité, interrompre le traitement 48 h avant et ne reprendre que 48 h après l'examen.

Précautions d'emploi :

La metformine peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre

(douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une général avec une fatigue intense pirez. Si vous vous trouvez dans le cas où peut-être besoin d'être traité pour recevoir un e lactique peut conduire à un suite de prendre ADO® et faire un médecin ou l'hôpital le

voque pas d'hypoglycémie (taux trop faible). Cependant, si vous le temps que d'autres traiter le diabète qui peuvent ycéémie (comme les sulfamides sulfonylure, les méglitinides), il y a un

Si vous ressentez des symptômes tels que des faiblesses, une augmentation de la transpiration, de la fréquence cardiaque rapide, des troubles de la vision, difficultés à vous concentrer, boire ou manger. Ce contenant du sucre devrait vous aider à mieux.

s médicamenteuses et autres

s :

ne consommez pas d'alcool pendant que vous prenez ce médicament. L'alcool peut augmenter les risques d'acidose lactique, particulièrement si votre foie est défaillant ou si vous êtes en sous-nutrition. Ceci s'applique également aux médicaments contenant de l'alcool.

Prévenez votre médecin si vous prenez ADO® en même temps que l'un des médicaments suivants. Il pourra alors être nécessaire de contrôler plus souvent votre glycémie ou d'ajuster la dose de ADO® :

- Si vous devez recevoir une injection de produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine, par exemple pour un examen radiographique ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre ADO® un certain temps avant et après de tels examens.
- diurétiques (utilisés pour éliminer une partie de l'eau de l'organisme en augmentant la production d'urine),
- agonistes des récepteurs bêta-2-adrénnergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme),
- corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme),
- autres médicaments utilisés pour traiter le diabète. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Lorsqu'une grossesse est envisagée ou pendant la grossesse, il est recommandé de ne pas traiter le diabète par la metformine mais d'utiliser l'insuline pour

ADO®

Metformine

Formes et Présentations :

- Comprimés pelliculés à 1000 mg : boîte de 60

LOT : 4941
PER : 11-25
P.P.V : 34 DH 00

ADO 850 mg
Boîte de 60 comprimés pelliculés



6118000090038

met
(so
Exc
AD
Met
(soit
Exc
Prop
la m
bigua

Indic.

- Traitement du diabète de type 2, lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique ne sont pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique.
- ADO® peut être utilisé seul ou en association avec des antidiabétiques oraux ou avec l'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité au chlorhydrate de metformine,
- Diabète acidocétosique, précoma diabétique.
- Insuffisance rénale ou altération de la fonction rénale,
- Affections aiguës susceptibles d'altérer la fonction rénale telles que déshydratation, infection grave, choc, administration intramusculaire des produits de contraste iodés,
- Maladie aiguë ou chronique pouvant entraîner une hypoxie tissulaire telle que : insuffisance cardiaque ou respiratoire, infarctus du myocarde récent, choc...
- Insuffisance hépatocellulaire, intoxication alcoolique aiguë,
- Allaitement,
- Exploration des produits de contraste (UV-angiographie) en règle générale, à éviter chez les diabétiques, en cas de nécessité, interrompre le traitement 48 h avant et ne reprendre que 48 h après l'examen.

Précautions d'emploi :

La metformine peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre

(douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une général avec une fatigue intense pirez. Si vous vous trouvez dans le cas où peut-être besoin d'être traité pour recevoir un e lactique peut conduire à un suite de prendre ADO® et faire un médecin ou l'hôpital le

voque pas d'hypoglycémie (taux trop faible). Cependant, si vous le temps que d'autres traiter le diabète qui peuvent ycéémie (comme les sulfamides sulfonylure, les méglitinides), il y a un

Si vous ressentez des symptômes tels que des faiblesses, une augmentation de la transpiration, de la fréquence cardiaque rapide, des troubles de la vision, difficultés à vous concentrer, boire ou manger. Ce contenant du sucre devrait vous aider à mieux.

s médicamenteuses et autres

s :

ne consommez pas d'alcool pendant que vous prenez ce médicament. L'alcool peut augmenter les risques d'acidose lactique, particulièrement si votre foie est défaillant ou si vous êtes en sous-nutrition. Ceci s'applique également aux médicaments contenant de l'alcool.

Prévenez votre médecin si vous prenez ADO® en même temps que l'un des médicaments suivants. Il pourra alors être nécessaire de contrôler plus souvent votre glycémie ou d'ajuster la dose de ADO® :

- Si vous devez recevoir une injection de produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine, par exemple pour un examen radiographique ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre ADO® un certain temps avant et après de tels examens.
- diurétiques (utilisés pour éliminer une partie de l'eau de l'organisme en augmentant la production d'urine),
- agonistes des récepteurs bêta-2-adrénnergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme),
- corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme),
- autres médicaments utilisés pour traiter le diabète. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Lorsqu'une grossesse est envisagée ou pendant la grossesse, il est recommandé de ne pas traiter le diabète par la metformine mais d'utiliser l'insuline pour

ADO®

Metformine

Formes et Présentations :

- Comprimés pelliculés à 1000 mg : boîte de 60

LOT : 4941
PER : 11-25
P.P.V : 34 DH 00

ADO 850 mg
Boîte de 60 comprimés pelliculés



6118000090038

met
(so
Exc
AD
Met
(soit
Exc
Prop
la m
bigua

Indic.

- Traitement du diabète de type 2, lorsque le régime alimentaire et l'exercice physique ne sont pas suffisant pour rétablir l'équilibre glycémique.
- ADO® peut être utilisé seul ou en association avec des antidiabétiques oraux ou avec l'insuline.

Contre-indications :

- Hypersensibilité au chlorhydrate de metformine,
- Diabète acidocétosique, précoma diabétique.
- Insuffisance rénale ou altération de la fonction rénale,
- Affections aiguës susceptibles d'altérer la fonction rénale telles que déshydratation, infection grave, choc, administration intramusculaire des produits de contraste iodés,
- Maladie aiguë ou chronique pouvant entraîner une hypoxie tissulaire telle que : insuffisance cardiaque ou respiratoire, infarctus du myocarde récent, choc...
- Insuffisance hépatocellulaire, intoxication alcoolique aiguë,
- Allaitement,
- Exploration des produits de contraste (UV-angiographie) en règle générale, à éviter chez les diabétiques, en cas de nécessité, interrompre le traitement 48 h avant et ne reprendre que 48 h après l'examen.

Précautions d'emploi :

La metformine peut provoquer une complication très rare mais grave appelée acidose lactique, en particulier si vos reins ne fonctionnent pas correctement. Le risque d'acidose lactique est également accru en cas de diabète non contrôlé, de jeûne prolongé ou de consommation d'alcool. Les symptômes de l'acidose lactique sont des vomissements, des maux de ventre

(douleurs abdominales) avec crampes musculaires, une général avec une fatigue intense pirez. Si vous vous trouvez dans le cas où peut-être besoin d'être traité pour recevoir un e lactique peut conduire à un suite de prendre ADO® et faire un médecin ou l'hôpital le

voque pas d'hypoglycémie (taux trop faible). Cependant, si vous le temps que d'autres traiter le diabète qui peuvent ycéémie (comme les sulfamides sulfonylure, les méglitinides), il y a un

Si vous ressentez des symptômes tels que des faiblesses, une augmentation de la transpiration, de la fréquence cardiaque rapide, des troubles de la vision, difficultés à vous concentrer, boire ou manger. Ce contenant du sucre devrait vous aider à mieux.

s médicamenteuses et autres

s :

ne consommez pas d'alcool pendant que vous prenez ce médicament. L'alcool peut augmenter les risques d'acidose lactique, particulièrement si votre foie est défaillant ou si vous êtes en sous-nutrition. Ceci s'applique également aux médicaments contenant de l'alcool.

Prévenez votre médecin si vous prenez ADO® en même temps que l'un des médicaments suivants. Il pourra alors être nécessaire de contrôler plus souvent votre glycémie ou d'ajuster la dose de ADO® :

- Si vous devez recevoir une injection de produit de contraste à base d'iode dans votre circulation sanguine, par exemple pour un examen radiographique ou un scanner, vous devrez arrêter de prendre ADO® un certain temps avant et après de tels examens.
- diurétiques (utilisés pour éliminer une partie de l'eau de l'organisme en augmentant la production d'urine),
- agonistes des récepteurs bêta-2-adrénnergiques comme le salbutamol ou la terbutaline (utilisés pour traiter l'asthme),
- corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections, notamment des inflammations sévères de la peau ou l'asthme),
- autres médicaments utilisés pour traiter le diabète. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

Grossesse :

Lorsqu'une grossesse est envisagée ou pendant la grossesse, il est recommandé de ne pas traiter le diabète par la metformine mais d'utiliser l'insuline pour