

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0041878

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1736 Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : KOTNI Amed

Date de naissance : 01 Janvier 1952

Adresse : LDI DAHA Rue 1 N° 36 Q. I. BERNAUSSI Casablanca

Tél. : 0672150702 Total des frais engagés : 612,10 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

**Docteur OUDGHIRI Jamal Eddine**

SPECIALISTE

MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

MEDECIN (spécialiste)

34, RUE ABDERRAHMANE SIDI BABA (Casablanca)

Tél : 0522 27 87 00 - CASABLANCA

08 Aout 2023

Age : 61

Cachet du médecin :

Date de consultation : 08 Aout 2023

Nom et prénom du malade : OUMALEK Khadija

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : Gastralgie intenses

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : Pathologie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Maladie

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 8/8/2023 Le : 8/10/2023

Signature de l'adhérent(e) : Signature

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin Attestant le Paiement des Actes
08 Aout 2023	G	(300 B4)	(300 B4)	Docteur OUDGHEM JEAN-PATRICK SPECIALISTE EN DENTISTE NIGERIEN MALADIES DE L'APPAREIL MASTICATOIRE 34, RUE DE LA CHAUMIERE 1000 BRUXELLES TÉL: 02 22 51 11 03

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE VENZO Dr. Chihouni Rida 113 Tél: 02 22 51 11 03	08.08.2023	312,10

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des travaux
	H 25533412 00000000 00000000 35533411	G 21433552 00000000 00000000 11433553	B	Montants des soins
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Date du devis
				Date de l'exécution
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur OUDGHIRI Jamal Eddine  
FACULTE DE MEDECINE DE MONTPELLIER(FRANCE)

Specialiste :

- C.E.S. DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF
- C.U. DE PROCTOLOGIE MEDICO-CHIRURGICALE
- DIPLOME D'UNIVERSITE : MALADIES METABOLIQUES
  - \* DIABETOLOGIE
  - \* NUTRITION
- \* MALADIES DU CHOLESTEROL- GOUTTE - OBESITE

AUTORISATION SECRETARIAT GENERALE  
DU GOUVERNEMENT  
N° 5741 du 30 NOVEMBRE 1982



الدكتور جمال الدين الودعيري

خريج كلية الطب بمونبولي (فرنسا)

اختصاصي :

أمراض الجهاز الهضمي والبواسير  
مرض المراة - مرض السكري -

أمراض التغذية - أمراض الكوليسترول

الدار البيضاء في 34 Rue Ait Baha  
Tél. : 0522.27.87.08

OUALEK KHALDZIA

Casablanca, le : 08 Aout 2023

1/ Ixor 200mg 10ml 24  
Népi Après le petit  
dejeuner

2/ Reflux acide 200mg 24 sticks  
1/2 heure Après les repas

3/ Metformine 400mg 12ml 14  
1 g à diluer dans  
1 verre d'eau, Après le déjeuner

PHARMACEUTIQUE KOUNOUZ  
Dr. KENZO  
Ed. Chahbouni, Route 13. Km 9.6  
Tal.Fax: 05 22 27 87 08  
Casablanca

Docteur OUDGHIRI  
Médecin

DIABETE 34 Rue Ait Baha (Ex. Ferdinand de Lesseps)  
CASABLANCA  
Tél. : 0522.27.87.08

05 22 27 87 08 . رقة الودعيري (Ex. Ferdinand de Lesseps) شارع بوردو - الدار البيضاء - الهاتف :

SUR Bd BORDEAUX - Email :oudghirijed@hotmail.com

34. Rue AIT BAH (Ex. Ferdinand de Lesseps) Casablanca - Tél : 05 22 27 87 08

# IXOR®

(Oméprazole)

## DENOMINATION D

- IXOR® Comprimés
- IXOR® Comprimés

Veuillez lire attentivement ce m  
importantes po  
Gardez ce m  
- Si vous avez d'  
à votre médecin

- Ce médicament donnez pas à **des personnes**, il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que l'IXOR® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre l'IXOR® ?
3. Comment prendre l'IXOR® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver l'IXOR® ?
6. Informations supplémentaires.

### 1 - QU'EST-CE QUE L'IXOR® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

#### - Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

Code ATC : A02BC01

l'IXOR® comprimé effervescent contient la substance active oméprazole. Il appartient à la classe des médicaments appelée inhibiteurs de la pompe à protons. Il diminue la quantité d'acide produite par votre estomac.

#### - Indications thérapeutiques

l'IXOR® comprimé effervescent est utilisé pour traiter les affections suivantes : ulcères digestifs.

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- Les ulcères de la partie haute de votre intestin (ulcère duodénal) ou de votre estomac (ulcère gastrique).

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

- Les ulcères de l'estomac associés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). l'IXOR® comprimé effervescent peut aussi être utilisé pour la prévention de ceux-ci si vous prenez des AINS.

- Un excès d'acide dans l'estomac, dû à une goutte au niveau du pancréas (goutte de Zollinger-Ellison)

chez les enfants.

#### Enfants âgés de plus d'un an et avec un poids corporel ≥ 10 kg

- Le reflux gastro-oesophagien (RGO). L'acide de l'estomac remonte au niveau de l'oesophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) entraînant douleur, inflammation et brûlures.

- Les symptômes chez l'enfant peuvent comprendre des remontées dans la bouche du contenu de l'estomac (régurgitation), des vomissements et une prise de poids limitée.

#### Enfants âgés de plus de 4 ans et adolescents

- Les ulcères infectés par une bactérie appelée Helicobacter pylori. Dans ce cas, le médecin peut également prescrire à votre enfant des antibiotiques qui permettent de traiter l'infection et de guérir l'ulcère.

### 2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE L'IXOR® ?

#### - Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

#### - Ne prenez jamais l'IXOR® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.

- Si vous êtes allergique à un autre inhibiteur de la pompe à protons (par exemple pantoprazole, lansoprazole, rabeprazole, esomeprazole).
- Si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).
- Si vous êtes dans une des situations décrites ci-dessus, ne prenez pas l'IXOR® comprimé effervescent. Vous avez des douleurs, parlez-en à votre pharmacien ou votre pharmacien avant de prendre l'IXOR® comprimé effervescent.
- En raison de la présence d'aspartame, ce médicament est contre-indiqué pour les personnes souffrant de maladie sucre.

#### - avec l'IXOR® (Mises en garde spéciales et règles d'emploi)

jeune en sodium chez les patients suivant un régime.

vviron 765,7 mg de sodium par comprimé

vviron 768,6 mg de sodium par comprimé

e médecin ou pharmacien avant de prendre l'IXOR® comprimé effervescent.

l'IXOR® comprimé effervescent peut masquer des symptômes et conséquent, avant que vous ne commencez à prendre l'IXOR® comprimé effervescent ou lorsque vous êtes sous traitement, vous devez informer immédiatement votre médecin si l'un des éléments suivants se produit :

- Vous perdez du poids sans raison ou si vous avez des problèmes d'avaler.

- Vous avez des douleurs à l'estomac ou une indigestion.

- Vous vomissez de la nourriture ou du sang.

- Vous avez des selles noires (teintes de sang).

- Vous souffrez de diarrhée sévère ou persistante, car l'oméprazole a été associé à une faible augmentation de diarrhées infectieuses.

- Si vous avez des problèmes hépatiques sévères.

- Si l'IXOR® est déjà arrivé de développer une réaction cutanée après un traitement avec un médicament similaire à l'IXOR® qui réduit l'acidité de l'estomac.

- Vous devez faire un test dans le sang spécifique (Chronomagrine A).

Si vous prenez l'IXOR® comprimé effervescent au long cours (durée supérieure à un an), votre médecin vous conseillera probablement de façon régulière. Vous devez définir précisément tous les symptômes et événements nouveaux ou exceptionnels quand vous voyez votre médecin.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons tel que l'IXOR® comprimé effervescent, en particulier sur une période supérieure à un an, peut légèrement augmenter le risque de fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres. Prévenez votre médecin si vous souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticoïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).

Si vous avez une éruption sur la peau, en particulier dans les zones exposées au soleil, prévenez votre médecin dès que vous le pouvez, car ce peut être également arrêter votre traitement avec l'IXOR®. Rappelez-vous de mentionner également tout autre effet indésirable tel que des douleurs dans vos articulations.

#### - Enfants

Certains enfants atteints d'une maladie chronique peuvent nécessiter un traitement à long terme bien que cela ne soit pas recommandé. Ne donnez pas ce médicament aux enfants de moins de 1 an ou <10kg.

#### - Prises d'autres médicaments (Interactions avec d'autres médicaments)

#### Autres médicaments et l'IXOR® comprimé effervescent

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avec préférence pris ou pourrez prendre tout autre médicament. Cela concerne également les médicaments que vous achetez sans ordonnance.

l'IXOR® comprimé effervescent peut interagir sur le fonctionnement d'autres médicaments et certains médicaments peuvent avoir un effet sur l'IXOR® comprimé effervescent.

Vous ne devez pas prendre l'IXOR® comprimé effervescent si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH).

Vous devez informer votre médecin ou pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Kétoconazole, itraconazole, posaconazole ou voriconazole (utilisés dans le traitement des infections fongiques);

- Digoxine (utilisé dans le traitement de problèmes cardiaques);

- Diazépam (utilisé dans le traitement de l'anxiété, de l'épilepsie ou comme relaxant musculaire);

- Phénytoïne (utilisé dans l'épilepsie); si vous prenez de la phénytoïne, une surveillance par votre médecin sera nécessaire à la fin de l'administration de l'IXOR® comprimé effervescent;

- Médicaments anti-coagulants pour fluidifier le sang tel que la

warfarine ou autres anti vitamines K; une surveillance par votre médecin sera nécessaire au début et à l'arrêt de l'administration de l'IXOR® comprimé effervescent;

- Rimapicline (utilisé pour traiter la tuberculose);

- Atazanavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH);

- Tacrolimus (dans le cas de greffe d'organe);

- Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé dans le traitement de la dépression modérée);

- Clofazimol (utilisé dans le traitement de la claudication intermittente);

- Siquinavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH);

- Clopidogrel (utilisé pour prévenir les caillots de sang (thrombus)).

- Elotributin (utilisé dans le traitement du cancer).

- Méthotrexate (médicament utilisé en chimiothérapie à forte dose dans le traitement du cancer) - si vous prenez une forte dose de méthotrexate, votre médecin peut temporairement arrêter votre traitement par l'IXOR® comprimé effervescent.

Si votre médecin vous a prescrit les antibiotiques suivants : amoxicilline et clarithromycine avec l'IXOR® comprimé effervescent pour le traitement d'un ulcère à Helicobacter pylori, il est important que vous informez votre médecin de tous les autres médicaments que vous prenez.

#### - Aliments et boissons (Interactions avec les aliments et les boissons)

l'IXOR® comprimé effervescent avec les aliments et boissons

les boissons. Les boissons effervescentes peuvent être prises avec de la nourriture ou le jus.

#### - Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

#### - Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

l'oméprazole est excrété dans le lait maternel mais il est peu probable qu'il y ait une influence sur l'enfant lorsqu'il est utilisé à doses thérapeutiques.

Votre médecin vous dira si vous pouvez prendre l'IXOR® comprimé effervescent pendant l'allaitement.

#### - Sports

Sans objet.

#### - Effets sur l'aptitude à conduire un véhicule ou à utiliser des machines

l'IXOR® comprimé effervescent n'est pas susceptible d'entrainer des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Des effets secondaires tels qu'un étourdissement et des troubles visuels peuvent se produire. Si c'est le cas, vous ne devez pas conduire de véhicules ou utiliser des machines.

#### - Excipients à effets notoires :

- Aspartam

- Sorbitol : en cas de régime désodé ou hyposodé, tenir compte de la teneur en sodium ;

- IXOR® 20 mg : environ 765,7 mg de sodium par comprimé effervescent

- IXOR® 10 mg : environ 768,6 mg de sodium par comprimé effervescent

### 3 - COMMENT PRENDRE L'IXOR® ?

#### - Instruction pour un bon usage

Veillez toujours à prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. Votre médecin vous dira combien de comprimés effervescent vous devez prendre et pendant combien de temps vous devez les prendre. Cela dépendra de votre état de santé et de votre âge.

- Mode et/ou voie(s) d'administration, fréquence d'administration et durée de traitement

#### - Posologie

Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

#### - Utilisation chez les adultes :

Traitement des symptômes du reflux gastro-oesophagien tels que brûlures et régurgitation acide ;

- Si votre médecin constate que votre oesophage a été légèrement endommagé, la dose recommandée est de 20 mg une fois par jour pendant 4 - 8 semaines. Votre médecin peut vous demander de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre oesophage n'a pas encore clairifié.

- La dose recommandée une fois que votre oesophage a été guéri est de 10 mg une fois par jour.

- Si votre oesophage n'a pas été endommagé, la dose usuelle est de 10 mg une fois par jour.

# REFLUXAID®

Comprimés à croquer anti-reflux

Sticks anti-reflux

Dans quel cas utiliser REFLUXAID®

REFLUXAID® est un dispositif destiné à être utilisé pour l'oesophagite.

L'utilisation du produit permet, de la difficulté à avaler la toux, et de l'enrouement.

#### Composition :

**COMPRIMÉS À CROQUER** : Sorbitol, Alginate de Magnésium, Extrait d'Anisum Stellatum, Extrait de Foeniculum Vulgare, Extrait de Chamomilla Recutita, Extrait de Lavandula Angustifolia, Extrait de Tilia Platiphylllos, stéarate de magnésium, acésulfame K, sucralose, arômes.

**SIROP (BOUTEILLE ET STICKS)** : Alginate de Magnésium, Extrait d'Anisum Stellatum, Extrait de Chamomilla Recutita, Extrait de Foeniculum Vulgare, Gomme de Xanthane, Lavandula, Extrait d'Angustifolia, Extrait de Tilia Platiphylllos, Sucralose, Methyl de sodium, p-hydroxybenzoate, p-hydroxybenzoate de propyle sodique, eau déminéralisée.

#### Formes :

Boîte de 24 comprimés à croquer (1 g)

Sirop 250 ml avec doseur

Boîte de 24 sticks de 10 ml

#### Mode d'emploi :

**COMPRIMÉS À CROQUER** : 1-2 comprimés après les repas et au moment du coucher.

**SIROP (BOUTEILLE ET STICKS)** : agiter avant utilisation. Chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans : 10-20 ml ou 1-2 sticks après les repas et au coucher. Enfants de moins de 12 ans : 1 demi-dose.

#### Contre-indications :

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à un composant.

#### Avertissements :

Ne pas dépasser la dose recommandée. En cas de réaction indésirable arrêter le traitement et consulter un médecin. Tenir hors de portée et de vue des enfants. Utiliser avant la date d'expiration indiquée sur l'emballage. La présence de substances naturelles peut affecter les caractéristiques organoleptiques du produit (odeur, couleur, goût) sans que cela n'affecte la qualité du produit. Conserver le produit à une température comprise entre 4° C et 30° C.

*Ne contient pas de gluten, de lactose et d'OGM.*

Dispositif médical



**Fabriqué par :**

Pharcomed S.r.l. - Via Soncino, 9 - 24050 Torre Pallavicina (BG) - Italie

CE

1370



**Distribué par :**

Promoplus Pharma - Hay Raja 2 N° 100 BP 401 Had Soualem - Maroc

Rev. 20/10/2020

## Notice: information du patient


# INexium 20 mg, comprimés gastro-résistants

## INexium 40 mg, comprimés gastro-résistants

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'avoir des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin d'en lire une autre.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement recommandé par votre médecin. Il pourrait leur être nocif, même à doses très faibles.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, contactez votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout élément de cette notice. Voir rubrique 4.



tient

les aux

dans

Traitement des ulcères dus à des infections par *Helicobacter pylori* et prévention de leur récidive :

- La dose recommandée est d'un comprimé gastro-résistant de INexium 20 mg deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous prescrira également des antibiotiques, par exemple amoxicilline et clarithromycine.

## Prise du médicament

- Vous pouvez prendre vos comprimés à n'importe quel moment de la journée.
- Vous pouvez prendre vos comprimés avec de la nourriture ou quand votre estomac est vide.
- Avez vos comprimés en entier avec un verre d'eau. Les comprimés ne peuvent être ni mordus ni écrasés, parce que les comprimés contiennent des granules enrobés qui empêchent que ce médicament soit altéré par l'acide dans votre estomac. Il est important de ne pas endommager les granules.

## Que faire si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés

- Si vous avez des problèmes pour avaler vos comprimés :
  - Mettez-les dans un verre d'eau plate (non gazeuse). N'utilisez pas d'autres liquides.
  - Remuez jusqu'à ce que le comprimé soit décomposé (le liquide n'est pas limpide). Vous pouvez boire le liquide immédiatement ou dans les 30 minutes. Remuez toujours le mélange avant de le boire.
  - Pour être sûr que vous avez pris toute la dose, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez ce liquide. Les particules solides contiennent le médicament. Elles ne doivent être ni mordues, ni écrasées.
- En cas d'impossibilité à avaler, le comprimé pourra être dispersé dans un peu d'eau et introduit dans une seringue. Il pourra alors être administré à l'aide d'un tube allant directement dans votre estomac (sonde gastrique).

## Utilisation chez les enfants de moins de 12 ans

INexium, comprimés gastro-résistants, n'est pas recommandé pour les enfants de moins de 12 ans. L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

## Personnes âgées

Aucun ajustement de dose n'est nécessaire chez les personnes âgées.

## Si vous avez pris plus de INexium que vous n'auriez dû

Si vous prenez plus de INexium que la dose prescrite par votre médecin, parlez-en immédiatement à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Si vous oubliez de prendre INexium

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Cependant, si vous avez déjà pris la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée.

Prenez une dose supplémentaire (double dose) pour compenser la dose que vous avez oubliée.

Si vous avez des questions sur ce médicament, demandez plus d'informations à votre pharmacien.

## Que contient cette notice :

- Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre INexium
- Comment prendre INexium
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver INexium
- Contenu de l'emballage et autres informations

## 1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium peut être utilisé dans la prévention des ulcères gastriques non stéroïdiens.

en forme de