

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
 0 Prise en charge : pec@mupras.com
 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : BARBRI 063701 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre

Nom & Prénom : BARBRI HABIBA NEUFI

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 15/08/2015

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Age :

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Signature de l'adhérent(e) :

Le :

ACCUEIL

VOLET ADHÉRENT

Déclaration de maladie N° M21-64792

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.
 Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule :

Nom de l'adhérent(e) :

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fourisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACEUTIQUE Lot. 1 Unité 6 Oulad Azaiez Casablanca. Tel: 15 22 35 99 92 Tél: 092 038 81	15/08/2023	293,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

SOFIA

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

The diagram illustrates the 12th edition of the International System of Units (SI) base units. It features a central vertical axis labeled 'H' at the top and 'B' at the bottom. A horizontal axis to the left is labeled 'D' on the left and 'G' on the right. The units are represented by circles with numerical values:

- Length:** Metre (m) is at the top, connected to second-order units like decimetre (dm), centimetre (cm), millimetre (mm), and micrometre (μm).
- Time:** Second (s) is at the bottom, connected to minutes (min), hours (h), days (d), weeks (w), months (mo), and years (a).
- Mass:** Kilogram (kg) is on the left, connected to tonnes (t), tonnes-force (t_f), kilograms-force (kg_f), and newton (N).
- Electric Current:** Ampere (A) is on the right, connected to coulombs (C), volt (V), ohm (Ω), and weber (Wb).
- Temperature:** Kelvin (K) is at the top, connected to degrees Celsius (°C).
- Luminous Intensity:** Candela (cd) is at the bottom, connected to lux (lx).

 The diagram shows how these base units are interconnected through various prefixes and derived units.

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr Reda HEJJOUJI

Spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie
et chirurgie Cervico-Faciale



الدكتور رضا حوجي

إخلاصي في جراحة الأذن، الأنف و الحنجرة
و جراحة الوجه و العنق

- Diplômé de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat
- Ancien Médecin du CHU de Montpellier
- Ancien Interne à l'Hôpital Universitaire de Poitiers

- خريج كلية الطب و الصيدلة بالرباط

- طبيب سابق بالمستشفى الجامعي بمونبلييه

- طبيب داخلي سابق بالمستشفى الجامعي بواتييه

ORDONNANCE

Casablanca Le:

15/8/23

Dr. Reda HEJJOUJI
Spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie
et Chirurgie Cervico-Faciale
INPE 201239970

PHARMACIE MOULAY AHMED
Lot. 1 Unité 6 Ouled Azzouz
Casablanca - Tel: 05 22 55 55 55

06.20

1) Cetodoxol plus perls

4 perls x 21 → 8,40

6

134,8

2) Levomec 1% SP : AGP x 21 → 6,10

15

* 3) Diflupred 100g 2sp

18 + 31 → 49

62,70

4) Aciclovir 500mg x 21

45

Total:

293,70

تجزئة 108، شقة 1، إقامة فردوس، الأشرفية، الدار البيضاء

Lot 108, Appt 1, Résidence Ferdaous, Oulala Casablanca

redahejjouji@gmail.com + 212 5 29 95 94 90

19/12/23

Dr. Neda HEJJOUJI
Medicine & Cardiology
Dr. Chirurgia Cervico-Viscerală
INPF 0912399820

CETRAXAL® PLUS 3 mg/ml+0.25 mg/ml

Solution pour instillation auriculaire
Ciprofloxacine / fluocinolone

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.


- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.



2. Penchez la tête d'
l'oreille atteinte vers



3. Installez les gouttes
à l'aide du compte-gouttes
ou les doigts afin
de prévenir la contamination.



4. Après avoir administré les gouttes, ci-dessous :

Pour les patients atteints d'une infection avec aérateur transstympanique: pendant la tête d'un côté, la personne qui administre CETRAXAL® PLUS doit appuyer doucement sur le conduit auditif (photo 4a) 4 fois en effectuant de pompage. Cela permettra aux gouttes de couler dans le tube dans l'oreille moyenne.

Pour les patients avec une infection sans aérateur transstympanique: pendant que le patient penche la tête d'un côté, qui administre CETRAXAL® PLUS doit appuyer doucement de l'oreille externe vers le haut et vers l'arrière. Cela permettra aux gouttes de couler dans l'oreille moyenne.

LOT N° : PER :

T 277 0 4 / 2025

FAB :

0 4 / 2023

PPV : 96,20 Dhs



so
éte
méd
ou rendez-vous au centre médical le p

Si vous oubliez d'utiliser CETRAXAL®
instillation auriculaire :

N'utilisez pas de dose double pour celles oubliées. Continuez votre traitement a

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CETRAXAL® PLUS 3 mg/ml+0.25 mg/ml, solution pour instillation auriculaire et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CETRAXAL® PLUS 3 mg/ml+0.25 mg/ml, solution pour instillation auriculaire ?
3. Comment utiliser CETRAXAL® PLUS 3 mg/ml+0.25 mg/ml, solution pour instillation auriculaire ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CETRAXAL® PLUS 3 mg/ml+0.25 mg/ml, solution pour instillation auriculaire ?
6. Informations supplémentaires.

1. Qu'est-ce que CETRAXAL® PLUS 3 mg/ml+0.25 mg/ml, solution pour instillation auriculaire et dans quels cas est-il utilisé ?

CETRAXAL® PLUS est une solution à usage auriculaire (dans l'oreille). Elle contient:

- La ciprofloxacine, un antibiotique appartenant au groupe appelé les fluoroquinolones. La ciprofloxacine agit en tuant les bactéries qui causent les infections.
- et l'acétonide de fluocinolone, un corticoïde ayant des propriétés antalgiques et anti-inflammatoires pour le traitement de gonflement et de la douleur.

CETRAXAL® PLUS est une solution de gouttes auriculaires. Elle est utilisée chez les adultes et chez les enfants âgés de 6 mois et plus pour le traitement des otites externes aiguës (infection de l'oreille externe) et des otites moyennes (infection de l'oreille moyenne) d'origine bactérienne en cas de mise en place de drains transstympaniques (tubes de tympanotomie). Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou que vous sentez moins bien.

LEVAMOX®

(Amoxicilline + acide clavulanique)

DENOMINATION DU MEDICAMENT

- LEVAMOX® 1 g/125 mg Comprimé effervescent adulte, boîte de 12, 16 et 24.
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Comprimé effervescent enfant, boîte de 12 et 24.
- LEVAMOX® 1 g/125 mg Poudre pour suspension buvable adulte en sachet-dose, boîte de 12 et 16.
- LEVAMOX® 500 mg/62,5 mg Poudre pour suspension buvable enfant en sachet-dose, boîte de 12.
- LEVAMOX® 50 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable nourrisson en flacon de 30 ml.
- LEVAMOX® 100 mg/12,5 mg par ml Poudre pour suspension buvable enfant en flacon de 60 ml.

(Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1)

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que LEVAMOX® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVAMOX® ?
3. Comment prendre LEVAMOX® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver LEVAMOX® ?
6. Informations supplémentaires

1 - QU'EST-CE QUE LEVAMOX® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

LEVAMOX® est un antibiotique qui tue les bactéries responsables des infections. Il contient deux molécules différentes, appelées amoxicilline et acide clavulanique. L'amoxicilline appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines », qui peuvent parfois arrêter d'être efficaces (être inactivés). L'autre constituant actif (l'acide clavulanique) empêche cette inactivation.

- Indications thérapeutiques

LEVAMOX® est utilisé chez l'adulte, chez l'enfant et chez le nourrisson pour traiter les infections suivantes :

- infections de l'oreille moyenne et des sinus,
- infections des voies respiratoires,
- infections des voies urinaires,
- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LEVAMOX® ?

- Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament :

LEVAMOX® contient de l'aspartam, si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucrels, contactez-le avant de prendre ce médicament.

- Ne prenez jamais LEVAMOX® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans LEVAMOX®.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique grave (d'hypersensibilité) à un autre antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou du cou.

• Si vous avez déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictere (jaunissement de la peau) lors de la prise d'un antibiotique.

Ne prenez pas LEVAMOX® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre LEVAMOX®.

- Faites attention avec LEVAMOX® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse,
- êtes traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urinez pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ou avant d'administrer LEVAMOX® à votre enfant.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable

de l'infection.

Selon les résultats, il pourra vous ou à votre enfant prescrire LEVAMOX® ou un autre médicament.

- Réactions nécessitant une attention particulière

LEVAMOX® peut aggraver certaines maladies ou engager, notamment des réactions allergiques, des convulsions intestin. Lorsque vous prenez ou votre enfant prend LEVAMOX®, surveillez certains symptômes afin de réduire les risques.

- Tests sanguins et urinaires

Si vous effectuez ou votre enfant effectue des analyses rouges ou explorations fonctionnelles hépatiques) ou des glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier. En effet, LEVAMOX® peut interner ces types de tests.

Tenez compte, au besoin, des teneurs en potassium et sodium.

- Enfants et adolescents

Demandez conseil au médecin de votre enfant ou au pharmacien à votre enfant s'il :

- souffre de mononucléose infectieuse,
- est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,
- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.


Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Le cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.



A-CERUMEN est conseillé pour l'adulte et l'enfant à partir de 6 mois en usage régulier en alternative des cotons tiges, pour faciliter l'élimination du cérumen, dissoudre les bouchons de cérumen et prévenir leur formation.

Composition

Tensio-actifs doux (sodium humectant, excipients q.s.)

Présentation

Étui de 10 unidoses de 2ml
Le conditionnement en unido

Posologie

- Pour l'hygiène régulière
- En présence de bouchons, le matin et soir.

Mode d'emploi

1. Pencher la tête du côté opposé de l'oreille à traiter.
2. Instiller la moitié du contenu d'une unidose dans l'oreille.
3. Laisser en contact environ 1 minute en massant la base de l'oreille.
4. Pencher la tête pour laisser s'écouler le produit et les résidus de cérumen.
5. Rincer avec du sérum physiologique ou de l'eau claire, et essuyer l'excédent.
6. Instiller l'autre moitié du contenu de l'unidose dans la seconde oreille si nécessaire, et répéter les étapes 3, 4 et 5.

Précautions d'emploi

A rincer. Ne pas introduire trop profondément l'embout de l'unidose dans le conduit auditif afin de ne pas l'irriter.

Contre-indications


Ne pas utiliser le produit en cas de perforation du tympan, d'otite et chez les porteurs d'aérateur transtympanique.

Mises en garde

Ne pas avaler. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas utiliser une unidose endommagée ou déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne. En cas de douleur au niveau de l'oreille, consultez votre médecin. Si les symptômes persistent ou s'accentuent, consultez votre médecin. Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif aux Laboratoires Gilbert - site internet : www.labogilbert.fr et/ou à l'Autorité Compétente nationale. **TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

Conditions de conservation

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'étui. Ne pas réfrigérer. Conserver à l'abri de la lumière. Conserver à une température comprise entre 10°C et 40°C.



Dr Reda HEJJOUJI

Spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie
et chirurgie Cervico-Faciale

- Diplômé de la faculté de Médecine et de pharmacie de Rabat
- Ancien Médecin du CHU de Montpellier
- Ancien Interne à l'Hôpital Universitaire de Poitiers



الدكتور رضا حجوji

اختصاصي في جراحة الأنف، الأنف و الحنجرة
و جراحة الوجه و العنق

- خريج كلية الطب و الصيدلة بالرباط
- طبيب سابق بالمستشفى الجامعي بمونبلييه
- طبيب داخلي سابق بالمستشفى الجامعي بواتييه

ORDONNANCE

Casablanca Le :

15/8/23

Dr Reda
HEJJOUJI
Spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie
et chirurgie Cervico-Faciale
INPF 29 1239970

Bordeaux Habibie

1) Inhalation ORL: 300ml

2) Aspirateur (D366) 10ml

Dr Reda HEJJOUJI
Spécialiste en Oto-Rhino-Laryngologie
et chirurgie Cervico-Faciale
INPF 29 1239970



تجزئة 108، شقة 1، إقامة فرونس، الألفة، الدار البيضاء

Lot 108, Appt 1, Résidence Ferdaous, Oulfa Casablanca

@redahejjouji@gmail.com + 212 5 29 95 94 90