

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0050504

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 2617 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : CHASIA MOHAMED

Date de naissance : 02/11/56

Adresse : HABITUELLE

Tél. : 0670274025 Total des frais engagés : 786,10 - Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : 04/09/2023 Age :

Nom et prénom du malade : CHASIA MOHAMED Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : CHRONIQUE

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 04/09/2023

Signature de l'adhérent(e) : ED



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
.....
.....
.....
.....
.....

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE ALJ 004 - Abdetlah Elmouman Casablanca 3334	01/06/2023	286.20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000

The diagram shows a circle divided into two halves by a horizontal axis. The top half contains circles numbered 1 through 8 in a clockwise direction starting from the top. The bottom half contains circles numbered 8 through 1 in a counter-clockwise direction. Arrows at the top and bottom indicate the direction of the sequence.

[Création, remont, adjonction]
tionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

tionnel Thérapeutique nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET SACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

صيدلية العلج

PHARMACIE ALJ

ALJ Mohamed Abdelilah

Université Paul Sabatier Toulouse

279, Bd Abdelmoumen

Casablanca 20100

Tel : 05.22.86.06.54



Casablanca le : 01/06/2023
Facture n° :

Client P.H.A.S.I.H. MOLHAMEN
ICE

Médicaments	Quantité	Prix. U.	Total
Cardio aspirin	3	27.70	83.10
Diamicro 60	1	78.70	78.70
Nebiflet	2	87.50	175.00
Sulcit	2	185.20	370.40
Tabor	1	79.00	79.00
			<u>786.20</u>
Sept cent quatre vingt six dirham et 20 cts			

العلج
ALJ PHARMACEUTICALS
ALJ Md. Abdelmoumen
279 Bd. Abdelmoumen Casablanca
Tel: 05.22.86.06.54

Pharmacie ALJ

279, Bd Abdelmoumen Casablanca

ICE : 001525945000041 – Patente : 34402734 – IF : 42044350 – RC : 180264

UT. AV.:

0 6 2 5

P.P.V

7 9 0 0

LOT N°:

G J 8 5 9 9

79,00

09366082/4

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.



CARDIOASPIRI

100 mg, comprimés gastro-résistants



Dans cette notice :

1. Qu'est ce que CardioAspirine 100 mg et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations nécessaires à connaître avant de prendre CardioAspirine 100 mg ?
3. Comment prendre CardioAspirine 100 mg ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CardioAspirine 100 mg ?
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST CE QUE CARDIOASPIRINE 100 MG ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

CardioAspirine contient comme principe actif l'acide acétylsalicylique. Ce dernier inhibe, à doses réduites déjà, l'agrégation des plaquettes sanguines. Grâce à un enrobage résistant à l'acidité gastrique, le comprimé ne se décompose pas dans l'estomac. C'est pour cette raison que CardioAspirine ménage la muqueuse gastrique.

قد تلاحظت خدمات، تزيف في الانف أو تزيف اللثة أو الجهاز البولي التناسلي، وكذلك التزيف بعد العملية الجراحية. زيادة في زمن النزف ممكن.
 تم الإبلاغ عن حالات الفشل الكلوي المفاجئ، إذا كنت في وضع علامات فرط الحساسية، التوقف عن استخدام الدواء واستشارة الطبيب.
 إذا لاحظت أثناء العلاج اللون الأسود للبازار، أو القيء مع الدم، يجب التوقف عن استخدام الدواء واستشارة الطبيب فورا.
 إذا لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبروا طبيبك أو الصيدلي.

5. كيف يحتفظ كارديوسبرين 100 ملغ ؟

يحفظ هذا الدواء بعيداً عنتناول الأطفال. في حالة تناول غير محكم (جرعة زائدة)، زوروا الطبيب في أقرب وقت. حدوث طنين في الأذن و/أو تعرق قد يشير إلى وجود جرعة زائدة. تحفظ الأقراص الملمسة في درجة 25 درجة منوية. لا يجب استعمال الدواء بعد التاريخ المبين على العلبة بعد عبارة « EXP ».
 ، استشروا طبيبك أو الصيدلي لأنهم يتوفرون على معلومات مفصلة خاصة بالمهنيين.

ريديوسبرين 100 ملغ ؟

د ملبس من كارديوسبرين 100، بتغليف مقاوم لحموضة المعدة على 100 ملغ من حمض سواغات.
 ، و سواغات.
 ة الخارجي؟

يتوفر كارديوسبرين في تغليف بداخله 30 قرص مقاوم لحموضة المعدة

آخر تاريخ تمت فيه الموافقة على هذه النشرة: دجنبر 2016.
 صاحب الرخصة : بايير، ش.م

برج إيفوار 1 - الطابق 3، شارع سيدى محمد بن عبد الله، مارينا - 20030 الدار البيضاء - المغرب
 المصنع

بايير أج

51368 ليغيركوزن - المانيا

Bayer
87066266

Cardiosporine 100 mg/30 caps
Acide acétylsalisyleique

P.P.V. : 27.70 DH



Bayer S.A.



قد تلاحظت خدمات، تزيف في الانف أو تزيف اللثة أو الجهاز البولي التناسلي، وكذلك التزيف بعد العملية الجراحية. زيادة في زمن النزف ممكن.
 تم الإبلاغ عن حالات الفشل الكلوي المفاجئ، إذا كنت في وضع علامات فرط الحساسية، التوقف عن استخدام الدواء واستشارة الطبيب.
 إذا لاحظت أثناء العلاج اللون الأسود للبازار، أو القيء مع الدم، يجب التوقف عن استخدام الدواء واستشارة الطبيب فورا.
 إذا لاحظت تأثيرات جانبية غير مذكورة في هذه النشرة، أخبروا طبيبك أو الصيدلي.

5. كيف يحتفظ كارديوسبرين 100 ملغ ؟

يحفظ هذا الدواء بعيداً عنتناول الأطفال. في حالة تناول غير محكم (جرعة زائدة)، زوروا الطبيب في أقرب وقت. حدوث طنين في الأذن و/أو تعرق قد يشير إلى وجود جرعة زائدة. تحفظ الأقراص الملمسة في درجة 25 درجة منوية. لا يجب استعمال الدواء بعد التاريخ المبين على العلبة بعد عبارة « EXP ».
 ، استشروا طبيبك أو الصيدلي لأنهم يتوفرون على معلومات مفصلة خاصة بالمهنيين.

ريديوسبرين 100 ملغ ؟

د ملبس من كارديوسبرين 100، بتغليف مقاوم لحموضة المعدة على 100 ملغ من حمض سواغات.
 ، و سواغات.
 ة الخارجي؟

يتوفر كارديوسبرين في تغليف بداخله 30 قرص مقاوم لحموضة المعدة

آخر تاريخ تمت فيه الموافقة على هذه النشرة: دجنبر 2016.
 صاحب الرخصة : بايير، ش.م

برج إيفوار 1 - الطابق 3، شارع سيدى محمد بن عبد الله، مارينا - 20030 الدار البيضاء - المغرب
 المصنع

بايير أج

51368 ليغيركوزن - المانيا

Bayer
87066266

Cardiosporine 100 mg/30 caps
Acide acétylsalisyleique

P.P.V. : 27.70 DH



O



une réaction équate en cas d'exposition solaire :

• L'efficacité d'UAT doit aussi être réexaminée avec attention chez les patients orthopédiques.

de la peau.

SURVEILLANCE DANS L'UNITE DE

EMERGENCE ADOLESCENTS

L'efficacité de SULIAT HCT

Surveiller (à partir de 6)

SULIAT peut être utilisé

façon unique : la prise

non quotidienne tenant

comme une guérison

intervalle, mais d'autre

Prise de SULIAT HCT, comp

Veillez à votre vie médicale

Votre médecin pourra avoir

que vous avez arrêté l'uti

Ne prenez pas SULIAT HCT

- Le ~~lithium~~ un médicament

- Les médicaments ou subis

potentiels ou des substituts

- Les IEC ou aliskiren (voir

précaution).

Faites attention en ce qui concerne

- L'alcool, les somnifères et les anesthésiques (des médicaments administrés aux patients ayant une intervention chirurgicale et

autres procédures);

- L'Aurantia (un médicament utilisé dans la maladie de Parkinson, utilisé également pour traiter ou prévenir certaines maladies

générales par les virus);

- Les anticholinergiques (des médicaments utilisés pour traiter différents types de troubles tels que les crampes intestinales, les

crampes de la vessie, l'asthme, le mal des transports, les spasmes musculaires, la maladie de Parkinson ainsi que pour faciliter

l'anesthésie);

- Les médicaments anti-épileptiques et thymo-régulateurs utilisés pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires (ex. Carbamazépine,

Phénobarbital, Phénytoïne, Fosphénytoïne, Primidone);

- La Cholestérinase, la Colestipol ou d'autres résines (des substances utilisées principalement dans le traitement des taux élevés de

lipides dans le sang);

- L'imavasatine (médicament utilisé pour contrôler des taux élevés de cholestérol);

- La Cyclosporine (un médicament utilisé en cas de greffe d'organe pour prévenir le rejet d'organe ou utilisé dans d'autres circonstances,

par exemple polyarthrite rhumatoïde ou la dermatite atopique);

- les médicaments cytotoxiques (utilisés dans le traitement des cancers), tels que le Méthotrexate ou le Cyclophosphamide;

- la Digoxine ou d'autres glycosides digitaux (médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques);

- Thрапасил, Diazem (médicaments à visée cardiologique);

- les produits à contrôlé iodés (agents utilisés dans le cadre d'un examen d'imagerie);

- les médicaments utilisés dans le traitement du diabète (antidiabétiques oraux tels que la Metformine ou les insulines);

- les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte, tels que l'allopurinol;

- les médicaments pouvant augmenter le taux de sucre dans le sang (béta-bloquants, Diazoxide);

- les médicaments pouvant induire des « torsades de pointes » (rythme cardiaque irrégulier) tels que les antiarythmiques

(médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques) et certains antipsychotiques;

- les médicaments pouvant réduire le taux de sodium dans le sang, tels que les antidépresseurs, les antipsychotiques et les

antiépileptiques;

- les médicaments pouvant réduire le taux de potassium dans le sang, tels que les diurétiques (médicaments faisant uriner), les

corticoïdes, les laxatifs, l'Amphotéricine ou la Pénicilline G;

- les médicaments utilisés pour augmenter la tension artérielle tels que l'adrénaline ou la noradrénaline;

- les médicaments utilisés dans le HIV/SIDA (ex. Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir);

- Médicaments utilisés pour traiter des mycoses (ex. Kétoconazole, Itraconazole);

- Les médicaments utilisés dans le traitement des ulcérations et de l'inflammation de l'œsophage (Carbénoxolone);

- Les médicaments utilisés pour soulager la douleur ou l'inflammation, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

dont les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2 (inhibiteurs de la Cox-2);

- Les décontractants musculaires (médicaments permettant le relâchement des muscles utilisés au cours des opérations);

- La Trinitrine/Nitroglycérine et autres nitrates ou autres substances appelées « vasodilatateurs »;

- Les autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension, dont la Méthyldopa;

- La Rifampicine (utilisée par exemple pour traiter la tuberculose);

- Le millepertuis;

- Dantriloène (perfusion pour traiter des anomalies graves de température corporelle);

- La Vitamine D et les sels de calcium.

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

SULIAT HCT avec des aliments, boissons et de l'alcool

Le pamplemousse et le jus de pamplemousse ne doivent pas être consommés par les personnes à qui SULIAT HCT a été prescrit.

C'est du au fait que le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent conduire à une augmentation des taux sanguins de la

substance active Amiodipine, pouvant induire une augmentation imprévue de l'effet hypotenseur de SULIAT HCT. Avant de

consommer de l'alcool, parlez-en à votre médecin. L'alcool peut provoquer une diminution plus importante de votre tension artérielle

et/ou augmenter la possibilité de sensation vertigineuse ou d'évanouissement.

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE OU THÉRAPIES ALTERNATIVES

Sans objet.

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'allaitement

Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre SULIAT HCT avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez

que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de SULIAT HCT.

SULIAT HCT est déconseillé en début de grossesse, et il ne doit pas être pris lorsque vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cel

pourrait nuire gravement à votre enfant s'il est utilisé après le troisième mois de grossesse.

Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. SULIAT HCT est déconseillé chez les femmes qui

allaient et leur médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou

un prématuré.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

EFFETS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE UN VÉHICULE OU À UTILISER DES MACHINES

Ce médicament peut provoquer des étourdissements, une somnolence, des nausées ou des maux de tête. Si vous présentez ces

symptômes, ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Ce médicament contient du sodium à prendre en considération les patients contrôlant leur apport en sodium.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT HCT ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou

pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou lieu d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Mode et/ou lieu d'administration

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour, en général le matin.

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

La dose habituelle de SULIAT HCT est d'un comprimé par jour.

- Il est recommandé de prendre le comprimé à la même heure chaque jour, de préférence le matin.

- Avalez les comprimés tels quels avec un verre d'eau.

- Vous pouvez prendre SULIAT HCT au cours ou en dehors des repas. Ne prenez pas SULIAT HCT avec du pamplemousse ou du jus de

pamplemousse.

Si selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Ne pas dépasser la dose prescrite.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de SULIAT HCT, comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin. Des soins médicaux

pourront être nécessaires.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT HCT, comprimé.

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel.

- Ne prenez pas deux comprimés pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou vot

utes adultes et de
Les patients âgés,
g), ils doivent faire

autre médicament
t, dans certains cas,
numéros ci-dessous

t des suppléments
sparine.
garde spéciales et

185,25

une réaction équate en cas d'exposition solaire :

• L'efficacité d'UAT doit aussi être réexaminée avec attention chez les patients orthopédiques.

de la peau.

SURVEILLANCE DANS L'UNITE DE

EMERGENCE ADOLESCENTS

L'efficacité de SULIAT HCT

Surveiller (à partir de 6)

SULIAT peut être utilisé

façon unique : la prise

non quotidienne tenant

comme une guérison

intervalle, mais d'autre

Prise de SULIAT HCT, comp

Veillez à votre vie médicale

Votre médecin pourra avoir

que vous avez arrêté l'uti

Ne prenez pas SULIAT HCT

- Le ~~lithium~~ un médicament

- Les médicaments ou subis

potentiels ou des substituts

- Les IEC ou aliskiren (voir

précaution).

Faites attention en ce qui concerne

- L'alcool, les somnifères et les anesthésiques (des médicaments administrés aux patients ayant une intervention chirurgicale et

autres procédures);

- L'Aurantia (un médicament utilisé dans la maladie de Parkinson, utilisé également pour traiter ou prévenir certaines maladies

générales par les virus);

- Les anticholinergiques (des médicaments utilisés pour traiter différents types de troubles tels que les crampes intestinales, les

crampes de la vessie, l'asthme, le mal des transports, les spasmes musculaires, la maladie de Parkinson ainsi que pour faciliter

l'anesthésie);

- Les médicaments anti-épileptiques et thymo-régulateurs utilisés pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires (ex. Carbamazépine,

Phénobarbital, Phénytoïne, Fosphénytoïne, Primidone);

- La Cholestérinase, la Colestipol ou d'autres résines (des substances utilisées principalement dans le traitement des taux élevés de

lipides dans le sang);

- L'imavasatine (médicament utilisé pour contrôler des taux élevés de cholestérol);

- La Cyclosporine (un médicament utilisé en cas de greffe d'organe pour prévenir le rejet d'organe ou utilisé dans d'autres circonstances,

par exemple polyarthrite rhumatoïde ou la dermatite atopique);

- les médicaments cytotoxiques (utilisés dans le traitement des cancers), tels que le Méthotrexate ou le Cyclophosphamide;

- la Digoxine ou d'autres glycosides digitaux (médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques);

- Thрапасил, Diazem (médicaments à visée cardiologique);

- les produits à contrôlé iodés (agents utilisés dans le cadre d'un examen d'imagerie);

- les médicaments utilisés dans le traitement du diabète (antidiabétiques oraux tels que la Metformine ou les insulines);

- les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte, tels que l'allopurinol;

- les médicaments pouvant augmenter le taux de sucre dans le sang (béta-bloquants, Diazoxide);

- les médicaments pouvant induire des « torsades de pointes » (rythme cardiaque irrégulier) tels que les antiarythmiques

(médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques) et certains antipsychotiques;

- les médicaments pouvant réduire le taux de sodium dans le sang, tels que les antidépresseurs, les antipsychotiques et les

antiépileptiques;

- les médicaments pouvant réduire le taux de potassium dans le sang, tels que les diurétiques (médicaments faisant uriner), les

corticoïdes, les laxatifs, l'Amphotéricine ou la Pénicilline G;

- les médicaments utilisés pour augmenter la tension artérielle tels que l'adrénaline ou la noradrénaline;

- les médicaments utilisés dans le HIV/SIDA (ex. Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir);

- Médicaments utilisés pour traiter des mycoses (ex. Kétoconazole, Itraconazole);

- Les médicaments utilisés dans le traitement des ulcérations et de l'inflammation de l'œsophage (Carbénoxolone);

- Les médicaments utilisés pour soulager la douleur ou l'inflammation, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

dont les inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2 (inhibiteurs de la Cox-2);

- Les décontractants musculaires (médicaments permettant le relâchement des muscles utilisés au cours des opérations);

- La Trinitrine/Nitroglycérine et autres nitrates ou autres substances appelées « vasodilatateurs »;

- Les autres médicaments utilisés pour traiter l'hypertension, dont la Méthyldopa;

- La Rifampicine (utilisée par exemple pour traiter la tuberculose);

- Le millepertuis;

- Dantriloène (perfusion pour traiter des anomalies graves de température corporelle);

- La Vitamine D et les sels de calcium.

INTERACTIONS AVEC LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

SULIAT HCT avec des aliments, boissons et de l'alcool

Le pamplemousse et le jus de pamplemousse ne doivent pas être consommés par les personnes à qui SULIAT HCT a été prescrit.

C'est du au fait que le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent conduire à une augmentation des taux sanguins de la

substance active Amiodipine, pouvant induire une augmentation imprévue de l'effet hypotenseur de SULIAT HCT. Avant de

consommer de l'alcool, parlez-en à votre médecin. L'alcool peut provoquer une diminution plus importante de votre tension artérielle

et/ou augmenter la possibilité de sensation vertigineuse ou d'évanouissement.

INTERACTIONS AVEC LES PRODUITS DE PHYTOTHERAPIE OU THÉRAPIES ALTERNATIVES

Sans objet.

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE ET L'allaitement

Grossesse

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte.

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre SULIAT HCT avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez

que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de SULIAT HCT.

SULIAT HCT est déconseillé en début de grossesse, et il ne doit pas être pris lorsque vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cel

pourrait nuire gravement à votre enfant s'il est utilisé après le troisième mois de grossesse.

Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter. SULIAT HCT est déconseillé chez les femmes qui

allaient et leur médecin pourrait choisir un autre traitement si vous souhaitez allaiter, surtout si votre enfant est un nouveau-né ou

un prématuré.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

EFFETS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE UN VÉHICULE OU À UTILISER DES MACHINES

Ce médicament peut provoquer des étourdissements, une somnolence, des nausées ou des maux de tête. Si vous présentez ces

symptômes, ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas d'outils ou de machines.

Ce médicament contient du sodium à prendre en considération les patients contrôlant leur apport en sodium.

3- COMMENT PRENDRE SULIAT HCT ?

Instructions pour un bon usage

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou

pharmacien en cas de doute.

Posologie, Mode et/ou lieu d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Mode et/ou lieu d'administration

- Prenez ce médicament par voie orale, au même moment de la journée chaque jour, en général le matin.

Posologie, Fréquence d'administration et Durée du traitement

La dose habituelle de SULIAT HCT est d'un comprimé par jour.

- Il est recommandé de prendre le comprimé à la même heure chaque jour, de préférence le matin.

- Avalez les comprimés tels quels avec un verre d'eau.

- Vous pouvez prendre SULIAT HCT au cours ou en dehors des repas. Ne prenez pas SULIAT HCT avec du pamplemousse ou du jus de

pamplemousse.

Si selon la manière dont vous allez réagir au traitement, votre médecin pourra vous proposer une dose plus forte ou plus faible.

Ne pas dépasser la dose prescrite.

Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de SULIAT HCT, comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin. Des soins médicaux

pourront être nécessaires.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre SULIAT HCT, comprimé.

- Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez et prenez ensuite la dose suivante au moment habituel.

- Ne prenez pas deux comprimés pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou vot

utes adultes et de
Les patients âgés,
g), ils doivent faire

autre médicament
t, dans certains cas,
numéros ci-dessous

t des suppléments
sparine.
garde spéciales et

185,25

une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivoloïd chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie $\geq 250 \text{ mol/L}$) n'est pas recommandée.

Précautions d'emploi

- Anesthésie générale : si vous devez subir une anesthésie générale prévenez l'anesthésiste que vous prenez du nébivoloïd.
- Fréquence cardiaque anormalement faible (en-dessous de 50-55 battements par minute au repos).
- Insuffisance cardiaque non traitée.
- Angine de poitrine (angor).
- Troubles de la conduite cardiaque (bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré).
- Mauvaise circulation au niveau des extrémités.
- Douleurs dans la poitrine au repos (ango de Prinzmetal).
- Diabète : une surveillance devra être effectuée chez les patients diabétiques, car certains symptômes de l'hypoglycémie peuvent être masqués (augmentation de la fréquence Aspirine ou problèmes respiratoires sévères actuels ou passés).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrenale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (mauvaise circulation au niveau des extrémités).
- Hypotension (pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg).

• Maux de tête.

• Etourdissements.

• Fourmillements, picottement au niveau des extrémités des membres.

• Constipation.

• Nausées.

• Diarrhée.

• Fatigue.

• Gonflement (des mains, des pieds ou d'une autre partie du corps).

Plus rarement, ont également été ri

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés
PPV 87DH50

V140977/01

O ■

- Troubles de la vue.
 - Raalentissement du rythme cardiaque, trc insuffisance car diaque, trc conduction cardiaque.
 - Diminution anormale de la pre: agravation d'une claudication il.
 - Respiration difficile.
 - Digestion difficile, gaz vomissements.
 - Démangeaisons, éruption cutanée.
 - Impuissance.
 - Douleurs de type crampes à la marche.
 - Dépression.
- Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10000) :
- Eyanoussissements
 - Aggravation d'un psoriasis (maladie de la peau - plaques roses squameuses)

face présentant les barres de sécabilité vers le haut - entre le pouce et l'index de chacune des mains, puis appliquer une pression vers le bas avec les pouces, le long d'une des barres de sécabilité (voir le dessin). Pour obtenir 1/4 de comprimé, recommencer la même opération à partir d'1/2 comprimé.



une surveillance particulière. Elle comprend une surveillance clinique avec mesure de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, et un électrocardiogramme si nécessaire.

Chez les sujets ayant une insuffisance rénale légère à modérée, aucun ajustement posologique n'est nécessaire étant donné que la phase de titration pour atteindre la dose maximale tolérée est individuellement ajustée. En l'absence de données, l'utilisation du nébivoloïd chez les patients atteints d'une insuffisance rénale sévère (créatininémie $\geq 250 \text{ mol/L}$) n'est pas recommandée.

Precations d'emploi

- Anesthésie générale : si vous devez subir une anesthésie générale prévenez l'anesthésiste que vous prenez du nébivoloïd.
- Fréquence cardiaque anormalement faible (en-dessous de 50-55 battements par minute au repos).
- Insuffisance cardiaque non traitée.
- Angine de poitrine (angor).
- Troubles de la conduite cardiaque (bloc auriculo-ventriculaire du 1er degré).
- Mauvaise circulation au niveau des extrémités.
- Douleurs dans la poitrine au repos (ango de Prinzmetal).
- Diabète : une surveillance devra être effectuée chez les patients diabétiques, car certains symptômes de l'hypoglycémie peuvent être masqués (augmentation de la fréquence Asyndrome ou problèmes respiratoires sévères actuels ou passés).
- Phéochromocytome non traité (*atteinte de la glande surrenale provoquant une hypertension artérielle sévère*).
- Acidose métabolique.
- Bradycardie (rythme cardiaque inférieur à 60 battements par minute) ou rythme cardiaque irrégulier (mauvaise circulation au niveau des extrémités).
- Hypotension (pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg).

Maux de tête.
Etourdissements.
Fournillements, picotements au niveau des extrémités des membres.
Essoufflement.
Constipation.
Nausées.
Diarrhée.
Fatigue.

Gonflement (des mains, des pieds ou d'une autre partie du corps).
Plus rarement, ont également été ri:
Cauchemars.

Troubles de la vue.
Raalentissement du rythme
insuffisance car diaque, trc
conduction cardiaque.
Diminution anormale de la pre:
agravation d'une claudication il:
Respiration difficile.
Digestion difficile,
 vomissements.
Démangeaisons, éruption cutan
Impuissance.
Doûleurs de type crampes à la marche
Dépression.

Effets indésirables très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10000) :
• Eyanouissments
• Aggravation d'un psoriasis (maladie de la peau - plaques roses squameuses)
face présentant les barres de sécabilité vers le haut - entre le pouce et l'index de chacune des mains, puis appliquer une pression vers le bas avec les pouces, le long d'une des barres de sécabilité (voir le dessin). Pour obtenir 1/4 de comprimé, recommencer la même opération à partir d'1/2 comprimé.

* VIGNETTE

NEBILET® 5mg
28 comprimés O ■
PPV 87DH50 V140977/01



DIAMICRON® 60 mg

Gliclazi

modifiée

Veuillez
car elle

- Garde
- Si vous
pharmacie

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. voir rubrique 4.

78,30

votre

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
3. Comment prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : sulfamide hypoglycémiant - dérivé de l'urée - code ATC : A10BB09

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est un médicament qui réduit le taux de sucre dans le sang (antidiabétique oral appartenant à la classe des sulfonylurées).

DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée est indiqué dans certaines formes de diabète (diabète de type 2 non insulino-dépendant) chez l'adulte, lorsque le régime alimentaire, l'exercice physique et la perte de poids seuls ne sont pas suffisants pour obtenir une glycémie (taux de sucre dans le sang) normale.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DIAMICRON 60 MG, COMPRIMÉ SÉCABLE À LIBÉRATION MODIFIÉE ?

Ne prenez jamais DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée :

- si vous êtes allergique au gliclazide ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6, ou à d'autres médicaments de la même classe (sulfonylurées), ou à d'autres médicaments apparentés (sulfamides hypoglycémiants) ;
- si vous avez un diabète insulino-dépendant (de type 1) ;
- si vous avez des corps cétoniques et du sucre dans vos urines (ce qui peut signifier que vous avez une acido-cétose diabétique), un pré-coma ou un coma diabétiques ;
- si vous souffrez d'insuffisances rénale ou hépatique sévères ;
- si vous prenez des médicaments pour traiter des infections fongiques (miconazole) (voir rubrique «Autres médicaments et DIAMICRON 60mg, comprimé sécable à libération modifiée») ;
- si vous allaitez (voir rubrique «Grossesse, allaitement et fertilité»).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DIAMICRON 60 mg, comprimé sécable à libération modifiée.

Vous devez respecter le traitement prescrit par votre médecin pour atteindre une glycémie normale. Cela signifie qu'à part la prise régulière du traitement, vous respectez un régime alimentaire, faites de l'exercice physique et, quand cela est nécessaire, perdez du poids.

Durant le traitement par gliclazide, un contrôle régulier de votre taux de sucre dans le sang (et éventuellement dans les urines), et également de votre hémoglobine glyquée (HbA1c), est nécessaire.

Dans les premières semaines de traitement, le risque d'hypoglycémie (faible taux de sucre dans le sang) peut être augmenté. Dans ce cas, un contrôle médical rigoureux est nécessaire.

Une hypoglycémie peut survenir :

- si vous prenez vos repas de manière irrégulière ou si vous sautez un repas,
- si vous jeûnez,
- si vous êtes malnutri,
- si vous changez de régime alimentaire,
- si vous augmentez votre activité physique et que votre apport en hydrates de carbone ne compense pas cette augmentation,
- si vous buvez de l'alcool, en particulier si vous sautez des repas,
- si vous prenez d'autres médicaments ou des remèdes naturels en même temps,
- si vous prenez de trop fortes doses de gliclazide,
- si vous souffrez de troubles hormonaux particuliers (troubles fonctionnels de la glande thyroïdienne, de la glande hypophysaire ou du cortex surrénalien),