

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage - Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-639024

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7988 Société :
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
 Nom & Prénom : RAHALI BRAHIM
 Date de naissance : 14 05 66
 Adresse : Apt 5 Imu 4 Résidence N WIAM
 Hay Hassan, 20220 Casa
 Tél. : 0661217567 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr AIT M'HAMED Laïla
PEDIATRE
249 Bd Yacoub Mansour, Résidence
Hassan, 2 étage, N°3, Hay Hassan
0522 39 39 04 / 0605 11 79 79

Date de consultation : 02/09/2023

Nom et prénom du malade : Rahali Ibrahim Age : 06 ans

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Maladie Pédiatrique 2023

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casa Le : 02/09/23

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
-----------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	--

02/09/2023 18 + 20d.

270,000dh

Dr AIT M'HAMED LAILA
PEDIATRE
249, Bd yaacoub mansour, Résidence Mansour, 2 étage, N°3, Hay Hassani
0522 39 39 04 / 0666 11 79 79
INSEE 091214551

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

PHARMACIE MASJID C.I.L.
Dj. Bouin Aboumeroudne
Lotissement du Sig
Boulevard E. Lelam C.I.L. - Casablanca
0522 39 89 73

02/09/2023

144,12

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien

Date des Soins

Nombre

AM

PC


IM

IV


Montant détaillé des Honoraires

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.



O.D.F
PROTHESES DENTAIRES



DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
G	
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتورة أيت محمد ليلي
إختصاصية في أمراض
الطفل والرضيع

Dr Ait M'hamed Laila
Pédiatre
Maladies du nouveau-né,
du nourrisson et de l'enfant


Cabinet
Pédiatrique

0210917028

Rahali Loub

avant 8 mois

1968



20,60 x 2

clavulin Eil Fruit Sirop

14,20

1968 x 3 jours

(avant ne pas)

x 08 jours

14,20

2 Enaler solution

1968

20,60 x 2

x 03 jours

PHARMACIE MASJID C.I.L.
Dr. Sonia Aboumerziane
N°22 - L'Ensemble du Stade
Hay Essalam - I.L. - Casa
T. 05 22 39 88 73

Dr AIT M'HAMED Laila
PEDIATRE
249, Bd Yacoub Mansour
Mansour, 2^{ème} étage N°3, Hay Hassan
0522 39 39 04 / 0666 11 79 79

249, Boulevard Yacoub El Mansour
Résidence El Mansour. 2^{ème} Etage. Apt3. Casablanca

T. 05 22 39 39 04 | Urgences. 06 66 11 79 79 | Email : draitmhamed@gmail.com

الفان، لاسما عند تناول جرعات مرتفعة.
 ظهرت على طفلك هذه الآثار الجانبية، فاصصل على إعطائه:
 100 ميلغرام / 12,50 ميلغرام لكل من لثاء الوجبات و
 500 ميلغرام / 62,5 ميلغرام "أكليس" قبل وجبات الطعام

ج (لدى الأطفال).

تبية قلبية الشبوع:

تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 100:

ج جدي، حكة،

ج جدي بارز مع حكة (شرى).

ر الهيم:

ج (الرأس).

تبية قلبية الشبوع التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:

يأخذ معدل بعض المواد (الأنزيمات) التي ينتجها الكبد.

تبية الشبوع:

تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 1000:

ج جدي، يمكن أن تكون منه تعديلات تشبه بقعا صغيرة (نقط سوداء مركزية محيط بها

جى عديدة الأشكال).

تظهر على طفلك هذه الأعراض، فقصص بطبيبك على وجه الاستعجال.

الآثار الجانبية الشبوع التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:

انخفاض عدد الخلايا التي تساهم في نخر الدم (الصفيحات)،

انخفاض عدد الكريات البيضاء.

آثار جانبية ذات تردد غير معروف:

لا يمكن تقدير التردد من خلال البيانات المتوفرة:

رود فعل تحسسية (انظر أعلاه).

التهاب الأمعاء الغليظة (انظر أعلاه).

التهاب الغشاء العائلي الذي يمحيط بالدمعاع (التهاب السحايا العقيم).

رود فعل الحادة:

طفح منتشر يصاحبه تجعدات وتورف الجلد، لاسما حول الفم والأنف والعينين وفي المفاصل.

وشكل من الطفح أكثر حدة يتسبب في اتصال جلدي حد (أكثر من 30 بالمائة من السطح).

طفح جلدي أحمر منتشر تصاحبه تجعدات صغيرة تحتوي على قرح (التهاب الجلد القفازي).

طفح حشوي أحمر تصاحبه كلال تحت الجلد وتعدت (بقار المشي).

متلازمة الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا مع طفح جلدي وحشي وتتضمن في العدد الليمفاوية.

خللا الدم البيضاء (رقط المحصنات وإزيمات الكبد) فرط التحسس من الأدوية.

إذ تظهر على طفلك أحد هذه الأعراض، فاقصص بطبيبك على الفور.

التهاب الكبد.

الفرقان، الذي ينتج عن ارتفاع معدل البيليروبين في الدم (وهي مادة ينتجها الكبد)، وتؤدي

من العين.

التهاب الكلى.

استطالة مدة نخر الدم.

فرط النشاط.

اختلاجات (لدى الأشخاص الذين يتناولون جرعات مرتفعة من كلافلان أو يعاقلون من مث

التسان الأسود (تشعر بالسان).

تورن الأسنان (تورن الأسنان)، ويختفي صوما عند فرش الأسنان.

الآثار الجانبية التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم أو البول:

انخفاض مهم في عدد الكريات البيضاء.

انخفاض عدد الكريات الحمراء (فقر الدم الانحلالي).

بالورات في البول.

التصريح بالآثار الجانبية:

إن شعر طفلك بأي أثر غير مستحب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي.

ينطبق ذلك على أي أثر غير مستحب لم يرد ذكره بهذه النشرة.

يمكنك أيضا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظام الإبلاغ الوطني أو على العنوان:

GlaxoSmithKline Maroc 42-44 تقاطع بوليفارد الرشيد وشارع أبو حامد الغزالي

الدار البيضاء 20000 أو على البريد الإلكتروني:

pharmacovigilance.na@gsk.com

5. كيف يمكن حفظ كلافلان؟

يحفظ بعيدا عن متناول ومراي الأطفال.

يرجى عدم استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدرج على العلوة. يرجع تاريخ انتهاء

شروط الحفظ:

- كلافلان 100 ميلغرام / 12,50 ميلغرام لكل مل، مسحوق لمستطقل قليل للشرب في قنينة

قبل التحضير: يحفظ داخل العلوة في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعيدا عن الرطوبة.

بعد التحضير: يحفظ المستطقل المحضر 4 أيام كحد أقصى في درجة حرارة ما بين 2+ و 8+ م.

كلافلان 500 ميلغرام / 62,5 ميلغرام مسحوق لمستطقل قليل للشرب في قنينة

يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعيدا عن الرطوبة.

لا ينبغي رمي الأدوية في مسالك الصرف الصحي أو مع الفضلات المنزلية. اطلب المشورة من

غير المستعمدة. قد تساعد هذه التنايير في حماية البيئة.

6. مخاطر إضافية:

ما الذي يعنوي عليه كلافلان 100 ميلغرام / 12,5 ميلغرام لكل مل، مسحوق لمستطقل قليل

PBV: 70,60 DH
 LOT: 650051
 PER: 08/2024

CLAVULIN
 100mg/12,50mg/1ml
 poudre suspension buvable, 60ml



1. Qu'est-ce que CLAVULIN ?
 2. Quelles sont les indications ?
 3. Comment utiliser ?
 4. Quels sont les effets secondaires ?
 5. Comment conserver ?
 6. Contenu de l'emballage.

1. QU'EST-CE QUE CLAVULIN ?
 Classe pharmacothérapeutique :
 CLAVULIN est un antibiotique, appelé amoxicilline et qui peut parfois arrêter l'inactivation.
 CLAVULIN est utilisé chez :

- infections de l'oreille ;
 - infections des voies respiratoires,
 - infections des voies urinaires,
 - infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
 - infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CLAVULIN ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de commencer le traitement.

Ne donnez jamais CLAVULIN à votre enfant :

- s'il est allergique à l'amoxicilline, à l'acide clavulanique, à la pénicilline ou à l'un des médicaments mentionnés dans la rubrique 6,

- s'il a déjà présenté une réaction allergique grave à un autre antibiotique. Ceci peut entraîner un gonflement du visage ou de la gorge,

- s'il a déjà eu des problèmes au foie ou développé un ictère (jaunissement de la peau).

→ Ne donnez pas CLAVULIN à votre enfant s'il est dans l'une des situations suivantes :

- En cas de doute, demandez conseil à son médecin, au pharmacien ou à l'infirmier.

Avertissements et précautions

Demandez conseil au médecin de votre enfant, au pharmacien ou à l'infirmier/ère avant de commencer le traitement.

- souffre de mononucléose infectieuse,

- est traité(e) pour des problèmes au foie ou aux reins,

- n'urine pas régulièrement.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser CLAVULIN.

Dans certains cas, votre médecin pourra rechercher le type de bactérie responsable de l'infection. Si les résultats, il pourra prescrire à votre enfant un dosage différent de CLAVULIN.

Señalar reacciones. Si reacciones, avisar al médico.

Reactions necessitant une attention particulière

CLAVULIN peut aggraver certaines maladies ou engendrer des effets secondaires graves. Si vous présentez l'un des symptômes suivants, consultez votre médecin.

allergiques, des convulsions et une inflammation du gros intestin. Lorsque votre enfant présente certains symptômes afin de réduire les risques. Voir « Réactions nécessitant une attention particulière ».

Tests sanguins et urinaux

Si votre enfant effectue des analyses de sang (nombre de globules rouges ou globules blancs) ou d'urine (dosage du glucose), vous devez informer le médecin ou l'infirmier avant de commencer le traitement.

CLAVULIN peut influer sur les résultats de ces types de tests.

Autres médicaments et CLAVULIN :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si votre enfant prend ou a récemment pris un autre médicament.

Si votre enfant prend de l'allopurinol (en traitement de la goutte) avec CLAVULIN, il est plus élevé.

Si votre enfant prend du probénécide (en traitement de la goutte), son médecin peut lui prescrire un autre médicament.

Si des médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine) sont prescrits, des analyses sanguines supplémentaires peuvent être requises.

CLAVULIN peut influer sur l'action du méthotrexate (un médicament utilisé pour traiter les rhumatismes).

CLAVULIN peut influer sur l'action du mycophénolate mofétil (traitement pour prévenir le rejet d'un organe transplanté).

Grossesse, allaitement et fertilité

Si votre enfant, devant recevoir ce médicament, est enceinte ou allaite, ou si elle est enceinte ou allaite, demandez conseil à son médecin avant de prendre ce médicament.

CLAVULIN contient :

Clavulin 100mg/12,5mg Nourissons, poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml :
 - Ce médicament contient 3,2 mg d'aspartam par ml. L'aspartam contient une petite quantité de sucre. Ne donnez pas ce médicament à votre enfant s'il est diabétique ou s'il a des problèmes de sucre dans le sang.

- Ce médicament contient 1,7 mg de benzoate de sodium par ml. Le benzoate de sodium peut provoquer des effets secondaires chez les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare qui provoque l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

- Ce médicament contient 1,7 mg de benzoate de sodium par ml. Le benzoate de sodium peut provoquer des effets secondaires chez les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare qui provoque l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

- Ce médicament contient 1,7 mg de benzoate de sodium par ml. Le benzoate de sodium peut provoquer des effets secondaires chez les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare qui provoque l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

- Ce médicament contient 1,7 mg de benzoate de sodium par ml. Le benzoate de sodium peut provoquer des effets secondaires chez les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare qui provoque l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

- Ce médicament contient 1,7 mg de benzoate de sodium par ml. Le benzoate de sodium peut provoquer des effets secondaires chez les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare qui provoque l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

- Ce médicament contient 1,7 mg de benzoate de sodium par ml. Le benzoate de sodium peut provoquer des effets secondaires chez les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare qui provoque l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

- العينان، لاسيما عند تناول جرعات مرتفعة.
- إذا ظهرت على طفلك هذه الآثار الجانبية، فاصِل على إعطائه:
- **كلافلان 100 ملغرام / 12,50 ملغرام لكل مل أثناء الوجبات و**
- **كلافلان 500 ملغرام / 62,5 ملغرام "أكياس" قبل وجبات الطعام**
- القيء.
- الإسهال (لدى الأطفال).
- **الآثار الجانبية قليلة الشبوع:**
- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 100:
- طفح جلدي، حكة.
- طفح جلدي بأزرق مع حكة (شرى).
- عسر الهضم.
- دوخة.
- صداع الرأس.

الآثار الجانبية قليلة الشبوع التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:

- ارتفاع معدل بعض المواد (الأنزيمات) التي ينتجها الكبد.
- **الآثار الجانبية القليلة الشبوع:**
- يمكن أن تظهر لدى أقل من شخص واحد من أصل 1000:
- طفح جلدي، يمكن أن تتكون منه بثورات تشبه بقعاً صغيرة (نقطة سوداء مركزية تحيط بها

• إذا ظهرت على طفلك هذه الأعراض، فقصِل طبيبياً على وجه الاستعجال.

الآثار الجانبية القليلة الشبوع التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم:

• انخفاض عدد الكريات البيضاء.

• **أثر جلدية ذات تردد غير معروف:**

• لا يمكن تقدير التردد من خلال البيانات المتوفرة.

• ردود فعل تحسسية (انظر أعلاه).

• التهاب الأمعاء الغليظة (انظر أعلاه).

• التهاب الغشاء المحامي الذي يصعب بالعلاج (التهاب السحايا العميق).

• ردود الفعل الجلدية الحادة.

• طفح منتشر يصاحبه تورمات وتورف الجلد، لاسيما حول الفم والأنف والعينين وفي المناطق

• وشكل من الطفح أكثر حدة ينسب إلى انفصال جلدي حاد (أكثر من 30 بالمائة من السطح أو

• طفح جلدي أحمر منتشر يصاحبه تورمات صغيرة تحوي على قيح (التهاب الجلد الفقاعي أو

• طفح حرجلي أحمر يصاحبه كلال تحت الجلد وتورمات (بثر لمنش).

• متلازمة الأعراض الشبيهة بالإلغوز مع طفح جلدي وحصى وتضخم في الغدد الليمفاوية و/أو

• خلايا الدم البيضاء (فرط الحمضات) وإنزيمات الكبد (فرط التحسس من الأدوية.

• إذا ظهر على طفلك أحد هذه الأعراض، فقصِل طبيبياً على الفور.

• التهاب الكبد،

• الذي ينتج عن ارتفاع معدل البيليروبين في الدم (وهي مادة ينتجها الكبد)، وتؤدي إلى

• طفح جلدي،

• طفح منتشر،

• (لدى الأشخاص الذين يتناولون جرعات مرتفعة من كلافلان أو يعانون من مشاكل

• سود (تسورف الصان).

• طفح (لدى الأطفال)، ويختفي عموماً عند فرس الأسنان.

• **التي يمكن أن تظهر عند إجراء تحاليل الدم أو البول:**

• بهم في عدد الكريات البيضاء.

• عدد الكريات الحمراء (فقر الدم الانحلالي).

• البول.

• والجانبية:

• أي أثر غير مستحب، المرجو إخبار الطبيب أو الصيدلي.

• أي أثر غير مستحب لم يرد ذكره بهذه النشرة.

• بلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عبر نظام الإبلاغ الوطني أو على العنوان:

• **GlaxoSmithKline M** قطع مع بوليفرد الرشيدى وشارع أبو حامد الغزالي

• 2000 أو على البريد الإلكتروني:

• **pharmacovigilance.net**

• **حفظ كلافلان؟**

• تناول و مرأى الأطفال.

• مال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدرج على العبوة. يرجع تاريخ انتهاء

• **كلافلان 100 ملغرام / 12,50 ملغرام لكل مل، مسحوق لمستعلق قابل للشرب في قنينة**

• قبل التحضير: يحفظ داخل العبوة في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعداً عن الرطوبة.

• قبل التحضير: يحفظ المستعلق المحضر 7 أيام كحد أقصى في درجة حرارة ما بين 2+ و 8+ من

• **كلافلان 500 ملغرام / 62,5 ملغرام مسحوق معلق للتلان عن طريق الفم في أكياس**

• يحفظ في حرارة لا تتجاوز 25 درجة مئوية وبعداً عن الرطوبة.

• لا ينبغي رمي الأدوية في مسالك الصرف الصحي أو مع الفضلات المنزلية. اطلب المشورة من الـ

• غير المستعمدة. قد تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

• **6. معلومات إضافية**

• ما الذي يحتوي عليه كلافلان 100 ملغرام / 12,5 ملغرام لكل مل، مسحوق لمستعلق قابل

CLAVULIN 100mg/12,50mg par ml Nourrisson, poudre pour suspension
CLAVULIN 100mg/12,50mg par ml Enfant, poudre pour suspension
CLAVULIN 500mg/62,5mg Enfant, poudre pour suspension buvable en
sachet-dose, boîte de 12 sachets.
Amoxicilline/Acide clavulanique

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien.
- Ce médicament est généralement prescrit pour un bébé ou un enfant. Ne le
- pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques.
- Si votre enfant présente un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre
- infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas m

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CLAVULIN et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CLAVULIN ?
3. Comment utiliser CLAVULIN ?
4. Q
5. Q
6. C

CLAVULIN
100mg/12,50mg/ml
poudre suspension buvable, 60ml



6 118000 160526

- infections de la peau et des tissus mous, incluant les infections dentaires,
- infections des os et des articulations.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER CLAVULIN

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez

..... مرات في اليوم، من الأصل قبل الأكل، مدة يوم

PPV: 70,60 DH
LOT: 650051
PER: 08/2024