

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

M22- 0014844

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 8912 Société : R.A.M
 Actif Pensionné(e) Autre :
 Nom & Prénom : CHRIFI DRISS A74114
 Date de naissance : 24.09.1971
 Adresse : 107 AL MOATTI LOT N°41 APP 1 RANTE
 d'Azemmour KM 12 DAR BOUAGZJA Casablanca
 Tél. : 06 31 47 30 200 Total des frais engagés : 1436,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Soukaina Age: 23

Lien de parenté :

Soi-même Conjoint Enfant

Soi-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

ALD ALC Pathologie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :  Le : / /

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE KADIR LOTISSEMENT Lot Ben Aïda 98 par boulevard Casablanca Tél. : 05 22 78 99	26/06/23	536,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	26.02.23	12	30000A

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires; ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

	H
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Lamia JABRI

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté de
Médecine de Casablanca



Dr. Amal BENKIRANE

Professeur d'Anatomie Pathologique
Ex. Enseignante à la Faculté
de Médecine de Casablanca

CASAPATH

DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CHIROPATHOLOGIQUE

De la part du Dr : Dr Lamia JABRI - Dr Amal BENKIRANE

Dr Lamia JABRI - Dr Amal BENKIRANE
Gynécologue - Obstétricienne
250, Bd. Abdellouman Ben Badis
Abraj Abdellouman Tower A
3ème Etage Appt. N° 14 - Casablanca
Tél.: 05 22 25 25 01 - 06 61 03 34 60
Email : drchebarbi123@gmail.com

Nom et prénom du patient : Dr. ILYA

Age : 41 Sexe : F

Date de prélèvement : 26 JUIN 2023

Renseignements cliniques et paracliniques :
Hx : Col utérin
Normal - en feu

Organe prélevé :
Hystérectomie

Nature de l'acte réalisé :
Hystérectomie

Biopsie antérieure :
 Oui Non
Réf :
Dr. Lamia JABRI - Dr Amal BENKIRANE

FCV : Vagin Exocol : Endocol :
Réf :
Dr. Lamia JABRI - Dr Amal BENKIRANE

Date des dernières règles : Parité :
26/05/2023 - 0

Thérapeutique antérieure ou en cours :
Hormonale

Signature & Casier
Dr. Lamia JABRI - Dr Amal BENKIRANE
Gynécologue - Obstétricienne
250, Bd. Abdellouman Ben Badis
Abraj Abdellouman Tower A
3ème Etage Appt. N° 14 - Casablanca
Tél.: 05 22 25 25 01 - 06 61 03 34 60
Email : drchebarbi123@gmail.com

RECU LE : 26/06/2023
EDITE LE : 28/06/2023

NOM & PRENOM : JOUKI TOURYA
PRESCRIPTEUR : Dr. CHEBARBI LAILA
AGE : 47 ans
Code Patient : 115601
N/REF : 30626790
ORGANE : FROTTIS

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

4 enfants vivants, col macroscopiquement normal: FCV.

COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE

- Frottis en milieu liquide selon la technique Prepstain

- Qualité du frottis :

Satisfaisante

- CLASSE DU FROTTIS SELON LE SYSTEME DE BETHESDA :

Pas de lésion intra-épithéliale ou de malignité.

- Description cytologique :

Le frottis étudié après cytocentrifugation de l'échantillon recueilli en milieu liquide montre une population cellulaire essentiellement inflammatoire faite de polynucléaires neutrophiles. La cellularité est peu abondante faite de cellules malpighiennes superficielles et intermédiaires à cytoplasme éosinophile et à noyau régulier avec une chromatine fine sans anomalie du rapport nucléo cytoplasmique. L'interprétation de certaines cellules est gênée par l'inflammation.

Il n'est pas vu de cellules endocervicales.

Il n'est pas noté de signes cytologiques d'infestation virale ou de signes de dysplasie.

CONCLUSION :

- Frottis cervical inflammatoire.
- Absence de signes cytologiques de dysplasie ou de néoplasie.
- Un contrôle après éventuel traitement est souhaitable.

Signé : Dr. Amal BENKIRANE
Pr. Amal BENKIRANE
Anatomo - Pathologiste
Centre de Pathologie Casapath
5, Rue des Hôpitaux-Réa, du parc Casablanca
Tél.: 05 22 22 13 46 / 66 - Fax: 05 22 22 14 24

Dr. Laila CHEBARBI ep. MIKOU
GYNÉCOLOGUE - OBSTÉTRICIENNE
Suivi de grossesse - Accouchement - Stérilité
Maladies des Seins et chirurgie gynécologique
Echographie - Endoscopie

Lauréate de la faculté de médecine de Casablanca
Ancien médecin interne au CHU Ibn Rochd
Ex chef de service de l'hôpital Med. Sekkat



الدكتورة ليلى الشباربي ميكو
اختصاصية في أمراض النساء والتوليد

مراقبة الحمل - التوليد
عقم الزوجين - أمراض الثدي
جراحة أمراض النساء - الفحص بالصدى و المعنطار
خريجة كلية الطب بالدار البيضاء
طبيبة داخلية سابقا بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد
رئيسة مصلحة سابقا بمستشفى محمد السقاط

Casablanca, le : 26.08.13

DR CHEBARBI LAILA a l'honneur de présenter

Ses compliments à MME JOUKI TOURIYA

Et lui adresse selon l'usage sa note d'honoraires

Soit la somme de six cent dirhams.

Consultation+ frottis = 300 DH . Echographie 300 DH.

Dr Laila CHEBARBI ep. MIKOU
Gynécologue - Obstétricienne
250 Bd. Abdelloumen
3ème étage
Tél : 05 22 25 25 01
Email : drchebarbi123@gmail.com

250، شارع عبد المؤمن، إقامة أبراج عبد المؤمن، الطابق الثالث، شقة 14 - الدار البيضاء
250, Bd. Abdelloumen, Résidence Abraj Abdelloumen
Imm A, 3ème étage appart N° 14 - Casablanca
Tél.: 05 22 25 25 01 - GSM : 06 61 63 34 60 - E-mail : drchebarbi123@gmail.com



CENTRE DE PATHOLOGIE SPÉCIALISÉE CASABLANCA

6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc - 1er étage 20360 - Casablanca

Tel: 0522 22 13 46/66 - Fax : 0522 22 14 24 - Email : labocasapath@gmail.com

Patente 36333531 ICE 003224214000036 IF 40204512

FACTURE

REF : 23/08680

Date de facturation 26 / 06 / 2023
Médecin traitant Dr. CHEBARBI LAILA
Patient JOUKI TOURYA - 115601
Demande **C30626790 - 26/06/2023**

Liste des examens

FROTTIS

	Total	300,00	Dhs
coefficient-P		273,00	

Arrêtée la présente facture à la somme de : TROIS CENTS DIRHAMS

6, Rue des Hôpitaux - 1er étage - Casablanca
Centre de Pathologie Spécialisée du Parc
Tél: 0522 22 13 46 - Fax : 0522 22 14 24

Dr. Laila CHEBARBI ep. MIKOU
GYNECOLOGUE - OBSTÉTRICIENNE

Suivi de grossesse - Accouchement - Stérilité
Maladies des Seins et chirurgie gynécologique
Echographie - Endoscopie

Lauréate de la faculté de médecine de Casablanca
Ancien médecin interne au CHU Ibn Rochd
Ex chef de service de l'hôpital Med. Sekkat



الدكتورة ليلى الشباربي ميكو
اختصاصية في أمراض النساء، والتوليد

مراقبة الحمل - التوليد
عقم الزوجين - أمراض الثدي
جراحة أمراض النساء - الفحص بالصدى و المنظار
طبيبة داخلية سابقا بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد
رئيسة مصلحة سابقا بمستشفى محمد السادس

26 JUIN 2008

Casablanca, le :

H. - D. - T. - T. -
8.0.9
44160
II - Dephakin (Cp) (S.I.)
14x2 T x 10T
puis du 16^e au 28-T
96.40 du 29-T
21 Plusmizin (S.I.)
10

250، شارع عبد المؤمن، إقامة أبراج عبد المؤمن، الطابق الثالث، شقة 14 - الدار البيضاء
250, Bd. Abdelmoumen, Résidence Abraj Abdelmoumen
Imm A, 3ème étage appart N° 14 - Casablanca
Tél.: 05 22 25 25 01 - GSM : 06 61 63 34 60 - E-mail : drchebarbi123@gmail.com

63.30

20

Colpo trofline (s)

SV

247. *el* 10×2 μ *sem*

41

Aela (49)

24p | J.S.V.

536.20

205

~~Dr Laila CHEBABI, EP. MIKOU
Gynécologue, Obstétricienne
259 Bd Aïcha El Hammam, BP 147
2016 El Oued, Alg. Tel: 01 58 61 34 60
Email : drchebabil23@gmail.com~~

PHARMACEUTICALS
Lot Benabdellah N° 98 Date 20/02/2002
Casablanca, Tel: 0522 93 78 99

Aela

Réf: 522MA



Composition	Pour 2 comprimés
Rose-Biota	450mg
Maca	375mg
Rhodiola	30mg
Niacine (vitamine B3)	16mg
Vitamine B6	1,4mg
Acide folique (vitamine B9)	200µg

**VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence

de préfér

LA004 1123
LOT

PER 23
K

247.00

PROPRIETES :

Spécifiquement formulé par le Département Recherche et Développement des Laboratoires FORTE PHARMA, **AELA** présente plusieurs actions majeures contribuant à dynamiser l'énergie globale.

L'efficacité d'**AELA** repose sur une association optimale de plusieurs substances dont essentiellement :

- **La Rose-Biota®**, actif exclusif issu de pétales de rose pâle.
- **La Rhodiola** qui aide à réduire l'impact négatif du stress.
- **La Maca** aux propriétés stimulantes.
- **La Vitamine B6** qui contribue à réguler l'activité hormonale.
- **La Vitamine B3** qui aide au maintien de muqueuses normales.
- **La Vitamine B9** qui aide à réduire la fatigue.

CONSEILS D'UTILISATION :

Prendre 2 comprimés le matin, en une seule prise avec un verre d'eau.

Cure de 14 jours renouvelable.

PRESENTATION :

Boîte de 28 comprimés

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
FORTE PHARMA

"Le Patio Palace" - 41 - Av. Hector otto
98000 - MONACO

Quel est le nom du médicament Fluomizin?

Distribué par: ZENITHPHARMA
96, Zone Industrielle Tassila Inezgane
Agadir-Maroc
Dr. M. EL BOUHMADI, Pharmacien Responsable
AMM N°: 24/18DMP/21/NRQ
P.P.V.: 96.40 DHS

Forme: Comprimé 10.0 mg.
Gélule: Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium.
Sous forme de comprimé monohydraté.

Où obtenez-vous Fluomizin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Condition de délivrance: Tableau C (Liste II)
Boîte de 6 comprimés vaginaux.

Titulaire de l'autorisation

 medinova

Medinova AG,
Eggbühlstr. 28,
8050 Zürich
Suisse

Fabricant:

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Str. 51-61
59320 Ennigerloh
Allemagne

Distributeur

Distribué par Zenithpharma
96, Zone Industrielle Tassila Inezgane Agadir Maroc
Dr. M.EL. BOUHMADI Pharmacien Responsable

380956/311530

ces médicaments. Si vous prenez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec un estrogène dans le cadre d'un THS, les informations suivantes sont importantes. Veuillez lire également la notice qui accompagne votre médicament oestrogénique.

Ménopause précoce Il existe peu de données sur les risques du THS quand il est utilisé pour traiter la ménopause précoce. Il y a un faible niveau de risque chez les plus jeunes femmes. Cela signifie que l'équilibre des avantages et des risques pour les jeunes femmes utilisant un THS pour la ménopause précoce peut être meilleure que chez les femmes âgées.

Examens médicaux Avant de débuter un traitement THS, votre médecin doit vous poser des questions sur vos antécédents médicaux personnels et familiaux. Il est indispensable d'effectuer un examen clinique et gynécologique complet. Pendant toute la durée du traitement, des examens réguliers seront effectués, y compris un examen des seins. Il faut en tout cas procéder au moins une fois par an à une évaluation soigneuse des avantages et des risques et ne poursuivre le THS que tant que les avantages prédominent par rapport aux risques. Vous devrez peut-être être surveillé régulièrement par votre médecin pendant l'utilisation de Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

Cancer de la muqueuse de l'utérus (cancer de l'endomètre) Chez les femmes dont l'utérus est intact, la prise prolongée d'un THS à l'estrogène seul a un risque plus élevé de cancer et un épaissement abnormal de la muqueuse utérine. Ce risque supplémentaire peut être évité en combinant des comprimés de progestatif ainsi que des estrogènes pendant au moins 12 jours.

THS et cancer du sein Des données suggèrent que la prise de THS combiné estro-progestatif et probablement aussi la prise d'estrogènes seuls peut augmenter le risque de cancer du sein. Ce sur-risque dépend de la durée d'utilisation du THS et apparaît après quelques années. Cependant, il retourne au niveau normal après quelque années (au plus 5 ans) après l'arrêt du traitement avec (THS).

Votre médecin vous demandera de contrôler régulièrement vos seins et de l'informer en cas de certains changements.

THS et cancer ovarien Le cancer de l'ovaire est rare - beaucoup plus rare que le cancer du sein. L'utilisation d'un THS par estrogènes seuls ou par une combinaison d'estrogènes et de progestatifs a été associée à une légère augmentation du risque de cancer ovarien. Le risque de cancer ovarien varie en fonction de l'âge. Par exemple, chez les femmes âgées entre 50 et 54 ans qui ne prennent pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien seraposé chez 2 femmes sur 2000 en moyenne sur une période de 5 ans. Chez les femmes ayant pris un THS pendant 5 ans, il y aura environ 3 cas sur 2000 utilisatrices (soit environ un cas supplémentaire).

THS et thrombose La recherche a montré que les femmes sous THS ont environ 1,3 à trois fois plus de risque de thrombose veineuse profonde (un caillot de sang se formant dans une veine dans les jambes, les poumons ou ailleurs dans le corps) que chez les femmes non utilisatrices de THS. Ce risque supplémentaire est plus important pendant la première année d'utilisation de THS.

L'apparition de caillots sanguins peut être graves. Si un caillot sanguin arrive aux poumons, il peut causer une douleur dans la poitrine, une respiration difficile et d'autres symptômes.

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils n'en sont pas systématiquement.

Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé seul :

Arrêtez de prendre Duphaston 10 mg si vos symptômes suivants :

- troubles du foie ; les symptômes peuvent être : jaunissement de la peau ou du blanc des yeux ou une douleur abdo
- réactions allergiques : respiration difficile, difficultés à respirer ou des réactions telles que : vomissements, une diarrhée ou moins de 1 patiente sur 1000),
- gonflement de la peau autour du visage ou de la gorge qui peut entraîner des difficultés à respirer (touche moins de 1 patiente sur 1000).

Arrêtez immédiatement de prendre Duphaston 10 mg et si vous remarquez un des effets indésirables mentionnés ci-dessus.

Autres effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé seul :

Très fréquent (touche plus de 1 personne sur 10)

- Saignement vaginal

Fréquents (touche moins de 1 patiente sur 10) :

- migraine, maux de tête
- nausées, vomissement, douleurs abdominales
- règles irrégulières, importantes ou douloureuses,
- absence de règles ou règles moins fréquentes que la normale.
- douleur/tension des seins

Peu fréquents (touche moins de 1 patiente sur 100) :

- humeur dépressive
- sensations vertigineuses
- vomissement
- Problèmes de foie (jaunissement de la peau ou des yeux, sensation de faiblesse, sensation générale de malaise ou mal de ventre)
- réactions allergiques cutanées : éruption, démangeaisons importantes ou urticaire.
- augmentation du poids

Rares (touche moins de 1 patiente sur 1000) :

- augmentation de la taille des tumeurs sensibles aux progestatifs (telles qu'un méningiome)
- anémie due à une destruction des cellules rouges du sang (anémie hémolytique)
- hypersensibilité
- somnolence
- accumulation soudaine de liquide dans la peau ou les muqueuses (par exemple gorge ou langue), difficultés respiratoires et / ou démangeaisons et éruption cutanée, souvent comme réaction allergique (œdème angioneurotique)
- gonflement des seins
- gonflement dû à une rétention de liquide, souvent au niveau des jambes ou des chevilles.

Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé en association avec d'autres médicaments :

Il existe de nombreux médicaments qui peuvent être prescrits avec Duphaston 10 mg. Veuillez lire la notice de chaque médicament pour obtenir des informations supplémentaires.



Exp Date: JAN 2028
Lot/Batch: 3X402

Maphar
Boulevard Alkimia n° 6
Quartier Industriel - Sidi Bernoussi,
Casablanca, Maroc.
COLPOTROPHINE 10 mg CAP VAG BT 20
P.P.V.: 63DH60

6 118001 180707

Alkimia n° 6 Quarante Maroc
برو، Maroc

يرجى الاطلاع بانتباه على هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء، لأنها تضم معلومات هامة

- احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج إلى قرائتها من جديد.
- إذا كانت لديك أسلة أخرى، ستخسر لدى الطبيب أو الصيدلي أو الممرض.
- لقد وصف هذا الدواء لشخصي. لا تقم باعطائه لشخص آخر، حتى مشابهها، لأنك قد تسبب الضرر له.
- إذا شعرت بأحد التأثيرات غير المرغوب فيها، اختر الطبيب أو الصيدلي. وغير مرغوب فيها لم يذكر في هذه النشرة. انظر الفقرة 4.

ما محتوى هذه النشرة؟

1. ما هو كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية وفي أي حالات يستعمل؟
2. ما المعلومات اللازم معرفتها قبل استعمال كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية؟
3. كيف يجب استعمال كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية؟
4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟
5. كيف يجب حفظ كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية؟
6. محتوى العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هو كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية وفي أي حالات يستعمل؟

الصنف الصيدلي العلاجي: ايستروجينات طبيعية وشبيه اصطناعية عن طريق موض
G03CA : ATC

ينتمي كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية إلى فئة الأدوية المسماة العلاج الهرموني الذي يستعمل هذا الدواء في التخفيف من أعراض سن اليأس، ولاسيما جفاف أو تهيج المهبل». وينتج عن انخفاض نسبة الإيستروجينات في الجسم: الذي يحدث بشكل طبيعي كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية باستبدال الإيستروجينات التي تنتجهما بويضات المرأة في المهبل حيث تطلق الهرمونات التي تمكن من الشعور بالانزعاج المزعج

2. ما المعلومات اللازم معرفتها قبل استعمال كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية؟

سوابق طبية ومراقبات منتظمة

ينطوي استعمال علاج هرموني بديل على بعض المخاطر التي يجب اعتبارها عند اخذ او موافقتها.

تعتبر التجربة في العلاج في حالة سن يأس مبكر (بسبب قصور مبيضي او عملية جر الالاس بشكل مبكر، قد تختلف المخاطر المرتبطة بعلاج هرموني بديل. اقصدى الطبيب قبل الشروع في علاج هرموني بديل (أو استئنافه)، سوف يستفسر الطبيب عن سوابق من الممكن أن يصف لك اختبارا سريري. وقد يضم فحص الثديين او فحص خاص عندما تبدئين في العلاج بواسطة كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية، يجب زيارة الطبيب (على الأقل مرة في السنة). خلال هذه الزيارات، يجب التحدث إلى الطبيب عن منافع دواء كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية.

احترمي توصيات الطبيب فيما يخص عمليات الاستكشاف المنتظم للتصوير الإشعاع

لا تستعمل أبدا كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية:

إذا كنت معنية بإحدى الحالات التالية، إذا كان لديك مش ب شأن النقط أسفله، اخري كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية.

لا تستعمل أبدا كوليبوتروفين، كبسولات مهبلية:

- إذا كانت لديك حساسية لبروميسطرين أو لأحد المكونات الأخرى المتوفرة في هذا
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من سرطان الثدي أو إذا اشتئه بوجود سرطان

ces changements. Si vous prenez Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé avec un estrogène dans le cadre d'un THS, les informations suivantes sont importantes. Veuillez lire également la notice qui accompagne votre médicament oestrogénique.

Ménopause précoce Il existe peu de données sur les risques du THS quand il est utilisé pour traiter la ménopause précoce. Il y a un faible niveau de risque chez les plus jeunes femmes. Cela signifie que l'équilibre des avantages et des risques pour les jeunes femmes utilisant un THS pour la ménopause précoce peut être meilleure que chez les femmes âgées.

Examens médicaux Avant de débuter un traitement THS, votre médecin doit vous poser des questions sur vos antécédents médicaux personnels et familiaux. Il est indispensable d'effectuer un examen clinique et gynécologique complet. Pendant toute la durée du traitement, des examens réguliers seront effectués, y compris un examen des seins. Il faut en tout cas procéder au moins une fois par an à une évaluation soignante des avantages et des risques et ne poursuivre le THS que tant que les avantages prédominent par rapport aux risques. Vous devrez peut-être surveiller régulièrement par rapport aux risques. Vous devrez peut-être être Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé.

Cancer de la muqueuse de l'utérus (cancer de l'endomètre) Chez les femmes dont l'utérus est intact, la prise prolongée d'un THS à l'estrogène seul a un risque plus élevé de cancer et un épaissement anomal de la muqueuse utérine. Ce risque supplémentaire peut être évité en combinant des comprimés de progestatif ainsi que des estrogènes pendant au moins 12 jours. THS et cancer du sein. Des données suggèrent que la prise de THS combiné estro-progestatif et probablement la prise de d'estrogènes seuls peut augmenter le risque de cancer du sein. Ce sur-risque dépend de la durée d'utilisation du THS et apparaît après quelques années. Cependant, il retourne au niveau normal avec (THS).

Votre médecin vous demandera de contrôler régulièrement vos seins et de l'informer en cas de certains changements.

THS et cancer ovarien Le cancer de l'ovaire est rare - beaucoup plus rare que le cancer du sein. L'utilisation d'un THS par estrogènes seuls ou par une combinaison d'estrogènes et de progestatifs a été associée à une légère augmentation du risque de cancer ovarien. Le risque de cancer ovarien varie en fonction de l'âge. Par exemple, chez les femmes âgées entre 50 et 54 ans qui ne prennent pas de THS, un diagnostic de cancer ovarien sera posé chez 2 femmes sur 2000 en moyenne sur une période de 5 ans. Chez les femmes ayant pris un THS pendant 5 ans, il y aura environ 3 cas sur 2000 utilisatrices (soit environ un cas supplémentaire).

THS et thrombose La recherche a montré que les femmes sous THS ont environ 1,3 à trois fois plus de risque de thrombose veineuse profonde (un caillot de sang se formant dans une veine dans les jambes, les poumons ou ailleurs dans le corps) que chez les femmes non utilisatrices de THS. Ce risque supplémentaire est plus important pendant la première année d'utilisation de THS. L'apparition de caillots sanguins peut être graves. Si un caillot arrive aux poumons, il peut causer une douleur dans la poitrine, un essoufflement, un évanouissement ou même la mort.

Si un caillot arrive aux jambes, il peut causer une douleur dans la partie inférieure de la cuisse, une sensation de brûlure, des saignements dans les veines

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé seul:
Arrêtez de prendre Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé et consultez un médecin immédiatement si vous présentez l'un des effets indésirables suivants :

- troubles du foie : les signes peuvent inclure une jaunisse ou une douleur abdominale (touche n° 12551)
- réactions allergiques : les signes peuvent inclure une respiration ou des réactions telles qu'un vomissement, une diarrhée ou une constipation, une éruption cutanée ou une gonflement de la peau autour du visage et de la gorge qui peut entraîner des difficultés à respirer (touche moins de 1 patiente sur 1000).
Arrêtez immédiatement de prendre Duphaston 10 mg et si vous remarquez un autre effet indésirable mentionné ci-dessus.

Autres effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé seul:
Très fréquent (touche plus de 1 personne sur 10)
Saignement vaginal

Fréquents (touche moins de 1 patiente sur 10):
- maux de tête, nausées, vomissement, douleurs abdominales, règles irrégulières, importantes ou dououreuses, absence de règles, ou règles moins fréquentes que la normale, douleur/tension des seins

Peu fréquents (touche moins de 1 patiente sur 100):
- migraine, maux de tête, nausées, vomissement, douleurs abdominales, règles irrégulières, importantes ou dououreuses, absence de règles, ou règles moins fréquentes que la normale, douleur/tension des seins

Rares (touche moins de 1 patiente sur 1000):
- humeur dépressive, sensations vertigineuses, vomissement

Problèmes de foie (jaunissement de la peau ou des yeux, sensation de faiblesse, sensation générale de malaise ou mal de ventre) ou urticaire, augmentation du poids

Rares (touche moins de 1 patiente sur 10000):
- augmentation de la taille des tumeurs sensibles aux progestatifs (telles qu'un méningiome), anémie due à une destruction des cellules rouges du sang (anémie hémolytique), hypersensibilité

- somnolence, accumulation soudaine de liquide dans la peau ou les muqueuses (par exemple gorge ou langue), difficultés respiratoires et / ou démangeaisons et éruption cutanée, souvent comme réaction allergique (œdème angioneurotique)

- gonflement des seins, gonflement dû à une rétention de liquide, souvent au niveau des jambes ou des chevilles.

Effets indésirables rapportés avec Duphaston 10 mg, comprimé pelliculé utilisé en association:
-

6 118000 010500
maplar
Km 10, route côtière 111, Quartier Industriel
Zenata, Ain Saba Casablanca - Maroc
DUPHASTON 10MG CP PEL B10 PPV : 44DH60
12551