

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

M22- N° 000939

174249

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5279 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : ANBAY - Fatima Ep BEN DANNA.

Date de naissance : 14-5-1955

Adresse : 1 Rue Ain AGHBAL Hay SALAM CASA-CIL

Tél. : 0662555641

Total des frais engagés : 231.01 Dhs

Cadre réservé au Médecin



Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 11/2/2023

Signature de l'adhérent(e) :

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10/07/20	C2		G	Dr EZZEDINE DURDANE CHIRURGIEN Tél: 06 11 00 95 M.P. 06 26 83

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <i>Laureat de la faculté de pharmacie tunisienne</i> <i>Dar. Lamine Route Nationale Casse Essacina</i> <i>CP 1000 8000 206</i> <i>65 58 96 75</i>	15/07/2023	# 234.10 #

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION


O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	G
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

ORDONNANCE

Safi, le 17/1/23

1 Eclat de la tête

35.40



① KALAFÉIC 160

38.00 x 2
= 76.00



② Alflamic 150

28.00

1 Cff x 2

ممثل الوكيل الرئيسي
Dr. BARCHI, Hafsa
Lancé de la faculté de pharmacie Tunisie
Dar Lamine Route de national Casablanca
Tunis - 1000 70 55 05 55 05 75

③ Codolipane

40.40



1 Cff x 3

④ Brexim



1 Cff x 2

Dr. EZZIDI NOUREDDINE
RGHEN
1111111111
11062683
INP : 1111111111
Tél. : 06.61.11.09.95 / 06.69.61.82.25
Adresse : Appt. 2 - N° 36 - Avenue Sidi Mohamed Ben Abdellah - Ville Nouvelle - SAFI

PPV:22DH20
PER:12/24
LOT:L4071





Aflamic®

Méloxicam

7,5 mg 15 mg

Boîte de 10, 20 ou 30

Deva

comprimé
voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin d'en faire une autre question, si vous avez des symptômes identiques, cela pourra être utile.

Ce médicament vous a été prescrit dans le cas de symptômes identiques, cela pourra être utile.

Si l'un des effets indésirables devient grave dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé ?

2. Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre ce médicament ?

3. Comment prendre AFLAMIC 7,5 mg ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver AFLAMIC 7,5 mg ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations pratiques.

1. QU'EST-CE QUE AFLAMIC 7,5 MG COMPRISE OU 15 MG COMPRISE ?

Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre ce médicament ?

Classe pharmacothérapeutique :

Anti-inflammatoires et antirhumatismaux, non stéroïdiens, oxicam, code ATC : M01AC06.

AFLAMIC contient une substance active dénommée méloxicam. Le méloxicam appartient à un groupe de médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui sont utilisés pour réduire l'inflammation et la douleur dans les articulations et les muscles.

AFLAMIC comprimé est indiqué chez l'adulte et l'enfant âgé de 16 ans et plus.

AFLAMIC est utilisé dans :

· le traitement de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose,

· le traitement de longue durée :

o de la polyarthrite rhumatoïde,

o de la spondylarthrite ankylosante.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AFLAMIC 7,5 MG COMPRISE OU 15 MG COMPRISE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Ne prenez jamais AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé :

· si vous êtes allergique au méloxicam ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,

· au cours des trois derniers mois de la grossesse,

· enfant et adolescents de moins de 16 ans,

· si vous avez présenté l'un des signes suivants après avoir pris de l'aspirine ou d'autres AINS:

o respiration sifflante, oppression respiratoire, difficulté à respirer (asthme),

o obstruction nasale due à des petits renflements de la muqueuse nasale (polypes nasaux),

o éruptions cutanées / urticaire,

o gonflement soudain des tissus sous la peau ou les muqueuses, tel qu'un gonflement autour des yeux, du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile (œdème de Quincke),

· si vous avez déjà présenté, après un traitement avec des AINS :

o un saignement de l'estomac ou des intestins,

o des perforations de l'estomac ou des intestins,

· ulcères ou saignement de l'estomac ou des intestins,

· antécédents d'ulcères ou de saignements récidivants peptiques ou de l'estomac (ulcération ou saignement résultant produit au moins deux fois),

· insuffisance hépatique sévère,

· insuffisance rénale sévère non dialysée,

· saignements récents dans le cerveau (hémorragie cérébrovasculaire),

· troubles hémorragiques de quelque type que ce soit,

· insuffisance cardiaque sévère,

· intolérance à certains sucrels étant donné que ce produit contient du lactose (voir également le paragraphe « AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé contient du lactose »).

Si vous n'êtes pas certain qu'un des points ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin.

Mise en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou, pharmacien avant de prendre AFLAMIC.

Mises en garde

Tous les médicaments tels que AFLAMIC pourraient être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (voir rubrique 3 « Comment prendre AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé »).

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risque pour ce type de pathologie, vous devez discuter de votre traitement avec votre médecin ou avec votre pharmacien. Par exemple :

· si vous avez une pression artérielle élevée (hypertension),

- si vous avez des taux élevés de sucre dans le sang;
- si vous avez un taux élevé de cholestérol dans le sang;
- si vous fumez.

Arrêtez immédiatement votre traitement si vous présentez des symptômes de saignement (donnant une coloration de l'appareil digestif (provoyant des douleurs abdominales), Des éruptions cutanées mettant potentiellement en danger la vie (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell), AFLAMIC, apparaissant sur le tronc d'abord, puis se déplaçant vers les membres, de cible ou des plaques circulaires ayant une bordure rougeâtre et une surface blanche). Les autres signes à surveiller sont les ulcérations génitales, et les conjonctivites et éruptions cutanées potentiellement mortelles sous forme de pseudo-grippaux. L'éruption peut évoluer vers un décollement de la peau.

Le risque de survenue de réactions cutanées graves survient dans les premières semaines de traitement.

Si vous avez développé un syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell alors que vous prenez AFLAMIC, vous ne devez pas prendre AFLAMIC. Si vous développez une éruption cutanée importante alors que vous prenez AFLAMIC, contactez un centre de soins de santé.

AFLAMIC ne convient pas au traitement des ulcères de l'estomac ou de l'iléum. AFLAMIC peut masquer les symptômes d'une infection. Si vous pensez que vous avez une infection, vous devez consulter un médecin.

Précautions particulières d'emploi

Comme il pourrait être nécessaire d'adapter votre traitement à votre état de santé, demandez conseil à votre médecin avant de prendre AFLAMIC.

- antécédent d'inflammation de l'oesophage (œsophagite), de l'estomac (gastrite) ou antécédent de tout autre affection de l'appareil digestif, exemple maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique;
- pression artérielle élevée (hypertension),
- si vous êtes âgé,
- maladie cardiaque, hépatique ou rénale,
- taux élevés de sucre dans le sang (diabète),
- volume sanguin diminué (hypovolémie), ce qui peut se produire si vous buvez beaucoup de sang, si vous avez été brûlé, ou si vous avez subi un accident avec perte importante de liquides,
- intolérance à certains sucrels diagnostiquée par votre médecin, contient du lactose;
- taux élevés de potassium dans le sang précédemment diagnostiqués;

Votre médecin devra s'assurer de suivre toute modification de votre état de santé et de votre traitement.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé : Étant donné que l'action de AFLAMIC peut affecter, ou peut être affectée par d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En particulier, prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris l'un des médicaments suivants :

- autres AINS,
- sels de potassium – utilisés pour prévenir ou traiter de faibles taux de potassium dans le sang

· tacrolimus – utilisé après une greffe d'organe

· triméthoprime – utilisé pour le traitement des infections de l'appareil urinaire

· médicaments utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins (anticoagulants),

· médicaments qui désagrégent les caillots sanguins (thrombolytiques),

· médicaments pour traiter les maladies cardiaques et rénales,

· corticostéroïdes (médicaments utilisés pour réduire l'inflammation et les réactions allergiques),

· ciclosporine – utilisée après les transplantations d'organes, dans les affections cutanées sévères, des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome néphrotique,

· déféroxsozo – utilisé pour traiter une surcharge en fer due à de fréquentes transfusions sanguines

· médicaments diurétiques,

· médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (par exemple bêta-bloquants),

· lithium – utilisé pour traiter les troubles de l'humeur,

· inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) – utilisés pour le traitement de la dépression,

· méthotrexate – utilisé pour traiter des tumeurs ou des affections cutanées incontrôlées et la polyarthrite rhumatoïde active,

· pémétrexed – utilisé pour traiter le cancer

· cholestyramine – utilisée pour faire baisser le cholestérol,

· antidiabétiques oraux (sulfonylurées, nateglinide) – utilisé pour le traitement du diabète.

Votre médecin doit suivre avec attention votre taux de sucre dans le sang, risque d'hypoglycémie.

AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé avec des aliments et boissons : Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives : Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité : Sans objet.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou



Aflamic®

Méloxicam

7,5 mg 15 mg

Boîte de 10, 20 ou 30

Deva

comprimé
voie orale

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice.

Gardez cette notice, vous pourrez avoir besoin d'en faire une autre question, si vous avez des symptômes identiques, cela pourra être utile.

Ce médicament vous a été prescrit dans le cas de symptômes identiques, cela pourra être utile.

Si l'un des effets indésirables devient grave dans cette notice, parlez-en à votre médecin.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé ?

2. Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre ce médicament ?

3. Comment prendre AFLAMIC 7,5 mg ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver AFLAMIC 7,5 mg ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations pratiques.

1. QU'EST-CE QUE AFLAMIC 7,5 MG COMPRISE OU 15 MG COMPRISE ?

Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre ce médicament ?

Classe pharmacothérapeutique :

Anti-inflammatoires et antirhumatismaux, non stéroïdiens, oxicam, code ATC : M01AC06.

AFLAMIC contient une substance active dénommée méloxicam. Le méloxicam appartient à un groupe de médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui sont utilisés pour réduire l'inflammation et la douleur dans les articulations et les muscles.

AFLAMIC comprimé est indiqué chez l'adulte et l'enfant âgé de 16 ans et plus.

AFLAMIC est utilisé dans :

· le traitement de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose,

· le traitement de longue durée :

o de la polyarthrite rhumatoïde,

o de la spondylarthrite ankylosante.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE AFLAMIC 7,5 MG COMPRISE OU 15 MG COMPRISE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Ne prenez jamais AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé :

· si vous êtes allergique au méloxicam ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,

· au cours des trois derniers mois de la grossesse,

· enfant et adolescents de moins de 16 ans,

· si vous avez présenté l'un des signes suivants après avoir pris de l'aspirine ou d'autres AINS:

o respiration sifflante, oppression respiratoire, difficulté à respirer (asthme),

o obstruction nasale due à des petits renflements de la muqueuse nasale (polypes nasaux),

o éruptions cutanées / urticaire,

o gonflement soudain des tissus sous la peau ou les muqueuses, tel qu'un gonflement autour des yeux, du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge, rendant éventuellement la respiration difficile (œdème de Quincke),

· si vous avez déjà présenté, après un traitement avec des AINS :

o un saignement de l'estomac ou des intestins,

o des perforations de l'estomac ou des intestins,

· ulcères ou saignement de l'estomac ou des intestins,

· antécédents d'ulcères ou de saignements récidivants peptiques ou de l'estomac (ulcération ou saignement résultant produit au moins deux fois),

· insuffisance hépatique sévère,

· insuffisance rénale sévère non dialysée,

· saignements récents dans le cerveau (hémorragie cérébrovasculaire),

· troubles hémorragiques de quelque type que ce soit,

· insuffisance cardiaque sévère,

· intolérance à certains sucrels étant donné que ce produit contient du lactose (voir également le paragraphe « AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé contient du lactose »).

Si vous n'êtes pas certain qu'un des points ci-dessus s'applique à vous, parlez-en à votre médecin.

Mise en garde spéciales et précautions particulières d'emploi :

Adressez-vous à votre médecin ou, pharmacien avant de prendre AFLAMIC.

Mises en garde

Tous les médicaments tels que AFLAMIC pourraient être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral. Le risque est d'autant plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de traitement prolongée.

Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement (voir rubrique 3 « Comment prendre AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé »).

Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez eu un accident vasculaire cérébral ou si vous pensez avoir des facteurs de risque pour ce type de pathologie, vous devez discuter de votre traitement avec votre médecin ou avec votre pharmacien. Par exemple :

· si vous avez une pression artérielle élevée (hypertension),

- si vous avez des taux élevés de sucre dans le sang;
- si vous avez un taux élevé de cholestérol dans le sang;
- si vous fumez.

Arrêtez immédiatement votre traitement si vous présentez des symptômes de saignement (donnant une coloration de l'appareil digestif (provoyant des douleurs abdominales), Des éruptions cutanées mettant potentiellement en danger la vie (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell), AFLAMIC, apparaissant sur le tronc d'abord, puis se déplaçant vers les membres, de cible ou des plaques circulaires ayant une bordure rougeâtre et une surface blanche). Les autres signes à surveiller sont les ulcérations génitales, et les conjonctivites et éruptions cutanées potentiellement mortelles sous forme de pseudo-grippaux. L'éruption peut évoluer vers un décollement de la peau.

Le risque de survenue de réactions cutanées graves survient dans les premières semaines de traitement.

Si vous avez développé un syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell alors que vous prenez AFLAMIC, vous ne devez pas prendre AFLAMIC. Si vous développez une éruption cutanée importante alors que vous prenez AFLAMIC, contactez un centre de soins de santé.

AFLAMIC ne convient pas au traitement des ulcères de l'estomac ou de l'iléum. AFLAMIC peut masquer les symptômes d'une infection. Si vous pensez que vous avez une infection, vous devez consulter un médecin.

Précautions particulières d'emploi

Comme il pourrait être nécessaire d'adapter votre traitement à votre état de santé, demandez conseil à votre médecin avant de prendre AFLAMIC.

- antécédent d'inflammation de l'oesophage (œsophagite), de l'estomac (gastrite) ou antécédent de tout autre affection de l'appareil digestif, exemple maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique;
- pression artérielle élevée (hypertension),
- si vous êtes âgé,
- maladie cardiaque, hépatique ou rénale,
- taux élevés de sucre dans le sang (diabète),
- volume sanguin diminué (hypovolémie), ce qui peut se produire si vous buvez beaucoup de sang, si vous avez été brûlé, ou si vous avez subi un accident avec perte importante de liquides,
- intolérance à certains sucrels diagnostiquée par votre médecin, contient du lactose;
- taux élevés de potassium dans le sang précédemment diagnostiqués;

Votre médecin devra s'assurer de suivre toute modification de votre état de santé et de votre traitement.

Enfants et adolescents

Sans objet.

Autres médicaments et AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé : Étant donné que l'action de AFLAMIC peut affecter, ou peut être affectée par d'autres médicaments, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

En particulier, prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris l'un des médicaments suivants :

- autres AINS,
- sels de potassium – utilisés pour prévenir ou traiter de faibles taux de potassium dans le sang

· tacrolimus – utilisé après une greffe d'organe

· triméthoprime – utilisé pour le traitement des infections de l'appareil urinaire

· médicaments utilisés pour prévenir la formation de caillots sanguins (anticoagulants),

· médicaments qui désagrégent les caillots sanguins (thrombolytiques),

· médicaments pour traiter les maladies cardiaques et rénales,

· corticostéroïdes (médicaments utilisés pour réduire l'inflammation et les réactions allergiques),

· ciclosporine – utilisée après les transplantations d'organes, dans les affections cutanées sévères, des pathologies comme la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome néphrotique,

· déféroxsozo – utilisé pour traiter une surcharge en fer due à de fréquentes transfusions sanguines

· médicaments diurétiques,

· médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle (par exemple bêta-bloquants),

· lithium – utilisé pour traiter les troubles de l'humeur,

· inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) – utilisés pour le traitement de la dépression,

· méthotrexate – utilisé pour traiter des tumeurs ou des affections cutanées incontrôlées et la polyarthrite rhumatoïde active,

· pémétrexed – utilisé pour traiter le cancer

· cholestyramine – utilisée pour faire baisser le cholestérol,

· antidiabétiques oraux (sulfonylurées, nateglinide) – utilisé pour le traitement du diabète.

Votre médecin doit suivre avec attention votre taux de sucre dans le sang, risque d'hypoglycémie.

AFLAMIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé avec des aliments et boissons : Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapie alternatives : Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité : Sans objet.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou