

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSÉMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0059288

Maladie

Dentaire

Optique


Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3723 Société : *174558*  
 Actif  Pensionné(e)  Autre :  
 Nom & Prénom : *BADREDDINE Blita*  
 Date de naissance : *28/10/1998*  
 Adresse : *Res. Al Taizy Tala C. 07. F. Al Fessanine*  
*May. Al Qads. Ben Naessi CASA*  
 Tél. : *0691968546* Total des frais engagés : *388,30 dhs.* Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation : *25/06/2023*

Nom et prénom du malade : *BADREDDINE Blita* Age : *25*

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint  Enfant

Nature de la maladie : *Myose Vaginale & gyn. utérine & extra*

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : *09/06/2023* Le : *09/06/2023*

Signature de l'adhérent(e) : *Blita*



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
25/08/12	CS	64		Dr. Mariano MCESET Médecin Dentiste Réf. 10000000000000000000000000000000 Sidi Bennour Tél. : 0922743214

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
BOUJEL PHARMACEUTIQUE 62, Bd. Souhaïbi - Casablanca Tel: 032740685 - Fax: 0522757984	28/08/12	388,30 DH

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux
				<input type="text"/>
<img alt="Diagram of a dental arch with numbered teeth from 1 to 8 on both upper and lower arches. A coordinate system is overlaid with H at the top, G at the right, D at the left, and B at the bottom. The diagram is used for				

- Echographie
- Suivi de grossesse
- ECG
- Suivi des maladies chroniques

- الفحص بالصدى
- تتبع الحمل
- تخطيط القلب
- متابعة الأمراض المزمنة

Casablanca, le

25 Sept 23

Badreddine Ghita

PHARMACIE  
BORJEL BERNOUSSI  
612, Bd. Souhaib Erroumi  
Sidi Bernoussi - Casablanca  
tel: 0522.74.06.85-Fax: 0522.75.79.84

11 caneflu 1g

1 gel/s

31.60 X 2 21 Peragin cre

1 cap x 16

(2 boite)

14.00 31 Doflo pomm 1g  
1 cap x 16

63.30 14 Ballong

1 gel

61.30 14 Relaxin 300g  
1 gel

123.90 X 2 14 16  
GL Rovaniqz 1000mg

les 15

Dr. Mariam MOBSIT  
Médecine générale  
Résidence ALFAJR GH  
Sidi Bernoussi - Casablanca

612, Bd. Souhaib Erroumi

Sidi Bernoussi

Casablanca

# بفاجين®

## نيترات إيكونازول

التركيب :

الشكل	السكونات	بفاجين دهن	بفاجين حملات نسائية
نيترات إيكونازول	ـ	ـ	ـ
سواع	ـ	ـ	ـ

الخواص :

مشتق إيميدازولي ذو مفعول مضاد للفطريات ويتوفر على طيف ذو فعالية جد متسعة وهو فعال على سائر الفطريات المعلنة وكذا على الباكتيريات من صنف غرام إيجابي.

دوعي الإستعمال :

يشار باستعمال بفاجين في النخالية المنشقة أو المبتلة، في داء المبيضات، في الفطر الجلدي بالجلد الأملس والغضون.

بفاجين حمولات يستعمل في داء الفطريات في الجهاز التناسلي المصحورة بالتعفن البكتيري أو لا.

ومفعوله على باكتيريات غرام إيجابي (+) يجعل استعماله كاف لوحده لمعالجة الفطريات الجلدية الملوثة.

موازن الإستعمال :

الحساسية المفرطة لنيترات إيكونازول

الأثار الجانبية :

نادرة: حكة، واحمرار الجلد.

المقادير :

- الدهن الجلدي : استعمال محلى في الصباح والمساء بواسطة دلك لطيف.

- الحمولات الخاصة بأمراض النساء: حمولة واحدة تقع بداخل الفرج مساواة عند النوم.

التقديم :

- الدهن الجلدي : أنيوبية بها 30 غرام.

- الحمولات الخاصة بأمراض النساء : علبة بها 3 حمولات.

الدهن : يحتفظ به في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

الحملات : يحتفظ بها في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

# Pevagine®

Nitrate d'Econazole

## Composition :

Produits	
Composition	
Nitrate	
d'Econazole	
Excipients q.s.p	

315°

## Propriétés :

Nitrate d'Econazole est un dérivé imidazole possédant un spectre d'action extrêmement large sur pratiquement tous les champignons pathogènes et les bactéries gram positif.

## Indications :

Pevagine est indiqué dans le pityriasis versicolor, les candidoses, les dermatophytoses de la peau glabre et des plis.

Pevagine ovules est indiqué dans le traitement des mycoses vaginales, surinfectées ou non par des bactéries.

Son activité sur les bactéries gram+ en indique l'usage en monothérapie dans les dermatomycoses surinfectées.

## Contre-indications :

Hypersensibilité au nitrate d'econazole.

## Effets indésirables :

Rares: sensation de brûlures, prurit et rougeur de la peau.

## Posologie :

- Crème dermique :

application matin et soir en massage doux jusqu'à pénétration complète.

- Ovules gynécologiques :

1 Ovule à introduire profondément dans le vagin le soir au coucher.

## Présentations :

- Crème dermique : tube de 30 g à 1% en nitrate d'éconazole.

- Ovules gynécologiques : boîte de 3 ovules gynécologiques dosées à 150mg.

Crème: A conserver à une température inférieur à 25°C.

Ovules: A conserver à une température inférieur à 30°C.

# بفاجين®

## نيترات إيكونازول

التركيب :

الشكل	السكونات	بفاجين حمولات نسائية	بفاجين دهن
نيترات إيكونازول	150 مغ	1 غرام	ـ
سواغ	كمية كافية لحمولة واحدة	كمية كافية	ـ

الخواص : مشتق إيميدازولي ذو مفعول مضاد للفطريات ويتوفر على طيف ذو فعالية جد متسعة وهو فعال على سائر الفطريات المعلنة وكذا على الباكتيريات من صنف غرام إيجابي.

دوعي الإستعمال :

يشار باستعمال بفاجين في التخالية المنشقة أو المتلونة، في دائء المبيضات، في الفطر الجلدي بالجلد الأملس والغضون. بفاجين حمولات يستعمل في دائرة الفطريات في الجهاز التناسلي المصحورة بالتعفن البكتيري أو لا.

ومفعوله على باكتيريات غرام إيجابي (+) يجعل استعماله كاف لوحده لمعالجة الفطريات الجلدية الملوثة.

موانع الإستعمال :

الحساسية المفرطة لنيترات إيكونازول

الأثار الجانبية :

نادرة: حكة، واحمرار الجلد.

المقادير :

- الدهن الجلدي : استعمال محللي في الصباح والمساء بواسطة ذلك لطيف.

- الحمولات الخاصة بأمراض النساء : حمولة واحدة ت quamid بداخل الفرج مساواة عند النوم.

التقديم :

- الدهن الجلدي : أنبوية بها 30 غرام.

- الحمولات الخاصة بأمراض النساء : علبة بها 3 حمولات.

الدهن : يحتفظ به في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

الحمولات : يحتفظ بها في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

# Pevagine®

Nitrate d'Econazole

## Composition :

Produits	Composition
	Nitrate d'Econazole
	Excipients q.s.p

31/60

## Propriétés :

Nitrate d'Econazole est un dérivé imidazole possédant un spectre d'action extrêmement large sur pratiquement tous les champignons pathogènes et les bactéries gram positif.

## Indications :

Pevagine est indiqué dans le pityriasis versicolor, les candidoses, les dermatophytoses de la peau glabre et des plis.

Pevagine ovules est indiqué dans le traitement des mycoses vaginales, surinfectées ou non par des bactéries.

Son activité sur les bactéries gram+ en indique l'usage en monothérapie dans les dermatomycoses surinfectées.

## Contre-indications :

Hypersensibilité au nitrate d'econazole.

## Effets indésirables :

Rares: sensation de brûlures, prurit et rougeur de la peau.

## Posologie :

- Crème dermique :

application matin et soir en massage doux jusqu'à pénétration complète.

- Ovules gynécologiques :

1 Ovule à introduire profondément dans le vagin le soir au coucher.

## Présentations :

- Crème dermique : tube de 30 g à 1% en nitrate d'éconazole.

- Ovules gynécologiques : boîte de 3 ovules gynécologiques dosées à 150mg.

Crème: A conserver à une température inférieur à 25°C.

Ovules: A conserver à une température inférieur à 30°C.



Laboratoires Pharmaceutiques PHARMA 5  
21, Rue des Asphodèles - Casablanca  
Yasmine LAHLOU FILALI - Pharmacien Responsable

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Signalez que vous prenez ce médicament si votre médecin vous prescrit un dosage du taux d'acide urique ou de sucre dans le sang.

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

#### COMMENT PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

Attention : cette présentation contient 1000 mg de paracétamol par comprimé : **ne pas prendre 2 comprimés à la fois.**

#### POSOLOGIE :

En raison de son dosage, ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 15 ans :

- La posologie usuelle est de 1 comprimé à 1000 mg par prise, à renouveler au bout de 6 à 8 heures. En cas de besoin, la prise peut être répétée au bout de 4 heures minimum.

- Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 3000 mg de paracétamol par jour, soit 3 comprimés par jour.

- Cependant, en cas de douleurs plus intenses, et sur avis de votre médecin, la posologie peut être augmentée jusqu'à 4000 mg par jour, soit 4 comprimés par jour. Les doses supérieures à 3000 mg de paracétamol par jour nécessitent l'avis médical.

**NE JAMAIS PRENDRE PLUS DE 4000 mg de PARACETAMOL PAR JOUR** (en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol dans leur formule).

Toujours respecter un intervalle de 4 heures au moins entre les prises.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

#### MODE D'ADMINISTRATION

##### Voie orale.

Le comprimé est à avaler tel quel avec une boisson (par exemple eau, lait, jus de fruits).

**Si vous avez pris plus de DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé que vous n'auriez dû :** Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre DOLIPRANE® 1000 mg comprimé :** Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

#### QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- dans certains cas rares, il est possible que survienne une éruption cutanée ou une réaction allergique. Il faut immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin.

- exceptionnellement, des modifications biologiques nécessitant un contrôle du bilan sanguin ont pu être observées : taux anormalement bas de certains éléments du sang (plaquettes) pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives. Dans ce cas, consultez un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### COMMENT CONSERVER DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

**Pas de précautions particulières de conservation.**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.



bottu s.a.

82, Allée des Casuarinas - Ain Sebâa - Maroc - Casablanca

S.Bachouchi - Pharmacien Responsable

LTM. 09/21 101022

# Doliprane® 1000mg

PARACÉTAMOL

Comprimé

## DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé :

La substance active est : paracétamol 1000 mg, sous forme de paracétamol DC 90 (1111,11 mg), pour un comprimé.

Les autres composants sont : croscarmellose sodique, providone K30, amidon de maïs prégélatinisé, acide stéarique (origine végétale).

## QU'EST -CE QUE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament contient du paracétamol. Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. Il peut également être prescrit par votre médecin dans les douleurs de l'arthrose.

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans) :

Lire attentivement la rubrique "Posologie".

Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

## QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ ?

### Contre-indications :

Ne pas prendre DOLIPRANE® 1000 mg, comprimé dans les cas suivants : allergie connue au paracétamol, maladie grave du foie, enfant de moins de 15 ans.

## PRENDRE DES PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES AVEC DOLIPRANE® 1000 mg, COMPRIMÉ :

### Précautions Particulières :

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de maladie grave du foie ou des reins, il est nécessaire de consulter votre médecin avant de prendre du paracétamol.

### Mises en garde :

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du paracétamol. Ne les associez pas avec d'autres médicaments contenant du paracétamol. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (1 comprimé par jour).

### Grossesse et allaitement :

Le Paracétamol, dans les conditions recommandées, n'a pas d'effets délétères sur la grossesse ainsi qu'en cas d'allaitement.

PPV:14DH00  
PER:06/26  
LOT:M1003





Gélule  
Voie orale

# Ballonyl®

Charbon activé

## COMPOSITION QUALITATIVE ET

Charbon activé ..... 162

Excipients : ..... qsp



## FORME ET PRESENTATIONS

Gélules

Boîte de 20, 30 et 60

## PROPRIETES

Ballonyl contient du charbon végétal activé. Grâce à son fort pouvoir adsorbant au niveau intestinal, il permet la capture des gaz, des toxines et des bactéries responsables de la fermentation.

Il possède un effet bénéfique sur le processus de digestion, en luttant contre les phénomènes de ballonnements et de flatulences.

## voie d'ADMINISTRATION ET UTILISATIONS

Voie orale

Prendre 2 gélules avec un grand verre d'eau, 3 fois par jour à distance des repas, en complément d'une alimentation variée et équilibrée. Renouveler les prises en fonction des sensibilités individuelles.

La posologie usuelle est de 4 gélules par jour. Sur les conseils de votre médecin ou de votre pharmacien, la posologie peut être portée à 6 gélules par jour.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un produit.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs substances, signaler à votre médecin ou à votre pharmacien tout traitement en cours.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

Garder hors de portée des enfants.

A conserver dans un endroit sec et frais.

Autorisation ministère de santé n° : DA20181805313DMP/20UCAV1

• Des rougeurs généralisant à tout le corps avec des pustules et une fièvre. Il peut s'agir d'une réaction grave appelée pustulose exanthématique aigüe généralisée. Cet effet survient généralement en début de traitement. Si cet effet survient, vous ne devrez plus jamais prendre de médicament contenant de la spiramycine.

• Une allergie. Vous la reconnaîtrez par des éruptions (tels que des boutons), une urticaire (réaction de la peau similaire à celle qui provoque la piqûre d'ortie), des démangeaisons, un brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), un malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

• Une éruption cutanée avec décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient (Syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson). Si cet effet survient, vous ne devrez plus jamais prendre de médicament contenant de la spiramycine.

#### Les effets suivants peuvent également survenir :

• Effets digestifs : régulièrement, des douleurs au niveau de l'abdomen, des douleurs à l'estomac, des nausées, des vomissements, une diarrhée, et très rarement, des coliques pseudomembranées (maladie de l'intestin reconnaissable par des diarrhées et des douleurs abdominales).

• Effets sur le système nerveux : très fréquemment, des sensations de picotement ou de fourmillement survenant occasionnellement et de façon passagère. Fréquemment, un trouble transitoire de la perception normale du goût (dysgueuse).

• Effets hépatiques : cas d'hépatite (inflammation du foie).

• Effets visuels lors d'une prise de sang : très rarement, une modification des tests évaluant l'état de votre foi, une leucopénie (une diminution du nombre de globules blancs), une neutropénie (quantité insuffisante de certains globules blancs dans le sang), une anémie hémolytique (destruction des globules rouges du sang).

• Effet sur le cœur et les vaisseaux : un allongement de l'intervalle QT (anomalie visible sur un électrocardiogramme), cœur qui bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière (arythmie ventriculaire), rythme des battements du cœur anormalement rapides (tachycardie ventriculaire), troubles du rythme cardiaque graves (torsades de pointes). (voir rubrique 2. « QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ROVAMYCINE ? »)

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne se serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'adresse email : pharmacovigilance.maroc@sanoft.com/ Tel standard : 05 22 66 90 00.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé

Spiramycine ..... 3 MILLIONS UI. 3 M.U.I.

Excipients : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, amidon de maïs gélifiable, hydroxypropylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique réticulé, cellulose microcristalline, méthylhydroxypropylcellulose, polyoxyéthyléneglycol 6000, dioxyde de titane E 171, pour un comprimé pelliculé.

Qu'est-ce que ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé et contenu

#### de l'emballage extérieur

Rovamycine se présente sous forme de comprimé pelliculé.

Rovamycine 3 M.U.I. : chaque boîte contient 10 et 16 comprimés.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Avril 2017.

#### Titulaire de l'AMM :

sanoft-aventis Maroc  
Route de Rabat R. P1 - Ain Sebaâ.

#### Fabricant :

Laboratoires Maphar - Zenata  
Km 10, Route côtière  
111, quartier industriel Zenata  
Ain Sebaâ  
20250 Casablanca – Maroc

#### CONSEIL D'EDUCATION SANITAIRE :

##### QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus. Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

##### En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2- Respectez strictement votre ordonnance.

3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.

# ROVAMYCINE® 3 M.U.I.

Spiramycine

comprimé pelliculé

SANOFI

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antibactérien, à usage systémique, code ATC : J01FA02.

Antibiotique antibactérien de la famille des macrolides.

Il est utilisé pour traiter ou éviter certaines infections causées par des bactéries sur lesquelles la spiramycine a un effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la spiramycine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### Avertissemens et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé.

Rovamycine dosé à 3 MILLIONS d'Unités Internationales est réservé à l'adulte. Vous devez prévenir votre médecin avant de prendre ce traitement.

Si vous avez déjà eu des problèmes cardiaques : il faut être prudent avec ce type de médicament si vous êtes né avec ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé à l'électrocardiogramme (ECG)), si vous avez un déséquilibre électrolytique dans le sang (en particulier des taux bas de potassium ou de magnésium dans le sang), si vous avez un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si vous avez un cœur affaibli (insuffisance cardiaque), si vous avez des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme, ou si vous êtes âgée(e) ou si vous prenez d'autres médicaments qui peuvent entraîner certaines anomalies de l'ECG (voir rubrique « Autres médicaments et Rovamycine »).

Si vous souffrez d'une maladie héréditaire rare affectant le nombre de vos globules rouges et qui provoque une fatigue, des pâleur ou des difficultés à respirer (maladie que l'on appelle déficit en Glucose-6-Phosphate-Déshydrogénase).

En début de traitement, vous devez prévenir immédiatement votre médecin. Si vous avez une rougeur qui se généralise à tout votre corps avec des pustules et accompagnée de fièvre. Il peut alors s'agir d'une réaction grave appelée pustulose exanthématische aiguë généralisée (voir également la rubrique 4. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »). Dans ce cas, il est important de prévenir immédiatement votre médecin car cette situation impose l'arrêt du traitement. Si vous avez une réaction de ce type, vous ne pourrez plus jamais prendre un médicament contenant de la spiramycine seule ou associée à une autre substance active.

À cours du traitement :

Dès cas de réactions cutanées sévères à type éruption de bulles avec décollement de la peau, souvent rapidement s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient rapportés avec la Ro de survenu de ce type.

Adressez-vous à votre ROVAMYCINE 3 M.U.I.

LOT : 21E001  
CP PEL B16

P.E.V. 123DH90

culé pris au

6 118000 060277

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

La substance active (la spiramycine) passe dans le lait maternel. L'allaitement est déconseillé en cas de traitement par ce médicament. Des troubles digestifs peuvent survenir chez le nouveau-né.

## 3. COMMENT PRENDRE ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé ? Posologie

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Rovamycine dosé à 3 MILLIONS d'Unités Internationales (3 M.U.I.) est réservé à l'adulte.

### A titre d'information :

Pour le traitement de certaines infections :

La dose habituelle est de 2 ou 3 comprimés dosés à 3 M.U.I. par jour (soit 6 à 9 MILLIONS d.U.I. par jour), en 2 ou 3 prises.

Si votre médecin a prescrit ce médicament pour traiter une angine, la durée du traitement recommandée est de 10 jours.

### Pour la prévention de certaines infections :

La dose habituelle est de 3 M.U.I. (soit 1 comprimé) toutes les 12 heures pendant 5 jours.

### Mode d'administration

Ce médicament doit être avalé avec un verre d'eau.

Vous devez répartir le nombre de comprimé en 2 ou 3 prises au cours de la journée.

### Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être pris à la dose prescrite et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura indiqué.

La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.

L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou d'interrompre votre traitement serait sans effet sur cette impression et retarderait votre guérison.

Si vous avez pris plus de ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû

Consultez votre pharmacien ou médecin car selon vos symptômes, un traitement ou une surveillance peut être nécessaire.

Si vous oubliez de prendre ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous devez arrêter le traitement et contacter immédiatement votre médecin si l'un des signes suivants apparaît :

• Des rougeurs se généralisant à tout le corps avec des pustules et une fièvre. Il peut s'agir d'une réaction grave appelée pustulose exanthématique aiguë généralisée. Cet effet survient généralement en début de traitement. Si cet effet survient, vous ne devrez plus jamais prendre ce médicament contenant de la spiramycine.

• Une allergie. Vous la reconnaîtrez par des éruptions (telles que des boutons), une urticaire (réaction de la peau similaire à celle que provoque la piqûre d'orme), des démangeaisons, un brusque gonflement du visage et du cou (œdème de Quincke), un malaise brutal avec baisse importante de la pression artérielle (choc anaphylactique).

• Une éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient (syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson). Si cet effet survient, vous ne devrez plus jamais prendre de médicament contenant de la spiramycine.

#### **Les effets suivants peuvent également survenir :**

• Effets digestifs : fréquemment, des douleurs au niveau de l'abdomen, des douleurs à l'estomac, des nausées, des vomissements, une diarrhée, et très rarement, des colites pseudomembraneuses (maladie de l'intestin reconnaissable par des diarrhées et des douleurs abdominales).

• Effets sur le système nerveux : très fréquemment, des sensations de picotement ou de fourmillement survenant occasionnellement et de façon passagère. Fréquemment, un trouble transitoire de la perception normale du goût (dysgueusie).

• Effets hépatiques : cas d'hépatite (inflammation du foie).

• Effets visibles lors d'une prise de sang : Très rarement, une modification des tests évaluant l'état de votre foie, une leucopénie (une diminution du nombre de globules blancs), une neutropénie (quantité insuffisante de certains globules blancs dans le sang), une anémie hémolytique (destruction des globules rouges du sang).

• Effet sur le cœur et les vaisseaux : un allongement de l'intervalle QT (anomalie visible sur un électrocardiogramme), cœur qui bat trop vite, trop lentement, ou de manière irrégulière (arythmie ventriculaire), rythme des battements du cœur anormalement rapides (tachycardie ventriculaire), troubles du rythme cardiaque graves (torsades de pointes). [voir rubrique 2. « QUELLES SONT LES

INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ROVAMYCINE ? »]

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via l'adresse email : pharmacovigilance.maroc@sanofi.com/ Tel standard : 05 22 66 90 00. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

##### **Ce que contient ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé**

Spiramycine ..... 3 M.U.I.  
Excipients : silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, amidon de maïs gélifiant, hydroxypropylcellulose, carboxyméthylcellulose sodique réticulé, cellulose microcristalline, méthylhydroxypropylcellulose, polyoxyéthyléneglycol 6000, dioxyde de titane E 171, pour un comprimé pelliculé.

Qu'est-ce que ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé et contenu

#### **de l'emballage extérieur**

Rovamycine se présente sous forme de comprimé pelliculé.

Rovamycine 3 M.U.I. : chaque boîte contient 10 et 16 comprimés.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Avril 2017.**

#### **Titulaire de l'AMM :**

sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat R. P.1 - Ain Sebaâ.

20250 Casablanca

#### **Fabricant :**

Laboratoires Maphar - Zenata

Kim 10, Route côtière

111, quartier industriel Zenata

Aïn Sebaâ

20250 Casablanca - Maroc

#### **CONSEIL D'EDUCATION SANITAIRE :**

##### **QUE SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?**

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient particulièrement à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas :

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

#### **En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :**

1- N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.

2- Respectez strictement votre ordonnance.

3- Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.

4- Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.

5- Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.



# ROVAMYCINE® 3 M.U.I.

Spiramycine

comprimé pelliculé

SANOFI

## Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourra leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## 1. QU'EST-CE QUE ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : antibactérien, à usage systémique, code ATC : J01FA02.

Antibiotique antibactérien de la famille des macrolides.

Il est utilisé pour traiter ou éviter certaines infections causées par des bactéries sur lesquelles la spiramycine a un effet.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la spiramycine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé.

Rovamycine dosé à 3 MILLIONS d'Unités Internationales est réservé à l'adulte.

**Vous devez prévenir votre médecin avant de prendre ce traitement :**

Si vous avez déjà eu des problèmes cardiaques : il faut être prudent avec ce type de médicament si vous êtes né avec ou si vous avez des antécédents familiaux d'allongement de l'intervalle QT (observé à l'électrocardiogramme (ECG)), si vous avez un déséquilibre électrolytique dans le sang (en particulier des taux bas de potassium ou de magnésium dans le sang), si vous avez un rythme cardiaque très lent (appelé « bradycardie »), si vous avez un cœur affaibli (insuffisance cardiaque), si vous avez des antécédents de crise cardiaque (infarctus du myocarde), si vous êtes une femme, ou si vous êtes âgée(s) ou si vous prenez d'autres médicaments qui peuvent entraîner certaines anomalies de l'ECG (voir rubrique « Autres médicaments et Rovamycine »).

Si vous souffrez d'une maladie héréditaire rare affectant le nombre de vos globules rouges et qui provoque une fatigue, des pâleur(s) ou des difficultés à respirer (maladie que l'on appelle déficit en Glucose-6-Phosphate-Déshydrogénase).

En début de traitement, vous devez prévenir immédiatement votre médecin.

Si vous avez une rougeur qui se généralise à tout votre corps avec des pustules et accompagnée de fièvre. Il peut alors s'agir d'une réaction grave appelée pustulose exanthématische aigüe généralisée (voir également la rubrique 4. « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »). Dans ce cas, il est important de prévenir immédiatement votre médecin car cette situation impose l'arrêt du traitement. Si vous avez une réaction de ce type, vous ne pourrez plus jamais prendre un médicament contenant de la spiramycine seule ou associée à une autre substance active.

**Au cours du traitement :**

Des cas de réactions cutanées sévères à type éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre à tout le corps et mettre en danger le patient (Syndrome de Lyell, syndrome de Stevens-Johnson, ont été rapportés avec la Rovamycine. Prévenez immédiatement votre médecin en cas de survenu de ce type d'effet.

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé.

### Autres m<sup>es</sup>seignes de ROVAMYCINE 3 MILLIONS UI, comprimé pelliculé

Informez pourriez Grossesse : Si vous êtes planifiez avant de En cas de médicament Pédiatrie : P.P.V. 1230H90

Comment pris ou

grossesse. Ce

meilleur pris ou

grossesse. Ce