

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

M22- N° 003908

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 26.17 Société : RAM

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : CHAJIA MOHAMED AYMAN

Date de naissance : 02/11/56

Adresse : HABITUELLE

Tél. : 0670274025 Total des frais engagés : 814,50 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 21/09/2023

Nom et prénom du malade : 3MIBON CL MAMOUNI FAYCIA Age :

Lien de parenté : Fils-méme Conjoint Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 04/09/2023

Signature de l'adhérent(e) : 

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/06/2013	St Po	1	300 Dhs	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	07/06/2013	514.50

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des travaux
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			Coefficient des travaux
	H	25533412 00000000 35533411	G	21433552 00000000 11433553
D	00000000	B	00000000	MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre.

- En cas de persistance des symptômes, consultez votre médecin.
- Evitez de toucher l'œil avec l'embout du flacon.
- Ne pas injecter, ne pas avaler.

Autres médicaments et LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre

Si vous utilisez actuellement (ou avez prévu d'utiliser) un autre collyre, attendez 15 minutes entre les instillations. Informez votre médecin ou votre

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas conserver de flacon entamé au-delà de 8 semaines.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre

pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre contient des phosphates

Ce médicament contient 37,3 microgrammes de phosphates par goutte équivalent à 1,25 mg/ml.

• La substance active est : Chlorure de sodium..... 0,900 g ..
Pour ..

• Les autres composants sont Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté, dihydrogén sodium dihydraté, eau pour injectables (voir « phosphates » et 4).

Qu'est ce que LARMABAI CENT, collyre et contenu extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre. Boîte de 1 flacon de

Titulaire

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri, Casablanca - Pharmacien Responsable : Mme Amina DAOUDI



LARMABAK 0,9%
Collyre 10 ml - PPV : 54,10 DH

pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre contient des phosphates

Ce médicament contient 37,3 microgrammes de phosphates par goutte équivalent à 1,25 mg/ml.

• La substance active est : Chlorure de sodium..... 0,900 g ..
Pour ..

• Les autres composants sont Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté, dihydrogén sodium dihydraté, eau pour injectables (voir « phosphates » et 4).

Qu'est ce que LARMABAI CENT, collyre et contenu extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre. Boîte de 1 flacon de

Titulaire

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri, Casablanca - Pharmacien Responsable : Mme Amina DAOUDI



LARMABAK 0,9%
Collyre 10 ml - PPV : 54,10 DH

pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre contient des phosphates

Ce médicament contient 37,3 microgrammes de phosphates par goutte équivalent à 1,25 mg/ml.

• La substance active est : Chlorure de sodium..... 0,900 g ..
Pour ..

• Les autres composants sont Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté, dihydrogén sodium dihydraté, eau pour injectables (voir « phosphates » et 4).

Qu'est ce que LARMABA
CENT, collyre et contenu extérieur ?

Ce médicament se présente en collyre. Boîte de 1 flacon de

Titulaire

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri,
Casablanca - Pharmacien Responsable : Mme Amina DAOUDI



LARMABAK 0,9%
Collyre 10 ml - PPV : 54,10 DH

pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre contient des phosphates

Ce médicament contient 37,3 microgrammes de phosphates par goutte équivalent à 1,25 mg/ml.

• La substance active est : Chlorure de sodium..... 0,900 g ..
Pour ..

• Les autres composants sont Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté, dihydrogén sodium dihydraté, eau pour injectables (voir « phosphates » et 4).

Qu'est ce que LARMABA
CENT, collyre et contenu extérieur ?

Ce médicament se présente en collyre. Boîte de 1 flacon de

Titulaire

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri,
Casablanca - Pharmacien Responsable : Mme Amina DAOUDI



LARMABAK 0,9%
Collyre 10 ml - PPV : 54,10 DH

pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Grossesse et allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

LARMABAK 0,9 POUR CENT, collyre contient des phosphates

Ce médicament contient 37,3 microgrammes de phosphates par goutte équivalent à 1,25 mg/ml.

• La substance active est : Chlorure de sodium..... 0,900 g ..
Pour ..

• Les autres composants sont Hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté, dihydrogén sodium dihydraté, eau pour injectables (voir « phosphates » et 4).

Qu'est ce que LARMABAI CENT, collyre et contenu extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de collyre. Boîte de 1 flacon de

Titulaire

Distribué par COOPER PHARMA - 41, rue Mohamed Diouri, Casablanca - Pharmacien Responsable : Mme Amina DAOUDI



LARMABAK 0,9%
Collyre 10 ml - PPV : 54,10 DH

chlorure de sodium, tétracémate de sodium, alcool polyvinyle, méthylhydroxypropylcellulose, acide chlorhydrique et/ou hydroxyde de sodium pour ajuster le pH, eau purifiée..... q.s.p. 100 ml

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre, flacon compte-gouttes de 3 ml.

d) CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

CORTICOÏDES

e) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE / EXPLOITANT

Laboratoires ALCON

4, Rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92563 RUEIL-MALMAISON CEDEX

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

ALCON CUSÍ, S.A.

E-08320 El Masnou-Barcelone

**2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)**

La fluorométholone est un anti-inflammatoire qui appartient au groupe des corticoïdes.

Ce médicament est indiqué pour traiter certaines maladies inflammatoires de

ce médicament est indiqué pour traiter certaines maladies de l'œil.

3. ATTENTION !

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ? (CONTRE-INDICATIONS)

En cas d'infection ou de lésions de la surface de l'œil (surtout telle qu'une infection bactérienne, fongique (due à un champignon copique) virale (provoquée, par exemple, par le virus herpétique varicelle-zona) ou amibienne).

Si vous êtes allergique à la fluorométholone c'est à l'un des autres contenus dans Flucon en particulier au chlorure de benzalkonium.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPECIALES

Si l'un de ces cas vous correspond, dites-le à votre médecin et FLUCON.

Faites attention avec FLUCON

- en cas d'utilisation prolongée de collyres par voie oculaire
- si la réaction inflammatoire ne diminue pas dans un délai raisonnable au cours du traitement, parlez-en à votre médecin. Vous souffrez peut-être



Faites attention avec Xolamol® collyre Avant

d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous avez ou avez eu dans le passé:

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou oppression thoracique, un essoufflement ou étouffement), angor de Prinzmetal (douleur à la poitrine en se reposant), insuffisance cardiaque, hypotension.
- perturbations du rythme cardiaque tels que des pouls lents.
- problèmes respiratoires, asthme ou maladie pulmonaire obstructive chronique.
- maladie de la circulation sanguine pauvre (comme la maladie de Raynaud ou le syndrome de Raynaud)
- diabète comme Xolamol® collyre peut masquer les signes et symptômes de l'hypoglycémie.
- hyperactivité de la glande thyroïde comme Xolamol® collyre peut masquer les signes et les symptômes.
- problèmes de foie, si vous avez une faiblesse musculaire ou avez été diagnostiquée comme ayant la myasthénie.
- toute allergie à un médicament que vous avez pris.

Si vous développez une conjonctivite (rougeur et irritation des yeux), un gonflement de l'œil ou des paupières, une éruption cutanée ou des démangeaisons

injection:

Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

Très fréquent (affectant plus de 1 utilisateur sur 10):

Brûlures et picotements des yeux, goût inhabituel.

Fréquent (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 100):

Rougeur de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux), larmoiement ou démangeaisons de l'œil (des yeux), et des effets sur la surface de l'œil (des yeux), gonflement et/ou irritation de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux), sensation d'avoir quelque chose dans l'œil (érosion de la cornée), diminution de la sensibilité cornéenne (ne pas réaliser d'avoir quelque chose dans les yeux et ne pas ressentir de la douleur), douleur oculaire, yeux secs, vision trouble, maux de tête, sinusite (sensation de tension ou de plénitude dans le nez), sensation d'être malade, aussi que des nausées et de la fatigue.

Peu fréquent (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 1000): Étourdissements, dépression, inflammation de l'iris, vision floue (dans certains cas, en raison de l'arrêt des médicaments pour traiter la contraction excessive de la pupille de l'œil), ralentissement du

Xolamol®

Lot: Fab: Exp:

PP.V: 110 DH 70

~~Contra-indications~~ au rythme cardiaque produisant un rythme cardiaque anormalement lent ou une insuffisance cardiaque grave.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux) **contactez immédiatement votre médecin**. Ces symptômes peuvent être dus à une réaction allergique ou peuvent être un effet secondaire de Xolamol® (secondaires possibles).

Si vous développez une douleur oculaire, maux de tête ou de la tête, ou si vous développez d'autres symptômes.

les de contact couples, il est recommandé que les soient enlevées avant de les remettre pas dans vos yeux. Si vous avez mal aux yeux ou que le benzalkonium peut entraîner une irritation des yeux (voir section 6).

Si vous avez eu dans le passé des symptômes tels que l'asthme, la maladie de Crohn, la maladie tonique sévère (maladie de Gougerot-Sjögren),

ou une réaction allergique soudaine et sévère au benzalkonium chlorure ou au xylamol® collyre, ne prenez pas ce médicament.

Si vous pensez que l'un de ces cas vous concerne, n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.



rythme cardiaque, évanouissement, respiration laborieuse, indigestion, et calculs rénaux (souvent marqués par l'apparition soudaine d'une atrope, la douleur des crampes dans leur bas du dos et/ou du côté, leur aine ou leur abdomen).

Rare (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 10 000):

Lupus érythémateux disséminé (une maladie immunitaire qui peut provoquer une inflammation des organes internes), picotements ou engourdissement des mains ou des pieds, troubles du sommeil, cauchemars, perte de mémoire, affaiblissement des muscles, diminution de la libido, accident vasculaire cérébral, myopie temporaire qui peut résoudre lorsque le traitement est arrêté, le développement de fluide

entre les voies respiratoires et le corps après une difficulté à avaler ou à respirer, urticaire ou éruption cutanée avec démangeaisons, éruption localisée et généralisée, démangeaisons, réaction allergique soudaine et sévère.

peut entraîner des effets indésirables semblables comme on le voit avec des agents bêta-bloquants par voie intraveineuse et/ou « orale ». L'incidence des effets indésirables après l'administration ophtalmique topique est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, pris par voie orale ou par

essoufflement ou étouffement), angor de Prinzmetal (douleur à la poitrine en se reposant), insuffisance cardiaque, hypotension.

- perturbations du rythme cardiaque tels que des pouls lents.
- problèmes respiratoires, asthme ou maladie pulmonaire obstructive chronique.
- maladie de la circulation sanguine pauvre (comme la maladie de Raynaud ou le syndrome de Raynaud)
- diabète comme Xolamol® collyre peut masquer les signes et symptômes de l'hypoglycémie.
- hyperactivité de la glande thyroïde comme Xolamol® collyre peut masquer les signes et les symptômes.
- problèmes de foie, si vous avez une faiblesse musculaire ou avez été diagnostiqué comme ayant la myasthénie.
- toute allergie à un médicament que vous avez pris. Si vous développez une conjonctivite (rougeur et irritation des yeux), un gonflement de l'oeil ou des paupières, une éruption cutanée ou des démangeaisons de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux) **contactez immédiatement votre médecin**. Ces symptômes peuvent être dus à une réaction allergique ou peuvent être un effet secondaire de Xolamol® collyre (voir «Effets secondaires possibles»).⁴

Dites à votre médecin si vous développez une

Brûlures et picotements des yeux, goût inhabituel.

Fréquent (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 100): Rougeur de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux), larmoiement ou démangeaisons de l'œil (des yeux), et des effets sur la surface de l'œil (des yeux), gonflement et/ou irritation de l'œil (des yeux) et autour de l'œil (des yeux), sensation d'avoir quelque chose dans l'œil (érosion de la cornée), diminution de la sensibilité cornéenne (ne pas réaliser d'avoir quelque chose dans les yeux et ne pas ressentir de la douleur), douleur oculaire, yeux secs, vision trouble, maux de tête, sinusite (sensation de tension ou de plénitude dans le nez), sensation d'être malade, aussi que des nausées et de la fatigue.

Peu fréquent (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 1000): Étourdissements, dépression, inflammation de l'iris, vision floue (dans certains cas, en raison de l'arrêt des médicaments pour traiter la contraction excessive de la pupille de l'œil), ralentissement du rythme cardiaque, évanouissement, respiration laborieuse, indigestion, et calculs rénaux (souvent marqués par l'apparition soudaine d'une atroce, la douleur des crampes dans leur bas du dos et/ou du côté, leur aine ou leur abdomen).

Rare (affectant 1 à 10 utilisateurs sur 10 000):

Lympho-érythémateux disséminé (une maladie

subissez une chirurgie oculaire, développez d'autres réactions ou aggravation des symptômes.

Si vous portez **des lentilles de contact souples**, il est important que vos lentilles soient enlevées avant d'utiliser votre collyre et ne les remettez pas dans vos yeux jusqu'à 15 minutes après l'utilisation de votre collyre comme le chlorure de benzalkonium peut éventuellement décolorer les lentilles de contact.

Avant la **chirurgie et l'anesthésie** (même chez le dentiste), dites à votre médecin ou votre dentiste que vous utilisez Xolamol® collyre, comme ce médicament peut modifier les effets de certains médicaments utilisés pendant l'anesthésie et il peut y avoir une chute brutale de la pression artérielle associée à l'anesthésie.

Utilisation chez l'enfant

L'expérience est limitée avec Xolamol® collyre chez les nourrissons et les enfants.

Utilisation chez les personnes âgées

n'utilisez pas Xolamol® collyre avant d'avoir consulté votre médecin.

Faites attention avec Xolamol® collyre Avant d'utiliser ce médicament, dites à votre médecin si vous avez ou avez eu dans le passé:

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou oppression thoracique, un

immunitaire qui peut provoquer une inflammation des organes internes), picotements ou engourdissement des mains ou des pieds, troubles du sommeil, cauchemars, perte de mémoire, affaiblissement des muscles, diminution de la libido, accident vasculaire cérébral, myopie temporaire qui peut résoudre lorsque le traitement est arrêté, le développement de fluide sous la rétine (décollement chirurgie de filtrante), tombé double, encroûtement des paupières (avec des symptômes de pression intraoculaire basse oreille, pression artérielle basse irrégulier, douleurs thoraciques cardiaques rapides et/ou irrégulières (accumulation de liquide), insuffisance cardiaque congestive avec essoufflement et gonflement des jambes en raison de l'accumulation sanguine réduit vers le cerveau).

topique est plus faible que lorsqu'il est pris par voie orale ou par injection.. Les effets indésirables suivants peuvent être observés avec Xolamol® collyre ou l'un de ses composants:

Très fréquent (affectant plus de 1 utilisateur sur

Lot:
Exp:
Fab:
P.P.V : 110 DH 70

زنلامول®
Xolamol®