

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0023367

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 7180 Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

MACKI ABDEL HAMID

Date de naissance :

Adresse :

Tél. : ..... Total des frais engagés : ..... Dhs

### Cadre réservé au Médecin

**DR. RACHIDI Imane**  
Médecin Général - Echographie  
- BERRECHID -  
Tél.: 0522 32 47 26

Cachet du médecin :

Date de consultation :

29/08/2023

Nom et prénom du malade : Haddouc Hanane, Age:

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Golo, oléothérapie

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :


Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le / /

Signature de l'adhérent(e) :



#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/08/23	g.	-	17201	DR. RACHID HADJ DRISS Médecin Généraliste BERRECHID 32 41 26 tel.: 0522 32 41 26

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	29.08.23	353,30

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	29.08.23		373,00 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

#### **RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES**

**Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.**

### **Important :**


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F  
PROTHESES DENTAIRES

## DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
D	
00000000	00000000
35533411	11433553

#### **[Création, remont, adjonction]**



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur RACHIDI Imane

Médecine Générale

Echographie Générale

Diplôme de la Faculté de Médecine  
de Montpellier - France



الدكتورة رشيدى ايمان

المطب العام

الفحص بالصدى

دبلوم من كلية الطب  
مونبليي - فرنسا

Berrechid, le :

29/08/23

برشيد، في :

Habib

(\*) Haima

1 - Selipro 200

40,00  $\times$  25

IP

2 - Aeticabine

46,90  $\times$  30

IP

3 - Promecam 50

31,50

IP

4 - I aely 80

40,50  $\times$  3

IP

Dr. RACHIDI Imane  
Medecin Gén. - Echographie  
BERRECHID

05 22 32 47 26

554 شارع إدريس الحريري الحسني - برشيد - الهاتف : 05 22 32 47 26

554 , Boulevard Idriss Lahrizi Hay El Hassani - Berrechid - Tél : 05 22 32 47 26

13,40 x 3      Levohypox PD      MP / T       $\alpha$  O<sub>2</sub> max

353,30

من المستحسن أن تأخذ بعدها عن بيفوروكس ( أكثر من 2 ساعه  
إن أمكن) الأدوية التالية:

• الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،  
• الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي ( راتجات التبادل  
الأيوني، سوكرفات، الموضعى المعدى - المعنوى، مضادات  
الحموضة والمنتصات)،  
• مسيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم  
عند مريض غسيل الكلى  
• المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد  
تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:  
• الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،

• الأدوية لعلاج السل،

• الأدوية لعلاج الملاريا ( الكلوروكين / البروغوانيل،

• الأدوية التي تحتوى على هرمون الاستروجين، لغير  
منه للحمل

• الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،

• المواد الأخرى مثل إيماتينيب، سونيتينيب، أورليستات،  
عليكم باشعار طبيكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصوص قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد  
يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية  
مكملات مع الصوص.

استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة


إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعندين أن تكونين  
حاملاً أو تخططين للحمل، اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول  
هذا الدواء.

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف  
الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

## 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

### قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوى ليفوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ،  
100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟



المادة الفعالة هي :

ليفوتيروكسين صودي ..... 25 ميكروغرام

..... 50 ..... 50 ميكروغرام

..... 100 ..... 100 ميكروغرام

..... 200 ..... 200 ميكروغرام

لقرص قابل للقطع

توزن أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين،

بروسخارمير صودي، ستيرات المغنيزيوم

قائمة السواغات ذو تأثير معروف

لاكتوز

الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.

كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانع:

ميرك كيه جي ايه ايه - فرانكفورتر شتراس 250 - 64293 دار

مشتقات - المانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،

المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسلیم

القائمة ||

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30 أبريل 2015

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque malaise ou une réaction indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre pharmacien pour toute amélioration ou si vous n'avez pas d'amélioration.

319334



6 118001 103041  
**Tardyferon® 80mg**  
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### PRÉPARATIONS ANTIANÉMIES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique [hypersensible] au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sués, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinale chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment, exemple).

• prenez des médicaments injectables contenant de l'acide alginique.

• prenez des médicaments contenant de l'acide chlorhydrique.

• prenez certains antibiotiques (les céphalosporines, les fluoroquinolones).

• prenez des médicaments pour traiter une maladie des os (bisphosphonates, le strontium).

• prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).

• Si vous prenez des médicaments pour traiter une maladie de l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa.

• Si vous prenez du zinc ou du calcium.

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de votre estomac : topiques gastriques, antiacides (sels d'aluminium, de calcium).

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de l'intestin (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous êtes récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé : Boissons

La consommation concomitante de laitage, de jus de fruit, de vin rouge, de légumineuses, d'œufs ou d'eau peut réduire l'absorption du fer par l'organisme.

### Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible.

Si vous êtes enceinte ou que vous allez l'être, informez votre pharmacien ou votre médecin avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de ce médicament sur la conduite de véhicules et l'utilisation des machines.

## 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament dans les indications de votre médecin ou pharmacien.

### Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants et aux adultes.

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque malaise ou une réaction indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre pharmacien pour toute amélioration ou si vous n'avez pas d'amélioration.

319334



6 118001 103041  
**Tardyferon® 80mg**  
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### PRÉPARATIONS ANTIANÉMIES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique [hypersensible] au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sués, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinale chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment, exemple).

• prenez des médicaments injectables contenant de l'acide alginique.

• prenez des médicaments contenant de l'acide chlorhydrique.

• prenez certains antibiotiques (les céphalosporines, les fluoroquinolones).

• prenez des médicaments pour traiter une maladie de l'appareil urinaire (ácidoses, phosphonates, le strontium).

• prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).

• Si vous prenez des médicaments pour traiter une maladie de l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa.

• Si vous prenez du zinc ou du calcium.

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de votre estomac : topiques gastriques, antiacides (sels d'aluminium, de calcium).

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de l'œsophage (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous êtes récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé : Boissons

La consommation concomitante de laitage, de jus de fruit, de vin rouge, de légumineuses, d'œufs ou d'eau peut réduire l'absorption du fer par l'organisme.

### Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible.

Si vous êtes enceinte ou que vous allez l'être, informez votre pharmacien ou votre médecin avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de ce médicament sur la conduite de véhicules et l'utilisation des machines.

## 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament dans les indications de votre médecin ou pharmacien.

• Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants et aux adultes.

# Tardyferon® 80 mg

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque malaise ou une réaction indésirable qui ne serait pas dans la rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre pharmacien pour toute amélioration ou si vous n'avez pas d'amélioration.

319334



6 118001 103041  
**Tardyferon® 80mg**  
30 comprimés pelliculés

Distribué par COOPER PHARMA  
41, Rue Mohamed Diouri - Casablanca  
Pharmacien Responsable : Amina DAOUDI

## Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

### PRÉPARATIONS ANTIANÉMIES

Ce médicament est un apport en fer. Il est recommandé dans l'anémie par carence en fer et pour prévenir cette carence pendant la grossesse lorsqu'un apport alimentaire en fer est insuffisant.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE TARDYFERON 80 mg, comprimé pelliculé ?

### Ne prenez jamais TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé :

- si vous êtes allergique [hypersensible] au fer ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous avez une anémie (quantité insuffisante de globules rouges dans le sang) non liée à une carence en fer.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé.

Si vous prenez TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé pour un manque de fer, il faudra également rechercher la cause de ce manque afin de la traiter.

Si votre manque de fer est associé à une maladie inflammatoire, le traitement par TARDYFERON 80 mg ne sera pas efficace.

En raison du risque d'ulcérations buccales et d'altération de la couleur dentaire, les comprimés ne doivent pas être sués, mâchés ou gardés dans la bouche mais avalés entiers avec de l'eau.

Si vous ne pouvez pas suivre cette instruction ou si vous rencontrez des difficultés de déglutition, veuillez contacter votre médecin.

D'après des données publiées dans la littérature, il a été observé des colorations de la paroi du tube gastro-intestinale chez des patients

âgés souffrant d'une insuffisance rénale, de diabète et/ou d'une augmentation de la tension qui recevaient des médicaments pour ces maladies et une supplémentation en fer pour traiter leur anémie.

### Précautions d'emploi

La consommation importante de thé inhibe l'absorption du fer. Il est conseillé de ne pas prendre ce médicament en même temps que cette boisson.

### Autres médicaments et TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé

Si vous utilisez déjà les médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé sauf si votre médecin le décide. En effet, certains médicaments ne peuvent être utilisés en même temps, alors que d'autres médicaments requièrent des changements spécifiques (de dose, de moment, exemple).

• prenez des médicaments injectables contenant de la vitamine C : prenez des médicaments contenant de la vitamine C.

• prenez certains antibiotiques (les céphalosporines, les fluoroquinolones).

• prenez des médicaments pour traiter une maladie des os (bisphosphonates, le strontium).

• prenez un médicament pour traiter une maladie des articulations (la penicillamine).

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de la thyroïde (la thyroxine).

• Si vous prenez des médicaments pour traiter une maladie de l'entacapone, la méthyldopa, la levodopa.

• Si vous prenez du zinc ou du calcium.

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie de votre estomac : topiques gastriques, antiacides (sels d'aluminium, de calcium).

• Si vous prenez un médicament pour traiter une maladie du cœur (cholestyramine).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous êtes récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé : Boissons

La consommation concomitante de laitage, de jus de fruit, de vin rouge, de légumineuses, d'œufs ou d'eau peut réduire l'absorption du fer par l'organisme.

### Grossesse, allaitement

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être pris pendant la grossesse.

L'utilisation de ce médicament est possible pendant la grossesse.

Si vous êtes enceinte ou que vous allez l'être, informez votre pharmacien ou votre médecin avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune donnée disponible sur les effets de ce médicament sur la conduite de véhicules et l'utilisation des machines.

## 3. COMMENT PRENDRE TARDYFERON 80 mg comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament dans les indications de votre médecin ou pharmacien.

• Posologie

Ce médicament est réservé aux enfants et aux adultes.





**ANTI-SPA® 200 mg, comprimés pelliculés**  
**Boîte de 30**  
**Mébévérine chlorhydrate**

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

LOT 224029  
 EXP 11 2024  
 P.P.V. 40.00

Informations à  
 ais à quelqu'un  
 indésirable non  
 cien.

- 2.
- AN.
3. COM
4. QUE!
5. COM
6. INFC

**1. QU'EST-IL UTILISÉ POUR ?**

**ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE**

(A: appareil digestif et métabolisme)

Ce médicament est un anti-spasmodique musculotrope.

Il est indiqué dans les douleurs spastiques du tube digestif et des voies biliaires et l'inconfort intestinal.



6 118000 021780

IS QUELS CAS  
 DE PRENDRE

comprimés pelliculés ?

comprimés pelliculés ET DANS QUELS CAS

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés ?**

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Ne prenez jamais ANTI-SPA 200 mg, comprimés pelliculés :**

Allergie à l'un des constituants et chez l'enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route (avaler de travers).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

**Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse et allaitement**

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin.

# PIROCAMSOTHEMA® 20 mg, suppositoires

Piroxicam

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas d'effet indésirable non mentionné dans



سوطاما  
SotHEMA

votre médecin doit évaluer les bénéfices que ce médicament est susceptible de rapport au risque encouru de développer des effets indésirables. En raison de ce traitement, votre médecin pourra de vous faire passer périodiquement des examens médicaux et sera alors amené à vous indiquer la fréquence à laquelle vous devrez être examiné.

PIROCAMSOTHEMA 20 mg, suppositoires est utilisé pour soulager certains symptômes de l'arthrose (maladie dégénérative des articulations), de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante (affection rhumatologique de la colonne vertébrale), tels que le gonflement, la raideur et la douleur articulaire. Il ne guérit pas de l'arthrose et vous soulagera uniquement, aussi longtemps que vous continuerez à le prendre.

Votre médecin ne sera amené à vous prescrire du piroxicam qu'en cas de symptômes insuffisamment soulagés avec d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PIROCAMSOTHEMA 20 mg, suppositoires ?

N'utilisez jamais PIROCAMSOTHEMA 20 mg, suppositoires dans les cas suivants :

- au delà de 5 mois de grossesse révolus,
- antécédents d'allergie à l'un des constituants du produit,
- antécédent d'allergie au piroxicam, à d'autres AINS et à d'autres médicaments, en particulier réactions cutanées graves (quel que soit le degré de sévérité) telles que la dermatite exfoliative (rougissement intense de la peau, avec desquamation de la peau par écailles ou par couches), les réactions vésiculo-bulleuses (syndrome de Stevens-Johnson, affection dans laquelle la peau est ensanglantée et présente des vésicules rouges, une érosion et des croutes) et le syndrome de Lyell (affection grave cutanée caractérisée par la présence de vésicules et le décollement de la couche supérieure de la peau),
- antécédents d'asthme déclenché par la prise de ce médicament ou d'un médicament apparenté, notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine,
- antécédents ou présence d'ulcère, d'hémorragie ou de perforation de l'estomac ou de l'intestin,
- troubles ou antécédents de troubles gastro-intestinaux (inflammation de l'estomac ou des intestins) prédisposant à des troubles hémorragiques tels que la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, les cancers gastro-intestinaux, ou les diverticulites (inflammation ou infection de vésicules du côlon),
- prise d'autres AINS, y compris AINS sélectifs de la COX-2 et acide acétylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments, utilisée pour soulager la douleur et la fièvre peu élevée),
- prise d'anticoagulants, tels que la warfarine, empêchant la formation de caillots sanguins,
- ulcère de l'estomac ou duodénum en révolution,
- maladie grave du cœur,

من المستحسن أن تأخذ بيديك على بيفوروبوكس ( أكثر من 2 ساعه  
ان أمكن) الأدوية التالية:

- الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،  
الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي ( راتنجات التبادل  
الأيوني، سوكرفات، الموضعى المعدى - المعوى، مضادات  
الحموضة والمضادات)،
- مسيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم  
عند مريض غشيل الكلى
- المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد  
تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:
- الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،
- الأدوية لعلاج السل،
- (الأدوية لعلاج الملاريا ) الكلوروquin / البروغوانيل،
- الأدوية التي تحتوى على هرمون الاستروجين، لغرض دون،  
من الحمل
- الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،
- المواد الأخرى مثل إيماتينيب، سونيتينيب، أورليستات،  
عليكم باشعار طبيبك في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

#### التفاعل مع المواد الغذائية والمشربات

##### الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد  
يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية  
مكملات مع الصويا

##### استخدام أثناء الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعتقدين أن تكونين  
حملاء أو تحظطين للحمل، اسأل طبيبك أو المصيلبي قبل تناول  
هذا الدواء.  
ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف  
الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

## 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

### قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ملدا يحتوي ليقوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ،  
100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟

المادة الفعالة هي :

ليقوتيروكسين صودي .....	..... 25 ميكروغرام
..... 50 ميكروغرام	.....
..... 100 ميكروغرام	.....
..... 200 ميكروغرام	.....
قرص قابل للقطع .....	.....

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين،  
كروسكار ميلوز صودي، ستيرات المغنيزيوم

قائمة السواغات ذو تأثير معروف

لاكتوز

الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليقوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.

كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصائغ:

ميرك كيه جي ايه ايه - فرانكفورتر شتراس 250- 64293 دار

مشتات - المانيا

موزع في المغرب من طرف

كوير فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،

المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسلیم

القائمة ||

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30أبريل2015

شرابين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصف العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتظام وبشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التصمب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة).

إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة ٢-٦، مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبلة TSH إجراء بعض التحليلات البيولوجية وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملاً، إذا كنت قد كان المريض طفل.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لدرين للغدة الدرقية.

هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصاً إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية ("الأدوية" "تقليل الشهية").

فعالية العلاج وعلامات التعرض بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع.

اشتراك مع أدوية أخرى  
أدوية أخرى مع ليفوتيروكس

ابلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منزلي أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكس.

## ٤- ما هي التأثيرات غير المرغوبية المحتملة؟

### وصف الآثار غير المرغوبية

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع. تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

علامات فرط التدفق (اختلالات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحو سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية للكالسيوم في البول)،

حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات والأكثر شيوعاً هي: طفح جلدي، حكة، انتفاخ في وجه، صعوبة في التنفس واحمرار.

### الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي آثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي آثر جانبى محتمل غير منذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن أمن الدواء.

## ٥- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع؟

### لا تتركه أبداً في متناول الأطفال.

### تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

### ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25°C في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في الفيارات

غير المستعملة. أصل المضيبي عبّر عن سلسلة من الأدوية  
غير المستعملة. هذه الإجراءات تستسجم بحماية البيئة.

من المستحسن أن تأخذ بعيداً عن ليغونيروكس (أكثر من 2 ساعة  
أن أمكن) الأدوية التالية:

• الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،

• الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجات التبادل  
الأيوني، سوكرفات، الموضعى المعدى - المعوى، مضادات  
المحموضة والممتصات)،

سيفلايمير، دواء يستخدم لمنع قرط في كبيبة الفوسفور في الدم  
عند مريض غسيل الكلى

• المراقبة السريرية والبيولوجية والتكييف لجرعة العلاج قد  
تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:

• الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،  
• الأدوية لعلاج السل،  
• الأدوية لعلاج الملاريا (الكلوروكين / البروغوانيل،

• الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون  
من الحمل

• الأدوية لعلاج الإصابة بغيروس الإيدز،  
• المواد الأخرى مثل إيماتينيب، سونيتينيب، أورليستات،

عليكم باشعار طبيكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

## التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

### الطعام والشراب

الصويا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد  
يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية  
مكملات مع الصويا

### استخدام أثناء الحمل والرضاعة

#### الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعتقدين أن تكونين  
حاملاً أو تخططين للحمل، اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول  
هذا الدواء.

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف  
الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

## 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

### قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليغونيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ،  
100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟  
المادة الفعالة هي :

ليغونيروكسين صودي .....	25 ميكروغرام
..... 50 ميكروغرام	..... 100 ميكروغرام
..... 200 ميكروغرام	..... لقرص قابل للقطع

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين،  
كروسكاريلوز صودي، ستارات المغذيوم  
قائمة السواغات ذو تأثير معروف

لاكتوز	الشكل الصيدلاني و المحتوى
--------	---------------------------

ما هو شكل ليغونيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟  
هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.  
كل علبة تحتوي على 30 قرص.  
الصانع:

ميرك كي جي ايه ايه - فرانكفورتر شتراس 250-256 دار  
مشتات - ألمانيا

موزع في المغرب من طرف  
كوبير فارما، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،  
المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسليم  
القائمة ||

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30أبريل2015

في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباها وشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التصبغ الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراضوراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العلامة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH) إجراء بعض التحاليل البيولوجية الإضافية (قياس و خاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت كبير في السن أو إذا باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملا، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفل).

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلل يوصى بالمرأة الدقيقة لدرين للغدة الدرقية. هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بضرر الغدة الحقيقية؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصاً إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية ("الأدوية" تقليل الشهية").

فعالية العلاج وعلامات التصلب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج. يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع.

اشتراك مع أدوية أخرى أدوية أخرى مع ليفوتيروكس بلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منه قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكس.

#### ٤- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يتسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع. تفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية)، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب

علامات فرط التدفق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رげة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحو سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك، عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)، ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات والأعراض الأكثر شيوعاً هي : طفح جلدي، حكة، انتفاخ في الرقبة والوجه، و صعوبة في التنفس و احمرار.

انتباها:

غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. لى أي آثر جانبى محتمل غير مذكور في يق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد المعلومات عن أمن الدواء.

#### ٥- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال. تاريخ انتهاء الصلاحية لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. اللعبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 ° م في العلبة الأصلية، محمية من الضوء، إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدحرج لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرى العام أو في النفايات.

#### ٤- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع .  
• تفاقم مرض قلبي (النحافة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

• علامات فرط التدفق (اختلالات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، نحوں سریع، اسہال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبیک،  
عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،  
ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسّن) العلامات والأعراض الأكثر شيوعاً هي: طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس وأحرار.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طبیک أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي آثر جانبی محتمل غير مذكور. في هذه التشریة، عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن آمن الدواء.

#### ٥- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP. العلبة بعد من ذلك الشهر.

ظروف التخزين

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 °C في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تحذيرات من بعض علامات واضحة للتدهور

لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في النفايات المنزلية لأن الصيدلي عملياً يعلم للتخلص من الأدوية

في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصة شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتظام و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند المرضى الذين يعانون من التعصب الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العالمة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جينس، فإن طبیک قد يتطلب منك (TSH) إجراء بعض التحاليل البيولوجية الإضافية (قياس وخاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت مصاب باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملاً، إذا كنت كبير في السن أو إذا كان المريض طفل).

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)، يوصى بالمراقبة الدقيقة لدرين للغدة الدرقية.

هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصور الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصاً إذا كان يشترك العلاج مع مثبطات الشهية ("الأدوية " تقليل الشهية").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع

اشتراك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيروكس  
ابلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منه قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكس.

من المستحسن ان تأخذ بعيداً عن ليقويروكس ( أكثر من 2 ساعه

إن أمكن) الأدوية التالية:

الادوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم، الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي ( راتنجات التبادل الأيوني، سوكر الفات، الموضعي المعدي - المعوي، مضادات الحموضة والمنتصات ) ،

سيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم عند رىض غسيل الكلى

المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:

الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،

الأدوية لعلاج السل،

(الأدوية لعلاج الملاريا ) الكلوروكين / البروغوانيل،

الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون منع الحمل

الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،

المواد الأخرى مثل إيماتينيب، سونيتيبيب، أو

عليكم باشعار طبيبك في حالة ما أخذتم أو تناولتم



6 118001 102013

Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

786216036

التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصوبيا قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية مكملات مع الصوبيا.

استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعتقدين أن تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، اسألي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

## 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

### قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليقويروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ، 100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟ المادة الفعالة هي :

ليقويروكسين صودي ..... 25 ميكروغرام

..... 50 ميكروغرام

..... 100 ميكروغرام

..... 200 ميكروغرام

لقرص قابل للقطع .....

عات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين،

أرميلوز صودي، ستيرات المغنيزيوم

سواغات ذو تأثير معروف

### الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليقويروكس و محتوى التغليف الخارجي؟

هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.

كل عليه تحتوي على 30 قرص.

الصانع:

ميرك كيه جي ايه ايه - فرانكفورتر شتراس 250- 64293 دار

مشتات - المانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،

المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسلیم

القائمة II

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30أبريل2015

من المستحسن أن تأخذ بيدك على بيوفوريوكس ( أكثر من 2 ساعه  
ان أمكن) الأدوية التالية:

- الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،  
الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي ( راتجات التبادل  
الأيوني، سوكرفات، الموضعى المعدى - المعوى، مضادات  
الحموضة والمنتصبات)،
- مسيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم  
عند مرض غشيل الكلى
- المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد  
تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:
- الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،  
• الأدوية لعلاج السل،  
• الأدوية لعلاج الملاريا ( الكلوروكين / البروغوانيل،  
• الأدوية التي تحتوى على هرمون الاستروجين، لغرض دون،  
من الحمل
- الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،  
• المواد الأخرى مثل إيماتينيب، سونيتينيب، أورليستات،  
عليكم باشعار طبيبك في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

#### التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب  
الصوصيات قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد  
يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية  
مكملات مع الصوصيات  
استخدام أثناء الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعتقدين أن تكونين  
حاملاً أو تحظرين للحمل، اسأل طبيبك أو الصيدلى قبل تناول  
هذا الدواء.  
ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف  
الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

## 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

### قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوى ليفوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ، 100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟	المادة الفعالة هي :
ليفوتيروكسين صودي ..... 25 ميكروغرام	
..... 50 ميكروغرام	
..... 100 ميكروغرام	
..... 200 ميكروغرام	
..... لقرص قابل للقطع	

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين،  
كروسكار ميلوز صودي، ستيرات المغنيزيوم  
قائمة السواغات ذو تأثير معروف  
لاكتوز

### الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليفوتيروكس و محتوى التغليف الخارجي؟  
هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.  
كل علبة تحتوي على 30 قرص.  
الصانع:

ميرك كيه جي ايه ايه - فرانكفورتر شتراس 250 - 64293 دار  
مشتات - ألمانيا

### موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،  
المملكة المغربية

### ظروف الوصف والتسلیم

القائمة

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30 أبريل 2015

يُنصح بشرب من سبعة إلى عشر كوب، وخاصة  
شرابين القلب التأاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية،  
اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم،  
في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض  
الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة  
 الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتظام و  
 بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند  
Lapp المرضى الذين يعانون من التعصب

أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز

إذا قمت بتحبير العلامة التجارية خـ

ليفوتيروكسين، دواء أصلي أو جنيس، فإـ

(TSH) إجراء بعض التحاليل البيولـ

و خاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقـ

باضطرابات قلبـية، إذا كنت حاملاً، إذا كنت كبيرـ في السن أو إذا

كان المريض طفـلاً.

عند النساء بعد سن اليأس المصابات بقصور الغدة الدرقية  
مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (تخلخل العظام)،  
يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.

هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج  
للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية  
ال حقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطـرة، خصوصاً إذا كان

يشترك العلاج مع مثبطات الشهـة (الأدوية " تقليل  
الشهـة").

فعالية العلاج وعلامات التعصب بإمكانها أن تظهر بعد فترة من  
15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص  
قبل القطع

اشتراك مع أدوية أخرى

أدوية أخرى مع ليفوتيروكـس

بلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منهـ  
قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتمـ  
الحصول عليها دون وصفة طـبية. بعض الأدوية قد تؤثر علىـ  
فعالية ليفوتيروكـس.

#### 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

وصف الآثار غير المرغوبة  
مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكـس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب  
آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حـتماً عند الجميع  
تقاـمـ مرـضـ قـلـبـيـ (ـذـبـحةـ الصـدـرـيـةـ، قـصـورـ القـلـبـ، اـضـطـرـابـاتـ  
نظمـ القـلـبـ)

علامات فـرـطـ التـدـرـقـ (ـاخـلـاجـاتـ، أـرـقـ، سـرـعـةـ التـهـيـجـ، رـجـفـةـ، عـ حرـارـةـ الجـسـمـ، عـرـقـ، نـحـولـ سـرـيعـ، اـسـهـالـ) : في هـذـهـ  
يـجـبـ استـشـارـةـ طـبـيـكـ ، الطـفـلـ، إـمـكـانـيـةـ زـيـادـةـ مـعـدـلـ الـكـالـسـيـوـمـ فـيـ الـبـولـ (ـكمـيـةـ  
مـنـ الـكـالـسـيـوـمـ فـيـ الـبـولـ)، فـعـلـ حـاسـاسـيـةـ مـحـتـمـلـةـ (ـفـرـطـ التـحـسـسـ) العـلـامـاتـ وـ  
الـأـعـرـاضـ الـأـكـثـرـ شـيـوعـاـ هـيـ: طـفـحـ جـلـديـ، حـكـةـ، اـنـفـاخـ فـيـ  
الـرـقـقـةـ وـالـوـجـهـ، وـصـعـوبـةـ فـيـ التـنـفـسـ وـاحـمـارـ .  
الـإـبـلـاغـ عـنـ الـأـثـارـ الجـانـبـيـةـ:

إذا كان لديك أي أثر غير مرغوب، ابلغ طـبـيـكـ أوـ الصـيـدـلـيـ .  
وهـذـاـ يـنـطـقـ أـيـضاـ عـلـىـ أيـ أـثـرـ جـانـبـيـ مـحـتـمـلـ غـيرـ مـذـكـورـ فـيـ  
هـذـهـ النـشـرـةـ. عنـ طـرـيقـ الإـبـلـاغـ عـنـ الـأـثـارـ الجـانـبـيـةـ، قدـ تـسـاعـدـ  
عـلـىـ تـوـفـيرـ الـمـزـيدـ مـنـ الـمـعـلـومـاتـ عـنـ اـنـهـ الـدـوـاءـ .

#### 5- ما هي طـرـيقـ حـفـظـ لـيفـوتـيرـوكـسـ، قـرـصـ قـابـلـ للـقطـعـ؟

لا تـرـكـهـ أـبـداـ فـيـ مـتـاـواـلـ الـأـطـفـالـ .  
تـارـيخـ اـنـتـهـاءـ الصـلـاحـيـةـ

لا يستـخدـمـ هـذـاـ دـوـاءـ بـعـدـ تـارـيخـ اـنـتـهـاءـ الصـلـاحـيـةـ المـذـكـورـ عـلـىـ  
تـارـيخـ اـنـتـهـاءـ الصـلـاحـيـةـ يـشـيرـ إـلـىـ الـيـومـ الـآـخـيـرـ EXPـ العـلـبةـ بـعـدـ  
مـنـ ذـلـكـ الشـهـرـ .

#### ظروف التخزين

يـجـبـ أـنـ يـتـمـ تـخـزـينـ هـذـاـ دـوـاءـ فـيـ درـجـةـ حرـارـةـ لـاـ تـجاـزوـ 25ـ مـ درـجـةـ .  
الـعـلـبةـ الأـصـلـيـةـ، مـحـمـيـةـ مـنـ الضـوءـ .

إـذـ لـزـمـ الـأـمـرـ، تحـذـيرـاتـ مـنـ بـعـضـ عـلـامـاتـ وـاضـحـةـ لـتـدـهـورـ  
لـاـ يـجـوزـ التـخـلـصـ مـنـ الـأـدـوـيـةـ فـيـ الـمـجـرـورـ الـعـامـ أوـ فـيـ النـفـيـاتـ  
الـمـنـذـرـةـ إـلـىـ الصـدـاـ .

وذلك من الأدوية التي يجب استبعادها من الأدوية غير المستعملة. هذه الإجراءات ستسهم بحماية البيئة.

## 6- محتويات العلبة و معلومات أخرى

### قائمة المواد الفعالة و السواغات

على ماذا يحتوي ليقوتيروكس 25 ميكروغرام، 50 ميكروغرام ، 100 ميكروغرام ، 200 ميكروغرام ، قرص قابل للقطع؟ المادة الفعالة هي:

ليقوتيروكسين صودي .....	..... 25 ميكروغرام
..... 50 ميكروغرام	.....
..... 100 ميكروغرام	.....
..... 200 ميكروغرام	.....
قرص قابل للقطع	.....

السواغات هي: لاكتوز أحادي الماء، نشاء الذرة، جيلاتين، كروسكارميلاز صودي، ستيرات المغنيزيوم

قائمة السواغات ذو تأثير معروف  
لاكتوز

الشكل الصيدلاني و المحتوى

ما هو شكل ليقوتيروكس و محتوى التقليف الخارجي؟

هذا الدواء ير على شكل قرص أبيض قابل للقطع.

كل علبة تحتوي على 30 قرص.

الصانع:

ميرك كيه جي ايه ايه - فرانكفورتر شتراس 250- 64293 دار- مسنتات - ألمانيا

موزع في المغرب من طرف

كوبر فارما ، 41 زنقة محمد ديوري، 20110 الدار البيضاء،

المملكة المغربية

ظروف الوصف والتسلیم

القائمة ||

آخر تاريخ لمراجعة هذه النشرة : 30 أبريل 2015

إن أمكن) الأدوية التالية:

الأدوية عن طريق الفم قد تحتوي على أملاح الحديد، الكالسيوم،

الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي (راتنجات التبادل الأيوني، سوكرفات، الموضعى المعدى - المعوى، مضادات الحموضة والمنتصبات)،

سيفيلامير، دواء يستخدم لمنع فرط في كمية الفوسفور في الدم عند مريض غسيل الكلى

المراقبة السريرية و البيولوجية و التكيف لجرعة العلاج قد تكون لازمة خلال فترة العلاج مع بعض الأدوية:

الأدوية مضادات الاختلاج لعلاج الصرع،

الأدوية لعلاج السل،

(الأدوية لعلاج الملاريا ) (الكلوروكين / البروغوانيل،

الأدوية التي تحتوي على هرمون الاستروجين، لغرض دون، منع الحمل

الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس الإيدز،

المواد الأخرى مثل إيماتينيب، سونيتينيب، أورليستات،

عليكم بإشعار طبيكم في حالة ما أخذتم أو تأخذون أدوية أخرى.

### التفاعل مع المواد الغذائية والمشروبات

الطعام والشراب

الصوص قد يقلل من فعالية هذا الدواء. وبالتالي فإن طبيبك قد يحتاج إلى تغيير جرعة من العلاج في بداية أو في نهاية مكملات مع الصوص.

استخدام أثناء الحمل والرضاعة

الحمل والرضاعة

إذا كنت حاملاً أو كنت ترضعين، وإذا كنت تعتقدين أن تكونين حاملاً أو تخططين للحمل، اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

ينبغي أن يستمر هذا العلاج خلال فترة الحمل، تحت إشراف الطبيب. قد يحتاج طبيبك إلى تغيير الجرعة في بداية أو في

#### 4- ما هي التأثيرات غير المرغوبة المحتملة؟

##### وصف الآثار غير المرغوبة

مثل جميع الأدوية، ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ، قد يسبب آثار جانبية، ولكنها لا تحصل حتماً عند الجميع .  
·نفاقم مرض قلبي (الذبحة الصدرية، قصور القلب، اضطرابات نظم القلب)

- علامات فرط التدفق (اختلاجات، أرق، سرعة التهيج، رجفة، ارتفاع حرارة الجسم، عرق، تحول سريع، اسهال) : في هذه الحالة، يجب استشارة طبيبك ،
- عند الطفل، إمكانية زيادة معدل الكالسيوم في البول (كمية كبيرة من الكالسيوم في البول)،
- ردود فعل حساسية محتملة (فرط التحسس) العلامات والأعراض الأكثر شيوعاً هي : طفح جلدي، حكة، إنتفاخ في الرقبة والوجه، وصعوبة في التنفس واحمرار.

**إبلاغ عن الآثار الجانبية:**

إذا كان لديك أي آثر غير مرغوب، ابلغ طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي آثر جانبي محتمل غير مذكور في هذه النشرة. عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية، قد تساعد على توفير المزيد من المعلومات عن آمن الدواء.

#### 5- ما هي طريقة حفظ ليفوتيروكس، قرص قابل للقطع ؟

لا تتركه أبداً في متناول الأطفال.

تاريخ انتهاء الصلاحية

لا يستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير EXP العلبة بعد من ذلك الشهر.

**ظروف التخزين**

يجب أن يتم تخزين هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 °C في العلبة الأصلية، محمية من الضوء.

إذا لزم الأمر، تخزينات من بعض علامات واضحة للتدحرج ، لا يجوز التخلص من الأدوية في المجرور العام أو في النفايات المنزانية ، لأن ذلك يضر ببيئة الماء والهواء.

في حالة اضطراب بمرض القلب والأوعية الدموية، وخاصة شرايين القلب التاجية (احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نظم قلبي)، أو ارتفاع ضغط الدم، في حالة عدم كفاية وظيفة الغدة الكظرية (انخفاض إنتاج بعض الهرمونات).

في جميع هذه الحالات، يوصى العلاج بالهرمونات الغدة الدرقية لكل حالة على حدة، يجب مراقبة المرضى بانتباٌٌ و بشكل خاص.

هذا الدواء يحتوي على اللاكتوز. لا ينصح استخدامه عند Lapp المرضى الذين يعانون من التصبغ الجلاكتوز، ونقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلاكتوز أو الجلاكتوز (أمراض وراثية نادرة). إذا قمت بتغيير العالمة التجارية خلال فترة علاجك مع ليفوتيروكسين، دواءً أصليًّا أو جينيًّا، فإن طبيبك قد يطلب منك (TSH) إجراء بعض التحاليل البيولوجية الآتية

و خاصة إذا كان لديك سرطان الغدة الدرقية،  
·باضطرابات قلبية، إذا كنت حاملاً.  
·كان المريض طفلًا.

عند النساء بعد سن اليأس المص مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بهشاشة 702180336  
6 118001 102013 Levotyrox® 50µg, Comprimés sécables B/30 PPV: 13,40 DH (عظام)،  
يوصى بالمراقبة الدقيقة لديهن للغدة الدرقية.

هذا الدواء عند تناوله بمفرده أو مع أدوية أخرى، ليس بعلاج للسمنة باستثناء إذا كانت السمنة مرتبطة بقصر الغدة الدرقية الحقيقي؛ قد تكون الجرعات الكبيرة خطرة، خصوصاً إذا كان يشتراك العلاج مع مثبطات الشهية (الأدوية " تقابل الشهية").

فعالية العلاج وعلامات التصبغ بإمكانها أن تظهر بعد فترة من 15 يوماً إلى شهر واحد بعد بدء العلاج.

يجب أخبار الطبيب أو الصيدلاني قبل تناول ليفوتيروكس قرص قابل للقطع

**اشتراك مع أدوية أخرى**

أدوية أخرى مع ليفوتيروكس

ابلغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي إذا كنت تأخذ منه قليل أو قد تأخذ أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها دون وصفة طبية. بعض الأدوية قد تؤثر على فعالية ليفوتيروكس.

عن الملف التفصيلي للدواء: دايمونت دايمونتس

Docteur RACHIDI Imane

Médecine Générale

Echographie Générale

Diplôme de la Faculté de Médecine  
de Montpellier - France



Berrechid, le : 28/08/23

الدكتورة رشيدية إيمان

الطب العام

الفحص بالصدى

دبلوم من كلية الطب  
مونبلي - فرنسا

برشيد، في :

Hadjou  
Homay

T.S Hass



DR. RACHIDI Imane  
Médecin Gén.-Echographie  
- BERRECHID -  
Tél.: 0522 32 47 26

05 22 32 47 26 ، شارع إدريس الحريزي الحسني - برشيد - الهاتف :

554 , Boulevard Idriss Lahrizi Hay El Hassani - Berrechid - Tél : 05 22 32 47 26

**FACTURE N°: 23009638****BERRECHID .... : 29/08/2023****Nom et Prénom ... : Madame Hanane HADDAOUI****Prescripteur .... : Dr. RACHIDI IMANE****Bilan :**

NFS B80+ TSH B250+

**Montant Net .... : 373,00 Dhs****Arrêtée la présente facture à la somme de:***Trois cent soixante treize Dirhams et zéro centime*

Dr. A HAWAZINE



INPE 063060990

Dr. RACHIDI IMANE

Date du prélèvement : 29/08/23

Dossier édité le : 29/08/2023

Code Patient : 90136



Mme HADDAOUI Hanane

Page : 1 / 1

Prélèvement Effectué au Laboratoire

290823 116

**HEMATOLOGIE**

ABX PENTRA 60

Valeurs de référence

Antécédents

**HEMOGRAMME** sur Automate ABX Pentra 60 ( HORIBA)

<b>GLOBULES ROUGES</b> .....	: 5,02	M/ $\mu$ l	(3,8 à 5,4)	30/09/20 : 4.61
HEMOGLOBINE .....	: 8,90	g/dL	(12,5 à 15,5)	30/09/20 : 9.30
HEMATOCRITE .....	: 31,00	%	(37 à 47)	30/09/20 : 32.60
V.G.M .....	: 61,75	$\mu$ 3	(82 à 98)	30/09/20 : 70.72
T.C.M.H .....	: 17,73	pg	(>OU= 27)	30/09/20 : 20.17
C.C.M.H .....	: 28,71	%	( 32 à 36)	30/09/20 : 28.53
<b>PLAQUETTES</b> .....	: 481 000	/mm3	(150 000 à 400 000)	30/09/20 : 613000
<b>GLOBULES BLANCS</b> .....	: 10 210,00	/mm3	(4 000 à 10 000)	30/09/20 : 10210.00

**FORMULE LEUCOCYTAIRE :**

POLYNUCLEAIRES NEUTROPHILES ...	: 55,70	%	30/09/20 : 54.00
Soit .....	: 5 646,97	/mm3	(1 800 à 7 500)
POLYNUCLEAIRES EOSINOPHILES ...	: 1,100	%	30/09/20 : 2.000
Soit .....	: 112,3	/mm3	(100 à 400)
POLYNUCLEAIRES BASOPHILES ....	: 0,20	%	30/09/20 : 0.00
Soit .....	: 20,4	/mm3	(0 à 200)
LYMPHOCYTES .....	: 36,00	%	30/09/20 : 37.00
Soit .....	: 3 675,6	/mm3	(1 000 à 4 500)
MONOCYTES .....	: 7,00	%	30/09/20 : 7.00
Soit .....	: 714,7	/mm3	(2 00 à 1 000)
<b>TOTAL</b> .....	: 100,00	%	

**ENDOCRINOLOGIE**

Valeurs de référence

Antécédents

**TSH(Ultra-sensible)** ..... : 9,65  $\mu$ IU/ml

30/09/20 : 7.06

Valeurs attendues

Euthyroidie ..... : 0.25 à 5  $\mu$ IU/mlHyperthyroidie .... : < à 0.15  $\mu$ IU/mlHypothyroidie .... : > à 7  $\mu$ IU/ml

LABORATOIRE CENTRAL MEDICAL ERRAZI

Dr Abdellatif EL DERRI

Pharm. Hanane HADDAOUI



INPE 063060990