

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- O Réclamation : contact@mupras.com
- O Prise en charge : pec@mupras.com
- O Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

atricule : 14 67

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : MOUINEN Brahim

Date de naissance : 01 - 06 - 1954

Adresse : N°14 Lot Buled Rolen Hy Mly Rachid 1

Casablanca Maroc
Tél. 0664-94-12-31 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 26 / 08 / 2023

Nom et prénom du malade : MOUINEN Brahim

Age: 69

Lien de parenté : Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie : Affections neuropsychiatriques

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC

Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le :

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
24/08/2023			350,00	Dr. L YAZIDI Abdellatif Neuro Psychiatre 83 Bd. 11 Janvier - Casablanca 05 22 44 36 50

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE BENSAIHA Dr. Abdellatif Bensaiha Tél: 05 22 44 36 50	24/08/2023	818,80

ANALYSES - RADIographies

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Coefficient des Travaux	
				MONTANTS DES SOINS	
				DEBUT D'EXECUTION	
				FIN D'EXECUTION	
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				Coefficient des Travaux
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	MONTANTS DES SOINS	
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				DATE DU DEVIS
					DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS					VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur LYAZIDI Abdelkrim

NEURO - PSYCHIATRE

((Ex. Médecin du C H U Avicenne
de Rabat))

83, Bd du 11 Janvier - CASABLANCA

(à Côté du Cinéma Colisée)

Tél. & Fax : 0522.44.36.50

Sur Rendez-Vous

Casablanca le : 24/08/2023 الدار البيضاء في 24/08/2023

بالميعاد

83, شارع 11 يناير الدار البيضاء

(جانب سينما كوليزي)

الهاتف والفاكس : 0522.44.36.50

طبيب نفساني

اختصاصي في الأمراض النفسية
والعصبية و أمراض الرأس

طبيب سابق بالمركز الصحي
الجامعي ابن سينا بالرباط

83، شارع 11 يناير الدار البيضاء

(جانب سينما كوليزي)

الهاتف والفاكس : 0522.44.36.50

الدكتور اليزيدي عبد الكريم

(79.80x4)

1) Velspar 37,5.

Buvier

(85.10x2)

2) gel x 2 l.

solution 5% →

(23,70x4)

3) T ronx gel 1/2 l.

gel 1/2 l.

(34,70x4)

4) Zepur 50 → .

(47,90x2)

5) Amorfonil 2 g/100 ml de 03 mois



Dr. LYAZIDI Abdelkrim
Neuro Psychiatre
83 Bd du 11 Janvier - Casablanca
Tél. : 0522.44.36.50

Dr. LYAZIDI Abdelkrim
Neuro Psychiatre
83 Bd du 11 Janvier - Casablanca
Tél. : 0522.44.36.50

Durée de Traitement

VELAXOR® LP

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre m

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'a

identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

a) DÉNOMINATION

VELAXOR® LP

b) COMPOSITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES

• Gélule dosée à 37.5 mg :	Par gélule
Venlafaxine (DCI)	37.50 mg
Équivalent en Venlafaxine chlorhydrate à :	42.43 mg
• Gélule dosée à 75 mg :	
Venlafaxine (DCI)	75.00 mg
Équivalent en Venlafaxine chlorhydrate à :	84.86 mg

Excipients (communs) : Hypromellose, Eudragit RS 100, Lauryl sulfate de sodium, Stéarate de magnésium, Eudragit E 12.5.

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule à libération prolongée.

d) PRÉSENTATIONS

- Gélule dosée à 37.5 mg : Boîte de 30.
- Gélule dosée à 75 mg : Boîte de 30.

e) CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

ANTIDÉPRESSEURS. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline.

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

- Épisodes dépressifs majeurs (c'est-à-dire caractérisés).
- Anxiété généralisée, évoluant depuis au moins 6 mois.
- Prévention des récidives dépressives chez les patients présentant un trouble unipolaire.
- Trouble anxiété sociale (phobie sociale).

3. ATTENTION !

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- Hypersensibilité connue à la venlafaxine.
- IMAO non sélectifs (iproniazide).
- Allaitement.

b) MISES EN GARDE

- Avant de débuter le traitement, il est important de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une dépression d'intensité légère ou de symptômes transitoires. En effet, pour les patients concernés, le premier mode de prise en charge doit être un suivi médical régulier avec écoute et soutien psychologique.
- Comme lors de tout traitement par antidépresseur, le risque suicidaire chez les patients déprimés persiste en début de traitement, la levée de l'inhibition psychomotrice pouvant précéder l'action antidépressive proprement dite du médicament.
- Une élévation de la pression artérielle dose-dépendante pouvant survenir lors de l'administration de venlafaxine, une surveillance de la pression artérielle est nécessaire au cours du traitement, notamment à des doses égales ou supérieures à 200 mg.
- En cas d'antécédents de pharmacodépendance, il importe de surveiller attentivement la survenue de manifestations évocatrices d'un abus ou d'un mésusage.
- La prévention des récidives dépressives s'adresse à des patients ayant présenté (y compris l'épisode en cours de

traitement) au moins trois épisodes modérée à sévère

• Utilisation chez l'enfant et l'adolescent. L'utilisation de Velaxor LP chez les adolescents de moins de 18 ans (tentatives de suicide, principalement agressives et colères) ont été plus fréquentes que chez les adultes. Les études cliniques chez les enfants et adolescents ont montré que l'efficacité de l'antidépresseur par rapport à l'efficacité d'autre médicament en cas de nécessité d'antidépresseur, le patient étant attentif à détecter l'aggravation. De plus, on ne dispose d'aucune étude chez l'enfant et l'adolescent sur la sécurité, la tolérance et le développement.

c) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI UTILISER CE MÉDICAMEN

- Chez les patients épileptiques.
- Chez les patients à pression artérielle élevée (glaucome aigu à angle fermé).
- En cas de virage maniaque.
- Le risque de saignement peut augmenter lors d'un traitement.
- Chez les patients hypertendus.
- En cas d'insuffisance rénale.

EN CAS DE DOUCE, IL EST IMPÉTUEUX DE DÉBUTER LE TRAITEMENT.

L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN

d) INTERACTIONS MÉDICALES

Contre-indiquées :

- IMAO non sélectifs (iproniazide). Respecter un délai de deux semaines entre l'arrêt de l'IMAO et le début du traitement par la venlafaxine, et au moins une semaine entre l'arrêt de la venlafaxine et le début du traitement par l'IMAO.
- Syndrome sérotoninergique :

Ceux-ci se manifestent par l'apparition (éventuellement brutale), simultanée ou séquentielle, d'un ensemble de symptômes pouvant nécessiter l'hospitalisation, voire entraîner la mort. Ces symptômes peuvent être d'ordre : psychique (agitation, confusion, hypomanie), moteur (myoclonies, tremblements, hyperréflexie, rigidité, hyperactivité), végétatif (hypotension, tachycardie, frissons, sueurs, hyperthermie, éventuellement coma), digestif (diarrhée).

Déconseillées :

- Sympathomimétiques alpha et bêta (adrénaline, noradrénaline, dopamine), dans le cas d'une action par voie parentérale : hypertension paroxystique avec possibilité de troubles du rythme.
- IMAO sélectifs A (moclobémide, toloxatone) : risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique*. Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique très étroite. Débuter l'association aux posologies minimales recommandées.
- Linézolid : risque d'apparition d'un syndrome sérotoninergique*. Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique très étroite. Débuter l'association aux posologies minimales recommandées.

LOT 1302421

EXP 02/26

PPV 79DH80

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Solian® 50 mg, comprimé amisulpride

SANOFI

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

- Qu'est-ce que Solian et dans quels cas est-il utilisé
- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Solian
- Comment prendre Solian
- Quels sont les effets indésirables éventuels
- Comment conserver Solian
- Contenu de l'emballage et autres informations.

OU EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Solan appartient à une famille de médicaments appelés antipsychotique.

Ce médicament est utilisé pour traiter les personnes souffrant de schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale caractérisée par certains troubles psychiques ou comportementaux, comme par exemple des hallucinations ou de l'agitation.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Indications

N'itez jamais Solian : vous êtes allergique à la substance active (amisulpride) ou à l'un des autres ingrédients contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Si vous souffrez d'un phéochromocytome (excès de sécrétion des glandes surrénales au niveau des reins et libérant des hormones qui provoquent une pression très élevée).

Si vous êtes enfant de moins de 15 ans. Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire. N'itez jamais un autre médicament, sauf si vous que l'association avec Solian est contre-indiquée (Voir le paragraphe "Combinaison de médicaments et Solian").

Avant de prendre Solian, parlez à votre médecin ou pharmacien.

Votre médecin pourra pratiquer un électrocardiogramme avant de vous donner ce traitement. En effet, ce médicament peut provoquer des troubles du rythme cardiaque (voir rubrique 4).

Utilisez ce médicament avec précaution dans les cas suivants :

- chez les personnes âgées, notamment si elles sont atteintes de démence, en raison du risque de baisse de la tension artérielle et de somnolence ; en cas d'insuffisance rénale, la posologie peut être réduite par votre médecin.
- si vous présentez des facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral (appelé également « attaque cérébrale ») et se produisant lorsque la circulation du sang est brusquement interrompue dans une partie du cerveau,
- si vous ou un membre de votre famille avez des antécédents de formation de caillots sanguins, car la prise d'antipsychotiques peut provoquer la formation de caillots sanguins,
- si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale), dans ce cas la dose peut être réduite par votre médecin,
- si vous souffrez d'épilepsie ou de la maladie de Parkinson,
- si vous souffrez de diabète ou si vous présentez des facteurs de risque de diabète,
- si vous avez des antécédents d'hypoprolactinémie (quantité excessive de prolactine dans le sang) ou une tumeur dépendante de la prolactine (hormone provoquant la sécrétion de lait), par exemple un cancer du sein ou des troubles d'origine hypophysaire. Dans ce cas, votre médecin doit vous surveiller étroitement pendant le traitement.

Des problèmes hépatiques graves ont été rapportés avec Solian. Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez de la fatigue, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales ou une coloration jaune des yeux ou de la peau.

Pendant le traitement, si vous présentez une rigidité musculaire et des troubles de la conscience, accompagnés d'une fièvre inexplicable : arrêtez immédiatement votre traitement et consultez d'urgence votre médecin.

Pendant le traitement, si vous avez des troubles de la vue ou des maux de tête, consultez rapidement votre médecin.

En cas de survenue d'une infection ou d'une fièvre inexplicable, votre médecin pourra être amené à vous faire pratiquer immédiatement un bilan sanguin. En effet, ce médicament peut provoquer une perturbation des éléments sanguins (diminution du nombre de globules blancs) mise en évidence sur les résultats d'une prise de sang (voir rubrique 4. « Quels sont les effets indésirables éventuels »).

Ce médicament ne doit pas être arrêté brutalement car cela peut provoquer l'apparition d'un phénomène de sevrage. Celui-ci se caractérise par l'apparition de signes tels qu'insomnie, nausées, vomissement mais on peut observer également des

mouvements anormaux et la réapparition de troubles psychotiques.

Enfants et adolescents

• Ce médicament

l'enfant ju-

• L'utilisation

recomman-

Autres médic

Informez vot

prenez, avez

prendre tout

Vous ne deve

avec la caberg

(médicament

lactation), le

(médicament

dépression), l

pour traiter l

l'hydroxyzine

l'anxiété ou l

(médicament pour traiter le paludisme).

Vous devez éviter de prendre ce médicament avec :

- certains médicaments utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson (amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine, sélégiline, tolcapone),
- la levodopa,
- l'oxybate de sodium (médicament pour traiter la narcolepsie),
- certains médicaments pouvant entraîner des troubles graves du rythme cardiaque (torsades de pointes) tels que :
 - des médicaments utilisés pour traiter un rythme cardiaque irrégulier (les antiarythmiques de classe I tels que quinidine, hydroquinidine, disopyramide et les antiarythmiques de classe III tels que amiodarone, dronedarone, sotalol, dofetilide et ibutilide),
 - certains médicaments contre les troubles psychiatriques (chlorpromazine, cyamémazine, droperidol, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, lévomepromazine, pimozide, pipamperone, pipotiazine, spirulide, sulpiride, tiapride, zuclopentixol),
 - certains antiparasitaires (chloroquine, haloftanrine, luméfantrine, pentamidine),
 - un médicament utilisé pour lutter contre la dépendance à certaines drogues (la méthadone),
 - d'autres médicaments tels que : arsenieux, diphenhydramine, dolasetron IV, érythromycine IV, hydroxychloroquine, lévofloxacin, méquitazine, mizolastine, pruralopride, vincamine IV, moxifloxacine, spiramycine IV, temofénène, vandétanib,
 - des médicaments contenant de l'éthanol (alcool).

Solian avec des aliments et boissons et de l'alcool

Comme avec tous les antipsychotiques de cette famille, vous devez éviter la prise de boissons alcoolisées pendant votre traitement.

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1,

Aïn setââ Casablanca

SOLIAN 50mg, cp B 30

P.P.V. : 85,10 DH

6 118000 061458

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1,

Aïn setââ Casablanca

SOLIAN 50mg, cp B 30

P.P.V. : 85,10 DH

6 118000 061458



ZEPAM® 6 mg

bromazépam

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de la relire.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été prescrit. Ne le donnez pas en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

PPV : 34DH70
PER : 05/26
LOT : M1610

Composition :

Bromazépam (DCI) : 6 mg par comprimé-bâtonnet quadri-

Excipients : Q.S.P 1 comprimé.

Excipient à effet notoire : lactose.

Forme pharmaceutique :

ZEPAM® comprimé-bâtonnet quadrisécable (blanc); boîte de

Dans quels cas utiliser ce médicament ?

C'est un anxiolytique de la famille des benzodiazépines.

Il est utilisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de :

PPV : 34DH70
PER : 05/26
LOT : M1610

Attention !

a) Dans quel cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des autres composants.
- Insuffisance hépatique sévère, aiguë ou chronique (risque de choc hémorragique).
- Myasthénie.
- Insuffisance respiratoire.
- Syndrome d'apnée du sommeil.

PPV : 34DH70
PER : 05/26
LOT : M1610

b) Posologie usuelle

En pratique courante :

Chez l'adulte, en début de traitement, la posologie quotidienne

1 comprimé-bâtonnet, réparti le plus souvent de la manière suivante :

- 1/4 de comprimé-bâtonnet le matin (1,5 mg),
- 1/4 de comprimé-bâtonnet à midi (1,5 mg),
- 1/2 comprimé-bâtonnet le soir (3 mg).

PPV : 34DH70
PER : 05/26
LOT : M1610

Elle doit ensuite être adaptée individuellement en fonction de

La posologie peut être augmentée jusqu'à 3 comprimés par jour.

Le comprimé n'est pas une forme adaptée à l'enfant de moins de 12 ans.

Enfant, sujet âgé, insuffisant rénal ou hépatique : il est recommandé

par exemple la moitié de la posologie moyenne peut être suffisante.

c) Mode et voie d'administration

Voie orale. Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau.

d) Fréquence et moment auquel le médicament doit être administré

Les prises devront être régulièrement réparties dans la journée.

e) Durée du traitement

Ne pas dépasser 12 semaines de traitement sans avis médical.

Le traitement doit être aussi bref que possible.

L'indication sera réévaluée régulièrement, surtout en l'absence de symptômes.

Effets non souhaités et gênants :

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

Troubles de mémoire, sensation d'ivresse, somnolence en particulier chez la personne âgée, ralentissement des idées, sensation de fatigue musculaire, baisse de la libido, éruption cutanée, troubles du comportement.

Exceptionnellement :

- réactions paradoxales avec augmentation de l'anxiété, agitation, agressivité, confusion des idées, hallucinations;
- amnésie antérograde.

Ces troubles nécessitent l'arrêt du traitement.

f) Précautions d'emploi

Des précautions sont nécessaires en cas de myasthénie.

Utilisé seul, ce médicament n'est pas adapté au traitement des états dépressifs.

Une prise prolongée ou des doses importantes de ce médicament favorisent une dépendance.

Tranxène® 5 mg

Tranxène® 10 mg

Clorazépate dipotassique

Gélule

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre cette élle contient des informations importantes pour vous.

• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes d'effets secondaires sont identiques aux vôtres. • Si vous ressentez un quelconque effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE TRANXENE, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : ANXIOLYTIQUES, code ATC : N05BA05 (N : système nerveux central).

Ce médicament est utilisé :

- pour traiter l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles générants,
- pour prévenir ou traiter les manifestations liées à un sevrage alcoolique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TRANXENE, gélule ?

Ne prenez jamais TRANXENE, gélule :

- Si vous êtes allergique au clorazépate dipotassique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous avez une insuffisance respiratoire grave.
- Si vous souffrez d'un syndrome d'apnée du sommeil (trouble caractérisé par des arrêts de la respiration pendant le sommeil).
- Si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique grave).
- Si vous souffrez de myasthénie (maladie caractérisée par une tendance excessive à la fatigue musculaire).

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions

Avant de prendre TRANXENE, prévenez votre médecin :

- si vous avez une insuffisance respiratoire,
- si vous avez une maladie du foie (insuffisance hépatique),
- si vous avez une maladie des reins (insuffisance rénale),
- si vous avez eu des problèmes de dépendance à l'alcool.

Avant de prendre TRANXENE, vous devez savoir que :

• Une anxiété peut révéler un autre trouble physique ou psychique. Une évaluation médicale doit être effectuée avant la prescription de ce médicament. Ce traitement médicamenteux ne peut à lui seul résoudre les difficultés liées à une anxiété. Il convient de demander conseil à votre médecin. Il vous indiquera les conduites pouvant aider à la lutte contre l'anxiété.

• Ce médicament ne traite pas la dépression. Si vous souffrez également de dépression, votre médecin vous prescrira un traitement approprié. Si la dépression n'est pas traitée, elle peut s'aggraver avec une persistance ou une augmentation possible du risque suicidaire.

Dans les heures qui suivent la prise du médicament, il peut survenir, en particulier chez les enfants et les personnes âgées :

- une perte de la mémoire concernant les événements survenus pendant le traitement (amnésie antérograde),
- des troubles du comportement (tels que agressivité ou actes automatiques), agitation, nervosité, colère, euphorie ou irritabilité, tension,
- une insomnie, des cauchemars,
- une altération de l'état de conscience, idées délirantes,

Celui-ci se caractérise par des crises d'insomnie, douleurs musculaires, également une agitation, un engourdissement ou des perturbations de la sensibilité anormale au toucher, etc...

Pour plus d'information, consultez votre pharmacien.

Risque de rebond

Une réapparition temporaire de l'anxiété. Afin de diminuer le risque de l'anxiété, la dose sera adaptée aux modalités d'arrêt du traitement. Plusieurs études épidémiologiques ont montré des tentatives de suicide et des tentatives d'overdose avec des benzodiazépines et autres psychotropes. Le lien de causalité n'a pas été établi.

Risques de l'utilisation longue

La prise concomitante de TRANXENE, gélule avec d'autres psychotropes, tels qu'une dépression respiratoire, peut entraîner l'effet combiné de TRANXENE et des opioïdes. Ces deux types de substances peuvent entraîner des signes de dépression respiratoire.

Utilisation chez les personnes âgées

TRANXENE doit être utilisé avec prudence chez les personnes âgées. Les risques de somnolence, d'engourdissement et de confusion peuvent favoriser les chutes.

Les chutes sont souvent de nature accidentelle.

Autres médicaments et interactions

Informez votre médecin si vous prenez ou allez prendre tout autre médicament. Vous devez prévenir votre pharmacien de tout traitement en cours.

La prise de médicaments psychotropes pendant la durée du traitement.

TRANXENE, gélule avec alcool

La consommation d'alcool est déconseillée pendant la prise de TRANXENE.

Grossesse, allaitement et fertilité

Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte ou que vous souhaitez l'être, consultez votre médecin afin qu'il réévalue l'intérêt du traitement.

Si vous prenez TRANXENE au cours du 1er trimestre de la grossesse : de nombreuses études n'ont pas montré d'effet malformatif des benzodiazépines. Cependant, certaines études ont décrit un risque potentiellement augmenté de survenue de fente labio-palatine chez le nouveau-né par rapport au risque présent dans la population générale. Une fente labio-palatine (parfois nommée « bec de lièvre ») est