

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
 - Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
 - La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
 - L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
 - En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances
 - Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
 - Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
 - Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
 - La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
 - La radio après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée AID et AIC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 - Prise en charge : pec@mupras.com
 - Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS :Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Nº W21-688584

<input type="checkbox"/> Maladie	<input type="checkbox"/> Dentaire	<input type="checkbox"/> Optique	<input checked="" type="checkbox"/> Autres
Cadre réservé à l'adhérent(e)			
Matricule : <u>10342</u>	Société : <u>A7565</u>		
<input type="checkbox"/> Actif	<input type="checkbox"/> Pensionné(e)	<input type="checkbox"/> Autre :	
Nom & Prénom : <u>Enaazog Roustegha</u>			
Date de naissance : <u>11/01/1973</u>			
Adresse <u>WIFAK II Rue 73 n° 3 oufia east</u>			
Tél. <u>06 37 59 98</u>	Total des frais engagés <u>144,690</u>		Dhs

Autorisation CNDP N° : A-A-2115/2019

Cachet du médecin :	
Date de consultation :	09/09/2003
Nom et prénom du malade :	Salhi Faâima
Lien de parenté :	<input type="checkbox"/> Lui-même <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant
Nature de la maladie :	HHT
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :	X
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.	

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Asy

Signature de l'adhérent(e) :

Le : 12-19-23

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05/09/2023	Chir	300	300	NADIA MEDICAL CARTE DE SOINS CREDIT CARD ASSOCIATION N° 04113014
05/09/2023	Consultation	500	500	HAYAT HAYAT que BLOC 25 CHIRURGIE HOSPITAL SCA

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
HARMACIE OUM AL KORAH Dr. Iman TAOUSSI Wifaq 4, Rue 109 N° 06 OUJDA Maroc - Tél: 022 93 28.63	5/9/23	446,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				<input type="text"/> COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/> MONTANTS DES SOINS
				<input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION
				<input type="text"/> FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			<input type="text"/> COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000	B 00000000 35533411 11433553	<input type="text"/> MONTANTS DES SOINS
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			<input type="text"/> DATE DU DEVIS
				<input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION				

الدكتورة حياة ناجي افتخارية في أمراض القلب والشرايين

Docteur Hayat NAJIH
Cardiologue



Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca

Ancien interne à l'hôpital de la Timone à Marseille

Ancien interne du CHU Ibn Rochd de Casablanca

Diplômée en Echocardiographie de l'Université Bordeaux Segalen

Diplômée en cardiologie pédiatrique de l'Université Paris Descartes

Diplômée en imagerie vasculaire de l'Université Paris Sud

خريجة كلية الطب بCasablanca، الدار البيضاء.

طبيبة داخلية سابقاً بمستشفى مارسيليا بفرنسا.

طبيبة داخلية سابقاً بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

حاصلة على شهادة فحص القلب بالصدى من جامعة بوردو بفرنسا.

حاصلة على شهادة فحص الشرايين والأوعية بالصدى من جامعة باريس.

حاصلة على شهادة أمراض القلب للأطفال من كلية الطب بباريس.

Casablanca, le :

05/09/2022

Salfi fatima

(1) - Biphasic ST, dicro

MII, 10+
56,80 - 42 - 0 - 0



(2) - Abscisse

WORA
S1
OUM
TAN
46 Oulta
103 N
401551

SO

PHARMACIE OUM TAN

103 N° 46 Oulta

TAN 4, Rue Tel: 022 93 78 29

Ward 4, Casablanca

15

Hayat
Cardiologue
Bd Afghanistan, Bd Houria, Bloc 225
Hay Hassan II, Casablanca
Tél. : 05 22 90 70 51 - GSM : 06 62 69 23 00



Bd. Afghanistan, Derb Houria, Bloc 225, N°1, 2ème Etage , Hay hassani, Casablanca

شارع أفغانستان درب الحرية . بلوك 225 رقم 1 ، الطابق الثاني، الحمّامصي، الدار البيضاء.

Tél. : 05 22 90 70 51 - GSM : 06 62 69 23 00

CABINET DE CARDIOLOGIE DR NAJIH HAYAT

FACTURE

NOM : SALHI

PRENOM : FATIMA

<u>DATE</u>	<u>ACTE</u>	<u>MONTANT</u>	<u>SIGNATURE</u>
05/09/2023	Consultation+ECG	300 dh	<i>Dr. NAJIH Hayat Cardiologue Bd Afghanistan 100 Nouria, Bloc 25 Hay Hassani Casablanca INPE: C911739/4</i>
05/09/2023	ECHOCOEUR	700 dh	<i>Dr. NAJIH Hayat Cardiologue Bd Afghanistan 100 Nouria, Bloc 25 Hay Hassani Casablanca INPE: C911739/4</i>

Docteur Hayat NAJIH
Cardiologue



دكتورة حياة ناجي
نتخصص في أمراض القلب والشرايين

Diplômée de la faculté de médecine de Casablanca
Ancien interne à l'hôpital de la Timone à Marseille
Ancien interne du CHU Ibn Rochd de Casablanca
Diplômée en Echocardiographie de l'Université Bordeaux Segalen
Diplômée en cardiologie pédiatrique de l'Université Paris Descartes
Diplômée en imagerie vasculaire de l'Université Paris Sud

جدة كلية الطب في الدار البيضاء.
جدة داخلية سابقاً بمستشفى مارسيليا بفرنسا.

جدة داخلية سابقاً بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
ملة على شهادة فحص القلب بالصدف من جامعة بوردو بفرنسا.
ملة على شهادة فحص الشرايين والوعود بالصدف من جامعة باريس.
ملة على شهادة أمراض القلب للأطفال من كلية الطب بباريس.

Casablanca, le : 05/09/2003

Mme Salhi Fatima, âgée
de 32 ans, et hypertendue
(HTA grado), et se plaint
de vertige + dyspnée d'effort +
safrétose, et nécessite un
bilan biologique complet

Dr. NAJAH Hayat
Cardiologue
Bd Afghanistan, N°1, 2ème Etage, Hay Hassani, Casablanca
Tél. : 05 22 90 70 51 - GSM : 06 62 69 23 99

Bd. Afghanistan, Derb Houria, Bloc 225, N°1, 2ème Etage, Hay hassani, Casablanca
شارع أفغانستان درب الهرة ، بلوك 225، رقم 1، الطلاق الثاني، العمر المصفى، الدار البيضاء.
Tél. : 05 22 90 70 51 - GSM : 06 62 69 23 99

بىبريتير اكس® أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ

حبات ملمسة

بيراندوبريل أرجينين / إنداهاميد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- إحفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لستند إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أستهلاك أخرى إسال الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً، فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض مشابهة، فقد تلحق بهضرر.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة
- أضرار إلى مقتضى الآثار الجانبية المحتملة؟).



المشكلات المنشئة (منها أيام السنة)،

• مضادات الالتهاب الغير ستربيودية (مثل ibuprofène)، أو الدوارة المحتوية على مقدار كبير من الساليسيلات (مثل حمض الصبار سالسيليك المادة التي توجد في العديد من الأدوية التي تتعتمد لخفيف الألم وغضق العصراء، بالإضافة إلى منع نزف الدم).

• أسلوب عرض B في amphotéricine B (العلاج الإصبابي المطرية الشديدة)، الأدوية المستعملة في علاج اضطرابات النساء مثل الائتمان، أو الفتق، أو الصمام مثل مضادات الاكتاف الثلاثية الحالقات، أو مضادات الدهن (مثل أسيبوريد، سولبوريد، تيابرید، هالوبوريد)، دروبوريدول).

• تراكيزات tetracosactide (العلاج من مرض كرون (maladie de Crohn

• تراكيزات tetracosactide (العلاج حالات العدواني)، موسمات الأوعية الدموية بما فيها مشفات الترات (المستحضرات التي من شأنها توسيع الأوعية الدموية).

• أدوية تستعمل لعلاج الضغط الشريان المنخفض، الصدمة أو الربو (مثل إفدرين، نورادرينالين أو أدرينالين)، بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، ميات ملمسة مع الطعام والشراب من المستحضرات أخذ بيريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ قبل وجبة الطعام.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططي للإنجاب، راجعي الطبيب أو المبدالي قبل المذكرة تعاطي أي دواء.

العملية يجب أعلم طبيبك إذا كنت تعاندين بذلك عامل أو توكفين وقوف حمل.

إن كانت لك حساسية من مادة البىاندوبريل، أو من صفت آخر من مثبتات الازتم للحواف للأبيجينين، أو من الإنداهاميد، أو من أي مثلكم آخر، أو من آية مادة أخرى تعالج في تركيب هذا

تناول 1 ملخ حبات ملمسة؟

1.2 ملخ حبات ملمسة؟

الحالات يستعمل؟

COP9A

جزء من مادتين فعاليتين: البىاندوبريل

وإنزاغن القسط الشريانى لدى البالغين.

ويؤثرين (IEC)، وتقوم هذه المادة بتبعي

ضياميد مدار البوال، وإن مدارات البوال ترفع مقدار

من بغية مدارات البوال، بحيث أنه يرفع مقدار البوال

تحفيظ السفع الشريانى، ويعمل على تحفيظ العصان على الحكم به.

بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، ميات ملمسة؟

لا يجوز على الأطلاق استعمال بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، حبات ملمسة:

إن كانت لك حساسية من مادة البىاندوبريل، أو من صفت آخر من مثبتات الازتم للمحول

للأبيجينين، أو من الإنداهاميد، أو من آية مادة أخرى تعالج في تركيب هذا

في هذه

1. ما هو

2. ما هي

3. كيف

4. ما هي

5. كيف

6. محتوى

7. ما هو بير

الفلة العلاجية الم

إن بىبريتير اكس أرج

ان والإنداهاميد، وهو مضاد

يتنفس البىاندوبريل إلى م

الأوعية الدموية مسافة بهذا

البول الصادر عن الكلية، لكن

بردقة ضئيلة، وهذا تقول ذات الما

2. ما هي الملعومات المفروض معه

3. ما هي الملعومات المفروض معه

4. ما هي الملعومات المفروض معه

5. ما هي الملعومات المفروض معه

بىبريتير اكس® أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ

حبات ملمسة

بيراندوبريل أرجينين / إنداهاميد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- إحفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لستند إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أستهلاك أخرى إسال الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً، فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض مشابهة، فقد تلحق بهضرر.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة
- أضرار إلى مقتضى الآثار الجانبية المحتملة؟).



المشكلات المنشئة (منها أيام السنة)،

• مضادات الالتهاب الغير ستربيودية (مثل ibuprofène)، أو الدوارة المحتوية على مقدار كبير من الساليسيلات (مثل حمض الصبار سالسيليك المادة التي توجد في العديد من الأدوية التي تتعتمد لخفيف الألم وغضق العصراء، بالإضافة إلى منع نزف الدم).

• أسلوب عرض B في amphotéricine B (العلاج الإصبابي المطرية الشديدة)، الأدوية المستعملة في علاج اضطرابات النساء مثل الائتمان، أو الفتق، أو الصمام مثل مضادات الاكتاف الثلاثية الحالقات، أو مضادات الدهن (مثل أسيبوريد، سولبوريد، تيابرید، هالوبوريد)، دروبوريدول).

• تراكيزات tetracosactide (العلاج من مرض كرون (maladie de Crohn

• تراكيزات tetracosactide (العلاج حالات العدواني)، موسمات الأوعية الدموية بما فيها مشفات الترات (المستحضرات التي من شأنها توسيع الأوعية الدموية).

• أدوية تستعمل لعلاج الضغط الشريان المنخفض، الصدمة أو الربو (مثل إفدرين، نورادرينالين أو أدرينالين)، بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، ميات ملمسة مع الطعام والشراب من المستحضرات أخذ بيريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ قبل وجبة الطعام.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططي للإنجاب، راجعي الطبيب أو المبدالي قبل المذكرة تعاطي أي دواء.

العملية يجب أعلم طبيبك إذا كنت تعاندين بذلك عامل أو توكفين وقوف حمل.

إن كانت لك حساسية من مادة البىاندوبريل، أو من صفت آخر من مثبتات الازتم للحواف للأبيجينين، أو من الإنداهاميد، أو من أي مثلكم آخر، أو من آية مادة أخرى تعالج في تركيب هذا

تناول 1 ملخ حبات ملمسة؟

1.2 ملخ حبات ملمسة؟

الحالات يستعمل؟

COP9A

جزء من مادتين فعاليتين: البىاندوبريل

وإنزاغن القسط الشريانى لدى البالغين.

ويؤثرين (IEC)، وتقوم هذه المادة بتبعي

ضياميد مدار البوال، وإن مدارات البوال ترفع مقدار

من بغية مدارات البوال، بحيث أنه يرفع مقدار البوال

تحفيظ السفع الشريانى، ويعمل على تحفيظ العصان على الحكم به.

بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، ميات ملمسة؟

لا يجوز على الأطلاق استعمال بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، حبات ملمسة:

إن كانت لك حساسية من مادة البىاندوبريل، أو من صفت آخر من مثبتات الازتم للمحول

للأبيجينين، أو من الإنداهاميد، أو من آية مادة أخرى تعالج في تركيب هذا

في هذه

1. ما هو

2. ما هي

3. كيف

4. ما هي

5. كيف

6. محتوى

7. ما هو بير

الفلة العلاجية الم

إن بىبريتير اكس أرج

ان والإنداهاميد، وهو مضاد

يتنفس البىاندوبريل إلى م

الأوعية الدموية مسافة بهذا

البول الصادر عن الكلية، لكن

بردقة ضئيلة، وهذا تقول ذات الما

2. ما هي الملعومات المفروض معه

3. ما هي الملعومات المفروض معه

4. ما هي الملعومات المفروض معه

5. ما هي الملعومات المفروض معه

بىبريتير اكس® أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ

حبات ملمسة

بيراندوبريل أرجينين / إنداهاميد

اقرأ بدقة هذه النشرة قبل أن تأخذ هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات هامة لك.

- إحفظ بهذه النشرة فقد تحتاج لستند إليها من جديد.
- إذا كانت لديك أستهلاك أخرى إسال الطبيب أو الصيدلاني.
- لقد وصف هذا الدواء لك شخصياً، فلا يجوز إطلاقاً إعطاؤه لشخص آخر، حتى وإن كانت الأعراض مشابهة، فقد تلحق بهضرر.
- إذا شعرت بأي آثار جانبية تكلم مع الطبيب أو الصيدلاني. هذا ينطبق أيضاً على جميع الآثار الجانبية الغير المدلى بها في هذه النشرة
- أضرار إلى مقتضى الآثار الجانبية المحتملة؟).



المشكلات المنشئة (منها أيام السنة)،

• مضادات الالتهاب الغير ستربيودية (مثل ibuprofène)، أو الدوارة المحتوية على مقدار كبير من الساليسيلات (مثل حمض الصبار سالسيليك المادة التي توجد في العديد من الأدوية التي تتعتمد لخفيف الألم وغضق العصراء، بالإضافة إلى منع نزف الدم).

• أسلوب عرض B في amphotéricine B (العلاج الإصبابي المطرية الشديدة)، الأدوية المستعملة في علاج اضطرابات النساء مثل الائتمان، أو الفتق، أو الصمام مثل مضادات الاكتاف الثلاثية الحالقات، أو مضادات الدهن (مثل أسيبوريد، سولبوريد، تيابرید، هالوبوريد)، دروبوريدول).

• تراكيزات tetracosactide (العلاج من مرض كرون (maladie de Crohn

• تراكيزات tetracosactide (العلاج حالات العدواني)، موسمات الأوعية الدموية بما فيها مشفات الترات (المستحضرات التي من شأنها توسيع الأوعية الدموية).

• أدوية تستعمل لعلاج الضغط الشريان المنخفض، الصدمة أو الربو (مثل إفدرين، نورادرينالين أو أدرينالين)، بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، ميات ملمسة مع الطعام والشراب من المستحضرات أخذ بيريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ قبل وجبة الطعام.

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططي للإنجاب، راجعي الطبيب أو المبدالي قبل المذكرة تعاطي أي دواء.

العملية يجب أعلم طبيبك إذا كنت تعاندين بذلك عامل أو توكفين وقوف حمل.

إن كانت لك حساسية من مادة البىاندوبريل، أو من صفت آخر من مثبتات الازتم للحواف للأبيجينين، أو من الإنداهاميد، أو من أي مثلكم آخر، أو من آية مادة أخرى تعالج في تركيب هذا

تناول 1 ملخ حبات ملمسة؟

1.2 ملخ حبات ملمسة؟

الحالات يستعمل؟

COP9A

جزء من مادتين فعاليتين: البىاندوبريل

وإنزاغن القسط الشريانى لدى البالغين.

ويؤثرين (IEC)، وتقوم هذه المادة بتبعي

ضياميد مدار البوال، وإن مدارات البوال ترفع مقدار

من بغية مدارات البوال، بحيث أنه يرفع مقدار البوال

تحفيظ السفع الشريانى، ويعمل على تحفيظ العصان على الحكم به.

بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، ميات ملمسة؟

لا يجوز على الأطلاق استعمال بىبريتير اكس أرجينين 5 ملغ/1,25 ملغ، حبات ملمسة:

إن كانت لك حساسية من مادة البىاندوبريل، أو من صفت آخر من مثبتات الازتم للمحول

للأبيجينين، أو من الإنداهاميد، أو من آية مادة أخرى تعالج في تركيب هذا

في هذه

1. ما هو

2. ما هي

3. كيف

4. ما هي

5. كيف

6. محتوى

7. ما هو بير

الفلة العلاجية الم

إن بىبريتير اكس أرج

ان والإنداهاميد، وهو مضاد

يتنفس البىاندوبريل إلى م

الأوعية الدموية مسافة بهذا

البول الصادر عن الكلية، لكن

بردقة ضئيلة، وهذا تقول ذات الما

2. ما هي الملعومات المفروض معه

3. ما هي الملعومات المفروض معه

4. ما هي الملعومات المفروض معه

5. ما هي الملعومات المفروض معه

appelée cirrhose,

- si vous avez une acidité élevée dans le sang (acidose),
- si vous avez plus de 70 ans,
- si vous avez (ou avez eu) un diabète ou une maladie des reins,
- si vous prenez un médicament augmentant le taux de potassium dans le sang (hyperkaliémiant),
- si vous prenez de l'aspirine (acide acétylsalicylique),
- si vous prenez des anti-inflammatoires non-stéroïdiens,
- si vous prenez un produit de contraste iodé.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, le médicament ne doit généralement pas être utilisé.

Analyses de sang

Votre médecin pourra vous demander de faire des analyses de sang, notamment :

- si vous avez une maladie du foie ou des reins,
- si vous avez un taux de sucre dans le sang trop élevé (diabète),

Ces analyses de sang permettront à votre médecin de vérifier en particulier vos taux de potassium et sodium ainsi que le fonctionnement de vos reins. Ces examens sont indispensables notamment chez les patients à risque. Si vous êtes un adulte et que vous prenez ce médicament pour traiter une maladie du cœur, votre médecin contrôlera régulièrement les taux de potassium et de créatinine dans le sang.

tard dans la journée. Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce médicament. Vous ne devez pas arrêter le traitement sans son accord.

Si vous avez pris plus de ALDACTONE, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

En cas d'absorption massive, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison le plus proche.

Ce surdosage peut entraîner les malaises suivants : somnolence, nausées, vomissements, diarrhée.

Si vous oubliez de prendre ALDACTONE, comprimé sécable

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous arrêtez de prendre ALDACTONE, comprimé sécable

Sans objet.

SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS SUR L'UTILISATION DE CE MÉDICAMENT, DEMANDEZ PLUS D'INFORMATIONS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fabricants :

DELPHARM - **REUX**

5 RUE DU
27000 EVREUX
FRANCE

ou

PIRAMAL
WHALTON
NORTHUMBERLAND
ROYAUME UNI

La dernièr
a été révi

ALDACTONE 50 mg
P.P.V. 56,80 DH

P.P.V. 56,80 DH



6

3

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit. Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ainsi que ses bénéfices et ses risques.
- Ne pas arrêter de votre propre initiative un traitement prescrit.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

Ne jamais laisser les médicaments à la portée des enfants

appelée cirrhose,

- si vous avez une acidité élevée dans le sang (acidose),
- si vous avez plus de 70 ans,
- si vous avez (ou avez eu) un diabète ou une maladie des reins,
- si vous prenez un médicament augmentant le taux de potassium dans le sang (hyperkaliémiant),
- si vous prenez de l'aspirine (acide acétylsalicylique),
- si vous prenez des anti-inflammatoires non-stéroïdiens,
- si vous prenez un produit de contraste iodé.

Si vous êtes dans l'une de ces situations, le médicament ne doit généralement pas être utilisé.

Analyses de sang

Votre médecin pourra vous demander de faire des analyses de sang, notamment :

- si vous avez une maladie du foie ou des reins,
- si vous avez un taux de sucre dans le sang trop élevé (diabète),

Ces analyses de sang permettront à votre médecin de vérifier en particulier vos taux de potassium et sodium ainsi que le fonctionnement de vos reins. Ces examens sont indispensables notamment chez les patients à risque. Si vous êtes un adulte et que vous prenez ce médicament pour traiter une maladie du cœur, votre médecin contrôlera régulièrement les taux de potassium et de créatinine dans le sang.

tard dans la journée. Durée du traitement

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devez prendre ce médicament. Vous ne devez pas arrêter le traitement sans son accord.

Si vous avez pris plus de ALDACTONE, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

En cas d'absorption massive, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison le plus proche.

Ce surdosage peut entraîner les malaises suivants : somnolence, nausées, vomissements, diarrhée.

Si vous oubliez de prendre ALDACTONE, comprimé sécable

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous arrêtez de prendre ALDACTONE, comprimé sécable

Sans objet.

SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS SUR L'UTILISATION DE CE MÉDICAMENT, DEMANDEZ PLUS D'INFORMATIONS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fabricants :

DELPHARM - **REUX**

5 RUE DU
27000 EVREUX
FRANCE

ou

PIRAMAL
WHALTON
NORTHUMBERLAND
ROYAUME UNI

La dernièr
a été révi

ALDACTONE 50 mg
P.P.V. 56.80 DH

P.P.V. 56.80 DH



029

6

3

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit. Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ainsi que ses bénéfices et ses risques.
- Ne pas arrêter de votre propre initiative un traitement prescrit.
- Ne pas reprendre le traitement sans avis médical.

Ne jamais laisser les médicaments à la portée des enfants