

RECOMMANDEES IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10871

Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : HAFFAÏDZI ABDELKRIJ

Date de naissance : 26/10/31/1966

Adresse : EL FAGHRI B EL TAJID, Rue Loudaya
N° 21 BERCHID

Tél. : 06 5986 8927 Total des frais engagés : 9814,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. ESSOUBI Abderrahim
Omnipraticien
128, Bd Mohamed V Berrechid
Tél: 05 22 33 75 70
06 50 43 56 34

Date de consultation : 11 SEP 2023

Nom et prénom du malade : ATEFANE KHADIGA Age: _____

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : APPARITION d'effets

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : 11 SEP 2023

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : N.S.R.

Le : 12/10/9/2023

Signature de l'adhérent(e) : HAF



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
7/1 SEP 2023	C	1	15000	 Dr Abderrahim Berrechid 06 50 43 56 34

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie AL Jihane BERRADA Boulevard AL Houria 24176 - Benchechta	11/09/2023	834,60

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS D'AVOCAT

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient													
				Coefficient des travaux												
				Montants des soins												
				Début d'exécution												
				Fin d'exécution												
O.D.F PROTHESES DENTAIRES		DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE														
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">G</td> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td></td> </tr> </table>		H	25533412	21433552	D	00000000	00000000	B	00000000	11433553	G	35533411		Coefficient des travaux
H	25533412	21433552														
D	00000000	00000000														
B	00000000	11433553														
G	35533411															
		<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>		Montants des soins												
				Date du devis												
				Date de l'exécution												

Dr. Abderrahim ESSOUBI

OMNIPRATICIEN
ECHOGRAPHIE GENERALE

INPE : 061062402

الدكتور عبد الرحيم السوبسي

الطب العام
الفحص بالصدى

11 SEP. 2023

Berrechid, le

Nom
Pds

TA

AMÉRIANE
JCHADIA
82,14

Pharmacie AL OUM
BERRADA Jihane
Pharmaciene
52, Boulevard AL Houria
Tél: 0222 32 41 76 - Berrechid

Pharmacie AL OUM

BERRADA Jihane

Pharmaciene

52, Boulevard AL Houria

Tél: 0222 32 41 76 - Berrechid

S.V

82,10 - FMB OUM - 20
1 - 0 - 1 + 28 Jns

2 x 64,10 - Axiomycone ff.
(L'Hz de 14)

1 - 0 - 1
Amit Repas + 14 Jns

2 x 29,00 - 24 Rdel 600 Cestus

1 - 0 - 1
Aps Repas + 14 Jns

2 x 168,00
- 24 Rdel 600
(286 e 14 Jns)

1 - 0 - 1
Aps Repas + 14 Jns

834,00
Dr. ESSOUBI
128, Boulevard Mohamed V - BERRECHID
Tél: 0222 33 75 70
0650 43 56 24

128، شارع محمد الخامس - برشيد - هاتف و فاكس

128, Boulevard Mohamed V - BERRECHID - Tél./Fax : 05 22 33 75 70

GSM : 06 50 43 56 24

AXIMYCINE®

Amoxicilline

AXIMYCINE®

DENOMINATION DU MÉDICAMENT

- AXIMYCINE® 1 g comprimés
- AXIMYCINE® 500 mg comprimé
- AXIMYCINE® 250 mg/5 ml pos. doses
- AXIMYCINE® 500 mg/5 ml pos. doses

Veuillez lire attentivement l'information médicamenteuse car elle contient des renseignements importants pour vous. Gardez cette notice, vous y trouverez des renseignements utiles pour vous et pour votre pharmacien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit pour une maladie qui peut être transmise à d'autres personnes. Il pourrait maladie dont vous avez été atteint. Si l'un des effets indésirables mentionnés ci-dessous n'a pas été mentionné dans votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que l'AXIMYCINE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AXIMYCINE® ?
3. Comment prendre AXIMYCINE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AXIMYCINE® ?
6. Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE AXIMYCINE® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

pénicillines à large spectre - code ATC : J01CA04

AXIMYCINE® est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient

à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

- Indications thérapeutiques

AXIMYCINE® est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps.

AXIMYCINE® peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AXIMYCINE® ?

- Ne prenez jamais AXIMYCINE® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- Ne prenez pas AXIMYCINE® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE®.
- En cas de phénacétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartame dans la poudre pour suspension buvable.

- Faites attention avec AXIMYCINE® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE® si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
- avez des problèmes rénaux
- n'urinez pas régulièrement

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE®.

Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,
- un dosage d'astéroïde (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AXIMYCINE®. En effet, AXIMYCINE® peut influer sur les résultats de ces tests.

- Enfants • et adolescents •

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (interactions avec d'autres médicaments)

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

- Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AXIMYCINE®, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

• Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre

médecin peut vous faire d'adapter votre dose d'AXIMYCINE®.

- Si vous prenez d'autres médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), informez votre médecin pour savoir si vous avez besoin d'effectuer des analyses sanguines supplémentaires.
- Si vous prenez d'autres anti-infectifs (tels que les tétracyclines) AXIMYCINE® peut être moins efficace.
- Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement de cancer et du psoriasis sévère) AXIMYCINE® peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

14 comprimés dispersibles

PPV 64DH10

LOT 2N0052

EXP 04/2025

planifiez de

avant de

réactions
capacité à
ez bien.

il
e pour les

d'administration et

enfants ou traitement.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Poudre pour suspension buvable :

- Agitez bien le flacon avant chaque utilisation.
- Utilisez la cuillère-mesure fournie avec le flacon.

Comprimés dispersibles :

• Faites dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avaler immédiatement le mélange.

Posologie habituelle :

Enfants pesant moins de 40 kg

Les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

• Votre médecin vous indiquera la quantité d'AXIMYCINE® que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.

• La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises

• La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour

Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus

La suspension n'est habituellement pas prescrite aux adultes et aux enfants pesant moins de 40 kg. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

La posologie habituelle d'AXIMYCINE® est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 4 g par jour, à 90 mg toutes les 12h, selon la sévérité et le type d'infection.

• Infections sévères : 750 mg à 1 g trois fois par jour.

• Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques) : 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes plus graves ou quand la maladie est étendue à tout le corps) : jusqu'à 6 g par jour.

• Ulcère de l'estomac : 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicaments destinés à traiter les ulcères de l'estomac.

• Pour prévenir les infections cardiaques destinées à traiter les ulcères de l'estomac. La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être administrés simultanément. Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pourra vous donner plus de détails.

• La dose maximale recommandée est de 6 g par jour

Problèmes rénaux

Si vous souffrez de problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.

Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?

• Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.

• Une fois que vous avez fini votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez de nouveau le médecin.

Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps qui peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peines blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.

Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre rein fonctionnent normalement.

• Si vous avez pris plus d'AXIMYCINE® que vous n'auriez dû (Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage)

AMBIASE

formes orales :

Adultes : 1,5 g (3 comprimés pelliculés à 500 mg) par jour en 3 prises au début des repas

Enfants : 30 à 40 mg/kg/jour en 3 prises au début des repas.

Durée de traitement de l'ambiasse intestinale ou hépatique aiguë est de 7 jours.

Forme injectable :

Adultes : 1,5 g/jour (500 mg 3 fois par jour) en perfusion intra-veineuse.

Enfants : 30 à 40 mg/kg/jour en perfusion intra-veineuse.

Dans l'ambiasse hépatique, au stade abcédaire, l'évacuation de l'abcès doit être effectuée conjointement au traitement par le métronidazole.

L'administration par voie IV se fait en perfusion lente, à raison de un flacon de 100 ml en 30 à 60 minutes.

B- TRICHOMONASE

a- Chez la femme :

Urétrites et vaginites à trichomonas :

- traitement mixte de 10 jours comportant un comprimé pelliculé à 250 mg par voie orale 2 fois par jour.

ou

- 2 g en dose unique en une seule prise (4 comprimés pelliculés à 500 mg).

Le traitement oral est souvent complété chez la femme par l'administration d'un ovule à 500 mg pendant 10 jours.

b- Chez l'homme :

Urétrites à trichomonas : 500 mg (2 comprimés pelliculés à 250 mg) par voie orale en deux prises pendant 10 jours. Très exceptionnellement, il peut être nécessaire d'élèver à 750 mg ou à 1 g (3 ou 4 comprimés pelliculés à 250 mg) la dose journalière.

Que le partenaire présente ou non des signes cliniques d'infestation à trichomonas vaginalis, il importe qu'il soit traité concurremment, même en l'absence de réponse positive du laboratoire.

C- LAMBLIASIS

Adultes : 750 mg à 1 g (3 à 4 comprimés pelliculés à 250 mg) par jour pendant 5 jours.

Enfants de : 2 à 5 ans (suspension buvable) : 250 mg/jour

5 à 10 ans : 375 mg/jour (suspension buvable et, à partir de 6 ans pour les comprimés pelliculés)

10 à 15 ans : 500 mg/jour (1 comprimé pelliculé à 250 mg 2 fois/j)

D- VAGINITES NON SPECIFIQUES

Un comprimé pelliculé à 500 mg 2 fois par jour, associé à un ovule par jour par voie vaginale, pendant 7 jours.

Traitement simultané du partenaire

E- INFECTIONS A GERMES ANAEROBIES

Adultes : 1 à 1,5 g (2 à 3 comprimés pelliculés à 500 mg) par jour.

Enfants : 20 à 30 mg/kg/jour

La posologie varie selon la gravité de l'infection traitée.

En cas d'infection sévère, la voie IV est indiquée à raison de :

Adultes : 1 à 1,5 g/j en 2 ou 3 perfusions intraveineuse

Enfants : 20 à 30 mg/kg/j en 2 ou 3 perfusions intraveineuse.

Le relais peut être pris par voie orale, à la même posologie, lorsque l'état du malade le permet.

F- PROPHYLAXIE DES INFECTIONS POSTOPERATOIRES

L'antibioprophylaxie doit être de courte durée, le plus souvent limitée à la période préopératoire, 24 heures parfois, mais jamais plus de 48 heures.

30 minutes avant le début de l'intervention :

Adultes : dose unique de 1 g en IV.

Enfants : dose unique de 20 à 40 mg/kg en IV.

L'administration par voie IV se fait en perfusion lente, à raison de un flacon de 100 ml en 30 à 60 minutes.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage massif, le traitement est symptomatique.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS. NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

- Troubles digestifs bénins : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs épigastriques.

Glossite, stomatite, goût métallique.

Exceptionnellement : cas de pancréatite réversible à l'arrêt du traitement.

- Troubles dermatologiques : prurit, éruption cutanée, urticaire, œdème de Quincke.

Exceptionnellement : choc anaphylactique.

- Troubles neuro-psychiques : céphalées, vertiges, neuropathies sensitives, convulsions, ataxies, confusion, hallucinations.

- Troubles hématologiques : très rares cas de neutropénies, d'agranulocytose, thrombopénie.

- Modification réversible des tests hépatiques.

- Coloration brun rougeâtre des urines par un métabolite.

CONSERVATION

Solution injectable pour perfusion 500 mg/100 ml : A conserver à l'abri de la lumière.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas,

ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS.

ZYRDOL® (Métronidazole)

FORMES PHARMACEUTIQUES ET PRÉSENTATIONS

- Comprimés pelliculés dosés à 250 mg en boîte de 20
- Comprimés pelliculés dosés à 500 mg en boîte de 20
- Suspension buvable dosée à 125 mg/ 5 ml, flacon de 120 ml
- Solution injectable pour perfusion dosée à 500 mg/ 100 ml

COMPOSITION

- Comprimé pelliculé à 250 mg
Métronidazole
- Excipient qsp 1 comprimé pelliculé
- Comprimé pelliculé à 500 mg
Métronidazole
- Excipient qsp 1 comprimé pelliculé
- Suspension buvable à 125 mg/ 5 ml
Métronidazole
- Excipient qsp 100 ml
- Solution injectable à 500 mg / 100 ml
Métronidazole
- Excipient qsp 100 ml

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Antibiotique antibactérien antiparasitaire de la famille des nitro-5-imidazolés.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (INDICATIONS)

- Antibiasées.
- Trichomonases urogénitales.
- Vaginites non spécifiques.
- Lambliases.
- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles.
- Relais des traitements curatifs par voie injectable des infections à germes anaérobies sensibles.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Contre-indication absolue :
- Hypersensibilité aux nitro-imidazolés.
- Contre-indication relative :

Disulfiram-Alcool.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Éviter les boissons alcoolisées
- Il convient d'interrompre le traitement et de consulter un médecin en cas d'apparition d'une mauvaise coordination des mouvements volontaires, apparition de vertiges ou de confusion.
- Prévenez votre médecin en cas d'antécédents de troubles hématologiques.
- Attention à la prise de ce médicament si vous souffrez de troubles nerveux sévères, chroniques ou qui évoluent.
- Suspension buvable :
- Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).
- Ce médicament contient 2,5 g par unité de prise (5 ml) : en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de diabète.
- Ce médicament contient des parahydroxybenzoates et peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).
- Comprimé pelliculé :
- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

INTERACTIONS MÉDAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

- Déconseillés :
- Alcool : chaleur, rougeurs, vomissements, tachycardie.
- Disulfiram : bouffées délirantes. Etat confusionnel.
- Nécessitant des précautions d'emploi :

Anticoagulants oraux : augmentation de l'effet anticoagulant et du risque hémorragique. Adapter les doses de l'anticoagulant oral.

A prendre en compte :

Fluoro-uracile

- Examen paraclinique :

Le métronidazole peut immobiliser les tréponèmes et donc faussement posiver un test de Nelson.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Le métronidazole peut être administré chez la femme enceinte, et doit être évité pendant l'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Il convient d'avertir les patients du risque potentiel de vertiges, de confusion, d'hallucinations ou de convulsions et de leur recommander de ne pas conduire de véhicules, ni d'utiliser de machines en cas de survenue de ce type de troubles.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

- Comprimés pelliculés à 250 mg : Lactose
- Comprimés pelliculés à 500 mg : Lactose
- Suspension buvable à 125 mg/ 5 ml : Saccharose, sodium environ 20 mg pour 100 ml : le taux de sodium est inférieur à 1 mmol par dose, c'est-à-dire "sans sodium", parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle.
- Solution injectable pour perfusion à 500 mg/ 100 ml : sodium environ 330 mg pour 100 ml.

POSÉOLOGIE USUELLE, VOIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin. A titre indicatif, la posologie usuelle est :

ZYRDOL® 500 mg 20 comprimés pelliculés

PPU 29DH00

EXP 12/2025
LOT 29028 4

CLARIL®

comprimé pelliculé

Clarithromycine 250 mg - 50

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

- Comprimé dosé à 250 mg de clarithromycine - Boîte de 14.
- Comprimé dosé à 500 mg de clarithromycine - Boîte de 14.
- CLARIL 250 mg
- 250 mg
- 1 comprimé

Clarithromycine
Excipients q.s.p :
Pelliculage : opadry, colorant jaune de quinoléine.

PROPRIÉTÉS :

Antibiotique de la famille des macrolides.

INDICATIONS :

- Traitement des infections dues aux germes défilés
- Sinusites aiguës.
- Exacerbations des bronchites chroniques
- Pneumopathies communautaires non sévères
- Traitement curatif des infections à Mycoplasma pneumoniae
- Angines documentées à streptocoque
- Surinfections des bronchites aiguës.
- Infections cutanées bénignes.
- Infections stomatologiques.
- En association à un autre antibiotique gastroduodénale.

CONTRE-INDICATIONS :

Absolues :

- Hypersensibilité à la clarithromycine
- Allergie aux macrolides.
- Alcaloïdes de l'ergot de seigle

Relatives :

- Bromocriptine, cabergoline
- Grossesse et allaitement

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

- Angines : 500 mg/j, en 2 prises
- Infections stomatologiques : 500 mg/j
- Infections bronchiques : 500 mg/j
- Sinusites aiguës, pneumopathies, bronchites : 500 mg/j
- Eradication de Helicobacter pylori : 500 mg/j matin et soir pendant 7 jours. La trithérapie sera
- Respecter la prescription médicale.
- Avaler les comprimés avec un verre d'eau de préférence.

ADAPTATION DE LA POSOLOGIE :

- Chez les insuffisants rénaux (clairance de créatinine < 30 ml/min)

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

- Tenir compte de la possibilité de survenue de colites pseudomembranées.
- Associer obligatoirement la clarithromycine à d'autres antibiotiques dans le traitement des infections bactériennes.
- Ne pas associer la clarithromycine à d'autres médicaments oto-toxiques, et en particulier les aminoglycosides.
- Précautions d'emploi :**
- En cas de survenue d'acouphènes ou de baisse de l'acuité auditive, un audiogramme doit être réalisé en plus d'une modification posologique.
- Insuffisance hépatique sévère.
- Insuffisance rénale sévère.
- Prendre en compte la possibilité de résistance croisée entre la clarithromycine et les autres macrolides, et d'autres antibiotiques tels que : la lincomycine et la clindamycine.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

CLARIL® est un médicament, ne pas laisser à la portée des enfants.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, un lavage gastrique et un traitement symptomatique s'imposent.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- Manifestations digestives : nausées, vomissements, gastralgies, diarrhée.
- Candidose buccale, glossite, stomatite.
- Manifestations cutanées allergiques.
- Hépatite cholestastique due à une augmentation transitoire des transaminases ASAT-ALAT.
- Des cas d'acouphènes et d'hypoacusie dus à une posologie > à 1 g/j sur des périodes de traitement prolongées, réversibles à l'arrêt du traitement.
- Rares cas de dysguestes.
- Colorations dentaires réversibles avec des soins dentaires.

Tout autre effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice devra être signalé systématiquement à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

CLARIL® est déconseillé pendant la grossesse sauf nécessité absolue.

Interrompre l'allaitement en cas de survenue de troubles digestifs chez le nouveau-né allaité.

En cas de prise de cisapride par le nouveau-né allaité, la clarithromycine est formellement interdite.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Associations contre-indiquées : Alcaloïdes de l'ergot de seigle vasoconstricteurs, Cisapride, Pimozide, Bépridil, Mizolastine.

Associations déconseillées : Agonistes dopaminergiques, Ebastine, Tacrolimus, Tolterodine, Halofantrine.

Associations nécessitant des précautions d'emploi : Anticoagulants oraux, Ciclosporine, Digoxine, Midazolam, Triazolam, Rifabutine, Atorvastatine, Cérvastatine, Simvastatine, Carbamazépine, Antiprotozoaires (indinavir, ritonavir), Disopyramide.

Associations à prendre en compte : Théophylline (base et sels) et Aminophylline.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

LISTE I - Délivré uniquement sur ordonnance.

- Comprimé à 250 mg Boîte de 14 : AMM N : 100/14 DMP/21/NCF

- Comprimé à 500 mg Boîte de 14 : AMM N : 101/14 DMP/21/NCF

Date de révision de la notice : Avril 2012

1 comprimé pelliculé
contenant 7,9 mg de clarithromycine.
500 mg.
محتويات كل قابض - الماركتينج
21/NRQDNM
es GALENICA - Casablanca - Maroc

CLARIL®
Boîte de 14 comprimés de 500 mg
PPV : 160,00 DH
6 118000191001

مضاد حيوي

كلاريترومبisin

Claritromycin

AXIMYCINE®

Amoxicilline

AXIMYCINE®

DENOMINATION DU MÉDICAMENT

- AXIMYCINE® 1 g comprimés
- AXIMYCINE® 500 mg comprimé
- AXIMYCINE® 250 mg/5 ml pos. doses
- AXIMYCINE® 500 mg/5 ml pos. doses

Veuillez lire attentivement l'information médicamenteuse car elle contient des renseignements importants pour vous. Gardez cette notice, vous y trouverez des renseignements utiles pour vous et pour votre pharmacien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien. Ce médicament vous a été prescrit pour une maladie qui peut être transmise à d'autres personnes. Il pourrait maladie dont vous avez été atteint. Si l'un des effets indésirables mentionnés ci-dessous n'a pas été mentionné dans votre pharmacien.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que l'AXIMYCINE® et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AXIMYCINE® ?
3. Comment prendre AXIMYCINE® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver AXIMYCINE® ?
6. Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE AXIMYCINE® ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

- Classe pharmaco-thérapeutique ou le type d'activité

pénicillines à large spectre - code ATC : J01CA04
AXIMYCINE® est un antibiotique. Le principe actif est l'amoxicilline. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelés « pénicillines ».

- Indications thérapeutiques

AXIMYCINE® est utilisé pour traiter des infections causées par des bactéries dans différentes parties du corps. AXIMYCINE® peut également être utilisé en association à d'autres médicaments pour traiter les ulcères de l'estomac.

2 - QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE AXIMYCINE® ?

- Ne prenez jamais AXIMYCINE® (Contre-indications)

- Si vous êtes allergique à l'amoxicilline, à la pénicilline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Si vous avez déjà présenté une réaction allergique à un antibiotique. Ceci peut inclure une éruption cutanée ou un gonflement du visage ou de la gorge.
- Ne prenez pas AXIMYCINE® si vous êtes dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE®.
- En cas de phénacétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartame dans la poudre pour suspension buvable.

- Faites attention avec AXIMYCINE® (Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi)

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE® si vous :

- souffrez de mononucléose infectieuse (fièvre, maux de gorge, ganglions enflés et fatigue extrême)
 - avez des problèmes rénaux
 - n'urinez pas régulièrement
- En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre AXIMYCINE®.

Tests sanguins et urinaires

Si vous devez effectuer :

- des analyses d'urine (dosage du glucose) ou des analyses de sang pour explorer le fonctionnement de votre foie,
- un dosage d'astéroïde (utilisé pendant la grossesse pour vérifier que le bébé se développe normalement).

Informez votre médecin ou votre pharmacien que vous prenez AXIMYCINE®. En effet, AXIMYCINE® peut influer sur les résultats de ces tests.

- Enfants + adolescents +

Sans objet.

- Prises d'autres médicaments (interactions avec d'autres médicaments)

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avec récemment pris ou pourrez prendre tout autre médicament.

- Si vous prenez de l'allopurinol (utilisé dans le traitement de la goutte) avec AXIMYCINE®, le risque de réaction cutanée allergique est plus élevé.

- Si vous prenez du probénécide (utilisé dans le traitement de la goutte), votre

médecin peut vous faire d'adapter votre dose d'AXIMYCINE®.

- Si vous prenez d'autres médicaments destinés à empêcher la coagulation du sang (tels que la warfarine), informez votre médecin pour savoir si vous avez besoin d'effectuer des analyses sanguines supplémentaires.
- Si vous prenez d'autres antibiotiques (tels que les tétracyclines) AXIMYCINE® peut être moins efficace.
- Si vous prenez du méthotrexate (utilisé dans le traitement de cancer et du psoriasis sévère) AXIMYCINE® peut provoquer une augmentation des effets indésirables.

14 comprimés dispersibles

PPV 64DH10

LOT 2N0052

EXP 04/2025

planifiez de

avant de

réactions à

capacité à

ez bien.

ne pour les

d'administration et

surez ou traitement.

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Répartissez les prises de manière régulière au cours de la journée ; elles doivent être espacées d'au moins 4 heures.

Poudre pour suspension buvable :

- Agitez bien le flacon avant chaque utilisation.
- Utilisez la cuillère-mesure fournie avec le flacon.

Comprimés dispersibles :

• Faites dissoudre complètement chaque comprimé dans un verre d'eau et bien remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Avaler immédiatement le mélange.

Posologie habituelle :

Enfants pesant moins de 40 kg

Les posologies sont déterminées en fonction du poids de l'enfant en kilogrammes.

• Votre médecin vous indiquera la quantité d'AXIMYCINE® que vous devez administrer à votre bébé ou votre enfant.

• La posologie habituelle est de 40 mg à 90 mg par kilogramme de poids corporel et par jour, à administrer en deux ou trois prises

• La dose maximale recommandée est de 100 mg par kilogramme de poids corporel et par jour

Adultes, patients âgés et enfants pesant 40 kg ou plus

La suspension n'est habituellement pas prescrite aux adultes et aux enfants pesant moins de 40 kg. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

La posologie habituelle d'AXIMYCINE® est de 250 mg à 500 mg trois fois par jour ou 4 g par jour, à 90 g toutes les 12h, selon la sévérité et le type d'infection.

• Infections sévères : 750 mg à 1 g trois fois par jour.

• Maladie de Lyme (infection transmise par des parasites appelés tiques) : 4 g par jour, manifestations systémiques (phase tardive - avec des symptômes plus graves ou quand la maladie est étendue à tout le corps) : jusqu'à 6 g par jour.

• Ulcère de l'estomac : 750 mg ou 1 g deux fois par jour pendant 7 jours avec d'autres antibiotiques et médicaments destinés à traiter les ulcères de l'estomac.

• Pour prévenir les infections cardiaques destinées à traiter les ulcères de l'estomac. La posologie varie selon le type de chirurgie. D'autres médicaments peuvent également être administrés simultanément. Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère pourra vous donner plus de détails.

• La dose maximale recommandée est de 6 g par jour

Problèmes rénaux

Si vous souffrez de problèmes rénaux, la posologie pourra être diminuée par rapport à la posologie habituelle.

Pendant combien de temps faut-il prendre AXIMYCINE® ?

• Vous devez continuer de prendre AXIMYCINE® aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit, même si vous vous sentez mieux. Toutes les doses sont importantes pour combattre l'infection. Si certaines bactéries devaient survivre, elles pourraient être à l'origine d'une réapparition de l'infection.

• Une fois que vous avez fini votre traitement, si vos symptômes persistent, consultez de nouveau le médecin.

Des mycoses (infections à levures apparaissant sur les zones humides du corps qui peuvent causer des douleurs, des démangeaisons et des peines blanches) peuvent se développer si AXIMYCINE® est utilisé pendant une longue période. Si c'est votre cas, informez-en votre médecin.

Si vous prenez AXIMYCINE® pendant une longue période, votre médecin pourra réaliser des analyses supplémentaires pour surveiller que vos reins, votre foie et votre rein fonctionnent normalement.

• Si vous avez pris plus d'AXIMYCINE® que vous n'auriez dû (Symptômes et conduite à tenir en cas de surdosage)

FORMES ET PRÉSENTATIONS :

Comprimé dosé à 250 mg de clarithromycine - Boîte de 14.

Comprimé dosé à 500 mg de clarithromycine - Boîte de 14.

COMPOSITIONS :

Clarithromycine 250 mg
Excipients q.s.p. 1 comprimé

Pelliculage : opadry, colorant jaune de quinoléine.

PROPRIÉTÉS :

Antibiotique de la famille des macrolides.

INDICATIONS :

Traitements des infections dues aux germes définis comme sensibles dans les mani-

- Sinusites aiguës.

- Exacerbations des bronchites chroniques.

- Pneumopathies communautaires non sévères.

- Traitement curatif des infections à *Mycobacterium avium* chez les patients infectés.

- Angines documentées à streptocoque A bêta-hémolytique.

- Surinfections des bronchites aiguës.

- Infections cutanées bénignes.

- Infections stomatologiques.

- En association à un autre antibiotique et à un antisécrétor pour les infections gastroduodénale.

CONTRE-INDICATIONS :

Absolues :

- Hypersensibilité à la clarithromycine ou à

- Allergie aux macrolides.

- Alcaloïdes de l'ergot de seigle (dihydroergo-

Relatives :

- Bromocriptine, cabergoline et pergolide, ta-

- Grossesse et allaitement.

POSÉOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

- Angines : 500 mg/j, en 2 prises pendant 5 j

- Infections stomatologiques et cutanées : 50

- Infections bronchiques : 500 mg à 1 g/j en 1

- Sinusites aiguës, pneumopathies, bronchiq

- Eradication de *Helicobacter pylori* : 500 mg à

matin et soir pendant 7 jours. La trithérapie s

- Respecter la prescription médicale.

- Avaler les comprimés avec un verre d'eau de

ADAPTATION DE LA POSÉOLOGIE :

- Chez les insuffisants rénaux (clairance de créa

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde :

- Tenir compte de la possibilité de survenue de coll.

- Associer obligatoirement la clarithromycine à d'autres antibiotiques.

- Ne pas associer la clarithromycine à d'autres médicaments oto-toxiques, et en particulier les aminosides.

Précautions d'emploi :

- En cas de survenue d'acouphènes ou de baisse de l'acuité auditive, un audiogramme devra être réalisé en plus d'une

modification posologique.

- Insuffisance hépatique sévère.

- Insuffisance rénale sévère.

- Prendre en compte la possibilité de résistance croisée entre la clarithromycine et les autres macrolides, et d'autres antibiotiques

telles que la lincomycine et la clindamycine.

En cas de doute, demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

CLARIL® est un médicament, ne pas laisser à la portée des enfants.

SURDOSSAGE :

En cas de surdosage, un lavage gastrique et un traitement symptomatique s'imposent.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- Manifestations digestives : nausées, vomissements, gastralgies, diarrhée.

- Candidose buccale, glossite, stomatite.

- Manifestations cutanées allergiques.

- Hépatite cholestastique due à une augmentation transitoire des transaminases ASAT-ALAT.

- Des cas d'acouphènes et d'hyposiacousie dus à une posologie > à 1 g/j sur des périodes de traitement prolongées, réversibles

à l'arrêt du traitement.

- Rares cas de dysgueusies.

- Colorations dentaires réversibles avec des soins dentaires.

Tout autre effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice devra être signalé systématiquement à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

CLARIL® est déconseillé pendant la grossesse sauf nécessité absolue.

Interrompre l'allaitement en cas de survenue de troubles digestifs chez le nouveau-né allaité.

En cas de prise de cisapride par le nouveau-né allaité, la clarithromycine est formellement interdite.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Associations contre-indiquées : Alcaloïdes de l'ergot de seigle vasoconstricteurs, Cisapride, Pimozide, Bépridil, Mizolastine.

Associations déconseillées : Agonistes dopaminergiques, Ebastine, Tacrolimus, Toltérodine, Halofantrine.

Associations nécessitant des précautions d'emploi : Anticoagulants oraux, Ciclosporine, Digoxine, Midazolam, Triazolam, Rifabutine, Atorvastatine, Cérvastatine, Simvastatine, Carbamazépine, Antiprotéases (indinavir, ritonavir), Disopyramide.

Associations à prendre en compte : Théophylline (base et sels) et Aminophylline.

CONDITIONS DE CONSERVATION : A conserver à une température ne dépassant pas 25 C.

LISTE I - Délivré uniquement sur ordonnance.

- Comprimé à 250 mg Boîte de 14 : AMM N : 100/14 DMP/21/NCF

- Comprimé à 500 mg Boîte de 14 : AMM N : 101/14 DMP/21/NCF

Date de révision de la notice : Avril 2012

كلا

Lot: J3593
Per: 11/24

قرصا 14

عن طريق الفم

INexium 20 mg, comprimé

INexium 40 mg, comprimé

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament car elle contient

des informations

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, consultez un pharmacien.
- Ce médicament n'est pas destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, sauf sur ordonnance de votre médecin.
- Si vous recevez ce médicament à la pharmacie, vérifiez que l'emballage correspond à celui de cette notice.

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que INexium ?
2. Quelles sont les indications ?
3. Comment prendre INexium ?
4. Quels sont les effets secondaires ?
5. Comment conserver INexium ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

EXP 10-2025
LOT ZEHT

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubair benn al eswari roches
noires casablanca

INEXIUM

20 mg Cpr GR

Boîte 14

640/15DMP/21/NRQ P.P.V: 82,10 DH

6 118001 020591



1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé ?

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

INexium 20 mg, comprimé

INexium 40 mg, comprimé

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, consultez un pharmacien ou un professionnel de la santé.
- Ce médicament n'est pas destiné aux personnes âgées de moins de 12 ans.
- Si vous recevez ce médicament d'un pharmacien, assurez-vous qu'il a bien lu cette notice.

EXP 10-2025
LOT ZEHT

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubair benn al eswari roches
noires casablanca

INEXIUM

20 mg Cpr GR

Boîte 14

640/15DMP/21/NRQ P.P.V: 82,10 DH



6 118001 020591

Que contient ce médicament ?

1. Qu'est-ce que INexium ?
2. Quelles sont les indications ?
3. Comment prendre INexium ?
4. Quels sont les effets secondaires ?
5. Comment conserver INexium ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations



1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé ?

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

INexium 20 mg, comprimé

INexium 40 mg, comprimé

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament car elle contient

des informations

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, consultez un pharmacien ou un autre professionnel de la santé.
- Ce médicament n'est pas destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus.
- Si vous recevez ce médicament de votre pharmacien, assurez-vous que c'est la bonne dose et la bonne forme.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium ?
2. Quelles sont les indications ?
3. Comment prendre INexium ?
4. Quels sont les effets secondaires ?
5. Comment conserver INexium ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

EXP 10-2025
LOT ZEHT

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubair benn al eswari roches
noires casablanca

INEXIUM

20 mg Cpr GR

Boîte 14

640/15DMP/21/NRQ P.P.V: 82,10 DH

6 118001 020591



1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé ?

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.

INexium 20 mg, comprimé

INexium 40 mg, comprimé

ésoméprazole

Veuillez lire attentivement la notice avant de prendre ce médicament car elle contient

des informations

- Gardez cette notice.
- Si vous avez des questions, consultez un pharmacien ou un autre professionnel de la santé.
- Ce médicament n'est pas destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus.
- Si vous recevez ce médicament de votre pharmacien, assurez-vous que c'est la bonne dose et la bonne forme.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que INexium ?
2. Quelles sont les indications ?
3. Comment prendre INexium ?
4. Quels sont les effets secondaires ?
5. Comment conserver INexium ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

EXP 10-2025
LOT ZEHT

SYNTHEMEDIC

22 rue zoubair benn al eswari roches
noires casablanca

INEXIUM

20 mg Cpr GR

Boîte 14

640/15DMP/21/NRQ P.P.V: 82,10 DH

6 118001 020591



1. Qu'est-ce que INexium et dans quel cas est-il utilisé ?

INexium contient un médicament appelé ésoméprazole. Celui-ci appartient à un groupe de médicaments appelé "inhibiteurs de la pompe à protons". Ceux-ci agissent en diminuant la quantité d'acide produite par l'estomac.

INexium est utilisé dans le traitement des affections suivantes :

Adultes

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.
- Ulcères gastriques dus à des médicaments appelés AINS (médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens). INexium est également indiqué dans la prévention des ulcères gastriques associés à la prise d'AINS.
- Acidité gastrique accrue due à une tumeur au niveau du pancréas (syndrome de Zollinger- Ellison).
- Poursuite du traitement après la prévention d'une récidive hémorragique d'ulcères avec INexium par voie intraveineuse.

Adolescents âgés de 12 ans et plus

- «La maladie du reflux gastro-oesophagien» (RGO). L'acide provenant de l'estomac remonte au niveau de l'œsophage (le tube qui relie la gorge à l'estomac) et entraîne douleur, inflammation et brûlures d'estomac.
- Ulcères de l'estomac ou de la partie supérieure de l'intestin qui sont infectés par une bactérie nommée «*Helicobacter pylori*». Si vous souffrez de cette affection, votre médecin peut également vous prescrire des antibiotiques pour traiter cette infection et guérir l'ulcère.