

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de réeducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- | | |
|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Réclamation | : contact@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Prise en charge | : pec@mupras.com |
| <input type="checkbox"/> Adhésion et changement de statut | : adhesion@mupras.com |

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 0770

Société : Royal Air Maroc

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

HAMRI Abdesslam

Date de naissance :

24.10.41

Adresse :

Lotis charouit Colombe

B.P. 6079 Val Fleuri, TANGER

Tél. : 05 08 53 21 32

Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. HADDAD HACHIMI Med.
Médecine Générale
63, Rue de Hollande N°1
Tél. : 05 29 93 85 05 - Tanger

Date de consultation : 22.01.2023

Nom et prénom du malade : BENNANI Amina

Age:

Lien de parenté :

lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Talgasie

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Tanger

Le : 12.09.2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
22/08/2023	C.A.	1	20.25	<i>DR. HADDAD HACHIMI Med. 63, Rue de la Généralata, 100-101 DOSSARD HACHIMI Med. 63, Rue de la Généralata, 100-101</i>
23/08/2023	C.A.	1	20.25	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Pharmacie Soufia Bkair Tanger Sidi Aïtar Tanger ICE: 00296602500040 INPE: 102054613 TEL: 05 39 93 34 25	23.08.2023	467.40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
AMS Docteur BERNARD AVDEES et 23 mai 2029 0272 163000771	22.10.2023	P 20.0	285 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				Coefficient des travaux														
				Montants des soins														
				Début d'exécution														
				Fin d'exécution														
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
				Coefficient des travaux														
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> </table>		H	G	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B	B		Montants des soins
H	G																	
25533412	21433552																	
00000000	00000000																	
D	G																	
00000000	00000000																	
35533411	11433553																	
B	B																	
	<p>[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession</p>			Date du devis														
				Date de l'exécution														

Dr. Mohammed HADDAD HACHIMI
MEDECINE GENERALE
63 Rue de Hollande N°1
Tel : 05 39 93 85 05
TANGER

الدكتور محمد الحداد الهاشمي
الطب العام
63 شارع هولندة رقم 1
الهاتف 05.39.93.85.05
طنجة

22.08.2023

Mme. BENNANI AMINA

TSH us

Dr. HADDAD HACHIMI Med.
Médecine Générale
63, Rue de Hollande N°1
Tél.: 05 39 93 85 05 - Tanger

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
LIAMS Docteur BENNANI A.
Angie Av de Fés et 29 Rue Md Abdou
TANGER Tél.: 0539 937452 / 938477

Dr. Mohammed HADDAD HACHIMI
MEDECINE GENERALE
63 Rue de Hollande N°1
Tel : 05 39 93 85 05
TANGER

الدكتور محمد الحداد الهاشمي
الطب العام
شارع هولندة رقم 1
الهاتف 05.39.93.85.05
طنجة



Nom : Bennani amina

Date : 23/08/2023

21.50 x 2

S.V

1/3] Migralgine gélules : un(e) matin, midi et soir (2 boites)

S.V

2/3] Créstor cp 5 mg : un(e) cp. le soir QSP trois mois

114.10 x 3

✓

3/3] Inexium cp 20 : un(e) cp. le matin QSP un(e) mois

82.10

46x.40

CW

Dr. HADDAD HACHIMI Med.
Médecine Générale
63, Rue de Hollande N°1
Tél: 05 39 93 85 05 - Tanger



Ce médicament contient du paracétamol, de la codeïne et de la caféine.
D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION).

• GROSSESSE-ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
Ce médicament passe dans le lait maternel, en conséquence l'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement.

**SI VOUS DECOUVREZ QUE VOUS ETES ENCEINTE PENDANT LE TRAITEMENT,
CONSULTEZ VOTRE MEDECIN CAR LUI SEUL PEUT JUGER DE LA NECESSITE DE LE
POURSUIVRE.**

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE
L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

• CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'attention des utilisateurs de machines et des conducteurs de véhicules est attirée sur les risques de somnolence liés à l'emploi de ce médicament.

Ce phénomène s'atténue après plusieurs prises.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

• SPORTIFS

Sportifs, attention, ce médicament contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

• COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

POSOLOGIE

RESERVE A L'ADULTE

1 gélule à avaler avec un verre d'eau, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures ; éventuellement, 2 gélules en une prise, en cas de douleur sévère, sans dépasser 6 gélules par jour.
CE MEDICAMENT VOUS A ETE DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE LE CONSEILLEZ PAS A UNE AUTRE PERSONNE.

• MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

VOIE ORALE

• FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE

Les prises doivent être espacées de 4 heures au minimum.

• DUREE DU TRAITEMENT

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

• CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenez votre médecin ou dirigez-vous vers un centre spécialisé.

• EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Liés à la présence de codeïne : constipation, somnolence, états vertigineux, nausées, vomissements, gêne respiratoire, réactions cutanées, rétrécissement de la pupille, difficulté à uriner.
- Liés à la présence du paracétamol : dans certains cas rares, il est possible que survienne une réaction allergique avec une éruption cutanée : il faut immédiatement arrêter la prise de ce traitement et avertir votre médecin.
- Liés à la présence de caféine : il est possible que ce médicament vous provoque excitation, insomnie, et palpitations.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE, ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

• CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 30°C et à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.



MIGRALGINE®

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.

■ COMPOSITION

PARACETAMOL	400,0 mg
CAFEINE	62,5 mg
PHOSPHATE DE CODEINE	
HEMIHYDRATE	20,0 mg

pour une gélule

Excipient à effet notoire : lactose

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

MIGRALGINE®
18 GELULES



6 118000 040538

MIGRALGINE®

Le médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
cas de sensibilité à l'un des composants.

Maladie grave du foie.

Suffisance respiratoire quelque soit son importance.

Enfants de moins de 15 ans.

Allaitement (Cf. Grossesse et Allaitement).

- En association avec des médicaments contenant de la buprénorphine, de la nalbuphine ou de la pentazocine .

Ce médicament NE DOIT généralement pas être utilisé SAUF AVIS CONTRAIRE DE VOTRE MEDECIN en association avec l'alcool ou des médicaments contenant de l'alcool, ou en cas de traitement par l'enoxacine (antibiotique).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

• MISES EN GARDE SPECIALES

- Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.
- Certaines douleurs peuvent ne pas être soulagées par ce médicament, demandez l'avis de votre médecin.

• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant de prendre ce médicament, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- La prise de boissons alcoolisées pendant ce traitement est déconseillée.
- Compte tenu de la présence de caféine, ce médicament peut entraîner des insomnies, en conséquence, il convient d'éviter les prises en fin de journée.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

• INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine, la pentazocine ou l'enoxacine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.



Ce médicament contient du paracétamol, de la codeïne et de la caféine.
D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION).

• **GROSSESSE-ALLAITEMENT**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.
Ce médicament passe dans le lait maternel, en conséquence l'allaitement est contre-indiqué pendant le traitement.

SI VOUS DECOUVREZ QUE VOUS ETES ENCEINTE PENDANT LE TRAITEMENT,
CONSULTEZ VOTRE MEDECIN CAR LUI SEUL PEUT JUGER DE LA NECESSITE DE LE
POURSUIVRE.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE
L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.

• **CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES**

L'attention des utilisateurs de machines et des conducteurs de véhicules est attirée sur les risques de somnolence liés à l'emploi de ce médicament.
Ce phénomène s'atténue après plusieurs prises.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.

• **SPORTIFS**

Sportifs, attention, ce médicament contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

• **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**

POSOLOGIE

RESERVE A L'ADULTE

1 gélule à avaler avec un verre d'eau, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures ;
éventuellement 2 gélules en une prise, en cas de douleur sévère, sans dépasser 6 gélules par jour.
CE MEDICAMENT VOUS A ETE DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE LE CONSEILLEZ PAS A UNE AUTRE PERSONNE.

• **MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION**

VOIE ORALE

• **FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE**

Les prises doivent être espacées de 4 heures au minimum.

• **DUREE DU TRAITEMENT**

Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.

• **CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSSAGE**

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenez votre médecin ou dirigez-vous vers un centre spécialisé.

• **EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES
ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Liés à la présence de codeïne : constipation, somnolence, états vertigineux, nausées, vomissements, gêne respiratoire, réactions cutanées, rétrécissement de la pupille, difficulté à uriner.
- Liés à la présence du paracétamol : dans certains cas rares, il est possible que survienne une réaction allergique avec une éruption cutanée : il faut immédiatement arrêter la prise de ce traitement et avertir votre médecin.
- Liés à la présence de caféine : il est possible que ce médicament vous provoque excitation, insomnie, et palpitations.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE, ET GENANT QUI NE SERAIT PAS
MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

• **CONSERVATION**

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 30°C et à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.



bottu s.a

82, Allée des Casuarinas - Ain Sébâa - Casablanca
S. Bachouchi - Pharmacien Responsable

MIGRALGINE®

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre,
même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

• COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

PARACETAMOL 400,0 mg
CAFFÉINE 62,5 mg

PHOSPHATE DE CODEINE HEMIHYDRATE 20,0 mg

Excipients : silice colloïdale anhydre, lactose monohydraté, monostéarate de glycérol, pour une gélule*
*Composition de l'enveloppe de la gélule : inositoline (E-132), jaune de quinoléine (E-

■ COMPOSITION

PARACETAMOL 400,0 mg

CAFFÉINE 62,5 mg

PHOSPHATE DE CODEINE

HEMIHYDRATE 20,0 mg

pour une gélule

Excipient à effet notoire : lactose

NE PAS LAISSER À LA PORTEE DES ENFANTS

MIGRALGINE®

18 GELULES



6 118000 040538

MIGRALGINE®

Ne pas boire avec l'alcool ou des médicaments contenant de l'alcool, ou en cas de traitement par l'énoxacine (antibiotique).

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

• MISES EN GARDE SPECIALES

- Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée en raison du risque de dépendance.
- Certaines douleurs peuvent ne pas être soulagées par ce médicament, demandez l'avis de votre médecin.

• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant de prendre ce médicament, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave des reins ou du foie.
- La prise de boissons alcoolisées pendant ce traitement est déconseillée.
- Compte tenu de la présence de caféine, ce médicament peut entraîner des insomnies, en conséquence, il convient d'éviter les prises en fin de journée.

EN CAS DE DOUCE NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

• INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec la buprénorphine, la nalbuphine, la pentazocine ou l'énoxacine, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.



PPV : 21DHE
PER : 05/25
LOT : M1706

Il vous est recommandé de prendre des statines, car parfois un régime alimentaire adapté et une activité physique ne suffisent pas à corriger votre taux de cholestérol. Vous devez poursuivre le régime hypocholestérolémiant et l'activité physique en même temps que la prise de CRESTOR.

- Ou
- Vous avez d'autres facteurs qui augmentent votre risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs.

Une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé liés à ces facteurs peuvent être causés par une maladie appelée l'athérosclérose. L'athérosclérose est due à une accumulation de dépôts de graisse dans vos artères.

Pourquoi il est important de continuer de prendre CRESTOR : CRESTOR est utilisé pour corriger le taux de substances grasses dans le sang appelées lipides, le plus fréquent étant le cholestérol. Il y a différents types de cholestérol trouvé dans le sang : le « mauvais cholestérol » (LDL-C) et le « bon cholestérol » (HDL-C). CRESTOR peut réduire le « mauvais cholestérol » et augmenter le « bon cholestérol ». Il aide également l'aptitude de votre corps à faire circuler le sang.

Par contre, pour certaines personnes, un taux de cholestérol élevé n'a pas de symptômes sur la façon dont elles se sentent parce que cela n'entraîne pas de symptôme. Cependant, sans traitement, des dépôts graisseux peuvent s'accumuler sur la paroi des vaisseaux sanguins et réduire leur diamètre.

Parfois, ce rétrécissement des vaisseaux peut empêcher le passage du sang jusqu'au cœur ou au cerveau conduisant à une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

En diminuant votre taux de cholestérol, vous pouvez réduire le risque d'avoir une attaque cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou des problèmes de santé qui y sont liés.

Il est très important de continuer à prendre CRESTOR, même si votre taux de cholestérol revient à la normale, parce qu'il prévient la remontée de votre taux de cholestérol et donc l'accumulation de dépôts de graisse. Cependant, vous devez arrêter votre traitement si votre médecin vous le dit, ou si vous découvrez que vous êtes enceinte.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CRESTOR, comprimé pelliculé ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre CRESTOR.

- Si vous avez des problèmes hépatiques ;
- Si vous avez des problèmes rénaux ;
- Si vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexplicables, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol : contactez immédiatement votre médecin si vous avez des douleurs musculaires inexplicables particulièrement si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez de la fièvre ; informez également votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une faiblesse musculaire qui est constante.
- Si vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Si vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Si vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant le taux de cholestérol appelé fibrate ; veuillez consulter les informations contenues dans la notice ; et ce, même si vous avez déjà pris dans le passé un médicament qui abaisse le taux de cholestérol ;
- Si vous prenez un médicament pour traiter l'infection au VIH, par exemple du ritonavir avec lopinavir et/ou atazanavir, reportez-vous à la rubrique « Autres médicaments et CRESTOR » ;
- Si vous prenez ou avez pris durant les 7 derniers jours un médicament appelé acide fusidique (un médicament contre les infections bactériennes), par voie orale ou par injection. L'association d'acide fusidique et de CRESTOR peut causer de graves problèmes musculaires (rhabdomyolyse). Reportez-vous à la rubrique « Autres médicaments et CRESTOR ».
- Si vous avez plus de 70 ans (votre médecin a besoin de choisir la dose initiale de CRESTOR adaptée pour vous) ;
- Si vous avez une insuffisance respiratoire grave ;
- Si vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) (votre médecin a besoin de choisir la dose initiale de CRESTOR adaptée pour vous).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute) :

- Vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (le dosage le plus élevé) ; vous devez vérifier avec votre médecin ou pharmacien la dose de CRESTOR avant de débuter le traitement.

Chez un petit nombre de sujets, les statines peuvent avoir un effet sur le foie, ceci est identifié par un simple test de recherche d'augmentation des enzymes du foie dans le sang. Pour cette raison, votre médecin pratiquera habituellement un test sanguin (bilan hépatique) avant traitement et au cours du traitement.

30 comprimés pelliculés
Voie Orale

5 mg

Maphar
Bd Moknha N° 6, Ql.
sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 599 57854 520
P.P.V : 6 118001 183102

UTILISATEUR

imé pelliculé
primé pelliculé
imprimé pelliculé

statine

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

CRESTOR®

rosuvastatine

1. QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. Quels sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase -
code ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

- Vous avez été prescrit parce que : Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé,

30 comprimés pelliculés
Voie Orale

5 mg

Maphar
Bd Moknha N° 6, Ql.
sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 599 57854 520
P.P.V : 6 118001 183102

UTILISATEUR

imé pelliculé
primé pelliculé
imprimé pelliculé

statine

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

CRESTOR®

rosuvastatine

1. QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. Quels sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase -
code ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

- Vous avez été prescrit parce que : Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé,

30 comprimés pelliculés
Voie Orale

5 mg

Maphar
Bd Moknha N° 6, Ql.
sidi Bernoussi, Casablanca
Crestor 599 57854 520
P.P.V : 6 118001 183102

UTILISATEUR

imé pelliculé
primé pelliculé
imprimé pelliculé

statine

Ne prenez jamais CRESTOR, comprimé pelliculé :

- Si vous êtes allergique à la rosuvastatine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, arrêtez immédiatement le traitement et prévenez votre médecin ; il convient de prendre un contraceptif approprié pour éviter d'être enceinte pendant le traitement par CRESTOR.
- Si vous avez actuellement des problèmes hépatiques.
- Si vous avez des problèmes rénaux graves (si vous avez un doute, demandez à votre médecin).
- Si vous avez des troubles musculaires appelés myopathie (douleurs musculaires répétées ou inexpliquées).
- Si vous prenez de la cyclosporine (utilisée par exemple lors de greffes d'organes).

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

De plus, vous ne devez pas prendre 40 mg de CRESTOR (dosage le plus élevé) si :

- Vous avez une insuffisance rénale modérée (en cas de doute, demandez à votre médecin) ;
- Vous avez des troubles de la thyroïde ;
- Vous avez des douleurs musculaires répétées ou inexpliquées, des antécédents personnels ou familiaux de problèmes musculaires ou si vous avez déjà présenté des douleurs musculaires avec un autre médicament abaissant les taux de cholestérol ;
- Vous consommez régulièrement des quantités importantes d'alcool ;
- Vous êtes d'origine asiatique (japonais, chinois, philippin, vietnamien, coréen et indien) ;
- Vous êtes déjà traité par un autre médicament abaissant les taux de cholestérol appelé fibrate.

Si vous êtes concernés par l'une de ces situations (ou si vous avez un doute), parlez-en à votre médecin.

Avertissements et précautions

CRESTOR®

rosuvastatine

1. QU'EST-CE QUE CRESTOR, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. Quels sont les informations à connaître avant de prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CRESTOR, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CRESTOR, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de l'HMG-CoA réductase -
code ATC : C10A A07

CRESTOR appartient au groupe des médicaments appelés statines.

- Vous avez été prescrit parce que : Vous avez un taux élevé de cholestérol ce qui signifie que vous présentez un risque de faire une attaque cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. CRESTOR est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans et plus pour traiter un taux de cholestérol élevé,

L'information sur le dosage pour des enfants âgés de 1 à 11 ans est fournie dans l'information du produit INexium sachet (Consultez votre médecin ou pharmacien si vous désirez plus d'informations).

Autres médicaments et INexium

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance. INexium peut faire fonctionner certains médicaments et certains médicaments peuvent être décomposés par INexium.

INexium peut empêcher la décomposition d'un comprimé, si vous prenez un médicament qui contient du neflifavir (utilisé pour traiter la maladie de Kaposi ou le VIH).

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants : il est possible qu'ils soient utilisés pour traiter le virus du VIH).
Il est également possible que certains médicaments soient utilisés pour prévenir les caillots sanguins (notamment l'aspirine, de l'itraconazole ou du voriconazole (utilisés pour traiter des infections (voir rubrique "Effets secondaires") et des champignons).
INexium peut également être utilisé pour traiter le cancer.

INexium contient du saccharose

INexium contient des sphères de sucre qui contiennent du saccharose, un type de sucre. Si votre médecin vous a dit que vous êtes intolérant à certains sucres, vous devez prendre contact avec votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre INexium

Veillez toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

- Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin voudra vous contrôler (particulièrement si vous le prenez depuis plus d'un an).
- Si votre médecin vous a prescrit de prendre ce médicament quand vous en sentez le besoin, vous devez contacter votre médecin si les symptômes changent.

Quantité à prendre

- Votre médecin vous dira combien de comprimés vous devez prendre, et pour combien de temps. Ceci dépendra de votre état, de votre âge et de la manière dont fonctionne votre foie.
- Les doses recommandées sont mentionnées ci-dessous.

Utilisation chez les adultes âgés de 18 ans et plus

Traitement du brûlant causé par la maladie du reflux gastro-oesophagien (RGO) :

- Si votre médecin a diagnostiqué une lésion de votre oesophage, la dose

et des crampes.

- Agitation, confusion ou dépression.
- Troubles du goût.
- Troubles de la vue tels que vision trouble.
- Respiration sifflante soudaine ou souffle court (bronchospasme).
- Inflammation de l'intérieur de la bouche.
- Infection appelée « muguet » pouvant affecter l'intestin et provoquée par un champignon.
- Problèmes hépatiques incluant une jaunisse qui peut provoquer un jaunissement de la peau, une urine foncée et de la fatigue.
- Perte de cheveux (alopecie).
- Eruption cutanée lors d'exposition au soleil.
- Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).
- Sensation générale de malaise et manque d'énergie.
- Augmentation de la transpiration.

Très rare (peut affecter jusqu'à une personne sur 10 000)

- Changement du nombre de cellules sanguines incluant l'agranulocytose (déficit en globules blancs).
- Agressivité.

<https://contactazmedical.astrazeneca.com>

Vous devez également déclarer les effets indésirables directement au Centre antipoison et de Pharmacovigilance via : cap@sante.gov.ma

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver INexium

- Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
- A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le flacon après la mention EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
- A conserver dans l'emballage d'origine (plaquette) ou conserver le flacon soigneusement fermé à l'abri de l'humidité.
- Ne jetez aucun médicament avec les eaux usées ou les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient INexium

- La substance active est l'ésoméprazole. INexium comprimés gastro-résistants, lot

INexium® 20 mg
ésoméprazole

إينكسيوم® 20 من

14

comprimés
gastro-
résistants
Par voie orale

إزوميرازول

14

قرص صامد
لحموضة المعدة
عن طريق الفم

AstraZeneca

Tenir hors de la portée et de la vue
des enfants

Lire attentivement la notice avant
utilisation

Précautions particulières de conservation

A conserver à une température ne dépassant
pas 30 °C

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine

[INEX 20 / ANIIIA/1006.1]

احفظ هذا الدوا في مكان بعيد عن
تناول أبدي الأطفال و عن مرأتهم
قبل الاستعمال إقرأ بيان النشرة
العلمية
احتياطات خاصة بشأن الحفظ
الحفظ في مكان لا يتجاوز الحرارة
30 درجة مئوية
يجب حفظه في علبته الأصلية

القائمة II - فقط وفقاً لوصفة طبية
Liste II - UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE

RESPECTER LES DOSES PRESCRIPTIONS
احترم المقادير الموصوفة



* 3 5 5 3 3 3 7 *

رقم رخصة وضع الدوا في السوق المغربي/
N° AMM Maroc/ 640/15 DMP/21/NRQ

المواد الفاعلة في تركيب الدوا:
إزوميرازول 20.00.....
بصيغة إزوميرازول ماغنزيوم ثلاثي التمبيه
ك.ل. ج. قرص صامد لحموضة المعدة
السواغات: كمية كافية لقرص صامد لحموضة المعدة
السواغات ذات التأثير المعروف: سكارور
14 قرص صامد لحموضة المعدة

**Fabricant, Conditionneur et Libérateur/
الصانع المعين والمحرر:**
AstraZeneca AB

Gärtunavägen
SE-151 85 Söderälje-Suède

et
fois par
leur

mg : 40 mg :
est gravée
gravée
me de
telle que
on à 30%.
nitidine,
dioxycide de





المختبر الدولي للتحليلات الطبية والعلمية

LABORATOIRE INTERNATIONAL D'ANALYSES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES

Docteur BENNANI Abdelmalek

Docteur d'Etat ès Sciences en Microbiologie

CES : Bactériologie - Virologie - Immunologie
Hématologie - Parasitologie - Mycologie

DESS Toxicologie

Ex Attaché des Hôpitaux de France

Madame BENNANI AMINA

Le 22/08/23 - Référence : 23HB8

Docteur M. HADDAD HACHIMI

Page : 1/1

HORMONOLOGIE SANGUINE (Automate Immuno-Enzymologie)

Normales Antériorités

■ TSH US (3ème génération) -----: 1,038 µUI/ml 0,25 - 5

Hyperthyroïdie: inf à 0,15 Hypothyroïdie: Sup à 7

LIAMS * TAMER
Docteur BENNANI A

**LABORATOIRE INTERNATIONAL D'ANALYSES MEDICALES ET SCIENTIFIQUES
- LIAMS -**

BENNANI A. Docteur d'Etat
es Sciences en Microbiologie
Ex attaché des Hôpitaux de France

Angle avenue de Fès & 29 Rue Mohamed Abdou

TANGER

Tél. : 0539 93 74 52 / 0539 93 84 77 - Fax : 0539 93 88 56

CES Bactériologie - Virologie - Immunologie
Hématologie - Parasitologie - Mycologie
DESS Toxicologie

CNSS : 1186023
Id Fiscal : 80980910
INPE : 163000771
ICE : 001641594000045
Patente : 50122428

Tanger le 22 août 2023

Madame BENNANI AMINA

FACTURE N°	133001
------------	--------

Analyses :

TSH Contrôle -----	B	200	Total : B 200
--------------------	---	-----	---------------

Prélèvements :

Sang-----	Pc	2	
-----------	----	---	--

TOTAL DOSSIER	285,00 DH
----------------------	------------------

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Deux Cent Quatre vingt Cinq Dirhams

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
LIAMS Docteur **BENNANI A.**
Angle Av de Fès et 29 Rue Md Abdou
TANGER Tel : 0539 937452 / 938477